

ASL (Algebras with straightening laws) は

関するいくつかの結果.

名工大 渡辺 敏一

## 序

ASL の概念は不变式論にあらわれた "straightening formula" を公理化したもので、不变式論に於ては、[2], [5] に見られるように、「 $G$  が半単純代数群、 $P$  をその極大 parabolic subgroup,  $X$  を  $G/P$  の Schubert subvariety,  $\mathcal{L}$  を  $G/P$  上の ample, <sup>inv.</sup>sheaf とするとき、 $X$  の  $|\mathcal{L}|$  による埋め込みの同次座標環は Cohen-Macaulay, normal である」いう事実の証明に寄与している。

一方では、ASL は 多項式環をいくつかの square-free な monomials から生成される ideal で割って得られるような環 (Stanley-Reisner 環と最近呼ばれる) の flat deformation となつてゐる。flat deformation で Cohen-Macaulay, Gorenstein 等の性質が保存される事に注目した公理化は [3], [1] 等に見られる。

ここで筆者が扱いたいと思うのは ASL という公理の

下にどこまでの事が云えるかを見てみようというもってある。ある公理が与えられたとき、より簡単な場合からつめて、てその公理のもう意味を探そうという方法は自然なものと思うが、ここでは一番簡単な2次元整域の場合の構造決定および3次元のいくつかの例などから、ASLの性質を探してみたい。現在の段階としては ASL というカテゴリーや市民権を得るかどうかまだわからぬ状態だが、大雑把ながらもある（関係式をたくさんもつ）環がある partially ordered set という比較的構造の単純なものと結びつけて書かれるという事は何かの意味があるのではないかと思う。

### §1. 定義と簡単な性質の復習。

$H$  を finite partially ordered set (以下 poset 略す),  $R$  の環 (1をもつ可換環),  $A$  を  $R$ -algebra とする。今,  $H$  が  $A$  の subset となるとき,  $H$  の元の積を monomial,  $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$  ( $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in H$ ) で  $\alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \dots \leq \alpha_n$  とみたすとき, この monomial を standard monomial であるという。

定義.  $A$  が ASL (algebra with straightening laws) on  $H$  over  $R$  とは, 次の (ASL-1), (ASL-2) をみたす事である。

(ASL-1)  $A$  は  $R$ -free module で standard monomials  $\in$

free basis としてもつ。

(ASL-2).  $\alpha, \beta \in H$ ,  $\alpha + \beta$  ( $\stackrel{\text{def.}}{\iff} \alpha \not\equiv \beta \wedge \beta \not\equiv \alpha$ ) であるとき,  $\alpha + \beta$  は standard でないから, standard monomials の和に一意的に表わされるべきである (ASL-1) より.)

$$\alpha + \beta = \sum_{i=1}^s r_i: \gamma_{i1} \gamma_{i2} \dots \gamma_{in_i} \quad (\gamma_{i1} \leq \gamma_{i2} \leq \dots \leq \gamma_{in_i}, r_i \in R)$$

をその表現とするとき, 各  $i$  につれて,  $\alpha \geq \gamma_{ii}$ ,  $\beta \geq \gamma_{ii}$ ,  $n_i \geq 1$ .

(1.2). (i)  $\alpha + \beta$ ,  $\alpha, \beta \geq \gamma$  なる  $\gamma \in H$  が存在しないとき,

$$\alpha \cdot \beta = 0.$$

(ii)  $I \subset H$  が 「 $\alpha \in I, \beta \leq \alpha \Rightarrow \beta \in I$ 」 をみたすとき, poset ideal という。A が ASL on H over R,  $I \subset H$ : poset ideal, (I) を I で生成される A の ideal とすると,  $A/(I)$  は ASL on  $H \setminus I$ , over R となる。 $\alpha \in H$  のとき,

$$I_\alpha = \{ \beta \in H \mid \beta \not\equiv \alpha \} \text{ とおくと,}$$

$I_\alpha$  は poset ideal。 $H_\alpha = H \setminus I_\alpha = \{ \beta \in H \mid \beta \geq \alpha \}$  とおくと  $A/(I_\alpha)$  は poset  $H_\alpha$  上の ASL となる。特に  $\alpha$  が H の極大元であるとき,  $H_\alpha = \{\alpha\}$ ,  $A/(I_\alpha) \cong R[\alpha]$  (R 上の一変数多項式環)。

の考え方。

$H_\alpha$  は A の元を表す他に, A のある ideal (又は  $\text{Spec}(A)$  の closed subset) と対応しているという事実を注目した。

(1.3) (いくつかの基本的性質)  $R = k$ : 1体とする。

$$(i) \dim A = (H \text{ の max. chain の長さ}) + 1$$

(ii)  $A$  は常に reduced.

(iii)  $\mathbb{K}[H] = \mathbb{K}[x_\alpha | \alpha \in H] / (x_\alpha x_\beta | \alpha + \beta)$  とおくと,  $\mathbb{K}[H]$

$\mathbb{K}[H]$  が Cohen-Macaulay (resp. Gorenstein, locally complete intersection) ならば  $\forall \alpha \in H$  を含む  $A$  の maximal ideal  $m$  に  
ついて  $A_m$  が同じ性質をもつ. 特に,  $A$  が graded ring で  $H$  の各元が homogeneous で  
あるときの degree が  $\geq 1$  とすると,  $A$  は Cohen-Macaulay (resp. ... ) である.

(iv)  $A$  が graded ring,  $H$  の各元の degree がすべて  $\geq 1$  とすると  
 $A$  の multiplicity  $= \#\{H \text{ の max. chain}\}$ .

( $\text{Proj}(A) = X \hookrightarrow \mathbb{P}^{|H|-1}$  とするとき,  $\deg X = (A \text{ の multiplicity})$ )

以下,  $A$  が graded ring で  $H$  の各元が homogeneous, LF の degree  
をもつ場合を考える. このとき單に「 $A$  は graded ASL」であ  
るという. 更に  $\forall \alpha \in H$ ,  $\deg \alpha = 1$  のとき「 $A$  は homogeneous  
ASL」であるという事にしよう.

$A$  が graded ASL のとき,  $A$  の Poincaré series を  
 $P(A, t)$  で表わす.  $P(A, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \dim A_n \cdot t^n$ . は次のよう  
に表わされる.

$$P(A, t) = \sum_{\substack{\alpha_1 \leq \dots \leq \alpha_s \\ \alpha_i \in H, s \geq 0}} \frac{t^{\deg \alpha_1 + \dots + \deg \alpha_s}}{(1 - t^{\deg(\alpha_1)}) \dots (1 - t^{\deg(\alpha_s)})}$$

(左辺は空集合を含む  $H$  の相異なる chain を除く).

(1.4)

$A$  が体  $\mathbb{K}$  上の graded ring,  $\dim A = d$ ,  $A = \bigoplus_{n=0}^{\infty} A_n = \mathbb{K}$  とおくとき,

$$\alpha(A) = \max \{ n \mid H_m^d(A)_n \neq 0 \}$$

と定めよ。(詳しくは [6] 参照) この不変量  $\alpha(A)$  について次の三つの事実を注意しておく。

(i)  $\alpha \in A_d$ ,  $\alpha$  は  $A$  の non-0-divisor のとき,

$$\alpha(A/\alpha A) = \alpha(A) + d. \quad \checkmark \text{ A は有限生成 } A' \text{-加群で }$$

(ii)  $A'$  が  $A$  の graded subring,  $A'$ -加群として  $A/A'$  の次元  $< \dim A'$  のとき,  $\alpha(A') \geq \alpha(A)$

(iii)  $A$  が Cohen-Macaulay のとき,  $P(A, t) = \frac{f(t)}{g(t)}$ ,

$f(t), g(t) \in \mathbb{Z}[t]$  とするとき,  $\alpha(A) = \deg(f(t)) - \deg(g(t))$ .

特に  $A$  が ASL on  $H$  over  $\mathbb{K}$  のとき,  $A$  が Cohen-Macaulay となる。

(iv)  $\alpha(A) \leq 0$ ,  $\alpha(A) < 0 \Leftrightarrow \tilde{\chi}(H) = 0$  但し,

$$\tilde{\chi}(H) = \sum_{s=-1}^{\infty} (-1)^s \cdot \#(H \text{ の長さ } s \text{ の chain}).$$

## § 2. 二次元 ASL domain

この節では  $A$  が graded ASL domain on  $H$  over  $\mathbb{K}$ ,  $\mathbb{K}$  は代数閉体とする。 $A$  は domain たる  $H$  は唯一つの minimal element  $\alpha$  をもつ。この事から  $H = \begin{bmatrix} \beta_1 & & & \\ 0 & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha \end{bmatrix}$

となる。二次元 graded ASL に関する主定理は、

定理 (2.1). (i)  $A$  は normal である。

(ii)  $A$  は rational singularity,  $\text{Proj}(A) \cong \mathbb{P}_k^1$ .

(iii)  $I_{\beta_i}$  の零点を  $a_i \in \mathbb{P}^1$  とする (便宜上  $a_i \neq \infty$  とする)。

$n \geq 3$  のとき,  $\deg \alpha = 1$  で,  $\deg \beta_i = d_i$  とおくと, (ASL-2) は

$$\beta_i \beta_j = \frac{1}{a_i - a_j} (\beta_i \cdot \alpha^{d_j} - \beta_j \alpha^{d_i})$$


の形となる。

(注) normal が云々たとき,  $A$  を表わす方法は, Demazure による 有理係数 divisor を用いるものと, resolution を与えるものとある。Demazure による  $A$  の表示は

$$A = R(\mathbb{P}^1, D), \quad D = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i} (a_i) \quad (R(\mathbb{P}^1, D) \text{ の表示})$$

については, [7] 参照)。

$\text{Spec}(A)$  の singularity の resolution の dual graph (J.



(証明).  $n = 1$  のとき  $A = k[\alpha, \beta_1]$ ,  $n = 2$  のとき

$$\beta_1 \beta_2 = \alpha \cdot f(\alpha, \beta_1) + \alpha \cdot g(\alpha, \beta_2) \quad (\text{ASL-2}).$$

$\deg \beta_1 \leq \deg \beta_2$  とすると,  $g$  は  $\beta_2$  に関して一次式。ゆえに,

$$\beta_1 \beta_2 = \alpha \cdot f(\alpha, \beta_1) + \beta_2 \cdot g(\alpha)$$

とおる。  $\beta'_1 = \beta_1 - g(\alpha)$  とおくと,  $\beta'_1 \beta_2 = \alpha \cdot f'(\alpha, \beta'_1)$ .

$F(x, y, z) = yz - x \cdot f(x, y)$  とおくと,  $F$  が既約なら,  
 $f(x, 0) \neq 0$ . こゝとさ  $(F, \frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z})$  は  $(x, y, z)$ -primary  
ideal なり,  $\mathbb{k}[x, y, z]/(F)$  は normal.

以下は  $n \geq 3$  とする. まず  $\deg \alpha = 1$  と仮定すると,

$$\alpha(A) = -\deg(\alpha) < 0 \quad (1.4). \quad H^2_m(A)_0 \cong H^1(X, \mathcal{O}_X) \quad (X = \text{Proj}(A)).$$

$\therefore H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$   $X$  は irreducible, reduced,  $\dim X = 1$  たゞし,  
 $X \cong \mathbb{P}^1_k$  ( $\cong \mathbb{P}^1_{k'} = \overline{k}$  を使う).  $A$  が normal を云うのは, 次の補  
題を使う.

補題.  $R$  は integral domain,  $x \in R$ ,  $x \neq 0$ .  $L \subset R/xR$  が  
reduced で  $R_x$  が normal たゞし  $R$  が normal.

今,  $A/\alpha A$  は ASL たゞし reduced.  $A_\alpha$  が normal を云うれば  $\alpha$   
が  $\mathbb{N}$ ,  $\text{Spec}((A_\alpha)_0) \stackrel{x=\text{Proj}(A)}{\cong} \text{affine open set } D_+(\alpha) \subset X \cong \mathbb{P}^1$   
なり normal.  $\therefore A_\alpha = (A_\alpha)_0[\alpha, \alpha^{-1}]$  が normal.

$A$  が normal graded ring たゞし  $A = R(\mathbb{P}^1, D)$  の形で書ける.  
 $\alpha \in A$ ,  $D$  は  $\alpha$  で決まる divisor とし  $\mathbb{Z}$  に.  $A/\alpha A$  は  
reduced.  $\deg \beta_j = d_j$  とおくと,  $V_+(I_{\beta_j}) = a_j$  とすとさ,  
 $D = \sum_{j=1}^n \frac{1}{d_j} \cdot (a_j)$ .  $\therefore A = \bigoplus_{n \geq 0} H^0(X, \mathcal{O}_X(nD)) \cdot T^n$ .  $\mathbb{k}(X) = \mathbb{k}(x)$  とす  
と,  $A = \mathbb{k}[T, \frac{1}{x-a_1} \cdot T^{d_1}, \dots, \frac{1}{x-a_n} \cdot T^{d_n}]$ . ( $\alpha = T$ ,  $\beta_j = \frac{1}{x-a_j} \cdot T^{d_j}$ ).  
 $\beta_i \beta_j = \frac{1}{a_i - a_j} (\beta_i \alpha^{d_j} - \beta_j \alpha^{d_i})$  たゞし  $T = L$ , (ASL-1) は部分分數展  
開の一意性から示される。

従って定理を証明するには、 $n \geq 3$ ,  $\deg \alpha \geq 2$ として矛盾を出せば良い。

$\bar{A}$  を  $A$  の正規化とする。 $\bar{A}$  は  $k$  上の graded ring である。

$$0 \rightarrow A \rightarrow \bar{A} \rightarrow \bar{A}/A \rightarrow 0$$

local cohomology long exact sequence とおくと、

$$H_m^2(A) \rightarrow H_m^2(\bar{A}) \rightarrow 0 = H_m^2(\bar{A}/A).$$

ゆえに、 $a(\bar{A}) \leq a(A) = -\deg \alpha \leq -2$ .  $a(\bar{A}) \leq -2$  ならば  $\bar{A}$  を分類して見よう。Demazure の記法により、([7] 参照)。

$$\bar{A} = R(X, D), \quad X = \mathbb{P}^1, \quad D = s \cdot (P) + \sum_{i=1}^r \frac{p_i}{q_i} \cdot (P_i)$$

とおく。但し  $P_1, \dots, P_r$  は  $\mathbb{P}^1$  の相異なる点、 $(P), (P_i)$  は対応する divisor,  $s \in \mathbb{Z}$ ,  $0 < p_i < q_i$  ( $i=1, \dots, r$ ),  $\deg D = s + \sum_{i=1}^r \frac{p_i}{q_i} > 0$

とする。[7] により、 $K_{\bar{A}}$  は次で与えられる。

$$K_{\bar{A}} \cong \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} H^0(X, \mathcal{O}(K_X + \sum_{i=1}^r \frac{q_i-1}{q_i} (P_i) + nD)). T^n$$

$a(\bar{A}) \leq -2$  より  $(K_{\bar{A}})_n = 0$  ( $n \leq -1$ ) である。 $n=1, -1$  に注目すると、

$$\deg (K_X + \sum_{i=1}^r \frac{q_i-1}{q_i} (P_i) + D) = -2 + s + r \leq -1$$

$$\deg (K_X + \sum_{i=1}^r \frac{q_i-1}{q_i} (P_i) - D) = -2 - s \leq -1$$

を得る。これと  $\deg D > 0$  である事より、 $r, s$  のとり得る値は次の如きに限られる。

$$(a) \quad r=2, \quad s=-1$$


$$(b) \quad r=1, \quad s=0$$

(c)  $x=0, s=1$  (このとき  $A$  は二度数多項式環).

点  $P_i$  はどこにいても  $\overline{A}$  としては同型だから, (a) の場合

$$D = \frac{P_1}{\beta_1} \cdot (\infty) + \frac{P_2 - q_2}{\beta_2} \cdot (0), \quad (a) \text{ のとき}, \quad D = \frac{P}{q} \cdot (\infty), \quad (c) \text{ のとき}$$

$D = (\infty)$  とおいて良い。いずれの場合も,  $k(x) = k(x)$  とおいて,  $R(x, D) = \overline{A} \subset k[x, T]$  である。さて, poset  $H$  は次のよう



として対応していき。ゆえに,  $\alpha^a / (\beta_i)^b$  が degree 0 にならなければ  $a, b$  をとると ( $a, b > 0$ ),  $\alpha^a / (\beta_i)^b$  は  $P_i$  で零である。従って

(1)  $\alpha^a$  が  $(\beta_i)^b$  より高位の零点を  $P_i$  でもつか又は

(2)  $(\beta_i)^b$  が  $\alpha^a$  より高位の極を  $P_i$  に持つてある

かいずれかの着である。上の場合で, まず (c) の場合を考えよう。

Case (c)  $x=0, s=1$ ;  $D=(\infty)$  のとき  $\overline{A}=k[T, xT]$ .

$a(\overline{A}) = -2 \leq a(A) = -\deg(\alpha)$ ,  $\deg \alpha > 1$  としよから,  $\deg \alpha = 2$ .

$\beta_i$  は  $\infty$  で上の (1), (2) の条件を考えよう。 $P_i \neq \infty$  のとき,

$A \subset \overline{A} \subset k[T, xT]$  だから,  $\alpha, \beta_i$  は  $P_i$  で正則。ゆえに  $\alpha$  は  $P_i$

で 0 にならなければいけない。ところが,  $\alpha \in H^0(X, \Theta(2D))$  で,

$H^0(X, \Theta(2D))$  の元は  $x$  の二次式だから, 高さ 2 の零点しか持たない。また,  $\beta_i = \infty$  で (2) が起るためには,  $\alpha$  は  $x$  の一次

以下の式でなければならず、すると  $\alpha$  は高さ 1 の零点しか

ない。ゆえに  $\bar{A}$  の graded subring  $A$  が grade を保つときま  
poset  $H = [\beta_1 \circ \beta_2 \cdots \circ \beta_n \quad (n \geq 3)]$  上の ASL になる事は不  
可能である。

Case (a), (b) の場合は次の事実に注意しよう。

補題.  $m \in \mathbb{Z}$ ,  $0 < m \leq -a(\bar{A})$  とする。

(i)  $D = \frac{P}{q}(\infty)$  のとき,  $\dim \bar{A}_m \leq 2$ .

(ii)  $D = \frac{P_1}{q_1}(\infty) + (-1 + \frac{P_2}{q_2})(0)$  のとき,  $\dim \bar{A}_m \leq 1$ .

この補題が云ふると,  $m = \deg \alpha = -a(A)$  とおくと,

$0 < m \leq -a(\bar{A})$  で,  $\alpha \in A_m \subset \bar{A}_m$ .  $H^0(X, \mathcal{O}(mD))$  の basis は

(i) の場合  $\{1\}$  又は  $\{1, x\}$ , (ii) の場合  $\{x^\ell\}$  の形だから,

$n \geq 3$  のとき, 相異なる  $P_1, \dots, P_n \in X$  に対して前項の (i)

又は (ii) が成立する事は不可能である。

(補題の証明) (i) の場合,  $-a(\bar{A})$  は  $\deg \lfloor (l \cdot \frac{P}{q} + \frac{q-1}{q}) \cdot (\infty) \rfloor \geq 2$

なる最小の  $l$  で, 即ち,  $l \cdot \frac{P}{q} > 1$  なる最小の  $l$  である。この

$l$  に対して,  $l \cdot \frac{P}{q} < 2$  はさうからだから,  $\deg \lfloor lD \rfloor = 1$ .

$0 < l' < l$  且  $l' \neq 1$  は当然,  $\deg \lfloor l'D \rfloor \leq 1$  だから,

$$\dim \bar{A}_m = \dim H^0(X, \mathcal{O}(mD)) = \deg \lfloor l'D \rfloor + 1 \leq 2.$$

(ii) の場合  $\deg \lfloor mD + \frac{P_1-1}{q_1}(\infty) + \frac{P_2-1}{q_2}(0) \rfloor \leq \deg \lfloor mD \rfloor$  を比較すると,

$$\deg \lfloor mD + \frac{P_1-1}{q_1}(\infty) + \frac{P_2-1}{q_2}(0) \rfloor = \begin{cases} \deg \lfloor mD \rfloor & (q_1|m, q_2|m) \text{ (1)} \\ \deg \lfloor mD \rfloor + 1 & (q_1|m, q_2 \nmid m \text{ 且 } q_2 \nmid m) \text{ (2)} \\ \deg \lfloor mD \rfloor + 2 & (q_1 \nmid m, q_2 \nmid m) \text{ (3)} \end{cases}$$

$m = -a(\bar{A})$  が上の ③ の場合で、  $0 < m < -a(\bar{A})$  なら  $m$  が上の ③ または ④ の場合に該当するのは容易にわかる。ゆえに  $m = -a(\bar{A})$  のとき、  $\deg_{\text{LmD}} = \deg_{\text{LmD}} + \frac{q_1-1}{q_1}(\infty) + \frac{q_2-1}{q_2}(0) - 2 = 2 - 2 = 0$ ,  $0 < m < -a(\bar{A})$  のとき、  $\deg_{\text{LmD}} \leq \deg_{\text{LmD}} + \frac{q_1-1}{q_1}(\infty) + \frac{q_2-1}{q_2}(0) - 1 \leq 2 - 1 = 1$  つまり  $\deg_{\text{LmD}} \leq 0$ . ゆえに  $\dim H^0(X, \mathcal{O}(mD)) = \dim \bar{A}_m \leq 1$ .

これで補題の証明が終り、従って定理(2.1)の証明も終った。「たしかにこれだけの事を証明するのにこんなにいそいそ道具を使う必要があるのか?」という気が大いにすこぶる、ASL の公理だけから、自明でない結果が得られて、これから後の発展に希望を与えていくと思う。

### §3. 三次元の ASL domain.

まだ試行錯誤なので、  $A$  は体  $R$  上の 3 次元 ASL-domain,  $\forall \alpha \in H, \deg \alpha = 1$  の場合を考え方。

次の補題により、3 次元 ASL-domain を作る問題は、2 次元の (domain とは限らない) ASL に帰着される。

補題 (3.1).  $A$  は  $R$  上の graded algebra, poset  $H$  が  $A$  の subset,  $H$  の各元は正の次数の同次元,  $A_0 = R$ ,  $A = R[H]$  とする。  $H$  の minimal elements を  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  とする。この時  
(i) ( $n=1$ )  $A/(\alpha_1)$  が  $H \setminus \{\alpha_1\}$  上の ASL で,  $\alpha_1$  は  $A$  の non-

0-divisor なら  $A$  は ASL on  $H$ .

(ii) ( $n \geq 2$ ) もし  $A$  が次の ①, ②, ③ 又は ①, ② をみたせば  $A$  は  $H$  上の ASL である。( $I_{\alpha_i}$  は (1.2) 参照。).

①  $A/(I_{\alpha_i})$  は  $H \setminus I_{\alpha_i}$  上の ASL である ( $i=1, \dots, n$ ).

②  $\alpha_i \alpha_j = 0$  ( $i \neq j$ )

③  $\bigcap_{i=1}^n (I_{\alpha_i}) = (0)$

④  $A$  は (ASL-2) をみたす。

(3.2).

例  $\forall d \geq 1, A = (\mathbb{R}[x, y, z])^{(d)}$  は ASL で表わされる。



(解説)  $A$  の degree 1 の  $\bar{\alpha}$  をとると,  $\text{Proj}(A) = \mathbb{P}^2$ ,

$\text{Proj}(A/(\alpha)) = D$  は  $\mathbb{P}^2$  上の degree  $d$  の curve.  $\therefore D = l_1 + \dots + l_d$ .

$l_1, \dots, l_d$  は一般の位置にある lines とする。 $l_i$  の座標環は  $D \cdot l_i = d$  だから,  の形の ASL として表わされる。

今 poset  $H = \{\alpha, \beta_i, \gamma_{ij}, \delta_i \mid i=1, \dots, d, 1 \leq i < j \leq d\}$ ; 順序関係は  $\alpha$  が最も上位,  $\beta_i, \beta_j \leq \gamma_{ij}, \beta_i \leq \delta_i$  なるようにする。(

$\text{Proj}(A/(I_{\beta_i})) = l_i$ ,  $\text{Proj}(A/(I_{\gamma_{ij}}))$  は  $l_i$  と  $l_j$  の交点,  $\text{Proj}(A/(I_{\delta_i}))$  は  $l_i$  上の他の  $l_j$  の上にない点となる。) (2.1) と上の補題 (3.1) +  $\hookrightarrow A$  が ASL である事を証明できる。 $H$  の形は次のようにある,



(3.3)  $D$  が  $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$  上の ample divisor のとき,  $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$  の  $|D|$  による埋め込みの座標環は ASL で表わされる。

(証明) このような環は  $\mathcal{O}(D) \cong \mathcal{O}(a, b)$  のとき,  
 $(k[x, y])^{(a)} \# (k[u, v])^{(b)}$  の形で表わされるので, (2.1) により次を示せば十分。

補題 (3.4).  $A_1, A_2$  は  $k$  上の graded ring で  $H_1, H_2$  上の ASL であるとす。各  $H_1, H_2$  の元の degree がすべて 1 とすき, Segre product  $A_1 \# A_2 = \bigoplus_{n \geq 0} (A_1)_n \otimes_k (A_2)_n$  は  $H_1 \times H_2$  上の ASL である。但し,  $H_1 \times H_2$  に  $\leq$ ,  $(\alpha_1, \alpha_2) \geq (\beta_1, \beta_2)$   
 $\Leftrightarrow \alpha_1 \geq \beta_1, \alpha_2 \geq \beta_2$  とする。


(証明は容易なので省略する。)

例 (3.5).  $X$  は non-singular projective surface over  $k = \bar{k}$ ,  $-K_X$  が ample ( $K_X$ :  $X$  上の canonical divisor),  $K_X \cdot K_X = d \geq 4$  とする (CP<sup>5</sup>,  $X$  は degree  $d$  の Del Pezzo surface), このとき  $X$  の  $-K_X$  による  $\mathbb{P}^{1-K_X}$  への埋め込みの同次座標環は ASL である。

(証明)  $X$  は  $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$  か又は  $\mathbb{P}^2$  の  $(9-d)$  個の点を blow-up  
([6], (5.1.13) 参照)  
 して得られる。 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$  は (3.4) で述べてあるし,  $\mathbb{P}^2$  の場合も (3.2) で述べてある。但し,  $X = \mathbb{P}^2$  のとき  $-K_X$  の元として  $l_1 + l_2 + l_3$  の形の元の他に,  $Q + l$  ( $Q$  は二次曲線) とする事も考えられる。この場合  $H$  は

$$H = \left[ \begin{array}{c} \delta_1 \quad \delta_2 \quad \delta_3 \quad \delta_4 \\ Q \quad \beta_1 \quad \gamma_1 \quad \gamma_2 \quad \varepsilon \end{array} \right]$$

(これは



で与えられる。点を blow-up すると座標環は subring で与えられる。例えば、 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4$  を blow-up  $L$  で得られて  $X'$  の  $| -K_{X'} |$  による同次座標環は  $\alpha, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2, \varepsilon$  で生成される

subring で、

$$H = \left[ \begin{array}{c} \delta_1 \quad \gamma_2 \\ Q \quad \beta_1 \quad \alpha \quad \beta_2 \\ \gamma_1 \end{array} \right]$$

上の ASL となる。

([6], (5.1.13) 参照)

今まで得られた ASL の多くはすべて national であるので、  
ASL domain ( $\mathbb{R}$  上の) はすべて national か? という予想  
を立ててもどう不自然ではないと思う。 $\dim A \leq 3$  のときは  
次が主張できる。

 $(\dim A \leq 3)$ 

定理 (3.6).  $A$  が  $\mathbb{R} = \overline{\mathbb{k}}$  上の ASL-domain on  $H, H_A$   
各元の degree は 1 とする。このとき、もし  $\text{Proj}(A)$  が Gorenstein  
variety であれば、 $A$  は  $\mathbb{R}$  上 national である。

(証明).  $\dim A = 2$  のときは (2.1) やわせ、  
 $\dim A = 3$  とする。 $A$  の Poincaré series を計算して、Riemann  
-Roch の定理と照し合せると、 $\omega_X \cdot D < 0$  である事が、次の補題より 得られる (但し、 $D = \text{Proj}(A/\langle \alpha \rangle)$ 、 $\alpha$  は  $H$  の最高次元)。  
曲面の分類論より、このとき  $X$  は ruled である。しかし  $D$  は

ample divisor でやはり ASL であるわせよから,  $D$  の各既約成分は smooth rational curve. 従って  $X$  は rational., ゆえに  $A$  は rational である。

補題. (3.6) の仮定の下に,  $\gamma$  を  $H$  の高さ 3 の元とする。

このとき  $\#\{\beta \mid \beta \in H, \beta \text{ は高さ } 2, \beta \leq \gamma\} \leq 2$ .

( $\because$ )  $P$  を  $\gamma$  に対応する  $X$  の点,  $\beta_1, \dots, \beta_n \leq \gamma$  とすると,  
 $(\mathcal{O}_{X,P}/\alpha \cdot \mathcal{O}_{X,P})^\wedge \cong k[[\beta_1, \dots, \beta_n]]/(\beta_i \beta_j \mid i \neq j)$  であることを  
 $(ASL-2)$  より容易にわかる。 $n \geq 3$  のとき  $\mathcal{O}_{X,P}$  は Gorenstein 環。  
と Riemann-Roch  
[ Poincaré series,  $\delta^\gamma$  ]  $w_X \cdot D = -2(a+b) + d$ , 但し,  $d = D^2 =$   
 $A$  の multiplicity,  $a, b$  はともに  $H$  の高さ 2, 3 の元の個数。  
上の補題より  $2b \geq d$  がわかる。]

結びに余り根拠のはうへ予想を引挙しよう。基礎環は体をとる。

1. ASL-domain は normal か?

2. ASL-domain は Cohen-Macaulay 環か?

3. ASL-domain は rational singularity か?

4. ASL-domain は rational か?

どの問に対しても反例はまだ存在しないと思うのだが。

#### REFERENCES.

- [1] K. Baclawski; Rings with Lexicographic Straightening Law,  
Adv. in Math. 39 (1981), 185-213.

- [2] C. DeConcini and V. Lakshmibai; Arithmetic Cohen-Macaulayness and arithmetic normality for Schubert varieties, Amer. J. Math. 103 (1981), 835-850.
- [3] C. DeConcini, D. Eisenbud and C. Procesi; Hodge Algebras (preprint).
- [4] D. Eisenbud; Introduction to Algebras with Straightening Laws, in Ring Theory and Algebra, III, 243-268, Dekker, 1980.
- [5] C.S.Seshadri, V.Lakshmibai, C.Musili; Geometry of G/P, I, II, III, IV, in "C.P.Ramanujam-A Tribute", 207-239, Proc. Ind. Acad. Sc. 87 (1978), 1-54, 55-177, ibid. 88 (1979), 279-362.
- [6] S. Goto and K. Watanabe; On Graded Rings, I, J. Math. Soc. Japan, 30 (1978), 179-213.
- [7] K. Watanabe; Some Remarks Concerning Demazure's Construction of Normal Graded Rings, Nagoya Math. J. 83 (1981), 203-211.