

60

Microlocal calculus と 概均質ベクトル空間  
の相対不変式の Fourier 変換

柏原 正樹 述

三輪 哲二 記

目次

序	2
§1 極大過剰決定系の principal symbol の理論	
1) 極大過剰決定系と principal symbol (complex case)	3
2) line bundle $L_1$ と principal symbol	13
3) Maslov index と $L_1$ の定義の仕上がり	29
4) regular intersection の接続行列	35
§2 概均質ベクトル空間の相対不変式の Fourier 変換	
1) 概均質ベクトル空間と相対不変式, $a$ -函数, $b$ -函数, $C$ -函数	42
2) 相対不変式の Fourier 変換	59
3) 接続行列と Maslov index	71

序

Microlocal calculus とは 函数をそれが満たす  
極大過剰決定系によって把え, その極大過剰  
決定系を microlocal に解析し, それを総合  
する事によって種々の具体的計算を行う方法  
である。ここでは 概均質ベクトル空間の Fourier  
変換の計算法を解説する。

このノートは1974年の夏から冬にかけて,  
柏原正樹氏が京都大学数理解析研究所及び  
東洋紡績堅田研究所求是荘で行った数回の  
講義をまとめたものである。なお同氏の  $\rho$ -函数  
の計算法の名古屋大学における講義が  
木村達雄氏によってまとめられているので  
参照してほしい。([1]) また, 実際の Fourier  
変換の計算は, 鈴木利明氏によって実行された。([9])  
Imaginary Lagrangean が現われる場合の扱いは  
[10] を見てほしい。

## §1 極大過剰決定系の principal symbol の理論

## 1) 極大過剰決定系と principal symbol (complex case)

この節では複素領域における極大過剰決定系の基本事項を証明なしで述べる。詳しくは [2] を見てほしい。

$X$ :  $n$ 次元複素多様体

$T^*X$ :  $X$ 上の cotangent bundle

$\mathcal{P}$ :  $T^*X$ 上に定義された擬微分作用素の層 (有限階)\*

以下 擬微分作用素を  $\Psi, D, O$  と略記する。

$P(x, D) \in \mathcal{P}$  は

$$P(x, D) = \sum_{-\infty < j \leq m} P_j(x, D)$$

と展開される。ここで  $P_j(x, \xi)$  は  $T^*X$  で定義された  $\xi$  について  $j$  次 homogeneous な正則関数である。

$$\mathcal{P}_m = \{ P(x, D) \in \mathcal{P} / P(x, D) = P_m(x, D) + \text{低階} \}$$

は高々  $m$  階の  $\Psi, D, O$  の層である。

$$\mathcal{P}_m / \mathcal{P}_{m-1} \cong \mathcal{O}_{T^*X}(m)$$

は,  $\xi$  について  $m$  次 homogeneous な関数の層であり

\*  $T^*X$  の zero section を含む領域では  $\mathcal{P}$  の section は有限階の微分作用素になる。

$$\sigma_m: P_m \longrightarrow P_m / P_{m-1} \cong \mathcal{O}_{T^*X}^{(m)}$$

により定義される  $m$  次 homogeneous な正則函数  $\sigma_m(P)$  を  $P \in P_m$  の principal symbol と言う。

$$\sigma_m(P) = P_m(x, \xi)$$

である。これは座標不変である。

$f(x, \xi)$ ,  $g(x, \xi)$  をそれぞれ  $m_1$  次,  $m_2$  次の homogeneous な函数とする時。

$$\{f, g\} = \sum_{j=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial \xi_j} \frac{\partial g}{\partial x_j} - \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{\partial g}{\partial \xi_j} \right)$$

で定義される  $(m_1 + m_2 - 1)$  次 homog. な函数を  $f$  と  $g$  の Poisson bracket と言う。

$$\sigma(P \cdot Q) = \sigma(P) \sigma(Q)$$

$$\sigma([P, Q]) = \{\sigma(P), \sigma(Q)\} \quad (1)$$

が成り立つ。

$$\mathcal{M} = P u = P / \mathcal{I}$$

を擬微分方程式系とする。(以下単に system と書く。)

\*ここで考える system は未知函数が一個のものである。

ここで  $\mathcal{J}$  は  $\mathcal{P}$  の coherent 左イデアルであり,  $\mathcal{M}$  の generator をひとつ取って  $u$  と書いた。

$$\mathcal{J} = \mathcal{P}P_1 + \cdots + \mathcal{P}P_N \quad P_j \in \mathcal{P}$$

の時, system  $\mathcal{M}$  は 未知函数  $u$  に関する 擬微分方程式系

$$P_1 u = \cdots = P_N u = 0$$

に対応している。もちろん,  $\mathcal{J}$  は, generator  $u$  の選び方に依存する。

$$\overline{\mathcal{J}} = \{ \sigma(P) \mid P \in \mathcal{J} \} \text{ で生成される } \mathcal{O}_{T^*X} \text{ のイデアル}$$

とすると, これは homog. な函数で生成され, その零点は  $T^*X$  の conic な subvariety となる\*。この subvariety は generator  $u$  の取り方に依らない。これを system の support と言い  $SS\mathcal{M}$  と書く。

$$SS\mathcal{M} = \{ (x, \xi) \in T^*X \mid \sigma(P)(x, \xi) = 0$$

$$\text{for } \forall P(x, D) \in \mathcal{J} \}$$

\*  $\overline{\mathcal{J}}$  を  $u$  の symbol ideal と言う。

$$SSM = \{(\alpha, \xi) \in T^*X / P_1(\alpha, \xi) = \dots = P_N(\alpha, \xi) = 0\} \quad (2)$$

は一般には成立しない。

例 (1.1)

$$M = \mathcal{P} / \mathcal{P}D_1 + \mathcal{P}(D_1^2 - D_2)$$

の時  $SSM$  は  $\{\xi_1 = \xi_2 = 0\}$  であって  $\{\xi_1 = 0\}$  ではない。  $D_1$  と  $D_1^2 - D_2$  は  $\mathcal{J}$  の base にはなっているが、その principal symbol  $\xi_1$  は  $\overline{\mathcal{J}}$  の base にはならない。

$\sigma(P_1), \dots, \sigma(P_N)$  が  $\overline{\mathcal{J}}$  の base になっている時  $P_1, \dots, P_N \in \mathcal{J}$  を involutory base と言う。この時 (2) が成り立つ。

$T^*X$  の勝手な subvariety が system の support になる事はない\*。(1) から、symbol ideal  $\overline{\mathcal{J}}$  は Poisson bracket について閉じている事がわかる。従ってもし、 $\overline{\mathcal{J}}$  が reduced ideal (i.e.  $f^k \in \overline{\mathcal{J}}$  なら  $f \in \overline{\mathcal{J}}$ ) であれば  $SSM$  は involutory である。すなわち

$$f = g = 0 \text{ on } SSM \implies \{f, g\} = 0 \text{ on } SSM$$

\* com'c であるだけでない。以下 com'c である事はいちいち断わらない。

であるが、実はこの事は *reduced* という仮定なしに成立する。(微分方程式論の基本定理!!)

*involutory* な *subvariety* は  $T^*X$  における余次元が  $n$  を越える事はない。特に余次元が  $n$  の *involutory variety* を *Lagrangian variety* とする。

定義 (1.2)

*support* が *Lagrangian* であるような *system* を極大過剰決定系<sup>\*</sup> とする。

例 (1.3)

$$i) \mathcal{O} = \mathcal{P} / \mathcal{P}D_1 + \dots + \mathcal{P}D_n$$

$$\text{supp } \mathcal{O} = X$$

$$ii) B_{pt} = \mathcal{P} \delta(x) = \mathcal{P} / \mathcal{P}x_1 + \dots + \mathcal{P}x_n$$

$$\text{supp } B_{pt} = T_{pt}^*X$$

$\mathcal{M}$  が M.O.S. で、その *support* を  $\Lambda$  とする。

$$\Lambda = \bigcup_j \Lambda_j$$

を既約成分への分解とする。

\*以下 M.O.S. (maximally overdetermined system) と略記する。

定義(1.4)

M.O.S.  $\mathcal{M}$  が  $\Lambda_j$  で simple とは  $\Lambda_j$  の generic point で  $\bar{J}$  が reduced な事を言う。

simple な M.O.S は micro local には, すなわち  $\Lambda_j$  の各点の近傍では, 適当な量子化された接触変換によって

$$\mathcal{N} = \mathcal{P} / \mathcal{P}x_1 + \dots + \mathcal{P}x_n$$

に変換される。これから, microfunction solution は generic point では 1次元 という事がわかる。しかし解の global な振舞いを知るためには, 解空間の base を global に指定する事が必要である。そのために, real Lagrangean の上に line bundle を定義し, その section として, principal symbol を定義する。その中 1 段として, complex Lagrangean で "principal symbol" を以下定義しよう。

これからは, M.O.S.\* はその generator  $\mathcal{U}$  をひとつ固定して考える。  $\mathcal{U}$  の support の既約成分のひとつを  $\Lambda$  とする。

\* simple と仮定する。

$$\mathcal{J} = \{P \in \mathcal{P} / Pu = 0\} \quad \mathcal{M} = \mathcal{P}u = \mathcal{P}/\mathcal{J}$$

としよ。

$\Lambda$  上に層  $\sqrt{\Omega_\Lambda^n} \otimes \sqrt{\Omega_X^n}^{-1}$  を考える。 $\Omega_\Lambda^n, \Omega_X^n$  はそれぞれ  $\Lambda, X$  上の  $n$ -form の層であり、 $\sqrt{\Omega_\Lambda^n} \otimes \sqrt{\Omega_X^n}^{-1}$  は  $\Lambda$  上の invertible sheaf で transition function が

$$\sqrt{\frac{\partial(\lambda_1, \dots, \lambda_n)}{\partial(\tilde{\lambda}_1, \dots, \tilde{\lambda}_n)}} \times \sqrt{\frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n)}}^{-1}$$

$\lambda, \tilde{\lambda}$  は  $\Lambda$ ,  $x, \tilde{x}$  は  $X$  の局所座標

で与えられるものとする。(蛇足であるが、厳密に言うと  $U \subset \Lambda$  に対し  $\lambda$  を  $U$  における,  $x$  を  $\pi(U)$  ( $\pi: T^*X \rightarrow X$ ) の近傍における局所座標とし,  $\mathcal{O}_\Lambda^{\lambda, x}$  を  $\mathcal{O}_\Lambda$  の copy とする。

$$\Gamma(U, \sqrt{\Omega_\Lambda^n} \otimes \sqrt{\Omega_X^n}^{-1}) = \sum_{\lambda, x} \mathcal{O}_\Lambda^{\lambda, x}(U) / \sim$$

ここで  $\sim$  は

$$f(\lambda) \left( \frac{\partial \lambda}{\partial \tilde{\lambda}} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{\partial x}{\partial \tilde{x}} \right)^{-\frac{1}{2}} = f(\tilde{\lambda})$$

なる同値関係である。但し complex で考える時は、定数倍は不定とする。real で考える時は  $\left| \frac{\partial \lambda}{\partial \tilde{\lambda}} \right|^{\frac{1}{2}} \left| \frac{\partial x}{\partial \tilde{x}} \right|^{-\frac{1}{2}}$  を考える事により

$$L_1 = \sqrt{v_1} \otimes \sqrt{v_M}^{-1}$$

$v_1, v_M$  は volume element

が、定数倍の不定さなしに定義できる。

$$P(x, D) = P_m(x, D) + P_{m-1}(x, D) + \text{低階}$$

に対して、 $T^*X$  における 1 階の微分作用素

$$L_p = H_{P_m} + \left( P_{m-1} - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 P_m}{\partial x_j^2} \right)$$

を考える。ここで

$$H_{P_m}(f) = \{P_m, f\}$$

である。 $L_p$  は  $X$  の局所座標に依るが、 $\sqrt{dx}^{-1} L_p \sqrt{dx}$  は依らない事がわかる。すなわち  $P(x, \xi) = \tilde{P}(\tilde{x}, \tilde{\xi})$  の時

$$L_p = \sqrt{\frac{\partial \tilde{x}}{\partial x}}^{-1} \cdot L_{\tilde{P}} \cdot \sqrt{\frac{\partial \tilde{x}}{\partial x}}$$

である。

定義 (1.5)

$\Lambda$  上の 1 階連立微分方程式系

$$L_p S = 0 \quad \text{for } \forall P \in \mathcal{J} \quad (3)$$

の解として決まる  $\sqrt{\Omega_1^n} \otimes \sqrt{\Omega_X^n}^{-1}$  の section  $S$  を  $u$  の (algebraic) principal symbol と言う。

$\Lambda$  は involutory であるから  $f=0$  on  $\Lambda$  ならば  $H_{P_m}(f)=0$  on  $\Lambda$  である。すなわち  $L_P$  は  $\Lambda$  の内部微分である。  $S = f(\lambda) \sqrt{d\lambda} \sqrt{dx}^{-1}$  に対して

$L_P(f(\lambda) \sqrt{d\lambda}) \sqrt{dx}^{-1}$  を対応させると、これは、 $X$  の局所座標に依らない。ここで  $L_P$  は  $\sqrt{\Omega_1^n}$  に Lie derivative として作用している。すなわち

$$L_P(f(\lambda) \sqrt{d\lambda}) = \left\{ L_P(f) + \frac{f}{2} \cdot \overset{\text{Lie derivative}}{L_{H_{P_m}}(d\lambda)} \right\} \sqrt{d\lambda}$$

である。(3)の解は存在して unique である事がわかる。また、 $\xi$  について homogeneous である。

例(1.6)

$$\Lambda = \{x_1 = \dots = x_r = \xi_{r+1} = \dots = \xi_n = 0\}$$

すなわち  $u = \delta(x_1, \dots, x_r)$

$$Pu = P/P x_1 + \dots + P x_r + P D_{r+1} + \dots + P D_n$$

とすると

$$b_\Lambda(u) = \frac{\sqrt{d\xi_1 \dots d\xi_n dx_{r+1} \dots dx_n}}{\sqrt{dx_1 \dots dx_r dx_{r+1} \dots dx_n}}$$

## 定義(1.7)

$\sigma_\lambda(u)$ の $\lambda$ に関する homogeneous degree を  $u$ の  $\lambda$ における order と言う。

$\lambda = X$  の時, order はどんな  $u$  に対しても 0, 例(1.6)では  $\text{ord}_\lambda(u) = \frac{1}{2}$  である。

invertible な  $Q \in \mathcal{P}$  (i.e.  $\sigma(Q) \neq 0$  on  $\lambda$ ) に対して

$$\sigma_\lambda(Qu) = \sigma(Q)|_\lambda \sigma_\lambda(u)$$

$$\text{ord}_\lambda(Qu) = \text{ord } Q + \text{ord}_\lambda u$$

が成り立つ。

2) line bundle  $L_\Lambda$  と principal symbol  
 これは, real analytic manifold  $M$  とその上の  
 pure imaginary cotangent bundle  $\sqrt{-1}T^*M$  で  
 考える。

$$\Lambda \subset \sqrt{-1}T^*M$$

を non singular Lagrangean とし,  $\Lambda$  に support  
 を持つ simple な M.O.S.  $\mathcal{M} = \mathcal{P}U$  を考える。  $\Lambda$   
 が連結ならば,  $\Lambda$  における microfunction solution は  
 1次元であるが, その base を指定したい。それには  
 $\Lambda$  上に line bundle  $L_\Lambda$  を作り, その real analytic  
 section が 解と1対1に対応するようにする。順々に  
 やって行こう。

まず codim  $l$  の submanifold  $N$  があって

$$\Lambda = \sqrt{-1}T_N^*M$$

となっている時を考える。局所座標を取り換えて

$$N = \{x_1 = \dots = x_l = 0\}$$

$$x = (x', x'') \quad x' = (x_1, \dots, x_l)$$

$$D = (D', D'') \quad \xi = (\xi', \xi'')$$

とする。  $\Lambda$  における microfunction solution  $u$  は microlocal には、分数階の重. D. O. を使って

$$(1) \quad u = P(x, D) \delta(x')$$

と表わされる。ここに

$$P(x, D) = \sum_{j=0}^{\infty} P_{\lambda-j}(x, D)$$

は、 $\lambda-j$  次 homog. な  $P_{\lambda-j}(x, i\xi)^*$  によって定義される次のような microfunction を kernel とする

$\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$  の積分作用素である。

$$\begin{aligned} & P(x, D) \delta(x-y) dy \\ &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int \sum_{j=0}^{\infty} P_{\lambda-j}(x, i\xi) \Phi_{\lambda-j+n}(i\langle x-y, \xi \rangle + i0) \\ & \quad \times \omega(\xi) dy \end{aligned}$$

$$\text{但し } \omega(\xi) = \sum (-1)^j \xi_j d\xi_1 \wedge \cdots \widehat{d\xi_j} \cdots \wedge d\xi_n$$

$$\Phi_{\lambda}(\tau) = \frac{\Gamma(\lambda)}{(-\tau)^{\lambda}}$$

であって、 $(-\tau)^{\lambda} \Big|_{\tau=-1} = 1$  なる分枝を取る。

\*  $\sqrt{1}T^*M$  の点で考えるので  $\sqrt{1} = \sqrt{1}$  がつく。

$\sum_{j=0}^{\infty} P_j(x, i\xi)$  が  $(x_0, i\xi_0)$  の近くで収束していれば  
 $v(x) \in C(x_0, i\xi_0)$  に対して

$$\int P(x, D) \delta(x-y) v(y) dy$$

を対応させる事により,  $P(x, D)$  が意味を持つ。特に

$$v(x) = \delta(x')$$

の時は  $x'=0, \xi''=0$  とおいたものを  $P_{\lambda-j}(x', i\xi')$  と書くと

$$u = \frac{1}{(2\pi)^e} \int \sum_{j=0}^{\infty} P_{\lambda-j}(x', i\xi') \Phi_{\lambda-j+l} (i(\langle x, \xi \rangle + i0)) \times \omega(\xi') \quad (4)$$

となる。この形なら  $P$  は unique に決まる。

例(2.1)

$$i) (-\Delta)^{\frac{\lambda}{2}} \delta(x) = \frac{2^\lambda \Gamma(\frac{\lambda+n}{2}) \pi^{-\frac{n}{2}}}{\Gamma(-\frac{\lambda}{2})} r^{-\lambda-n}$$

但し  $-\Delta$  の symbol は  $[-\{(i\xi_1)^2 + \dots + (i\xi_n)^2\}]^{\frac{\lambda}{2}}$ \*

$$r = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

$$ii) (x \pm i0)^\lambda = \frac{2\pi e^{\pm \frac{\pi i \lambda}{2}}}{\Gamma(-\lambda)} \left( \pm \frac{D}{i} \right)^{-\lambda-1} \delta(x)$$

(at  $\pm i'dx_\infty$ )

\* [ ] の中は positive  $\lambda$  の意味を持つ

$(\pm \frac{D}{2})$  の symbol は  $\pm \xi$   $z = \pm idx\infty$   
 でどちらとも positive となってその  $\lambda$  乗が意味を持つ。

$$\text{iii) } |x|^\lambda = \frac{\pi}{\Gamma(-\lambda) \cos \frac{\pi\lambda}{2}} |D|^{-\lambda-1} \delta(x)$$

$$|D|^{-\lambda-1} \text{ の symbol } = (\pm \xi)^{-\lambda-1} \text{ at } \pm idx\infty$$

$$\text{iv) } x_+^\lambda = \Gamma(\lambda+1) (D+0)^{-\lambda-1} \delta(x)$$

$(D+0)^{-\lambda-1}$  の symbol は  $(\pm i\xi)^{-\lambda-1}$  at  $\pm idx\infty$   
 で  $+0$  の意味は  $\zeta^{-\lambda-1}$  の分枝を  $\zeta^{-\lambda-1} \Big|_{\lambda=1} = 1$  と  
 取る事である。

さて (4) の  $u$  に対して

$$P_\lambda(x, i\vec{z})|_1$$

を対応させるのは、座標不変ではない。異なる座標  $\tilde{x}$  を取  
って

$$N = \{\tilde{x}' = 0\}$$

と仮定とする。また  $P$  が  $\tilde{P}$  になったとすると

$$\delta(x') = \left| \frac{\partial \tilde{x}'}{\partial x'} \right| \delta(\tilde{x}')$$

だから

$$u = P \delta(x') = \tilde{P} \left| \frac{\partial \tilde{x}'}{\partial x'} \right| \delta(\tilde{x}')$$

である。ここで

$$\sigma(P)|_1 = \sigma(\tilde{P})|_1$$

ではあるが、

$$\sigma(P)|_1 \neq \sigma(\tilde{P} \left| \frac{\partial \tilde{x}'}{\partial x'} \right|) \neq \sigma(P) \left| \frac{\partial \tilde{x}'}{\partial x'} \right| |_1$$

となって  $\left| \frac{\partial \tilde{x}'}{\partial x'} \right|$  だめずれる。

そこで  $\sigma(u) = \sigma(P)|_{\Lambda} / |dx'|$

と定義すれば,

$$\sigma(\tilde{P} | \frac{\partial \tilde{x}'}{\partial x'} |) |_{\Lambda} / |d\tilde{x}'| = \sigma(P) / |dx'|$$

となり座標不変になる。<sup>\*</sup>

次に,  $\Lambda$  が conormal bundle にならない時を考える。  
 $\pi: \sqrt{\Lambda} T^*M \rightarrow M$  を  $\Lambda$  上で考え, その rank の  
 最大値を  $n-l$  とする。

$$\Lambda' = \{ \pi|_{\Lambda} \text{のrankが} "n-l" \text{の点} \}$$

は  $\Lambda$  で open であり  $\Lambda' = \sqrt{\Lambda} T^*M$  という形をして  
 いる。よって  $\Lambda'$  では principal symbol  $\sigma(u)$  が  
 定義されている。

一方 algebraic principal symbol は  $\Lambda$  全体  
 で定義されていた。それは定数倍を考えずに, 方程式

$$L_p S = 0 \quad \text{for } P \in \mathcal{P} \quad Pu = 0$$

の解であった。

\*  $\frac{d\tilde{x}' \wedge dx'}{dx} = \frac{d\tilde{x}'}{dx'} = \frac{1}{(dx')^2}$  (変換性だけ考えた等式)  
 だから  $\sigma(u) = \sigma(P)|_{\Lambda} \sqrt{\frac{|d\tilde{x}' \wedge dx'|}{|dx|}}$  を取ってもよい。  
 19 (P.270の\*を見よ。)

そこでこのような  $S \in \mathcal{V}_1^{\frac{1}{2}} \otimes \mathcal{V}_M^{-\frac{1}{2}}$  をひとつ固定して  $\Lambda'$  の相異なる連結成分で

$$\sigma(u) = CS$$

で決まる定数  $C$  を比べて見よう。

その前にもう一度 motivation をはきりさせよう。

$\Lambda' = \Lambda_1 \cup \Lambda_2$  とする時、 $\Lambda_1$  における解  $u_1$  と  $\Lambda_2$  における解  $u_2$  があつた時  $\sigma(u_1)$  と  $\sigma(u_2)$  がどんな条件を満たしていれば、 $u_1$  と  $u_2$  は境い目を越えて、ひとつの解としてつながるか、という事が知りたい。逆にいうと、 $\Lambda$  全体における解  $u$  があれば、 $\sigma(u)$  は conormal でなくなる所で、どのように変化するか\*。これを調べるには、いろいろな方法があるが、例えば接触変換によって問題の境い目の点を、conormal の点に変換したとしよう。この時、 $\sigma(u)$  は変化するのだが、その変化の仕方が、境い目のあちとこちでは違つてしまう。その違いがどうなるかを知ればよい。それがわかれば、その違いを修正するように  $\sigma(u)$  の定義を変えてやれば、 $\sigma(u)$  は接触変換に対して一斉に変化するだろう。

\* 付録(i)を見てほしい。

当然ながら、違いを修正する factor は、どのような接触変換を選ぶかによって異なる。(もともと conormal な点で考えれば、ある接触変換はそれを再び conormal な点に移すから修正は不要だし、別の接触変換はその点を conormal でない点に移すため、修正の factor が必要になるだろう。)ところが、この修正の factor は、Maslov index と呼ばれる、計算可能な量で完全に記述されてしまう。以下接触変換を使わないやり方で、それを示す。

$(x_0, i\xi_0) \in \Lambda$  とする。  $x_0$  の近くで定義された real analytic function  $\varphi(x)$  を適当にとると

$$\Upsilon_\varphi = \{(x, i\xi) \in iT^*M / \xi = d\varphi(x)\}$$

が、 $\Lambda$  と transversal に交わる。 $\Upsilon_\varphi$  は conic ではないが canonical 2 form  $\sum d\xi_j dx_j$  がその上で消えるという意味では、Lagrangian である。注意しなくてはならないのは、上の条件を満たす  $\varphi$  の取り方は、deformation で結び合わないものがあるという事である。

([3], [4] を見てほしい。)

さて、今ひとつ  $\varphi(x)$  を固定して

$$v(t) = \int u(x) \delta(t - \varphi(x)) dx$$

を考える。これは1変数の microfunction で、 $\varphi$  が  $\Lambda$  と transversal だから定義できる。さらに、 $v(t)$  は multiplicity 1 の M.O.S. を満たす。その singularity は

$$t = \varphi(x_0), \quad i dt \infty$$

にある。特に

$$v(t) = G(D_t) \delta(t - \varphi(x_0))$$

と書ける。一般に M.O.S. の generator の order について次の公式が成り立つ。

$$\text{ord } u(x) \cdot v(x) = \text{ord } u(x) + \text{ord } v(x)$$

$$\text{ord } u(f(x)) = \text{ord } u$$

$$\text{ord} \int u(x, y) dy = \text{ord } u - \frac{\dim \text{ of } y}{2}$$

これらが成立するには、実は条件がいるけれども、それは今考えている  $v(t)$  の場合は満たされている。

$$e = \text{ord } u(x)$$

よおく。例(1.6)により

$$\text{ord } v = \text{ord } u + \frac{1}{2} - \frac{n}{2}$$

よって  $\text{ord } G = e - \frac{n}{2}$  である。これから

$$\sigma_{e-\frac{n}{2}}(G) = c \tau^{e-\frac{n}{2}} \quad \text{at } (t, i\tau dt)$$

となる。ここで定数  $c$  は何か。

まず、 $\Lambda = \sqrt{\Gamma} T_N^* M$  なる所で  $c$  を計算しよう。

局所座標を

$$N = \{ x = (x', x'') / x' = 0 \} \quad \begin{array}{l} x' = (x_1, \dots, x_\ell) \\ x'' = (x_{\ell+1}, \dots, x_n) \end{array}$$

$$x_0 = 0 \quad \xi_0 = (\xi_0', 0)$$

となるように選ぶ。

$$\Lambda = \{ x' = 0, \xi'' = 0 \}$$

$$Y_\varphi = \{ \xi = d\varphi(x) \}$$

であった。  $Y_\varphi$  の接空間は、 $\mathbb{R}^n + \sqrt{\Gamma} \mathbb{R}^n$  の subspace

$$T_{(x_0, i\xi_0)} Y_\varphi = \{ (x, i\xi) / \xi_i = \sum \frac{\partial^2 \varphi(x_0)}{\partial x_i \partial x_j} x_j \}$$

である。

$\Gamma$  と  $\gamma$  が transversal という条件は

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}(\alpha_0) \quad 1 \leq i, j \leq n$$

が non-singular である事である。適当な座標により

$$\varphi(x) = \tilde{\varphi}(x) + \{\text{3次以上}\} + \varphi(\alpha_0)$$

$$\tilde{\varphi}(x) = \langle \tilde{\alpha}_0', \alpha_0' \rangle + \frac{1}{2} \langle A x'', x'' \rangle$$

となる。(A ≠ non-singular)

基本公式(2.2)

$q(x)$  を non-degenerate quadratic form とし

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(t + q(x) + i0)^\lambda} = \frac{\pi^{\frac{n}{2}} \Gamma(\lambda - \frac{n}{2})}{\Gamma(\lambda)}$$

$$\times \frac{1}{\sqrt{|\det q|} e^{\frac{\pi i}{4}(n - \text{sgn } q)} (t + i0)^{\lambda - \frac{n}{2}}}$$

但し  $\text{sgn } q = \#(\text{positive eigenvalues})$   
 $- \#(\text{negative eigenvalues})$

証明は省略する。

これを使って C を計算しよう。

$$\begin{aligned}
 v(t) &= \int u(x) \delta(t - \tilde{\varphi}(x)) dx \\
 &= \int P(x'', D') \delta(x') \delta(t - \tilde{\varphi}(x)) dx \\
 &= \int \delta(x') P^*(x'', D') \delta(t - \tilde{\varphi}(x)) dx
 \end{aligned}$$

Claim

$$P^*(x'', D') \delta(t - \tilde{\varphi}(x)) = Q(D_t, D_{x_j}') \delta(t - \tilde{\varphi}(x))$$

と書き直せる。

(略証) まず  $x''$  を  $D_{x_j}''$  に変える。

$$(\tilde{\varphi}_j'(x) D_t + D_{x_j}') \delta(t - \tilde{\varphi}(x)) = 0$$

$A = \begin{pmatrix} \alpha_{l+1} & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}$  の時には  $j > l$  に対し

$$(\alpha_j' x_j D_t + D_{x_j}') \delta(t - \tilde{\varphi}(x)) = 0$$

$D_t$  は invertible 故

$$(x_j + \alpha_j^{-1} D_t^{-1} D_{x_j}') \delta(t - \tilde{\varphi}(x)) = 0$$

となつて,  $Q$  は  $D_t$  と  $D_{x_j}'$  ( $1 \leq j \leq l$ ) だけを含ま、  
次に  $\xi_0' = (1, 0, \dots, 0)$  とすれば" "とすれば。

$$\tilde{\varphi}(x) = x_1 + \frac{1}{2} \langle A x'', x'' \rangle$$

$$D_{x_j} \delta(t - \tilde{\varphi}(x)) = 0 \quad (2 \leq j \leq l)$$

$$D_{x_1} \delta(t - \tilde{\varphi}(x)) = -D_t \delta(t - \tilde{\varphi}(x))$$

となつて  $D_{x_j}$  は消せる。

ここに

$$\delta(Q) \Big|_{\substack{t-\tilde{\varphi}(x)=0 \\ \text{の conormal}}} = \delta(P^*) \Big|_{\substack{t-\tilde{\varphi}(x)=0 \\ \text{の conormal}}} \quad (5)$$

となっている。

計算を続ける。

$$\begin{aligned} v(t) &= \int \delta(x') Q(D_t, 0) \delta(t - \tilde{\varphi}(x)) dx \\ &= Q(D_t, 0) \int \delta(x') \delta(t - \tilde{\varphi}(x)) dx \\ &= Q(D_t, 0) \int \delta\left(t - \frac{1}{2} \langle Ax'', x'' \rangle\right) dx'' \end{aligned}$$

基本公式(2.2)を例(2.1)のii)を使って変形する。

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(t + g(x) + i0)^\lambda} = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}+1} e^{\frac{\pi i}{4} \operatorname{sgn} g - \frac{\pi i \lambda}{2}}}{\Gamma(\lambda) \sqrt{\det g}} \left(\frac{D_t}{i}\right)^{\lambda - \frac{n}{2} - 1} \delta(t)$$

特に全体を $(-2\pi i)$ で割って $\lambda=1$ とあければ

$$\int \delta(t - g(x)) dx = \pi^{\frac{n}{2}} e^{-\frac{\pi i}{4} \operatorname{sgn} g} \frac{1}{\sqrt{|\det g|}} \left(\frac{D_t}{i}\right)^{-\frac{n}{2}} \delta(t)$$

ここで

$$V(t) = (2\pi)^{\frac{n-l}{2}} e^{-\frac{\pi i}{4} \operatorname{sgn} A} \frac{1}{\sqrt{|\det A|}} Q(0, D_t, 0) \left(\frac{D_t}{i}\right)^{-\frac{n-l}{2}} \times \delta(t)$$

よって (5) から

$$\begin{aligned} \delta(Q)(0, i\tau, 0) &= \delta(P^*)(0, -i\tau \xi_0) \\ &= \delta(P)(0, i\tau \xi_0) \end{aligned}$$

ここで P.23 の  $\delta(G)$  が求められる。

$$\begin{aligned} \delta(G)(i\tau) &= (2\pi)^{\frac{n-l}{2}} e^{-\frac{\pi i}{4} \operatorname{sgn} A} \frac{1}{\sqrt{|\det A|}} \\ &\quad \times \delta(P)(0, i\tau \xi_0) \tau^{-\frac{n-l}{2}} \\ &=^* (2\pi)^{\frac{n}{2}} \delta(U)(0, i\tau d\tilde{\varphi}(x_0)) \tau^{-\frac{n-l}{2}} \\ &\quad \times \frac{e^{-\frac{\pi i}{4} \operatorname{sgn} A}}{\sqrt{|\det A|}} \sqrt{\frac{|dx|}{|d\tilde{z}' dx''|}} \end{aligned}$$

今まで、3次以上の項は無視してきたが、実は一般の  $\varphi$  に対しても、今求めた式は正しい。もう少し書き換えよう。

$$Y_\varphi : \quad \tilde{z}'' = A x'' \quad , \quad \tilde{z}' = \tilde{z}'_0$$

であったから  $Y_\varphi$  上では

$$\sqrt{|\det A|} = \sqrt{\frac{|d\tilde{z}''|}{|dx''|}}$$

\* これ以後は  $\sqrt{|\det A|}$  ではなく  $\sqrt{\frac{|d\tilde{z}' dx''|}{|dx|}}$  を採用する。

$$d\omega = \sum_j d\xi_j \wedge dx_j \text{ とすると}$$

$$\frac{|d\omega|^n}{|d\xi' \wedge dx'|} = |d\xi' dx'| = |\det A| |dx|$$

従って

$$\begin{aligned} \delta(G)(i\tau) &= (2\pi)^{\frac{n}{2}} e^{-\frac{\pi i}{4} \text{sgn} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}(x_0)} \\ &\quad \times \delta(U)(x_0, i\tau d\varphi(x_0)) \tau^{\frac{l-n}{2}} \frac{|dx|}{\sqrt{|d\omega|}} \end{aligned}$$

となる。

Maslov index により, 書き換えるのであるが, 定義や性質の説明は次の節に改めて述べる事とし

$$-i \text{sgn} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) = \tau(\lambda, \lambda_1, \mu_\varphi)$$

と書ける事のみ引用しておく。

3) Maslov index と  $\perp$  の定義の仕上げ

$V$  を  $2n$ 次元 real vector space

$E(v_1, v_2)$   $v_1, v_2 \in V$  を  $V$  上の pure imaginary valued の non degenerate skew symmetric bilinear form とする。

例 (3.1)

$$V = T_{(x_0, i\xi_0)}(\sqrt{-1}T^*M) \text{ とし}$$

$$d\omega = \sqrt{-1} \sum_{j=1}^n d\xi_j \wedge dx_j \text{ により}$$

$$E(v_1, v_2) = \langle d\omega, v_1 \wedge v_2 \rangle \text{ と定義する。}$$

$d\xi_j, dx_j$  の双対基底により  $V \cong \mathbb{R}^{2n} \ni (x, \xi)$   
と見なすと

$$E((x, \xi), (x', \xi')) = \frac{1}{\sqrt{-1}} (\langle x, \xi' \rangle - \langle x', \xi \rangle)$$

$V$  の subspace  $W$  の  $E$  に関する直交補空間を  $W^\perp$  と書く。  
 $W = W^\perp$  となる時  $W$  を Lagrangean と言う。  
例 (3.1) では,  $\sqrt{-1}T^*M$  の conic とは限らぬ Lagrangean  
 $Y$  に対して  $T_{(x_0, i\xi_0)}Y \subset T_{(x_0, i\xi_0)}(\sqrt{-1}T^*M)$  が  
Lagrangean になる。

## 定義 (3.2)

$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \subset V \text{ を 3つの Lagrangean として}$$

$$\tau(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = \operatorname{sgn}(E(x_1, x_2) + E(x_2, x_3) + E(x_3, x_1))$$

$$(x_1, x_2, x_3) \in \lambda_1 \oplus \lambda_2 \oplus \lambda_3$$

で定義される pure imaginary integer を Maslov index と言う。sgn は  $(x_1, x_2, x_3)$  についての 2次形式の  $\{\#(\operatorname{Im} > 0 \text{ の固有値}) - \#(\operatorname{Im} < 0 \text{ の固有値})\} \sqrt{-1}$  の値とする。

Maslov index の基本的な性質を述べよう。

- i)  $\tau(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = -\tau(\lambda_2, \lambda_1, \lambda_3) = -\tau(\lambda_1, \lambda_3, \lambda_2)$
- ii)  $\tau(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) - \tau(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_4) + \tau(\lambda_1, \lambda_3, \lambda_4) - \tau(\lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) = 0$
- iii)  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  を  $\dim(\lambda_i \cap \lambda_j) = \text{const.}$  で連続的に動かしても不変。
- iv)  $\tau(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \equiv \sqrt{-1}(n + \dim(\lambda_1 \cap \lambda_2) + \dim(\lambda_2 \cap \lambda_3) + \dim(\lambda_3 \cap \lambda_1)) \pmod{2\sqrt{-1}\mathbb{Z}}$

証明は付録 iii) を見てほしい。

## 例 (3.3)

例 (3.1) で  $\lambda_1 = \{x=0\}$ ,  $\lambda_2 = \{Ax=B\}$ ,  $\lambda_3 = \{\xi=0\}$  とする。  $\lambda_2$  は Lagrangean であった

めには  $\text{rank}(A, B) = n$  かつ  $A^t B = B^t A$  が必要十分である。 ( $\because \dim W + \dim W^\perp = 2n$  故  $\dim \lambda = n$  よって  $\text{rank}(A, B) = n$ ,  $A$ : non-singular なる条件は明らか。そうでないときは, 適当な symplectic transformation で  $A$ : non-singular に帰着する。) この時

$$\tau(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = \sqrt{-1} \text{sgn}(A^t B)$$

V)  $P \subset (\lambda_1 \cap \lambda_2) + (\lambda_2 \cap \lambda_3) + (\lambda_3 \cap \lambda_1)$  かつ  
 $P \subset P^\perp$  なる subspace があるとき

$P^\perp/P$  は  $E(U_1, U_2)$  によって symplectic space となるが,  $W \subset V$  に對して  $WP = [(W \cap P^\perp) + P]/P$  とすると  $(W^\perp)P = (WP)^\perp$  である。従って  $\lambda$  が Lagrangean なら  $\lambda^P \in \text{Lagrangean}$  この時

$$\tau(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = \tau(\lambda_1^P, \lambda_2^P, \lambda_3^P)$$

Maslov index によって  $-\sqrt{-1} \text{sgn} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}(x_0)$  を書こう。例(3.1)の記法で

$$\lambda = T_{(x_0, i\xi_0)} \pi^{-1}(x_0) = \{x = 0\}$$

$$\lambda_1 = T_{(x_0, i\xi_0)} \Lambda = \{x' = 0, \xi'' = 0\}$$

$$\mu_\varphi = T_{(x_0, i\zeta_0)} \Upsilon_\varphi = \{ \zeta' = 2Bx', \zeta'' = Ax'' \}$$

$\rho = \{ x=0, \zeta''=0 \}$  として  $V$  を適用すると

$$\begin{aligned} \tau(\lambda, \lambda_1, \mu_\varphi) &= \tau(\{x''=0\}, \{\zeta''=0\}, \{\zeta''=Ax''\}) \\ &= -\sqrt{A} \operatorname{sgn} A \end{aligned}$$

となる。

$L_1$  の定義の仕上げをしよう。

$$\begin{aligned} &\delta(u)(x_0, i\tau\zeta_0) e^{\frac{\pi}{4}\tau(\lambda, \lambda_1, \mu_\varphi)} \\ &= (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \frac{\sqrt{|d\omega|}}{|dx|} \delta(G)(i\tau) \tau^{\frac{n-l}{2}} \end{aligned} \quad (6)$$

$\varphi_a(x)$  を,  $\Lambda$  と  $\Upsilon_{\varphi_a}$  が  $(x_a, i\zeta_a)$  で常に transversal に交わるように,  $a$  について real analytic に動かしてみると

$$V_a(t) = \int \delta(t - \varphi_a(x)) dx$$

は  $a$  について real analytic. それで

$$V_a(t) = G_a(D_t) \delta(t - \varphi_a(x_a))$$

とした時  $\delta(G_a)$  も  $a$  について real analytic となる。

故に (6) の右辺は  $\Lambda$  上 ( $\Lambda'$  だけでなく) *real analytic* である。

結論

$$\sigma(U)(x, i\xi) e^{\frac{\pi}{4} \tau(\lambda, \lambda_1, \mu)}$$

は  $\mu \in T_{(x, i\xi)}(\sqrt{-1}T^*M)$  を  $\mu \cap \lambda = 0$   
 $\mu \cap \lambda_1 = 0$  を保って連続的に動かす時,  $\Lambda$  上 *real analytic* である。これを  $\sigma(U)(\mu)$  と書くと,  $\sigma(U)(\mu)$  は次に定義する  $L_\Lambda$  の section を与える。  
 定義 (3.4)

$\Lambda$  上に line bundle  $L_\Lambda$  を次のように定義する。

$U \subset \Lambda$  を単連結な近傍として,  $U$  の点を  $p$  で表わし

$$L_\Lambda(U) = \{ f(\mu_p) / \mu_p \text{ は } T_p(\sqrt{-1}T^*M) \text{ の} \}$$

Lagrangian  $\lambda_p = T_p \pi^{-1} \pi(p)$ ,  $\lambda_{1p} = T_p \Lambda$

と transversal をとると,

$$f(\mu_p) \in (\sqrt{U_\Lambda} \otimes \sqrt{U_M}^{-1})_p$$

但し a)  $\mu_p$  が  $p$  について continuously に動く時  $f(\mu_p)$

は *real analytic* な  $\sqrt{U_\Lambda} \otimes \sqrt{U_M}^{-1}$  の section

$$b) f(\mu_p) = f(\tilde{\mu}_p) e^{\frac{\pi}{4} (\tau(\lambda_p, \lambda_{1p}, \mu_p) - \tau(\lambda_p, \lambda_{1p}, \tilde{\mu}_p))}$$

$\tau(\lambda_p, \lambda_{1p}, \mu_p)$  は  $\mu_p$  が  $p$  について anti. に動いても  $\pi|_{\Lambda}$  の rank が変わる点で変化する。これに対して  $\tau(\lambda_p, \lambda_{1p}, \mu_p) - \tau(\lambda_p, \lambda_{1p}, \tilde{\mu}_p)$  は  $p$  について  $\Lambda$  上 locally constant である。しかし、一般に  $\Lambda$  は global には単連結ではないから ( $\Lambda$  は non-singular な部分だけ考えている。)  $L_{\Lambda} \simeq \sqrt{v_{\Lambda}} \otimes \sqrt{v_{\Lambda}^{-1}}$  とはならない。  $\Lambda = \sqrt{-1} T_N^* M$  の時は, global に上の同型が作れる。(この時は principal symbol という時にいちいち  $\mu$  をつけて考えない。)

次の諸公式が適当な付帯条件 (II, III は常に 0,  $K$ .) で成立する。

$$I) \quad \sigma(u(f(x))) = f^* \sigma(u)$$

$$II) \quad \sigma(Pu) = \sigma(P) \sigma(u) \quad \text{但し } P: \text{invertible}$$

$$III) \quad \sigma(\delta(x)) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \sqrt{\frac{|d\zeta|}{|dx|}}$$

$$IV) \quad \sigma\left(\int u(x, y) dy\right) = (2\pi)^{\frac{\text{dim}(\text{space})}{2}} \sigma(u(x, y) dy)$$

$$V) \quad \sigma(uv) = \sigma(u) \sigma(v)$$

このようにして定義した  $L_{\Lambda}$  の global section\* と M.O.S.  $m = P/g$  の global solution とが 1 対 1 に対応する事は明らかであろう。次に,  $\Lambda$  の交わりにおいて解の接続を調べる。

\* かつ, principal symbol に対応する方程式を満たすもの

## 4) regular intersectionの接続行列

二つの non-singular Lagrangean の交わりにおいて, principal symbol  $\sigma(U)$  がどのようにつながっているかを調べよう。principal symbol は量子化された接触変換に対して, 一斉に real analytic function multiple の変化をするだけ (証明はしなかつたが P20~P21の説明を見てほしい。P34の公式から証明するのも容易) なので, 方程式を標準形に変換して扱えばよい。

$\Lambda_0, \Lambda_1 \subset \sqrt{-1}T^*M$  を二つの Lagrangean とし交わり  $S = \Lambda_0 \cap \Lambda_1$  は,  $n-1$ 次元 non singular manifold として,  $\Lambda_0 \cup \Lambda_1$  に support を持つ system  $\mathcal{M} = \mathcal{P}U = \mathcal{P}/\mathcal{J}$  を考えよう。次の仮定をおく。

a)  $\Lambda_0$  と  $\Lambda_1$  は  $S = \Lambda_0 \cap \Lambda_1$  で "regular" に交わる\*。すなわち

$$T_p \Lambda_0 \cap T_p \Lambda_1 = T_p S$$

b)  $\overline{\mathcal{J}}$  は reduced

また  $\text{ord}_{\Lambda_j} U = e_j \quad (j=0,1)$

としよう。

\* P57の注意(1)を見てほしい。

この時, 接触変換によつて  $x_0^* = (0, i dx, \infty)$  の近傍で

$$A_0 = \{x_1 = \xi_2 = \dots = \xi_n = 0\}$$

$$A_1 = \{x_1 = x_2 = \xi_3 = \dots = \xi_n = 0\}$$

に変換され, 対応する量子化された接触変換で, 方程式は

$$(x_1 D_1 - \alpha) u = 0$$

$$(x_2 D_2 - \beta) u = 0$$

$$D_3 u = \dots = D_n u = 0$$

となる。但し  $\beta = e_0 - e_1 - \frac{1}{2} = \text{ord}_{A_0} u - \text{ord}_{A_1} u - \frac{1}{2}$  は不変である。

$u$  の algebraic な principal symbol は

$$\sigma_{A_0}(u) = \sum_1^{-1-\alpha} x_2^\beta \sqrt{\frac{d\xi_1 dx_2 \dots dx_4}{dx}}$$

$$\sigma_{A_1}(u) = \sum_1^{-1-\alpha} \sum_2^{-1-\beta} \sqrt{\frac{d\xi_1 d\xi_2 dx_3 \dots dx_4}{dx}}$$

であり,  $S$  で  $\sigma_{A_0}(u)$  は  $x_2^\beta \times$  正則関数,  $\sigma_{A_1}(u)$  は  $\xi_2^{-1-\beta} \times$  正則関数となっている。


$x_0^*$  における microfunction solution は 2次元ある。  
 $A_0 - S$  の連結成分のそれぞれでは, 解は1次元だから, それらを指定してしまえば, 交わりも含めて解であるために

は  $\Lambda_1 - S$  でも決まってしまう。この決まり方を表現する接続行列を求めたい。

標準形において独立な二つの解は (generic な  $\alpha, \beta$  に対して)

$$U_{\pm} = (x_1 + i'0)^{\alpha} (x_2 \pm i'0)^{\beta}$$

で与えられる。  $U_{\pm}$  の support を図示すると



となる。接続行列を決定するためには、この二つの解について、  $\sigma_{\Lambda_1}(U)$  と  $\sigma_{\Lambda_0}(U)$  の比を計算すればよい。しかしそのままでは、どちらも  $S$  で特異性を持つので、その正則部分を比べないといけない。  $\frac{\pi i \alpha}{2}$

$$\sigma_{\Lambda_0^{\pm}}(U_{\varepsilon}) = \frac{\sqrt{2\pi} e^{\frac{\pi i \alpha}{2}}}{\Gamma(-\alpha)} (x_2 + \varepsilon i'0)^{\beta} \sum_1^{-\alpha-1} \sqrt{\frac{|d\tilde{z}_1, dx_2, dx''|}{|dx|}}$$

$$\sigma_{\Lambda_1^+}(U_+) = \frac{2\pi e^{\frac{\pi i \alpha}{2}} e^{\frac{\pi i \beta}{2}}}{\Gamma(-\alpha)\Gamma(-\beta)} \sum_1^{-\alpha-1} \sum_2^{-\beta-1} \sqrt{\frac{|d\tilde{z}_1, d\tilde{z}_2, dx''|}{|dx|}}$$

$$\sigma_{\Lambda_1^-}(U_-) = \frac{2\pi e^{\frac{\pi i \alpha}{2}} e^{-\frac{\pi i \beta}{2}}}{\Gamma(-\alpha)\Gamma(-\beta)} \sum_1^{-\alpha-1} \sum_2^{-\beta-1} \sqrt{\frac{|d\tilde{z}_1, d\tilde{z}_2, dx''|}{|dx|}}$$

ここで  $\Lambda_0^\pm$  は  $x_2 \geq 0$   $\Lambda_1^\pm$  は  $\bar{x}_2 \geq 0$  の成分である。一般に、近傍の近傍で  $f_0$  と  $f_1$  を

$$\text{Im}\{f_0, f_1\} > 0^* \quad f_0|_{\Lambda_1} = 0 \quad f_1|_{\Lambda_0} = 0 \text{ と取り}$$

$$\Lambda_\nu^\pm = \{\pm f_\nu > 0\} \cap \Lambda_\nu \text{ とする。}$$

$$|f_1|^{\beta+1} \sigma_{\Lambda_1^\pm}(U_\varepsilon) = \frac{2\pi e^{\frac{\pi i \alpha}{2}} e^{\frac{\pi i \beta}{2}}}{\Gamma(-\alpha)\Gamma(-\beta)} \sum_1^{-\alpha-1} \sqrt{\frac{|d\bar{x}_1 d\bar{x}_2 dx''|}{|dx|}}$$

$$|f_0|^{-\beta} \sigma_{\Lambda_0^+}(U_\varepsilon) = \frac{\sqrt{2\pi} e^{\frac{\pi i \alpha}{2}}}{\Gamma(-\alpha)} \sum_1^{-\alpha-1} \sqrt{\frac{|d\bar{x}_1 dx_2 dx''|}{|dx|}}$$

$$|f_0|^{-\beta} \sigma_{\Lambda_0^-}(U_\varepsilon) = \frac{\sqrt{2\pi} e^{\frac{\pi i \alpha}{2}}}{\Gamma(-\alpha)} \sum_1^{-\alpha-1} \sqrt{\frac{|d\bar{x}_1 dx_2 dx''|}{|dx|}} \cdot e^{\varepsilon \pi i \beta}$$

$|f_1|^{\beta+1} \sigma_{\Lambda_1^\pm}(U_\varepsilon)$  は  $\sqrt{U_{\Lambda_1}} \otimes \sqrt{U_M}^{-1}$  の section である。

$|f_0|^{-\beta} \sigma_{\Lambda_0^\pm}(U_\varepsilon)$  は  $\sqrt{U_{\Lambda_0}} \otimes \sqrt{U_M}^{-1}$  の section である。

接触変換で不変にするためには  $L_\Lambda$  の section として比べなければならぬ。

$$S_1(\mu) = |f_1|^{\beta+1} \sigma_{\Lambda_1^\pm}(U_\varepsilon) e^{\frac{\pi}{4} \tau(\lambda, \lambda_{\Lambda_1}, \mu)}$$

$$S_0(\mu) = |f_0|^{-\beta} \sigma_{\Lambda_0^\pm}(U_\varepsilon) e^{\frac{\pi}{4} \tau(\lambda, \lambda_{\Lambda_0}, \mu)}$$

$$* \{f, g\} = \frac{1}{\sqrt{-1}} \sum \left( \frac{\partial f}{\partial \bar{x}_j} \frac{\partial g}{\partial x_j} - \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{\partial g}{\partial \bar{x}_j} \right) \text{ である。}$$

$S$ 上の正則関数を

$$\tilde{S}_1(\mu) = s_1(\mu) \sqrt{\frac{v}{|w \wedge df_1|}} \Big|_S$$

$$\tilde{S}_0(\mu) = s_0(\mu) \sqrt{\frac{v_1}{|w \wedge df_0|}} \Big|_S$$

で定義する。ここに  $w$  は  $S$  上の volume element  $V \neq M$  の volume element である。比

$$\tilde{S}_0(\mu) : \tilde{S}_1(\mu)$$

は  $v, w$  の取り方に依らない。しかし  $\mu, f_0, f_1$  に depend する。実は

$$\tilde{S}_0(\mu) e^{\frac{\pi}{4} \tau(\lambda_0, \lambda_1, \mu)} : \tilde{S}_1(\mu)$$

は  $\mu$  に依らない。  
 $\therefore \tilde{S}_0(\mu) e^{-\frac{\pi}{4} \tau(\lambda, \lambda_0, \mu)} : \tilde{S}_1(\mu) e^{-\frac{\pi}{4} \tau(\lambda, \lambda_1, \mu)}$

は  $\mu$  に依らないが、右側だけに  $e^{-\frac{\pi}{4} \tau(\lambda_0, \lambda_1, \lambda)}$  をかけたものも、もちろん  $\mu$  に依らない。よって基本性質の ii) から従う。 ( $S$  上)

更にこの比は、 $\underbrace{S}$  上、real analytic に変化する。(基本性質 iii)) 実は  $S$  のどの点かに依らぬ定数となる。それは標準形で計算すればよい。

$f_1 = \xi_2, f_0 = x_2, v = |dx|, w = |d\xi, dx''|$  と  
して計算すると

$$\begin{aligned}
 & |f_1|^{\beta+1} \sigma_{\lambda_1, \varepsilon}(U_\varepsilon)(\mu) \sqrt{\frac{|dx|}{|d\xi, d\xi_2, dx''|}} \Big|_S e^{\frac{\pi}{4} \tau(\lambda_1, \lambda_{1_0}, \mu)} \\
 & : \left( \begin{array}{c} |f_0|^{-\beta} \sigma_{\lambda_0^+}(U_\varepsilon)(\mu) \sqrt{\frac{|dx|}{|dx, d\xi_2, dx''|}} \Big|_S \\ |f_0|^{-\beta} \sigma_{\lambda_0^-}(U_\varepsilon)(\mu) \sqrt{\frac{|dx|}{|dx, d\xi_2, dx''|}} \Big|_S \end{array} \right) \\
 & = \frac{\sqrt{2\pi} e^{\frac{\varepsilon \pi i \beta}{2}}}{\Gamma(-\beta)} e^{\frac{\pi}{4} \{ \tau(\lambda, \lambda_1, \mu) + \tau(\lambda_1, \lambda_{1_0}, \mu) \}} \\
 & : \left( \begin{array}{c} 1 \\ e^{\varepsilon \pi i \beta} \end{array} \right) e^{\frac{\pi}{4} \tau(\lambda, \lambda_{1_0}, \mu)} \\
 & = \frac{\sqrt{2\pi}}{\Gamma(-\beta)} : \left( \begin{array}{c} e^{-\frac{\varepsilon \pi i \beta}{2}} \\ e^{\frac{\varepsilon \pi i \beta}{2}} \end{array} \right) e^{\frac{\pi}{4} \{ \tau(\lambda, \lambda_{1_0}, \mu) - \tau(\lambda, \lambda_1, \mu) \\
 & \qquad \qquad \qquad - \tau(\lambda_1, \lambda_{1_0}, \mu) \}} \\
 & \qquad \qquad \qquad \tau(\lambda_{1_0}, \lambda_1, \mu)
 \end{aligned}$$

今  $\lambda = \{x=0\}$

$\lambda_1 = \{x_1 = x_2 = \xi'' = 0\}$

$\lambda_{1_0} = \{x_1 = \xi_2 = \xi'' = 0\}$

であるから  $\tau(\lambda_{1_0}, \lambda_1, \lambda) = 0$

よ、上の比は

$$\frac{\sqrt{2\pi}}{\Gamma(-\beta)} : \left( \begin{array}{c} e^{-\frac{\varepsilon \pi i \beta}{2}} \\ e^{\frac{\varepsilon \pi i \beta}{2}} \end{array} \right) \quad \text{とある。}$$

最後に,  $f_1, f_0$  の選び方に依らないようにするには  
 比の右側に  $|\{f_0, f_1\}|^{\beta+\frac{1}{2}}$  をかけるとよい。以上から

$$\begin{aligned}
 & |f_1|^{\beta+1} \sigma_{\lambda_1, \varepsilon}(u_\varepsilon)(\mu) \sqrt{\frac{\nu}{|W_{\lambda_1} df_1|}} \Big|_S e^{\frac{\pi}{4} \tau(\lambda_1, \lambda_0, \mu)} \\
 & : |f_0|^{-\beta} |\{f_0, f_1\}|^{\beta+\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{\nu}{|W_{\lambda_0} df_0|}} \Big|_S \begin{pmatrix} \sigma_{\lambda_0^+}(u_\varepsilon)(\mu) \\ \sigma_{\lambda_0^-}(u_\varepsilon)(\mu) \end{pmatrix} \\
 & = \frac{\sqrt{2\pi}}{\Gamma(-\beta)} : \begin{pmatrix} e^{-\varepsilon \frac{\pi i \beta}{2}} \\ e^{\varepsilon \frac{\pi i \beta}{2}} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

がわかった。

## §2 概均質ベクトル空間の相対不変式の Fourier 変換

1) 概均質ベクトル空間と相対不変式,  $a$  函数,  $b$  函数,  $C$  函数

§1 で, 我々は simple な M.O.S. について考察した。

simple な M.O.S. が現われる具体的な場合としては, 概均質ベクトル空間の相対不変式の複素中の満たす M.O.S. が代表的である。この節では相対不変式の複素中の Fourier 変換の話にはいる前の準備をする。概均質ベクトル空間の基本事項については [5] を, local  $b$  函数については (相対不変式 1 個の場合) [1] を見て欲しい。(これらの知識のある人にとって, 相対不変式の数が 2 以上の場合の formulation だけが新しい。)

$V$  を  $n$  次元ベクトル空間\*,  $G \subset GL(V)$  を連結線型代数群とする\*\*。(G, V) が概均質ベクトル空間であるとは  $V$  の代数的真部分集合  $S$  があって  $V-S$  が単一の  $G$  orbit になっている時を言う。すなわち  $x_0 \in V-S$  として

$$V-S = Gx_0. \quad (\text{この時 } x_0 \text{ を generic point と言う})$$

$G_{x_0}$  を  $x_0$  の isotropy subgroup とすれば, この事は

$$\dim V = \dim G - \dim G_{x_0}$$

と同じである。実際計算などでは  $G$  の Lie 環  $\mathcal{O}_G$  が重要であ

\*この節では係数体は  $\mathbb{C}$  で考える。  
\*\*一般には  $G$  の  $GL(V)$  での表現を考える。

る。  $\mathcal{O}_{x_0} = \{A \in \mathcal{O} / Ax_0 = 0\}$  を使えば上式は

$$\dim V = \dim \mathcal{O} - \dim \mathcal{O}_{x_0}.$$

となる。  $x_0$  を与えた時  $\mathcal{O}_{x_0}$  は一次方程式を解けば得られるから、これによって概均質空間になる事を確かめる事ができる。

(例 1.1)

$G = GL(n, \mathbb{C})$   $V = \mathbb{C}^n$   $G$  は  $V$  に自然に作用する。  $S = \{0\}$  として概均質になる。

(例 1.2)

$G = GL(1, \mathbb{C}) \times SO(n, \mathbb{C})$   $V = \mathbb{C}^n$   $G$  は  $V$  に自然に作用する。  $SO(n, \mathbb{C})$  の元は  $V$  の多項式  $x_1^2 + \dots + x_n^2$  を不変にするものである。  $S = \{x_1^2 + \dots + x_n^2 = 0\}$  として概均質になる。

(例 1.3)

$G = GL(n, \mathbb{C}) \times SO(m, \mathbb{C}) \ni (g, h)$   
 $V = \{n \times m \text{ 行列} \} \ni x \quad (n < m \text{ とする})$

作用は  $x \longmapsto gxh^{-1}$

$x_0 = \begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \end{pmatrix}$  として  $\mathcal{O}_{x_0}$  を計算すると、概均質になる事は容易に確かめられる。実際は  $S = \{\det x^t x = 0\}$  である。

(例 1.4)

$$V \ni x = \begin{pmatrix} u_0 u_1 \cdots u_n \\ u_1 x_1 \\ \vdots \\ u_n \cdots x_n \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{G} \ni A = \begin{pmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \\ & \beta_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \beta_n \end{pmatrix}$$

作用  $x \mapsto Ax + {}^t(Ax)$  ここではLie環の作用を与えたが、これから指数写像によってLie群の作用を構成する事もできる。その際上記のAに対して  $\exp A$  を計算するのではなく、 $\mathcal{G}$  の base  $A_1, \dots, A_N$  を  $\exp A_j$  が簡単な形になるように取って計算する (例えば  $A_1 = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \end{pmatrix}$   $A_2 = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \end{pmatrix}$  etc) のがコツである。(木村の方法)  
 $S = \{ x_1 \cdots x_n \det x = 0 \}$  である。

(例 1.5)

$$V \ni x = \begin{pmatrix} x_1 x_2 \\ x_1 x_2 x_3 \\ x_2 x_3 x_4 \end{pmatrix} \quad \mathcal{G} \ni A = \begin{pmatrix} \alpha - \beta & & \\ \gamma & \alpha & \\ \delta & 2\gamma & \alpha + \beta \end{pmatrix}$$

作用  $x \mapsto Ax + {}^t(Ax)$ 

$$S = \{ x_1 \det x = 0 \}$$

概均質ベクトル空間の系統的な分類については [6] を見てほしい。そこでは既約正則な場合の完全な分類が与えられ

ている。例1.4 例1.5は既約でない場合で、佐藤先生がFourier変換の演習問題として提出され 数理研の短期共同研究で共同計算したものである。

例1.1は概均質ベクトル空間としては特殊な例に属する。その理由は、特異点集合が1点だけからなる事である。以下  $S$  を超曲面であると仮定する。

$S = S_1 \cup \dots \cup S_\ell$  と既約超曲面に分解し、  
 $S_i = \{f_i(x) = 0\}$  ( $i=1, \dots, \ell$ ) と既約多項式で表わされた時、 $f_i(x)$  は  $G$  の作用に関して相対不変式になる。  
 すなわち  $G$  の rational character  $\chi_i$  があって

$$f_i(g \cdot x) = \chi_i(g) f_i(x)$$

あるいは Lie 環で表現すれば、 $\chi_i$  の微分を  $\delta\chi_i$  と書いて

$$\langle Ax, \text{grad} \rangle f(x) = \delta\chi_i(A) f(x)$$

となる。 $\mathcal{O}_x$  を  $[\mathcal{O}_f, \mathcal{O}_f]$  と generic point  $x_0$  の isotropy  $\mathcal{O}_{f, x_0}$  から生成されたイデアルとする。 $\mathcal{O}_f$  の character  $\delta\chi$  が相対不変式 ( $V$  上多価なものも含める) に対応しているためには  $\delta\chi|_{\mathcal{O}_x}$  が必要十分であり 言い換えると

$$\mathcal{O}_x = \{ A \in \mathcal{O}_f \mid \delta\chi_i(A) = 0 \quad i=1, \dots, \ell \}$$

となる。  $\dim(\mathcal{O}_f/\mathcal{O}_{f_0}) = l$  であり,  $\delta\chi_i$   $i=1, \dots, l$  は  $\mathcal{O}_f/\mathcal{O}_{f_0}$  の dual space (それを  $X$  と書く) の base になる。

記号を説明する。  $s = (s_1, \dots, s_l) \in \mathbb{C}^l$   
 $s\delta\chi = \sum_{j=1}^l s_j \delta\chi_j$ ,  $f^s = f_1^{s_1} \dots f_l^{s_l}$   
 但し,  $\delta\chi_j$  は矢をつけてほしい。  $\chi = (\chi_1, \dots, \chi_l) \in \mathbb{Z}^l$   
 $\delta\chi = \sum_{j=1}^l \chi_j \delta\chi_j$  の意味にたうからである。

$V^*$  を  $V$  の dual space とする。

$$\varphi_s(x) = \text{grad} \log f(x)^s$$

によって  $V - S \longrightarrow V^*$  の写像が定義される。これは

$$\langle Ax, \varphi_s(x) \rangle = s\delta\chi(A)^* \quad (7)$$

を満たす。ある  $S$  (従って generic な  $S$ ) に対して

$$\text{Jacobian } \varphi_s(x) = \text{Hessian } \log f(x)^s \neq 0$$

となる時  $V$  を regular という。この時  $V^*$  もまた 概均質ベクトル空間となる。ここで  $G, \mathcal{O}_f$  の  $V^*$  への作用は

$$\langle gx, {}^t g^{-1}y \rangle = \langle x, y \rangle$$

\*  $\langle \ , \ \rangle$  は  $V$  と  $V^*$  の内積

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, {}^tAy \rangle$$

が決まる。  $V^*$  の特異点集合  $S^*$  は同じ数  $l$  個の既約成分に分かれ Jacobian  $\varphi_S \neq 0$  なる時  $\varphi_S$  は  $V-S$  から  $V^*-S^*$  への同型を与える。  $V^*$  の相対不変式については

$$f_i^*({}^tg^{-1}y) = \chi_i(g) f_i^*(y)$$

により  $f_i^*$  を定義する。( [5] で用いられている記法とは違うから注意してほしい。)

以下  $V \times V^* \cong T^*V$  と同一視する。

$$W = \{ (x, \text{grad } \log f^S) \in V \times V^* / S \in \mathbb{C}^l, x \in V-S \}$$

の closure

とする。  $W$  は  $n+l$  次元である。

$$W' = \{ (x, y) \in V \times V^* / \langle Ax, y \rangle = 0 \text{ for } \forall A \in \mathcal{O}_0 \}$$

を考えると (7) から明らかに

$$W \subset W'$$

であるが、一般にはこれは等しくない。

$W'$  上の関数  $S_1, \dots, S_l^*$  を

$$\langle Ax, y \rangle = \sum_{i=1}^l S_i(x, y) \delta \chi_i(A) \quad (8)$$

\*  $f^S$  の  $S$  と混同しないように気をつけてほしい。

で定義する。あるいは  $\delta x_i \in (\mathcal{O}_f/\mathcal{O}_{f_0})^*$  に対する  
dual base  $A_i \in \mathcal{O}_f/\mathcal{O}_{f_0}$  を取って

$$S_i(x, y) = \langle A_i x, y \rangle$$

と書いてもよい。

$$W_0 = W \cap \{S_1 = \dots = S_\ell = 0\}$$

とおく。これは Lagrangean になる。

$V \times V^*$  の Lagrangean variety  $\Lambda$  が "good Lagrangean" とは

1)  $\Lambda \subset W_0$

2)  $\Lambda$  は  $G$  pre-homogeneous

の時を言う。

一般に  $\Lambda$  を  $V \times V^*$  の 既約な Lagrangean で  
 $\mathbb{C}^* \times \mathbb{C}^*$  の action で不変, すなわち

$$(x, y) \in \Lambda \rightarrow (cx, c'y) \in \Lambda \text{ for } c, c' \in \mathbb{C}^*$$

なるものとする

$$\pi: V \times V^* \longrightarrow V \quad \pi^*: V \times V^* \longrightarrow V^*$$

に対して

$\pi(\Lambda) \subset V$ ,  $\pi^*(\Lambda) \subset V^*$  はそれぞれ既約かつ homogeneous な sub-variety であり,

$$\Lambda = \overline{T_{\pi(\Lambda)_{\text{reg}}}^* V} = \overline{T_{\pi^*(\Lambda)_{\text{reg}}}^* V^*}$$

が逆に対応する。ここで式の意味は  $\pi(\Lambda)$ ,  $\pi^*(\Lambda)$  の non singular part の conormal bundle の  $V \times V^*$  における closure である。

さて  $\Lambda$  が good Lagrangean の時は,  $G$  が  $\Lambda$  に pre homogeneous に作用するから,  $\pi(\Lambda)$ ,  $\pi^*(\Lambda)$  はともに,  $V$ ,  $V^*$  における  $G$  orbit の closure になっている。しかし, 逆は必ずしも成立しない。詳しくは [7] を見てください。

定理 (1.6)

$\Lambda$  が good Lagrangean ならば,  $\Lambda$  の generic point の近傍で  $W = W'$  でありさらに,  $W$  は non singular になる。さらに  $W$  の中で  $\Lambda$  は

$$\Lambda = \{s_1 = \dots = s_\ell = 0\}$$

で定義されている。

証明にはいる前に, 定理の意味を説明しておく。

我々は函数  $f(x)^S$  を, それが満たす微分方程式によって促えることを目標とした。その点を詳論しよう。

$\mathcal{D}$  は  $V$  上の微分作用素の層,  $\mathcal{D}[S]$  を  $S = (S_1, \dots, S_n)$  についての多項式で係数が微分作用素であるものとする。

$$\mathcal{J}[S] = \{ P(S) \in \mathcal{D}[S] \mid P(S) f^S = 0 \}$$

とおき,  $S \in \mathbb{C}^l$  を固定して  $\mathcal{D} / \mathcal{J}[S]$  を考えたものが  $f^S$  の満たす微分方程式系である (と定義する)。しかしこの方程式についてはあまりよくわかっていない。generic な  $S$  については, M.O.S. になりその support (擬微分方程式と考えて) が  $W_0$  に一致する事が予想される。

$f(x)^S$  が, 今考えているような, 概均質ベクトル空間の相対不変式の場合は  $\mathcal{J}[S]$  は次の方程式を含む。

$$\mathcal{M} : \{ \langle Ax, D_x \rangle - S \delta X(A) \} u = 0 \text{ for } \forall A \in \mathcal{G}$$

これは一般には,  $\mathcal{J}[S]$  から決まる方程式と一致しない。しかし, good Lagrangean  $\Lambda$  の近くでは, 定理 (1.6) の以下の証明からわかるように  $\mathcal{M}$  は simple な M.O.S. となり,  $\mathcal{D} / \mathcal{J}[S]$  の support に  $\Lambda$  がはいるとすれば  $\mathcal{D} / \mathcal{J}[S]$  は  $\mathcal{M}$  と一致する。結論として, good Lagrangean  $\Lambda$  の generic point の近傍では,

$f(x)$  の満たす方程式としては  $\mathcal{M}$  を考えてよい事になる。

(定理の証明)

$\Lambda^n \subset W^{n+l} \subset W'$  であるから  $W'$  が  $(n+l)$  次元  $\text{non singular}$  である事を示せば  $W=W'$  となる。そのためには、

$$d \langle Ax, y \rangle \Big|_{\text{at}(x_0, y_0)} \quad A \in \mathcal{Q}_0 \quad ((x_0, y_0) \in \Lambda)$$

のうち  $(n-l)$  個の独立なものがある事を示せばよい。

すなわち  $\dim \{ ({}^tAy_0, Ax_0) \in V^* \times V / A \in \mathcal{Q}_0 \} = n-l(q)$  を示す。

ところが  $\Lambda$  が  $G$  pre homog. だから

$$\dim \{ (Ax_0, -{}^tAy_0) \in V \times V^* / A \in \mathcal{Q} \} = n$$

であるが  $\dim(\mathcal{Q}/\mathcal{Q}_0) = l$  であるから

$\dim \{ (Ax_0, -{}^tAy_0) \in V \times V^* / A \in \mathcal{Q}_0 \} \geq n-l$  である。一方  $W \subset W'$  故  $\dim W' \geq n+l$

よって (9) が言えた。後半も  $S_i$  の定義から明らかであろう。

good Lagrangian  $\Lambda$  における  $\alpha$  函数  $\alpha_\Lambda^\alpha(S)$  を定義しよう。これは、 $\Lambda$  の generic point の近傍で、 $W$  上の函数と見た時の  $f^\alpha = f_1^{\nu_1} \cdots f_l^{\nu_l}$  の零点を記述するものである。(取りあえず  $\nu_j \in \mathbb{Z}_+$  としておく。)

## 命題 (1.7)

$\Lambda$  の generic point の近傍で,  $f^\lambda$  を  $W$  上の函数と見た時の零点集合は,  $S$  の同次多項式  $a_\lambda^\lambda(s)$  の零点として表わせる\*。これを  $\Lambda$  における局所  $q$  函数という。  $f_\lambda^\lambda \stackrel{\text{def}}{=} f^\lambda / a_\lambda^\lambda$  は  $\Lambda$  上正則かつ non zero な  $\Lambda$  上の  $G$  相対不変式。

$\therefore$ )  $f^\lambda$  の零点が,  $S_i$  だけで決まり, かつ  $S_i$  について homogeneous である事を示せばよい。まず  $S_i$  が  $G$  不変である事を言おう。  $g \in G$  として

$$\langle Ax, y \rangle = \langle Agx, {}^t g^{-1} y \rangle \quad \text{for } (x, y) \in W$$

を言えばよい。  $A - g^{-1} A g \in \mathcal{O}_0$  だから

$$\langle (A - g^{-1} A g)x, y \rangle = 0 \quad \text{for } (x, y) \in W$$

となるからそれは明らか。従って  $W$  において  $S_i = \text{const}$ ,  $(i=1, \dots, l)$  なる集合は  $G$  不変で  $n$  次元である。ところが  $\Lambda$  が "good Lagrangean" であるから  $\Lambda$  (すなわち  $S_i = 0$  ( $i=1, \dots, l$ )) は  $G$  homogeneous。よって  $S_i = \text{const}$  ( $i=1, \dots, l$ ) も  $G$  homogeneous である。  $f^\lambda$  は  $G$  相対不変であるから  $g \in G$  で動かしても  $f^\lambda$  の値は non zero 倍されるだけである。よって  $f^\lambda = 0$  の零点は  $S$  だけで記述できる事がわかった。それが  $S$  について homogeneous になる事は  $f^\lambda$  \*  $a_\lambda^\lambda(s)$  は  $f_\lambda^\lambda$  が正則かつ non zero となるように取る。

が homogeneous な事から明らかである。  $f_{\Lambda}^{\chi}$  の相対不変性は  $f^{\chi}$  の相対不変性と  $S_i$  の絶対不変性から明らか。

local  $u$  関数が定義できたから [1] と同じ手続きによって local  $\psi$  関数の存在と一意性が言える。

定理 (1.8)  $S$  の多項式  $\psi_{\Lambda}^{\chi}(s)$  と

$\sigma(P_j)|_{\Lambda} = f_{\Lambda}^{\chi_j}$  なる  $\Psi, D, O_p, P_j$  が存在して

$$f^{S+\chi} = \psi_{\Lambda}^{\chi}(s) P_1 \cdots P_\ell f^S$$

証明は [1] を見て考えてもらう事にして、意味を説明する。

$f^S$  は  $M, O, S, \mathcal{M}$  の generator  $U$  のこととし、

$f^{S+\chi} = f^{\chi} U$  とする。従って上の等式を言い換えると

$$f^{\chi} - \psi_{\Lambda}^{\chi}(s) P_1 \cdots P_\ell \in \sum_{A \in \mathcal{Q}} \mathcal{P}(\langle Ax, D_x \rangle - s \delta \chi(A))$$

となる。  $f^{S+\chi}$  を  $\varphi(s) P f^S$  の形に表わす事は、もちろん unique ではない。  $\varphi(s) = 1$   $P = f^{\chi}$  でもよい。

定理で与えた表現は  $\sigma(P)|_{\Lambda} \neq 0$  という特別な形をしている。すなわち  $P$  は invertible operator である。  $P$  を invertible に限れば、  $\varphi(s)$  は定数倍を除き確定する。それが  $\Lambda$  における local  $\psi$  関数である。!

$a_1^\chi(s)$  は  $b_1^\chi(s)$  の最高次部分であり,  $b_1^\chi(s)$  は cocycle 条件  $b_1^{\chi+\chi'}(s) = b_1^\chi(s) b_1^{\chi'}(s+\chi)$  を満たす。従って  $\chi \geq 0$  の仮定を取りはらっても local  $b$  関数を定義する事ができて定理 (1.8) が成り立つ。[1] におけるのと全く同じようにして, 次の構造定理が成り立つ。

命題 (1.9)

$\mathcal{X} = (\mathcal{O}_V/\mathcal{O}_{V_0})^*$  上の linear form  $\delta \chi_i$  において整数値を取るような  $e_j$  が存在して ( $j=1, \dots, N$ )

$$a_1^\chi(s) = e_1(s)^{e_1(\chi)} \cdots e_N(s)^{e_N(\chi)}$$

$$b_1^\chi(s) = [e_1(s) + \alpha_1]^{e_1(\chi)} \cdots [e_N(s) + \alpha_N]^{e_N(\chi)}$$

( $\alpha_j$  は定数) の形に書ける。

実際に  $b_1^\chi(s)$  を求めるのは次の定理に依る。詳しくは  $l=1$  の場合の [1] を見てほしい。(記号, 証明, 意味などすべて)

定理 (1.10)

①

→ 交わりは  $G$  pre homogeneous  $\mathbb{Z}$ -generic point  $(x_0, y_0)$

② =  $T_{Gx_0}^* V$

$$\int_V \pi^* \omega_{x_0, y_0}^* / \omega_{x_0, y_0}^*(A) = \frac{m}{n+m} \quad (m, n) = 1$$

または上式の左辺が不定の時は  $m=1$   $n=0$  とする。

この時\*

$$\frac{b_{\lambda_0}^x(s)}{b_{\lambda_1}^x(s)} = \left[ e_1(s) + \frac{a_1}{m+n} \right]^{e_1(x)} \cdots \left[ e_1(s) + \frac{a_{1+n}}{m+n} \right]^{e_1(x)}$$

$$\text{但し } e_1(s) + \frac{a_1}{m+n} = \frac{1}{n+1} (\text{ord}_{\lambda_1} f^s - \text{ord}_{\lambda_0} f^s) + \frac{m}{2}$$

$V$  の座標を固定して  $V$  上の  $n$  form  $dx = dx_1 \cdots dx_n$  を考えよう。  $W \xrightarrow{\pi} V$  を projection とし、  $W$  上の  $n+l$  form  $\pi^*(dx) \wedge ds$  ( $ds = ds_1 \cdots ds_l$ ) を考えると、命題 (1.7) と同じ論法で次が言える。

命題 (1.11)

$S$  の同次多項式  $C_1(s)$  があって

$$\frac{1}{C_1(s)} \pi^*(dx) \wedge ds$$

は正則かつ non zero である。また

$$\omega_1 = \left\{ \frac{1}{C_1(s)} \pi^*(dx) \wedge ds \right\} / ds \Big|_1$$

\* 記号  $[t]^v$  については P58 の注意 (3).

は  $\Lambda$  上の  $n$  form で、定数倍を除いて unique に決まり  
character  $\chi_0(g) = \det_V g$  に対応する相対不変  $n$  form  
になる。

[1] にあるのと同じく次の定理が成り立つ。

定理 (1.12)

$\Lambda$  を good Lagrangean とすると

$$\sigma_1(f^S) = f_1^S \sqrt{\omega_1} / \sqrt{dx}$$

$$\text{ord}_1 f^S = s \delta \chi(A_0) - \text{tr}_{V_{x_0}^*} A_0 + \frac{1}{2} \dim V_{x_0}^*$$

最も基本的な例 (1.2) について、以上の理論を説明しよう。

$n \geq 3$  とする。この時  $f(x) = x_1^2 + \dots + x_n^2$  は既約で  
 $l=1$  となる。  $u = f(x)^S$  の満たす方程式は

$$\begin{cases} (x_1 D_1 + \dots + x_n D_n - 2S) u = 0 \\ (x_i D_j - x_j D_i) u = 0 \end{cases}$$

である。


$V$  の  $G$  orbit への分解  $V - S \sqcup S - \{0\} \sqcup \{0\}$  に  
対応して, Lagrangean が三つある。

$$\Lambda_2 = \{(x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)\}$$

$$\Lambda_1 = \{(0, \dots, 0, \xi_1, \dots, \xi_n)\}$$

$$\Lambda_0 = \{(x, \xi) / f(x) = f(\xi) = 0 \quad x \parallel \xi\}$$

これらは, good orbit である。我々に必要な情報は次の  
ような graph に記入される\*。



ここで  $\circ$  は Lagrangean を表わし, codim 1 で交わ  
っている Lagrangean を棒でつなぐ。0,  $-s - \frac{1}{2}$ ,  $-2s - \frac{n}{2}$   
は order であり  $s+1$ ,  $s + \frac{n}{2}$  は local 化函数の  
比である。

注意(1)  $Z$  を  $T^*X$  中の  $\dim Z \leq n-2$  なる集合と  
すると Lagrangean  $\Lambda$  に support を持つ二つの  
M.O.S.  $\mathcal{M}_1$  と  $\mathcal{M}_2$  が

\* graph の作り方については [8] を見てほしい。

$$\mathcal{M}_1|_{A-2} \cong \mathcal{M}_2|_{A-2}$$

とすれば実は  $\mathcal{M}_1 \cong \mathcal{M}_2$  である。これから  $\text{codim } 1$  の  
交わりのみが重要である。

注意(2) hypersurface の conormal の order  
は常に  $-S - \frac{1}{2}$ , また regular pre homogeneous  
の時, 原点の conormal の order は  $-\sum_{i=1}^{\ell} r_i S_i - \frac{n}{2}$   
但し  $r_i = \deg f_i(x)$ ,  $n = \dim V$  である。

注意(3)

$$[t]^\nu \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\Gamma(t+\nu)}{\Gamma(t)} \quad \text{と定義する。}$$

$$\nu > 0, \text{ 整数 なら } [t]^\nu = t(t+1)\cdots(t+\nu-1)$$

$$\nu = 0 \quad \text{なら } [t]^0 = 1$$

$$\nu < 0, \text{ 整数 なら } [t]^\nu = \frac{1}{(t+\nu)\cdots(t-1)}$$

## 2) 相対不変式の Fourier 変換

$(G^{\mathbb{C}}, V^{\mathbb{C}})$  を regular な概均質ベクトル空間とし、その real form  $(G, V)$  をひとつ決める。ここで  $G$  は実連結代数群である。  $V$  上に、相対不変式  $f_1, \dots, f_\ell$  が決まる。我々の目標は  $f(x)^S = f_1(x)^{s_1} \dots f_\ell(x)^{s_\ell}$  の Fourier 変換を計算する事である。

## 例 (2.1)

$$(G^{\mathbb{C}}, V^{\mathbb{C}}) = GL(1, \mathbb{C}) \times SO(n, \mathbb{C}) \quad (n \geq 3)$$

□ ⊗ □

の real form は  $0 \leq q \leq p \leq n$   $p+q=n$  として

$$(G, V) = GL(1, \mathbb{R})_+ \times SO(p, q, \mathbb{R})_0$$

□ ⊗ □

但し  $GL(1, \mathbb{R})_+ = \mathbb{R}_+$ ,  $SO(p, q, \mathbb{R})_0 = \{g \in SL(p+q, \mathbb{R}) \mid gJ^t g = J, J = \begin{pmatrix} I_p & \\ & -I_q \end{pmatrix}\}$  の単位元の連結成分。  
相対不変式は一個であり、具体的に

$$i) f(x) = x_1^2 + \dots + x_n^2 \quad q=0$$

$$ii) f(x) = x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 - x_n^2 \quad q=1$$

$$iii) f(x) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_n^2 \quad q \geq 2$$

となる。iii) は  $n \geq 4$  の場合に現われる。

complexで考えている時と違って  $V - \{x \in V / f(x) = 0\}$  はG orbitにはならない。連結成分がG orbitになる。それらを  $V^{(1)}, \dots, V^{(N)}$  としよう。例(2.1)では

$$i) N=1 \quad V^{(1)} = V - \{0\}$$

$$ii) N=3 \quad V^{(1)} = \{x \in V; x_n > 0, f(x) < 0\}$$

$$V^{(2)} = \{x \in V; f(x) > 0\}$$

$$V^{(3)} = \{x \in V; x_n < 0, f(x) < 0\}$$

$$iii) N=2 \quad V^{(1)} = \{x \in V; f(x) < 0\}$$

$$V^{(2)} = \{x \in V; f(x) > 0\}$$

となる。

$$U_\nu(s) = \begin{cases} |f(x)|^s = |f_1(x)|^{s_1} \dots |f_\ell(x)|^{s_\ell} & x \in V^{(\nu)} \\ 0 & x \notin V^{(\nu)} \end{cases}$$

で定義される  $V$  上の超函数  $U_\nu(s)$  ( $\nu = 1, \dots, N$ ) は M.O.S.

$$\mathcal{M}: \{ \langle Ax, D_x \rangle - s \delta \chi(A) \} u = 0$$

の解である。一方  $V^*$  の方も、 $N$  個のG orbit  $V^{*(\nu)}$  に分かれる。

$$U_\nu^*(s) = \int_{V^{*(\nu)}} |f^*|^s(y) e^{i \langle y, x \rangle} dy$$

は、 $V$  上の超函数であり、 $U_\nu^*(s + \lambda_0)$  を考えると

これもまた  $M$  の解である。但し  $\chi_0$  は

$$\chi_0(g) = \det_V g$$


で決まる character である。

$$\begin{aligned} \therefore & \int_{V^*(U)} |f^*|^{s+\chi_0}(y) e^{i\langle y, gx \rangle} dy \\ &= \int_{V^*(U)} |f^*|^{s+\chi_0}(y) e^{i\langle tg y, x \rangle} dy \\ &= \int_{V^*(U)} |f^*|^{s+\chi_0}(tg^{-1}y) e^{i\langle y, x \rangle} d(tg^{-1}y) \\ &= \chi^s(g) \int_{V^*(U)} |f^*|^{s+\chi_0}(y) e^{i\langle y, x \rangle} dy \quad \text{q.e.d.} \end{aligned}$$

generic な  $S$  に対しては、 $V$  上の  $M$  の超函数解は、 $N$  次元ある。(この事は、この節以下の議論で順次明らかになる。) 二組の解空間の base  $u_\nu(S)$  ( $\nu=1, \dots, N$ ) と  $u_\nu^*(S+\chi_0)$  ( $\nu=1, \dots, N$ ) の間の変換行列を求める事が、Fourier 変換の計算である。

一般の場合を考える前に例(2.1)で説明しておこう。

complex における Lagrangean のつながり方を表わす図 (p57) に対応して real Lagrangean のつながり方を表わす図は次のようになる。



complex で考えた時は,  $T^*V^{\mathbb{C}} \cong V^{\mathbb{C}} \times V^{\mathbb{C}*}$  の中に  $\Lambda_0, \Lambda_1, \Lambda_2$  があつたわけだが, real で考える時には  $\sqrt{-1}T^*V \cong V \times V^*$  と同一視して考え,

$(x, \int y dx)$   $(x, y)$   
 $\Lambda_i \cap \sqrt{-1}T^*V$  の連結成分\*を  $\Lambda_i^{(\nu)}$  とおく。  $\Lambda_i$  が good Lagrangean なら  $\Lambda_i^{(\nu)}$  は  $G$  orbit となっている。従つて  $\Lambda_i^{(\nu)}$  を指定するには, その代表点を示せばよい。

$$\Lambda_2^{(1)} \quad \begin{matrix} \text{代表点} \\ (x_2^{(1)}, y_2^{(1)}) \end{matrix} = \left( \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$\Lambda_2^{(2)} \quad (x_2^{(2)}, y_2^{(2)}) = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

\*正確には  $\Lambda_i$  ではなく  $(x_0, y_0) \in \Lambda_i$  を generic point として  $G(x_0, y_0)$

$$\Lambda_2^{(3)}(x_2^{(3)}, y_2^{(3)}) = \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$\Lambda_1^{(1)}(x_1^{(1)}, y_1^{(1)}) = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\Lambda_1^{(2)}(x_1^{(2)}, y_1^{(2)}) = \left( \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\Lambda_1^{(3)}(x_1^{(3)}, y_1^{(3)}) = \left( \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\Lambda_1^{(4)}(x_1^{(4)}, y_1^{(4)}) = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\Lambda_0^{(1) \text{ 代表点}}(x_0^{(1)}, y_0^{(1)}) = \left( \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\Lambda_0^{(2)}(x_0^{(2)}, y_0^{(2)}) = \left( \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$\Lambda_0^{(3)}(x_0^{(3)}, y_0^{(3)}) = \left( \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

図で  となっているのは,  $\text{codim } 1$  の交わりを示す。例えば  $\Lambda_2 \cap \Lambda_1 \cap \sqrt{-1}T^*V$  は二つの成分からなり, それぞれは  $G$ -orbit になっている。そのうちの一方の generic point は

$$\left( \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = (x_1, y_2)$$

であり,  $G(x_1, y_2)$  を中心として  $\Lambda_2^{(1)}, \Lambda_2^{(2)}$  と  $\Lambda_1^{(1)}, \Lambda_1^{(4)}$  とが交わっている。この点をはきりさせるために, 4つのLagrangeanの generic point を書いてやると

$$\begin{array}{c} \Lambda_1^{(1)} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon \end{pmatrix} \right) \\ \Lambda_2^{(1)} \left( \begin{pmatrix} 1-\varepsilon \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \text{ --- } \Lambda_2^{(2)} \left( \begin{pmatrix} 1+\varepsilon \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \\ \Lambda_1^{(4)} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\varepsilon \\ -\varepsilon \end{pmatrix} \right) \end{array}$$

となる。ここで  $\varepsilon > 0$  であり,  $\varepsilon = 0$  の時, 交わりの generic point になる。

さて, 具体例として上記の例を思い浮かべてもらう事として一般論に戻ろう。

$\Lambda$  を good Lagrangean ( $\text{real}^*$ ) とし  $\Lambda^{(1)}$  をその連結成分とする。M.O.S.  $\mathcal{M}$  は  $\Lambda$  で simple だから,  $\Lambda^{(1)}$  における microfunction solution は一次元である。その base を指定しよう。そのためには principal symbol を指定すればよい。

\* pure imaginary と言うべきかも知れないが real と統一する。

$\Lambda^{(\nu)}$  の generic point を  $(x^{(\nu)}, y^{(\nu)})$  とすると  $\Lambda^{(\nu)} = \sqrt{-1} T_{Gx^{(\nu)}}^* V$  である。すなわち  $\Lambda^{(\nu)}$  は conormal bundle になっている。そこで  $\Lambda^{(\nu)}$  上で principal symbol が

$$\sigma_{\Lambda^{(\nu)}}(U_{\Lambda^{(\nu)}}) = |f_{\Lambda}|^S \sqrt{|(c_{\nu})|} / \sqrt{|dx|} \quad (50)$$

となるような microfunction solution を  $U_{\Lambda^{(\nu)}}$  とする。

補題 (2.2)

$\Gamma$  を  $V^*$  の cone とする。  $\varphi(y)$  を  $\Gamma$  で定義された  $k$  次 homogeneous な real analytic function とする。

$$u = \int_{\Gamma} \varphi(y) e^{i\langle y, x \rangle} dy$$

は、  $0 \times \Gamma \subset V \times V^*$  の近傍で定義され、  $0 \times \Gamma$  に support を持つ microfunction であり、その principal symbol は

$$\sigma(u) = (2\pi)^{\frac{n}{2}} \varphi(y) \sqrt{|dy|} / \sqrt{|dx|}$$

で与えられる。

$$\begin{aligned}
& \therefore \int \varphi(y) e^{i\langle y, x \rangle} dy \\
&= \int_0^\infty \int_{|\xi|=1} \varphi(r\xi) e^{ir\langle \xi, x \rangle} r^{n-1} dr \omega(\xi) \\
&= \int_0^\infty r^{k+n-1} e^{ir\langle \xi, x \rangle} dr \int_{|\xi|=1} \varphi(\xi) \omega(\xi) \\
&= \int_{|\xi|=1} \varphi(\xi) \Phi_{k+n}(i\langle \xi, x \rangle + i0) \omega(\xi)
\end{aligned}$$

今  $\sqrt{-1} T^* V \cong V \times V^*$  と同一視しているから  
 $(x, \sqrt{-1} y dx) \leftrightarrow (x, y)$

$$\sigma(u) = (2\pi)^{\frac{n}{2}} \varphi(y) \sqrt{|dy|} / \sqrt{|dx|} \quad \text{となる.}$$

g.e.d.

この補題によって  $U_\nu^*(s+\lambda_0)$  の  $0 \times V^{*(\nu)}$  における principal symbol が計算できる。例 (2.1) で言えば、 $\Lambda_2^{(1)}, \Lambda_2^{(2)}, \Lambda_2^{(3)}$  でわかる事になる。§1の4)の結果を利用して、 $\Lambda_2^{(1)}$  と  $\Lambda_2^{(2)}$  から  $\Lambda_1^{(1)}$  と  $\Lambda_1^{(2)}$  がわかり、 $\Lambda_2^{(2)}$  と  $\Lambda_2^{(3)}$  から  $\Lambda_1^{(3)}$  と  $\Lambda_1^{(4)}$  がわかる。次いで、 $\Lambda_1^{(1)}$  と  $\Lambda_1^{(4)}$  から  $\Lambda_0^{(1)}$  と  $\Lambda_0^{(2)}$ 、 $\Lambda_1^{(2)}$  と  $\Lambda_1^{(3)}$  から  $\Lambda_0^{(2)}$  と  $\Lambda_0^{(3)}$  における principal symbol がわかる。この時、 $\Lambda_0^{(2)}$  の値はどちらから求めても同じになる事は、 $U_\nu^*(s+\lambda_0)$  が  $V \times V^*$  全体で定義されているから当然である。

このようにして  $U_\nu^*(s+\chi_0)$  の  $\Lambda_0^{(\mu)}$  における principal symbol が求められる。一方  $U_\nu(s)$  の  $\Lambda_0^{(\mu)}$  における principal symbol は明らかに

$$\sigma_{\Lambda_0^{(\mu)}}(U_\nu(s)) = \begin{cases} |f|^s(x) & (\nu = \mu) \\ 0 & (\nu \neq \mu) \end{cases}$$

であるから、これにより、変換行列は計算できる。以下それを実行しよう。

$\Lambda = 0 \times V^*$  とする。  $f_\Lambda^\chi$ ,  $f^{*\chi}$  はどちらも、  $V^*$  の character  $\chi$  に対応する相対不変式だから 定数  $C_0 = (C_0^1, \dots, C_0^l)$  があって

$$f_\Lambda^\chi = C_0^\chi f^{*\chi}$$

となるはずである。  $C_0$  は次のようにして求められる。

P46 で  $\varphi_S(x)$  を定義したが  $(x, y) \in W'$  とする時

$$y = \varphi_{S(x, y)}(x)$$

である。(これは (7) と (8) から明らか。)  $S$  を変数として

$f^\chi(x) / f^{*\chi}(\varphi_S(x))$  を考えると、  $S$  の同次多項式になる。( [5] を見てほしい。) 実はこれは  $a_\Lambda^\chi(s)$  の定数倍になる。それは  $a_\Lambda^\chi(s)$  の定義と

$f^\lambda(x) / (f^\lambda(x) / f^{*\lambda}(\varphi_{S(x,y)}(x))) = f^{*\lambda}(y)$   
なる事から明らか。よって  $C_0$  は

$$a_1^\lambda(s)^{-1} f^\lambda(x) = C_0^\lambda f^{*\lambda}(\varphi_S(x))$$

から計算できる。

次に  $\omega_\lambda$  を考えよう。  $\omega_\lambda$  は character  $\lambda_0$  に  
対応する  $V^*$  上の  $n$  form であるから  $f^{*2\lambda_0} dy$  の定  
数倍に等しい。

$$\omega_\lambda = C_1 f^{*2\lambda_0} dy$$

$C_1$  を求めよう。

$\lambda$  の近傍で  $W$  の点は  $(-\text{grad} \log f^{*S}(y), y)$  と表  
わされる。

$$\begin{aligned} dx \wedge ds &= (-)^n d \text{grad} \log f^{*S}(y) \wedge ds \\ &= (-)^n \text{Hess} \log f^{*S}(y) dy \wedge ds \end{aligned}$$

$$\therefore \omega_\lambda = (-)^n \frac{\text{Hess} \log f^{*S}(y)}{C_1(s)} dy$$

$C_1(s)$  が  $n$  次同次である事に注意して

$$C_1 = f^{*-2\lambda_0}(y) \frac{\text{Hess} \log f^{*(-S)}(y)}{C_1(s)}$$

で計算できる。(10)のP31の注意を見て下さい。

(10)で定義したように

$$\begin{aligned}
 \sigma_{0 \times V^*(\nu)}(U_{0 \times V^*(\nu)}) &= |f_1|^s \sqrt{\omega_1} / \sqrt{dx} \\
 &= |c_0|^s |f^*(y)|^s \sqrt{|c_1|} |f^*(y)|^{\chi_0} \sqrt{|dy|} / \sqrt{|dx|} \\
 &= |c_0|^s \sqrt{|c_1|} |f^*(y)|^{s+\chi_0} \sqrt{|dy|} / \sqrt{|dx|} \\
 &= (2\pi)^{-\frac{n}{2}} |c_0|^s \sqrt{|c_1|} \sigma_{0 \times V^*(\nu)} \left( \int_{V^*(\nu)} |f^*(y)|^{s+\chi_0} e^{i\langle y, x \rangle} dy \right)
 \end{aligned}$$

これから

$$\begin{aligned}
 \sigma_{0 \times V^*(\mu)}(U_{\nu}^*(s+\chi_0)) \\
 = \begin{cases} (2\pi)^{\frac{n}{2}} |c_0|^{-s} |c_1|^{-\frac{1}{2}} \sigma_{0 \times V^*(\nu)}(U_{0 \times V^*(\nu)}(s)) & \nu = \mu \\ 0 & \nu \neq \mu \end{cases}
 \end{aligned}$$

さて、 $V$ における超関数  $u$  が  $M$  の解になっているとする。 $u|_{\Lambda^{(\nu)}} = C_{\Lambda^{(\nu)}} u_{\Lambda^{(\nu)}}$  とする。(10)の  $\Lambda^{(\nu)}$  次節で、我々は次の行列  $A(s)$  の計算法を知らう。

$$\begin{pmatrix} C_{0 \times V^*(1)} \\ \vdots \\ C_{0 \times V^*(N)} \end{pmatrix} = A(s) \begin{pmatrix} C_{V^{(1)} \times 0} \\ \vdots \\ C_{V^{(N)} \times 0} \end{pmatrix} \quad (11)$$

この時, Fourier変換は次のように与えられる。

$$\begin{pmatrix} U_1(s) \\ \vdots \\ U_N(s) \end{pmatrix} = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} |C_0|^s |C_1|^{\frac{1}{2}} t A(s) \begin{pmatrix} U_1^*(s+\lambda_0) \\ \vdots \\ U_N^*(s+\lambda_0) \end{pmatrix}$$

$\therefore$

$U = \sum C_{V^{(\mu)}} \times_0 U_\nu(s)$  とする。(11)から  $C_{0 \times V^{*(\mu)}}$  が決まると

$$\begin{aligned} \delta_{0 \times V^{*(\mu)}}(U) &= C_{0 \times V^{*(\mu)}} \delta_{0 \times V^{*(\mu)}}(U_{0 \times V^{*(\mu)}}) \\ &= (2\pi)^{-\frac{n}{2}} |C_0|^s |C_1|^{\frac{1}{2}} C_{0 \times V^{*(\mu)}} \delta_{0 \times V^{*(\mu)}}(U_\nu^*(s+\lambda_0)) \\ &= (2\pi)^{-\frac{n}{2}} |C_0|^s |C_1|^{\frac{1}{2}} \delta_{0 \times V^{*(\mu)}} \left( \sum_\mu C_{0 \times V^{*(\mu)}} U_\mu^*(s+\lambda_0) \right) \end{aligned}$$

$$\text{よって } U = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} |C_0|^s |C_1|^{\frac{1}{2}} \sum_\mu C_{0 \times V^{*(\mu)}} U_\mu^*(s+\lambda_0)$$

ここで  $C_{V^{(\mu)}} \times_0$  は任意だから, 求める結果を得る。

q.e.d.

## 3) 接続行列と Maslov index

$\Lambda_0, \Lambda_1$  を codim 1 で交わる good Lagrangian  
その交わりを  $S$  とする。

## 定義 (3.1)

$\Lambda_0$  と  $\Lambda_1$  very good intersection とは

- i)  $S$  が  $G$  pre-homogeneous
- ii)  $p$  を  $S$  の generic point として

$$\dim G_0 p = n - l$$

この時、次の補題が成り立つ。証明は付録 IV) を見てほしい。

## 補題 (3.2)

$\Lambda_0$  と  $\Lambda_1$  が good intersection ならば

- i)  $p$  の近傍で  $W = W'$  かつそれは non-singular
- ii)  $\Lambda_0$  と  $\Lambda_1$  は regular intersection.

これにより、量子化された接触変換によって、§14) の結果を利用できる。

以下  $p = (x_1, y_0) \in S$   $\Lambda_1 = \sqrt{-1} T_{Gx_1}^* V$  とする。まず p38 における  $\Lambda_{\pm}$  を区別する方法を考えよう。


$$T_p \Lambda_1 = \mathcal{O}f(x_1, y_0) + 0 \times V_{x_1}^*$$

$$T_p \Lambda_0 = \mathcal{O}f(x_1, y_0) + V_{y_0} \times 0$$

である。但し

$$V_{x_1}^* = (\mathcal{O}f x_0)^\perp \subset V^*, \quad V_{y_0} = (\mathcal{O}f y_0)^\perp \subset V$$

である。  $\Lambda_1 = \{f_0 = 0\}$



今  $a \in V_{x_1}^*$ ,  $b \in V_{y_0}$  を適当に選んで上図のようになったとする。この時  $\langle a, b \rangle > 0$  である。即ち、 $\langle a, b \rangle > 0$  の時  $\Lambda_0$  の  $a$  方向の成分における  $f_0$  の符号と、 $\Lambda_1$  の  $b$  方向の成分における  $f_1$  の符号とは等しい。ここで  $f_0, f_1$  は P38 で与えたものである。(ここで、+とか-とかには意味があるのではなく、 $\text{Im}\{f_0, f_1\} > 0$  のもとで、 $\Lambda_0$  の連結成分のどれかと  $\Lambda_1$  の連結成分のどれかと同符号になるかが意味を持つ。と

れによつて接触変換して標準形に持っていった時、どの成分がどの成分に対応するかわかる。) )

例 (2.1) p64 で言へば  $a = \begin{pmatrix} \varepsilon \\ 0 \\ \varepsilon \end{pmatrix}$   $b = \begin{pmatrix} \varepsilon \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$

であり、 $\Lambda_1^{(1)}$  と  $\Lambda_2^{(2)}$   $\Lambda_1^{(4)}$  と  $\Lambda_2^{(1)}$  が同符号である。

$\therefore$ ) 点  $P$  で考えると

$$H_{f_0} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_0}{\partial y} \\ -\frac{\partial f_0}{\partial x} \end{pmatrix} \in T_P \Lambda_1$$

$$H_{f_1} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ -\frac{\partial f_1}{\partial x} \end{pmatrix} \in T_P \Lambda_0$$

であり、 $\text{Im} \{f_0, f_1\} > 0$  は言い換えると

$$\text{Im} E(H_{f_0}, H_{f_1}) < 0$$

である。  $f_0(x_1+b, y_0) > 0$  は

$$\text{Im} E\left(\begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix}, H_{f_0}\right) > 0$$

$f_1(x_1, y_0+a) > 0$  は

$$\text{Im} E\left(H_{f_1}, \begin{pmatrix} 0 \\ -a \end{pmatrix}\right) > 0$$

となる。これから  $\begin{pmatrix} -b \\ 0 \end{pmatrix}$  と  $H_{f_1}$ ,  $\begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix}$  と  $H_{f_0}$  は同じ向きであるから

$$\operatorname{Im} E\left(\begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b \\ 0 \end{pmatrix}\right) = -\langle a, b \rangle < 0$$

q. e. d.

$$\Lambda_0 = \Lambda_0^+ \cup \Lambda_0^- \cup S$$

$$\Lambda_1 = \Lambda_1^+ \cup \Lambda_1^- \cup S$$

であり,  $\Lambda_0$  を p37 の  $\{x_2 = 0\}$  に,  $\Lambda_1$  を  $\{x_2 > 0\}$  に接触変換で移した時,  $\Lambda_0^+$  が  $\{x_2 > 0\}$  に  $\Lambda_1^+$  が  $\{x_2 > 0\}$  に対応する。

$$e(s) + a - \frac{1}{2} = \operatorname{ord}_{\Lambda_1} f^s - \operatorname{ord}_{\Lambda_0} f^s$$

とかく。

補題 (3.3)

$f_{\Lambda_0}^\lambda$  は  $Sz^e(x)$  位の pole

$f_{\Lambda_1}^\lambda$  は  $Sz^e(x)$  位の zero

$\omega_{\Lambda_0}$  は  $Sz^{2a}$  位の pole

$\omega_{\Lambda_1}$  は  $Sz^{2(a-1)}$  位の zero

∴) 接触変換して p36 をにらんでやると,  $\lambda \in \mathbb{C}$  として

$$\delta_{\Lambda_0}(f^{s+\lambda x}) = f_{\Lambda_0}^{s+\lambda x} \sqrt{\omega_{\Lambda_0}} / \sqrt{dx}$$

は  $\{ -e(s+\lambda x) - a \}$  の zero を持つから,  $\lambda$  と  $\lambda+1$  を比べれば,  $f_{\lambda_0}$  は  $e(x)$  位の pole である事がわかり,  $s+\lambda x=0$  として  $\omega_{\lambda_0}$  は  $2a$  位の pole である事がわかる.  $\lambda_1$  についても同様である. q.e.d.

我々は,  $f_0, f_1$  を作り p41 の公式に持ち込みたい。

(疲れたらコーヒーを飲みましょう。電動式コーヒーミルは便利です。)

$e(x) > 0$  なる  $x$  を取って

$$f_1|_{\lambda_1} = (f_{\lambda_1}^x)^{\frac{1}{e_1(x)}}, \quad f_0|_{\lambda_0} = (f_{\lambda_0}^x)^{-\frac{1}{e_1(x)}}$$

とする。これらの右辺は、補題(3.3)により、適当な分枝を取れば定義できる。さらに、

$$f_0|_{\lambda_1} = 0, \quad f_1|_{\lambda_0} = 0$$

となるように,  $f_0, f_1$  を延長する時,

$$\{f_0, f_1\}|_S$$

は延長の仕方に依らない事はやさしい。実は分枝をうまく取

って

$$\text{Im} \{f_0, f_1\} \Big|_S = 1$$


とできる事を示そう。

実は  $f_0 = \left( \frac{f^x}{a_{\lambda_0}^x(s)} \right)^{-1} e^{(x)}$      $f_1 = \left( \frac{f^x}{a_{\lambda_1}^x(s)} \right)^{-1} e^{(x)}$

が  $W$  上 well defined である。例えば  $f_0$  について言えば、右辺は、 $\lambda_0 - S$  の近傍で定義されたから、Gorbit に沿って解析接続すると、 $W - \lambda_1$  で一価正則となる。ところが  $a_{\lambda_0}^x(s) / a_{\lambda_1}^x(s) = e(s)^{e(x)}$  であるから

$$f_0^{e(x)} = e(s)^{e(x)} \frac{a_{\lambda_1}^x(s)}{f^x} = 0 \text{ on } \lambda_1$$

となって、 $\lambda_1 - S$  の近傍でも正則となる。 $S$  は  $W$  で  $\text{codim} \geq 2$  故、除ける特異点である。



$$\begin{aligned}
\sqrt{-1} \{f_0, f_1\} &= \sqrt{-1} \left\{ \left( \frac{f^\lambda}{a_{1,0}^\lambda(s)} \right)^{-\frac{1}{e(\lambda)}}, \left( \frac{f^\lambda}{a_{1,1}^\lambda(s)} \right)^{\frac{1}{e(\lambda)}} \right\} \\
&= \sqrt{-1} \left\{ e(s) \left( \frac{f^\lambda}{a_{1,1}^\lambda(s)} \right)^{-\frac{1}{e(\lambda)}}, \left( \frac{f^\lambda}{a_{1,1}^\lambda(s)} \right)^{\frac{1}{e(\lambda)}} \right\} \\
&= \sqrt{-1} \left( \frac{f^\lambda}{a_{1,1}^\lambda(s)} \right)^{-\frac{1}{e(\lambda)}} \left\{ e(s), \left( \frac{f^\lambda}{a_{1,1}^\lambda(s)} \right)^{\frac{1}{e(\lambda)}} \right\} \\
&= \sqrt{-1} \left( \frac{f^\lambda}{a_{1,1}^\lambda(s)} \right)^{-1} \frac{1}{e(\lambda)} \left\{ e(s), \frac{f^\lambda}{a_{1,1}^\lambda(s)} \right\} \\
&= \sqrt{-1} \frac{1}{f^\lambda e(\lambda)} \{e(s), f^\lambda\}^*
\end{aligned}$$

$$e(s) = \sum_{i=1}^l a_i s_i \quad \text{とす}$$

$$\{e(s), f^\lambda\} = \sum_{i=1}^l a_i \{s_i, f^\lambda\}$$

$$= \sum_{i=1}^l a_i \{ \langle A_i x, y \rangle, f^\lambda \}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{-1}} \sum_{i=1}^l a_i v_i f^\lambda = \frac{1}{\sqrt{-1}} e(\lambda) f^\lambda$$

$$\therefore \sqrt{-1} \{f_0, f_1\} = 1$$

q.e.d.

\*これらの等式は、 $f_0, f_1$  を全体に延長したものについて  $S$  上の値だけを考えた時に成り立つ。

$U_{\lambda_0^{\varepsilon_0}}(s), U_{\lambda_1^{\varepsilon_1}}(s)$  ( $\varepsilon_0, \varepsilon_1 = \pm$ ) を principal symbol とす

$$G_{\lambda_\nu^{\varepsilon_\nu}}(U_{\lambda_\nu^{\varepsilon_\nu}}(s)) = |f_{\lambda_\nu}|^s \sqrt{|\omega_{\lambda_\nu}|/|dx|}$$

で与えられる  $\mathcal{M}$  の microfunction solution とす  
る。一方  $U_{\varepsilon_1}$  を

$$U_{\varepsilon_1} \Big|_{\lambda_1^{\varepsilon_1}} = U_{\lambda_1^{\varepsilon_1}}(s)$$

$$U_{\varepsilon_1} \Big|_{\lambda_1^{-\varepsilon_1}} = 0$$

で決まる,  $\mathcal{M}$  の  $\lambda_0 \cup \lambda_1$  における解とする。

$$U_{\varepsilon_1} \Big|_{\lambda_0^{\varepsilon_0}} = C_{\varepsilon_0, \varepsilon_1} U_{\lambda_0^{\varepsilon_0}}(s)$$

とした時の  $C_{\varepsilon_0, \varepsilon_1}$  を求めよう。

P41 の公式の左辺は次のようになる。

$$|f_1|^{-e(s)-a+1} |f_{\lambda_1}|^s \sqrt{|\omega_{\lambda_1}|/|dx|} e^{\frac{\pi}{4} \tau(\lambda, \lambda_1^{\varepsilon_1}, \mu)} + \tau(\lambda, \lambda_0, \mu)$$

$$: C_{\varepsilon_0, \varepsilon_1} |f_0|^{e(s)+a} |f_{\lambda_0}|^s \sqrt{|\omega_{\lambda_0}|/|dx|} e^{\frac{\pi}{4} \tau(\lambda, \lambda_0^{\varepsilon_0}, \mu)}$$

ここで  $\tau(\lambda, \lambda_1^{\varepsilon_1}, \mu)$  は  $S$  に近い  $\lambda_1^{\varepsilon_1}$  の点で計算

する。  $\tau(\lambda, \lambda_{1_0}^{\varepsilon_0}, \mu) \neq \tau(\lambda_{1_1}, \lambda_{1_0}, \mu)$  は  $S$  で計算する。

まず

$$|f_1|^{1-a} \sqrt{|\omega_{\lambda_1}|} \sqrt{v/|w_{\lambda_1} df_1|} : |f_0|^a \sqrt{|\omega_{\lambda_0}|} \sqrt{v/|w_{\lambda_0} df_0|}$$

を求めよう\*。次の予想を仮定する。

予想(3.4)

$\omega_{\lambda_0}, \omega_{\lambda_1}$  の homog. degree を  $-\mu_0, -\mu_1$  とすると  $C_{\lambda_0}(s) = \text{const. } e(s)^{\mu_0 - \mu_1} C_{\lambda_1}(s)$

ここで  $\text{const.}$  を 1 となるように  $C_{\lambda_1}(s)$  を決める。  
(こうする事により p68 の  $C_i$  が決まる。)

また  $\mu_0 - \mu_1 = 2a - 1$  である。

$$\begin{aligned} & |f_1|^{2-2a} |\omega_{\lambda_1}| \cdot v/|w_{\lambda_1} df_1| : |f_0|^{2a} |\omega_{\lambda_0}| \cdot v/|w_{\lambda_0} df_0| \\ &= \left| \frac{fx}{a_{\lambda_1}^x(s)} \right| \left| \frac{2-2a}{e(x)} \right| \left\{ \frac{\pi^*(dx) \wedge ds}{C_{\lambda_1}(s)} / ds \right\} \cdot \left\{ v/|w_{\lambda_1} d \left( \frac{fx}{a_{\lambda_1}^x(s)} \right)^{\frac{1}{e(x)}}| \right\} \\ &: \left| \frac{fx}{a_{\lambda_0}^x(s)} \right| \left| \frac{-2a}{e(x)} \right| \left\{ \frac{\pi^*(dx) \wedge ds}{C_{\lambda_0}(s)} / ds \right\} \cdot \left\{ v/|w_{\lambda_0} d \left( \frac{fx}{a_{\lambda_0}^x(s)} \right)^{\frac{1}{e(x)}}| \right\} \end{aligned}$$

\*補題(3.3) からこれらは  $S$  上正則で比の意味を持つ。

$$\left| \frac{f^\chi}{a_{\lambda_1}^\chi(s)} \right|^{-\frac{2-2a}{e(x)}} \left\{ \frac{\pi^*(dx) \wedge ds}{C_{\lambda_1}(s)} \right\} \neq$$

$$\left| \frac{f^\chi}{a_{\lambda_0}^\chi(s)} \right|^{-\frac{2a}{e(x)}} \left\{ \frac{\pi^*(dx) \wedge ds}{C_{\lambda_0}(s)} \right\} \text{ は } W \pm \text{ well-}$$

defined な  $(n+1)$  form である。これを比べるには、  
generic な  $(a_{\lambda_1}^\chi(s), a_{\lambda_0}^\chi(s), C_{\lambda_1}(s), C_{\lambda_0}(s))$   
な  $\chi$  が "non zero" の orbit (p76の  $\Sigma$ ) の  
上で比べればよく、従って p79 の比の計算において、形式  
的に、 $a_{\lambda_0}^\chi(s) = e(s)^{e(x)} a_{\lambda_1}^\chi(s)$

$$C_{\lambda_0}^\chi(s) = e(s)^{2a-1} C_{\lambda_1}^\chi(s)$$

を代入しても構わない。よってこの比は 1 となる。

p78 から続いて、

$$|f_{\lambda_1}|^{-e(s)} |f_{\lambda_1}|^s e^{\frac{\pi}{4} \{ \tau(\lambda, \lambda_{\lambda_1 \varepsilon_1}, \mu) + \tau(\lambda_{\lambda_1}, \lambda_{\lambda_0}, \mu) \}}$$

$$: C_{\varepsilon_0 \varepsilon_1} |f_{\lambda_0}|^{e(s)} |f_{\lambda_0}|^s e^{\frac{\pi}{4} \tau(\lambda, \lambda_{\lambda_0 \varepsilon_0}, \mu)}$$

$$= \frac{\sqrt{2\pi}}{\Gamma(e(s)+a)} : e^{z_0 \varepsilon_1 \frac{\pi i}{2} (e(s)+a)}$$

となる。同じような論法で

$$|f_{\lambda_1}|^{-e(s)} |f_{\lambda_1}|^s : |f_{\lambda_0}|^{e(s)} |f_{\lambda_0}|^s = 1$$

と作るから

$$C_{\varepsilon_0 \varepsilon_1} = \frac{\Gamma(\varepsilon(s)+a)}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{\pi i}{2}(\varepsilon(s)+a)\varepsilon_0 \varepsilon_1} \times \\ \times e^{\frac{\pi}{4} \{ \tau(\lambda, \lambda_{1, \varepsilon_1}, \mu) + \tau(\lambda_{1, \varepsilon_1}, \lambda_{1_0}, \mu) + \tau(\lambda_{1_0}, \lambda_{1, \varepsilon_0}, \mu) \}}$$

以上で次の公式が得られた。

公式(3.5)\*

Uが、 $\Lambda_0 \cup \Lambda_1$  における  $\mathcal{M}$  の microfunction solution ならば

$$U = C_{\Lambda_\nu^{\varepsilon_\nu}} U_{\Lambda_\nu^{\varepsilon_\nu}} \quad \text{on } \Lambda_\nu^{\varepsilon_\nu}$$

とすると

$$\begin{pmatrix} C_{\Lambda_0^+} \\ C_{\Lambda_0^-} \end{pmatrix} = \frac{\Gamma(\varepsilon(s)+a)}{\sqrt{2\pi}} \\ \times \begin{pmatrix} e^{\frac{\pi i}{2}(\varepsilon(s)+a) + \frac{\pi}{4}\tau_{++}} & e^{-\frac{\pi i}{2}(\varepsilon(s)+a) + \frac{\pi}{4}\tau_{+-}} \\ e^{-\frac{\pi i}{2}(\varepsilon(s)+a) + \frac{\pi}{4}\tau_{-+}} & e^{\frac{\pi i}{2}(\varepsilon(s)+a) + \frac{\pi}{4}\tau_{--}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{\Lambda_1^+} \\ C_{\Lambda_1^-} \end{pmatrix}$$

$$\text{但し } \tau_{\varepsilon_0 \varepsilon_1} = \tau(\lambda, \lambda_{1, \varepsilon_1}, \mu) + \tau(\lambda_{1, \varepsilon_1}, \lambda_{1_0}, \mu) + \tau(\lambda_{1_0}, \lambda_{1, \varepsilon_0}, \mu)$$

\* 実際計算には公式(3.6)を使う。

最後に  $\tau_{\varepsilon_0, \varepsilon_1}$  の計算法を与えよう。

$V_1, V_2$  をベクトル空間とし  $f: V_1 \longrightarrow V_2$  を surjective な linear map とする。  $V_2$  の 2 次形式  $Q$  とすると  $\text{sgn } Q = \text{sgn } f^* Q$  である。これから直ちに、

補題 (3.6)  $(x_0, y_0)$  を  $\Lambda$  の generic point とすると

$$\tau(\lambda, \lambda_1, \mu_0) = \sqrt{\pi} \text{sgn} \langle A x_0, -{}^t A y_0 \rangle$$

$$A \in \mathcal{O}_f$$

$$= \sqrt{\pi} \text{sgn} \langle x, y \rangle$$

$$(x, y) \in T_{(x_0, y_0)} \Lambda$$

(但し  $\mu_0 = V \times 0$ )

$\tau(\lambda, \lambda_1, \varepsilon_1, \mu)$  について考えよう。  $\Lambda_1 = T_{Gx_1}^* V$  であるから  $\lambda \cap \lambda_1$  の次元は constant と仮定する。

$\tau(\lambda, \lambda_1, \varepsilon_1, \mu)$  は  $S$  で計算した  $\tau(\lambda, \lambda_1, \mu)$  に等しい。

P30 の性質 ii) から

$$\tau(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = \tau(\lambda_1, \lambda_2, \mu) + \tau(\lambda_2, \lambda_3, \mu) + \tau(\lambda_3, \lambda_1, \mu)$$

$$\text{また } \tau(\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2) = \tau(\lambda_1, \lambda_2, \mu_1) - \tau(\lambda_1, \lambda_2, \mu_2)$$

$$\text{とおくと } \tau(\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2) = \tau(\lambda_1, \lambda_3, \mu_1, \mu_2)$$

$$+ \tau(\lambda_3, \lambda_2, \mu_1, \mu_2) \text{ が成り立つ。}$$

従って

$$\begin{aligned} \tau_{\varepsilon_0 \varepsilon_1} &= \tau(\lambda, \lambda_{\lambda_1}, \lambda_{\lambda_0}) + \tau(\lambda_{\lambda_1}, \mu, \lambda_{\lambda_0}) \\ &+ \tau(\mu, \lambda, \lambda_{\lambda_0}) + \tau(\lambda_{\lambda_1}, \lambda_{\lambda_0}, \mu) \\ &+ \tau(\lambda_{\lambda_0} \varepsilon_0, \lambda, \mu) \\ &= \tau(\lambda, \lambda_{\lambda_1}, \lambda_{\lambda_0}) + \tau(\mu, \lambda, \lambda_{\lambda_0}) + \tau(\lambda_{\lambda_0} \varepsilon_0, \lambda, \mu) \end{aligned}$$

$\tau(\lambda, \lambda_{\lambda_1}, \lambda_{\lambda_0}) = 0$  を言おう。

$\rho = g(x_1, y_0) = \lambda_{\lambda_1} \cap \lambda_{\lambda_0}$  と  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$  の  $V$  を適用する。

$$\lambda_{\lambda_1}^\rho = (g(x_1, y_0) + V_{x_1}^*)^\rho = (\rho + V_{x_1}^*) / \rho$$

$$\lambda^\rho = (0 \times V^* \cap \rho^\perp) + \rho / \rho$$

$$= (0 \times V^* + \rho) \cap \rho^\perp / \rho$$

$$\rho + V_{x_1}^* \subset (0 \times V^* + \rho) \cap \rho^\perp \quad \text{故に } \lambda_{\lambda_1}^\rho = \lambda^\rho \quad \text{f.e.d.}$$

$$\text{よって } \tau_{\varepsilon_0 \varepsilon_1} = \tau(\lambda, \mu, \lambda_{\lambda_0} \varepsilon_0, \lambda_{\lambda_0})$$

$$= \tau(\lambda, \mu_0, \lambda_{\lambda_0} \varepsilon_0, \lambda_{\lambda_0}) + \tau(\mu_0, \mu, \lambda_{\lambda_0} \varepsilon_0, \lambda_{\lambda_0})$$

$$\Lambda_0 = T_{G y_0}^* V^* \text{ 故に}$$

$$\tau(\mu_0, \mu, \lambda_{\Lambda_0 \varepsilon_0}, \lambda_{\Lambda_0}) = \tau(\mu_0, \mu, \lambda_{\Lambda_0 \varepsilon_0}) - \tau(\mu_0, \mu, \lambda_{\Lambda_0}) \\ = 0 \text{ と仮定して}$$

$$\tau_{\varepsilon_0 \varepsilon_1} = \tau(\lambda, \mu_0, \lambda_{\Lambda_0 \varepsilon_0}) - \tau(\lambda, \mu_0, \lambda_{\Lambda_0})$$

$\tau(\lambda, \mu_0, \lambda_{\Lambda_0 \varepsilon_0})$  は補題(3.6)に与えた。同じように

$$-\tau(\lambda, \mu_0, \lambda_{\Lambda_0}) = \sqrt{-1} \operatorname{sgn} \langle x, y \rangle$$

$$(x, y) \in T_{(x_1, y_0)} \Lambda_0$$

$$= \sqrt{-1} \operatorname{sgn} \langle Ax_1, -{}^t Ay_0 \rangle$$

$$A \in \mathcal{O}_f$$

が成り立つ。

最後に p69 の  $A(s)$  が求めやすい形で公式を書き直しておく。

$$\text{公式(3.6)} \quad \Lambda_1 = T_{g x_1}^* V, \quad \Lambda_0 = T_{g y_0}^* V^* \text{ とする。}$$

$$\beta = \operatorname{ord}_{\Lambda_0} f^s - \operatorname{ord}_{\Lambda_1} f^s + \frac{1}{2} \text{ とおく}$$

$$\begin{bmatrix} c_{\Lambda_1^+} \\ c_{\Lambda_1^-} \end{bmatrix} = \frac{\Gamma(\beta)}{\sqrt{2\pi}} \begin{bmatrix} e^{-\frac{\pi i}{2} \beta} & e^{\frac{\pi i}{2} \beta} \\ e^{\frac{\pi i}{2} \beta} & e^{-\frac{\pi i}{2} \beta} \end{bmatrix} \times$$

$$\times \begin{bmatrix} e^{\frac{\pi}{4} \{ \tau(\Lambda_0^+) - \tau(\Lambda_0 \cap \Lambda_1) \}} & \\ & e^{\frac{\pi}{4} \{ \tau(\Lambda_0^-) - \tau(\Lambda_0 \cap \Lambda_1) \}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{\Lambda_0^+} \\ c_{\Lambda_0^-} \end{bmatrix}$$

$$\tau(\Lambda_0^\pm) = \sqrt{|F|} \operatorname{sgn} \langle Ax_0^\pm, -{}^tAy_0^\pm \rangle$$

$A \in \mathcal{O}_f$

for  $(x_0^\pm, y_0^\pm) \in \Lambda_0^\pm$

$$\tau(\Lambda_0 \cap \Lambda_1) = \sqrt{|F|} \operatorname{sgn} \langle Ax_1, -{}^tAy_0 \rangle$$

$A \in \mathcal{O}_f$

付録 Maslov index の性質

$\lambda, \mu$  を二つの Lagrangean で  $\lambda \cap \mu = 0$  なるものとする。この時  $\lambda + \mu = 0$  となるから、 $V$  は  $\lambda$  と  $\mu$  の直和である。射影  $\lambda \oplus \mu \rightarrow \lambda$  を  $P_{\lambda\mu}$  と書く。

補題1.  $E(P_{\lambda\mu}x, y) = E(x, P_{\mu\lambda}y)$

$\because P_{\lambda\mu} + P_{\mu\lambda} = 1$  だから  $E(P_{\lambda\mu}x, y) = E(P_{\lambda\mu}x, P_{\lambda\mu}y + P_{\mu\lambda}y)$   
 $\lambda$  が Lagrangean 故  $= E(P_{\lambda\mu}x, P_{\mu\lambda}y)$

同じく  $E(x, P_{\mu\lambda}y) = E(P_{\lambda\mu}x, P_{\mu\lambda}y)$  q.e.d.

$\lambda_\nu \cap \mu = 0$  ( $\nu = 1, 2$ ) とし  $\sigma(\lambda_1, \lambda_2, \mu) = \underset{\lambda_2}{\text{sgn}} E(P_{\lambda_1\mu}x, x)$   
 を補助的に定義する。

補題2.  $\sigma(\lambda_1, \lambda_2, \mu) = -\sigma(\lambda_2, \lambda_1, \mu)$

$\because \lambda_1 \xrightarrow{P_{\lambda_2\mu}} \lambda_2$  が互いに逆写像になる事を言おう。  
 $x \in \lambda_1$  の時  $P_{\lambda_1\mu}$

$$\begin{aligned} P_{\lambda_1\mu} P_{\lambda_2\mu} x &= P_{\lambda_1\mu} (x - P_{\mu\lambda_2} x) = P_{\lambda_1\mu} x - P_{\lambda_1\mu} P_{\mu\lambda_2} x \\ &= P_{\lambda_1\mu} x = x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{そこで} \underset{\lambda_2}{\text{sgn}} E(P_{\lambda_1\mu} x, x) &= \underset{\lambda_1}{\text{sgn}} E(P_{\lambda_1\mu} P_{\lambda_2\mu} y, P_{\lambda_2\mu} y) \\ &= \underset{\lambda_1}{\text{sgn}} E(y, P_{\lambda_2\mu} y) = -\underset{\lambda_1}{\text{sgn}} E(P_{\lambda_2\mu} y, y) \end{aligned}$$

q.e.d.

補題3.  $\dim(\lambda_1 \cap \lambda_2)$  が constant となるようにかつ連続的に  $\lambda_1, \lambda_2$  を動かした時  $\sigma(\lambda_1, \lambda_2, \mu)$  は不変

$\therefore \lambda_2$  上の二次形式  $E(P_{\lambda_1, \mu} x, x)$  の rank が不変な事を示せばよい。それは実は  $n - \dim(\lambda_1 \cap \lambda_2)$  となる。

$$\begin{aligned} x, y \in \lambda_2 \text{ の時 } E(P_{\lambda_1, \mu} y, x) &= E(y, P_{\mu, \lambda_1} x) \\ &= -E(P_{\mu, \lambda_1} x, y) = E(P_{\mu, \lambda_1} x - x, y) = E(P_{\mu, \lambda_1} x, y) \end{aligned}$$

であるから  $n - \text{rank } E(P_{\lambda_1, \mu} x, x)$

$$\begin{aligned} &= \dim \{ x \in \lambda_2 \mid E(P_{\lambda_1, \mu} y, x) = 0 \text{ for } \forall y \in \lambda_2 \} \\ &= \dim \{ P_{\lambda_1, \mu}(\lambda_2)^\perp \cap \lambda_2 \} = \dim \{ \lambda_1^\perp \cap \lambda_2 \} = \dim(\lambda_1 \cap \lambda_2) \end{aligned}$$

q.e.d.

系3.  $\sigma(\lambda_1, \lambda_2, \mu) \equiv \sqrt{-1} \{ n - \dim(\lambda_1 \cap \lambda_2) \} \pmod{2\sqrt{-1}\mathbb{Z}}$

$\tau(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$  は  $\sigma$  を使うと次のように表わせる。

補題4.  $\lambda_\nu \cap \mu = 0 \quad (\nu = 1, 2, 3)$  として

$$\tau(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = \sigma(\lambda_1, \lambda_2, \mu) + \sigma(\lambda_2, \lambda_3, \mu) + \sigma(\lambda_3, \lambda_1, \mu)$$

$\therefore$  左辺は  $\lambda_1 \oplus \lambda_2 \oplus \lambda_3 \ni (x_1, x_2, x_3)$  に対する二次形式  $E(x_1, x_2) + E(x_2, x_3) + E(x_3, x_1)$  の  $\text{sgn.}$  であり

右辺は同じく  $\lambda_1 \oplus \lambda_2 \oplus \lambda_3 \ni (y_1, y_2, y_3)$  に対する二次形式

$E(P_{\lambda_1, \mu} y_2, y_2) + E(P_{\lambda_2, \mu} y_3, y_3) + E(P_{\lambda_3, \mu} y_1, y_1)$  の二次形式の  $\text{sgn.}$  である。変換  $x_1 = y_1 + P_{\lambda_1, \mu} y_2$

$x_2 = y_2 + P_{\lambda_3, \mu} y_3 \quad x_3 = y_3 + P_{\lambda_3, \mu} y_1$  とその逆変換

$$y_1 = \frac{1}{2}(x_1 - P_{\lambda_1, \mu} x_2 + P_{\lambda_1, \mu} x_3)$$

$$y_2 = \frac{1}{2}(x_2 - P_{\lambda_2, \mu} x_3 + P_{\lambda_2, \mu} x_1)$$

$y_3 = \frac{1}{2}(x_3 - P_{\lambda_3\mu}x_1 + P_{\lambda_3\mu}x_2)$  によって, 上記の  
二次形式は移り合う。 q.e.d.

補題2と補題4からp.30のMaslov indexの性質が従  
う。

注意  $\lambda_1, \lambda_2$  に対し  $\Lambda(V, \lambda_1, \lambda_2) = \{\lambda \subset V /$   
 $\lambda \cap \lambda_\nu = 0 \ ( \nu = 1, 2 )\}$  とおくと, これは  $n - \dim(\lambda_1, \lambda_2)$   
+ 1個の connected componentに分かれ, 各々の  
componentには,  $\lambda_1, \lambda_2$  を固定する  $V$  の symplectic  
transformationsが推移的に作用する。  $\tau(\lambda_1, \lambda_2, \lambda)$  は  
各 componentで定数であり, 異なった componentで異な  
った値を取る。

- [1] 柏原-木村 極大過剰決定系と概均質ベクトル空間の  
 $\delta$ 函数 数研講究録 226 代数解析学とその応用
- [2] Sato-Kawai-Kashiwara Microfunctions  
and pseudo-differential equations, Lecture notes  
in Math. No. 287, Springer, 1973.
- [3] Hörmander Fourier Integral Operators I  
Acta Math. vol 127, 1971.
- [4] Arnold's Characteristic class entering  
in quantization conditions Func. anal. and  
its appl. vol 1. 1967.
- [5] 佐藤-新谷 概均質ベクトル空間の理論 数学の歩み  
15-1
- [6] 木村 修士論文 (東大)
- [7] 木村 概均質ベクトル空間の特異軌道と $\delta$ -函数 数研講  
究録 225
- [8] 佐藤-神保 Micro-local Calculus I 数研講究  
録 226
- [9] 鈴木 修士論文 (名大)
- [10] 佐藤-柏原-三輪 Imaginary Lagrangeanの  
現われる場合の Fourier 変換