

## 有限状態逐次決定過程との決定問題

京大・工学部 萩木俊秀

## 1. まえがき

この中で最適化問題 (Optimization Problem) は、各分野で、工場生産形で研究されてゐる。しかし、とくに問題の離散的あるいは組合せ問題的な性格をもつてき、その Formulation や解法に関する統一的な扱いは難しく、問題個別の議論に終始せざるを得ないのが現状のようである。

これに、そのような最適化問題の多くが(有限状態)逐次決定過程の形式で記述できることに着目し、動的計画法 (Dynamic Programming) [1] の適用可能性および可解性の立場から、逐次決定過程の種々のクラスを提案し、その統一的な把握を試みる。逐次決定過程の各クラスに対して、表現し得る最適化問題の範囲は異なり、また、その解法 (最適方策または最適解を求める) の難易度も変化する。これに、ある意味で対応する最適化問題の Complexity の階層を定めてみることも解釈することができる。この点を明らかにするため、

以下、2種の表現定理を逐次決定過程の各クラスについて議論し、同時に、その可解性（最適方策を求めるアルゴリズムの存在）を調べる。また、状態数の最小化問題と関連して各種決定問題についても議論する。この種の決定問題のあるものに決定可能であるか、多くは決定不可能である。したがって、紙面の都合上、証明は省略し、結果のみを記す。

## 2. 定義

最適化問題はオペレーティング決定過程 (ddp) の形式に書かれていると考える。ddp  $\Sigma \text{DDP} = (\Sigma, \delta, f)$  である。ただし、 $\Sigma$  は基本的決定の有限集合、 $\Sigma^*$  は  $\Sigma$  の要素を連接 (Concatenate) して得られる方策 (Policy) の全体である。すなはち  $s \in \Sigma^*$  は零系列である。 $S \subset \Sigma^*$  は許容方策 (Feasible Policies) の集合、 $f: S \rightarrow E$  ( $E$  は実数の集合) は各方策のコストを与える関数である。 $x \in S$  かつ  $(\forall y \in S)(f(x) \leq f(y))$  のとき  $x$  を  $\Sigma$  の最適方策 (Optimal Policy) といい、その全体を  $O(\Sigma)$  と記す。また、 $f: \Sigma^* \rightarrow Z$  ( $Z$  は整数の集合) かつ  $\Sigma^* \subset \text{Domain}$  とする部分帰納的関数であるとき、 $\Sigma$  は帰納的 ddp (r-ddp) であるという。

有限オートマトン (fa) のシステム  $M = (Q, \Sigma, \delta_0, \lambda, Q_F)$  である。ただし、 $Q$  は状態の有限集合、 $\Sigma$  は有限アルファベット、

$q_0 \in Q$  は初期状態,  $\lambda: Q \times \Sigma \rightarrow Q$  は状態遷移関数,  $Q_F \subset Q$  は最終状態の集合である。入力  $\varepsilon, x, y \in \Sigma^*$  に対し,  $\lambda(q, \varepsilon) = q$ ,  $\lambda(q, xy) = \lambda(\lambda(q, x), y)$  とする:  $\vdash \lambda: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$  とする。また,  $F(M) = \{x \in \Sigma^* \mid \bar{\lambda}(x) \in Q_F\}$ ,  $\bar{\lambda}(x) = \lambda(q_0, x)$  とする。

22. 逐次決定過程 (sdp) はシステム  $\Pi = (M, h, z_0)$  である。ただし,  $M$  は fa,  $h: E \times Q \times \Sigma \rightarrow E$  はコスト関数,  $z_0 \in E$  は初期状態  $q_0$  のもつコストの初期値である。これは  $h(z_0, q_0, \varepsilon) = z_0$ ;  $(\forall x, y \in \Sigma^*)(h(z_0, q_0, xy) = h(h(z_0, q_0, x), \lambda(q_0, x), y))$  が成り立つ。したがって,  $\bar{h}(x) = h(z_0, q_0, x)$  と置く。 $\Pi$  の許容方策の集合は  $F(\Pi) = F(M) \vdash \lambda: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{R}$  である。最適方策の集合は  $O(\Pi) = \{x \in F(\Pi) \mid (\forall y \in F(\Pi))(\bar{h}(x) \leq \bar{h}(y))\}$  である。 $sdp \Pi = (M, h, z_0)$  の  $h: \Sigma \times Q \times \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$  の定義域  $L_\Pi = \{(\bar{h}(x), \bar{h}(x), a) \mid x \in \Sigma, a \in \Sigma\}$  はもつ部分帰納的関数  $\vdash \lambda$ , 帰納的 sdp (r-sdp) という。つまり, r-sdp はすべての方策  $x \in \Sigma^*$  に対し  $x$  のコスト  $\bar{h}(x)$  が計算可能である ( $\bar{h}: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{R}$  は帰納的)。sdp あるじ r-sdp は有限状態をもつ確定的決定過程の一般的な表現形式である。

$sdp \Pi \Leftrightarrow (\forall z_1, z_2 \in E)(\forall q \in Q)(\forall a \in \Sigma)(z_1 \geq z_2 \Rightarrow h(z_1, q, a) \geq h(z_2, q, a))$ , すなはち r-sdp  $\Pi \Leftrightarrow (\forall (z_1, q, a), (z_2, q, a) \in L_\Pi)(z_1 \geq z_2 \Rightarrow h(z_1, q, a) \geq h(z_2, q, a))$  の条件で定義される。

自此單調 sdp (msdp), 單調 r-sdp (r-msdp) と呼ぶ。これらに対して、つぎのよう行動的計画法の関数方程式が成立する [2]。すなはち、 $G(\bar{g}) = \min \{ \bar{h}(x) \mid \bar{\lambda}(x) = \bar{g} \in Q \}$  とすると  $\bar{g}$  (minimum の存在を仮定),

$$\bar{G}(\bar{g}_0) = \min \{ \bar{g}_0, \min \{ h(G(\bar{g}'), \bar{g}', a) \mid \lambda(\bar{g}', a) = \bar{g}_0 \} \}$$

$$G(\bar{g}) = \min \{ h(G(\bar{g}'), \bar{g}', a) \mid \lambda(\bar{g}', a) = \bar{g} \}, \bar{g} \neq \bar{g}_0.$$

が成立する。 $\therefore$  関数方程式が解け出す

$$\min \{ G(\bar{g}) \mid \bar{g} \in Q_F \}$$

が最適方策  $x \in \Pi(\Pi)$  のコスト  $\bar{h}(x)$  である。このように msdp (ある一定 r-msdp) 行動的計画法の適用で主に確定的決定過程の一般的な表現形式である。

つまり、msdp  $\Pi$  が  $(\forall \bar{z}_1, \bar{z}_2 \in Z)(\forall g \in Q)(\forall a \in \Sigma)(\bar{z}_1 > \bar{z}_2 \Rightarrow h(\bar{z}_1, g, a) > h(\bar{z}_2, g, a))$ , あれば  $\Pi$  r-msdp  $\Pi$  が  $(\forall (\bar{z}, g, a), (\bar{z}_1, g, a) \in L_{\Pi})(\bar{z}_1 > \bar{z}_2 \Rightarrow h(\bar{z}_1, g, a) > h(\bar{z}_2, g, a))$  でかつて  $\exists z$ , そのとき smsdp, r-smsdp (Strictly Monotone sdp, r-sdp) となる。さらに、msdp  $\Pi$  が  $(\forall z \in E)(\forall g \in Q)(\forall a \in \Sigma)(h(z, g, a) \geq z)$ , あれば  $\Pi$  r-msdp  $\Pi$  が  $(\forall (z, g, a) \in L_{\Pi})(h(z, g, a) \geq z)$  でかつて  $\exists z$ , そのとき pmsdp, r-pmsdp (Positively Monotone sdp, r-sdp) となる。最後に、msdp  $\Pi$  が  $\exists z$  一定  $r$ -msdp  $\Pi$  が  $F(\Pi)$ : finite でかつて  $\exists z$ , そのとき lmsdp, r-lmsdp (Loop-Free msdp, r-msdp) であるとなる。

以上の msdp (r-msdp) の Subclasses に対して、後述するように、多くの決定問題が可能である。

$\Sigma_2$ , ddp  $\Pi$  に対して, sdp  $\Pi$  の  $O(\Pi) = O(\Gamma)$  を満たすとき,  $\Pi$  は  $\Gamma$  を 弱表現 するといふ。 $\Gamma$  を弱表現する sdp  $\Pi$  の最小数の状態をもつものを最小弱表現 といふ。また,  $\Pi$  が  $F(\Pi) = F(\Gamma)$ ,  $(\forall x \in F(\Pi)) (\bar{h}(x) = f(x))$  を満たすとき,  $\Pi$  の強表現 であるといふ。 $\Gamma$  を強表現する sdp  $\Pi$  の最小数の状態をもつものを最小強表現 といふ。 $\Pi_1 = (M_1, h_1, \beta_{01})$ ,  $\Pi_2 = (M_2, h_2, \beta_{02})$  が sdp であるとき,  $O(\Pi_1) = O(\Pi_2)$  のとき,  $\Pi_1$  と  $\Pi_2$  は弱等価, また,  $F(\Pi_1) = F(\Pi_2) \wedge (\forall x \in F(\Pi_1)) (\bar{h}_1(x) = \bar{h}_2(x))$  のとき,  $\Pi_1$  と  $\Pi_2$  は強等価であるといふ。最後に,  $\Omega_{sdp} = \{O(\Pi) \mid \Pi: sdp\}$  である。すなはち,  $O(\Gamma) \in \Omega_{sdp} \iff \Gamma$  を弱表現する sdp  $\Pi$  存在。以上の概要は, sdp の他のクラスについても同様に定義できる。

### 3. ddp および msdp の例

ddp, msdp の具体例について [1][2] を詳しく述べる。代表的  $\Gamma$  とのことで最短経路問題, 行商人問題, 各々のスケジューリング問題, Cutting Stock 問題などがある。

例 3.1  $\Gamma = (N, A)$  を節点集合  $N = \{1, 2, \dots, n\}$ , 枝の集合  $A = N \times N$  をもつ完全グラフとする,  $d_{ij}$  を枝  $(i, j)$  の長さとする。 $N_0 \subset N$  に対して, 節点 1 から出発し,  $N_0$  の各節点を少

とも1回経由し、節点Nに至る最短経路を是れ問題を考へる。 $N_0 = \emptyset$  から通常の最短経路問題、 $N_0 = N$  から「商人問題」等しい。

2,  $\Sigma = \{1, 2, \dots, n\}$  とし、 $i \in \Sigma$  を“現在の節点から節点iへ進む”という基本的決定と解釈する。この時、上の問題は  $ddp\ \Pi = (\Sigma, \mathcal{S}, f)$  と等しい。ただし、 $\mathcal{S} = \{x \in \Sigma^* \mid x = i_1, i_2 \dots i_k \text{ 且 } \{1, i_1, \dots, i_k, n\} \supset N_0\}$ ,  $f(x = i_1, i_2 \dots i_k, n) = d_{i_1, i_1} + d_{i_1, i_2} + \dots + d_{i_k, n}$  である。

つきに  $\Pi$  を強表現する  $sdp\ \Pi$  を考へる。 $(B, i) = \{i_1, i_2 \dots i_k, i \mid \{1, i_1, \dots, i_k, i\} \cap N_0 = B\}$  とする。 $\Pi = (M, h, \beta_0)$  の  $M \in Q = \{[B, i] \mid B \subset N_0, i \in N\}$ ,  $\beta_0 = [\emptyset, 1]$ ,  $Q_F = \{[N_0, n]\}$ ,

$$\lambda([B, i], j) = \begin{cases} [B \cup j, i] & \text{if } j \in N \\ [B, i] & \text{otherwise} \end{cases}$$

とする。明らかに  $(B, j) = \{x \mid \bar{\lambda}(x) = [B, j]\}$  であるから  $F(\Pi) = \mathcal{S}$  を得る。 $x \in \mathcal{S}$ ,  $\beta_0 = 0$ ,  $h(\beta_0, [B, i], j) = \beta_0 + d_{ij}$  とすれば、 $(\forall x \in \mathcal{S})(\bar{h}(x) = f(x))$  が成立する。よって、 $\Pi$  は  $\Pi$  を強表現する。また、 $h$  の構造より、 $\Pi$  は  $msdp$  である。 $msdp\ \Pi$  から得られる動的計画法の関数方程式は、この種の問題を解く一つのアルゴリズムを示すものである。

4.  $sdp$  とその Subclasses に対する弱表現定理 [4]

$\Sigma^*$  上の同値関係  $R$  が 右不変であるとは  $(\forall x, y \in \Sigma^*) (xRy \Rightarrow (\forall z \in \Sigma^*) (xzRyz))$  の成立であることをいう。同値関係  $R$  が  $B \subset \Sigma^*$  を 細分するとは、 $(\forall x, y \in \Sigma^*) (xRy \Rightarrow (x \in B \Leftrightarrow y \in B))$  の成立であることをいう。 $B$  を細分する右不変同値関係の全体を  $\Lambda(B)$  とする。 $B \subset \Sigma^*$  に対し、 $R_B \in (\forall x, y \in \Sigma^*) (xR_B y \Leftrightarrow (\forall z \in \Sigma^*) (xz \in B \Leftrightarrow yz \in B))$  は  $\Rightarrow$  定義である。 $R_B \in \Lambda(B)$ 。 $R \in \Lambda(B) \Leftrightarrow |\Sigma^*/R| < \infty$  かつそのものの全体を  $\Lambda_F(B)$  と書く。 $\Lambda_F(B) \neq \emptyset \Leftrightarrow B$ : 正規集合, すなはち、任意の  $T \in \Lambda_F(B)$  に対し、 $\exists a \in M_T \in F$  且  $F(M_T) = B$  であることが知られる。

$\mathcal{B} = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$  互いに素  $T_i B_i \subset \Sigma^*$  の族である。 $R \in \Lambda(\Sigma^*)$  が  $\mathcal{B}$  を J-分離するとは、 $xRy \wedge x \in B_i \wedge y \in B_j \Rightarrow i=j$  の成立であることをいう。(すなはち、 $R$  の各同値類は至多 1 個の  $B_i$  と交わる。)

定理 4.1  $ddp \ U \sim sdp$  によって弱表現された必要十分条件は、 $U/R_U$ ,  $U \equiv O(U)$ ,  $\mathcal{B}$  J-分離する  $T \in \Lambda_F(\Sigma^*)$  の存在であることをいう。

$U \subset \Sigma^*$  に対し、 $\Sigma^*$  上の2項関係  $\leq_U$  は  $(\forall x, y \in \Sigma^*) (x \leq_U y \Rightarrow (\forall z \in \Sigma^*) (yz \in U \Rightarrow xz \in U))$  は  $\Rightarrow$  定義である。つまり  $R \in \Lambda(U)$  に対し、 $\leq_U \in B/R$ ,  $B \subset \Sigma^*$  は拡張である。すなは

5,  $(\forall A_i, A_j \in B/R)(A_i \leq_R A_j \Leftrightarrow (\forall x \in A_i)(\forall y \in A_j)(x \leq_U y))$ 。  
 ここで  $\Sigma^*, \Sigma^*/R$  上の擬順序があり, とくに  $R = R_U$  の場合半順序となる。 $B \subset \Sigma^*$  で  $U$  に閉じて单调であるとは  $(\forall x, y \in B)(x \leq_U y \vee y \leq_U x)$  の成立である: と云う。

定理 4.2 ddp  $\Sigma$  が msdp によって弱表現可能の必要十分条件は  $\Sigma$  の条件で  $\exists T \in \Lambda_F(\Sigma^*)$  の存在であることを示す。

(i)  $T \sqsubset U/R_U$ ,  $U \equiv O(\Sigma)$ ,  $T$  が  $J$ -分離である。(ii) すべての  $C_j \in \Sigma^*/T$  が  $U$  に閉じて单调。

例題 4.1 ddp  $\Sigma = (\Sigma, \delta, f)$  で,  $\Sigma = \{a, b\}$ ,  $\delta = \{a^i b^j \mid i \geq 0, j \geq 0\}$

$$f(a^i b^j) = \begin{cases} i-j & \text{if } i > j \\ 0 & \text{if } j \geq i, \end{cases}$$

ここで定義ある。明らかに  $O(\Sigma) \cap U = \{a^i b^j \mid j \geq i\}$ 。

$\Sigma^*/R_U$  の同値類:  $A_i = \{a^i\}$ ,  $i = 0, 1, \dots$ ,  $B_0 = \{a^i b^j \mid j \geq i, j > 0\}$ ,  $B_i = \{a^k b^j \mid k-i = i, j > 0\}$ ,  $i = 1, 2, \dots$ ,  $D = \Sigma^* - \bigcup_{i=0}^{\infty} A_i - \bigcup_{i=0}^{\infty} B_i$ , が成立する。とくに,  $U/R_U = \{A_0, B_0\}$ 。  
 ここで,  $T \in \Lambda_F(\Sigma^*)$  が  $\Sigma^*/T = \{C_0, C_1\}$ ,  $C_0 = \{\varepsilon\}$ ,  $C_1 = \Sigma^* - C_0$  で定義され,  $T$  が  $U/R_U$  で  $J$ -分離である。つまり,  $\Sigma$  が sdp によって弱表現可能。つまり,  $\Sigma^*/R_U$  上で  $\leq_U$  が  $\leq_U$  と同一であると図1を得る。すなはち,  $T \in \Lambda_F(\Sigma^*)$  で  $\Sigma^*/T = \{C_0, C_1\}$ ,  $C_0 = \{a^i \mid i \geq 0\}$ ,  $C_1 = \Sigma^* - C_0$ , が  $\Sigma^*/R_U$  で定義される(図1参照),  $T$  が定理4.2の条件を満足するから  $\Sigma$  が msdp によって弱表現可能。

例題 4.2  $\{a^i b^j \mid j \geq i\}$ ,  
 $\{a^i b^j \mid i = j \geq 0\} \in \Omega_{\text{sdp}}$ .  $\{a^i b^j \mid i \geq j\} \in \Omega_{\text{sdp}}$ .  
 $\{a^i b^j c \mid j \geq i\}, \{a^i b^j c \mid i = j\}$ ,  
 $\{a^i b^j c \mid i \geq j\} \in \Omega_{\text{sdp}}$ .  $\{a^i b^j \mid j \geq i\} \in \Omega_{\text{msdp}}$ .  
 $\{a^i b^j \mid i = j\}, \{a^i b^j \mid i \geq j\} \in \Omega_{\text{msdp}}$ .  
 $\{a^i b^j c \mid j \geq i\}, \{a^i b^j c \mid i \geq j\} \in \Omega_{\text{msdp}}$ ,  
 $\{a^i b^j c \mid i = j\} \notin \Omega_{\text{msdp}}$ .

定理 4.3 ddp  $\Sigma$  or smsdp

(pmsdp)  $\vdash \Rightarrow$  弱表現工机 3

必要十分条件 1 は  $O(\Gamma)$ : 正規集合

2 の 3.

定理 4.4 ddp  $\Sigma$  or lmsdp  $\vdash \Rightarrow$  弱表現工机 3 必要十分条件 1 は  $O(\Gamma)$ : Finite 2 の 3.




図 1.  $\Sigma = \{a^i b^j \mid j \geq i\}$  は  
対する半順序  $\preceq_\Sigma$ .

### 5. sdp の Subclasses に対する強表現定理

ddp  $\Sigma = (\Sigma, S, f)$  に対する、同値関係  $R_\Sigma \in x R_\Sigma y \Leftrightarrow x R_S y \wedge (\forall xz \in S)(f(xz) = f(yz))$  による 2 定義 3. すなはち、 $p \in E$  に対する 2,  $\Psi_p = \{A_j \mid A_j \in S / R_\Sigma \wedge (\forall x \in A_j)(f(x) = p)\} \neq \emptyset$  3.

定理 5.1 [2][4] ddp  $\Sigma = (\Sigma, S, f)$  or sdp は  $\vdash \Rightarrow$  2 強表現工机 3 必要十分条件 1, すなはち  $p \in E$  に対する 2,  $\Psi_p \in J$ -分離才 3 すなはち  $T \in L_F(S)$  の序江才 3: と 2 の 3.

つぎに, ddp  $\Sigma$  に対して, 機順序  $\leq_{\Sigma}$  で  $x \leq_{\Sigma} y \Leftrightarrow x R_{\Sigma} y \wedge (\forall z \in \Sigma) (f(xz) \leq f(yz))$  によって定義する。 $B \subset \Sigma^*$  が  $\Sigma$  に関する単調であるとは  $(\forall x, y \in B) (x \leq_{\Sigma} y \vee y \leq_{\Sigma} x)$  の成立することをいう。

定理 5.2 [2][4] ddp  $\Sigma = (\Sigma, \delta, f)$  の msdp に対する強表現式の必要十分条件は, つぎの条件を満たす  $T \in \Lambda_F(\Sigma)$  の存在であることをいう。(i)  $T$  はすべての  $p \in E$  に対して  $\pi_p \in T$ -分離である。(ii) 各  $C_j \in \Sigma^*/T$  は  $\Sigma$  に関する単調である。

ddp  $\Sigma = (\Sigma, \delta, f)$  に対して, 機順序  $\leq_{\Sigma}$  で  $x \leq_{\Sigma} y \Leftrightarrow x R_{\Sigma} y \wedge ((\forall z \in \Sigma) (f(xz) < f(yz)) \vee x R_{\Sigma} y)$  によって定義する。 $B \subset \Sigma^*$  が  $\Sigma$  に関する強単調であるとは,  $(\forall x, y \in B) (x \leq_{\Sigma} y \vee y \leq_{\Sigma} x)$  の成立することをいう。

定理 5.3 [4] ddp  $\Sigma = (\Sigma, \delta, f)$  の smsdp に対する強表現式の必要十分条件は, つぎの条件を満たす  $T \in \Lambda_F(\Sigma)$  の存在であることをいう。(i)  $T$  はすべての  $p \in E$  に対して,  $\pi_p \in T$ -分離である。(ii) 各  $C_j \in \Sigma^*/T$  は  $\Sigma$  に関する強単調である。

ddp  $\Sigma = (\Sigma, \delta, f)$  と  $T \in \Lambda_F(\Sigma)$  に対して, つぎのようないつも  $\Gamma_{r;T}$  (一般には無限グラフ) を定義する。(1) 各  $A_i \in Y$  ( $\equiv \Sigma^*/R_{\Sigma}/T$ ) に対して,  $\Gamma_{r;T}$  に節点  $A_i$  が存在する。(2)  $\Gamma_{r;T}$  はつぎの3種の枝をもつ。(a)  $A_i, A_j \in Y$  に対して,  $A_i \neq A_j \wedge A_i T A_j \wedge A_i \leq_{\Sigma} A_j$  のとき  $A_i \neq A_j \wedge A_i, A_j \subset \Sigma \wedge f(A_i) < f(A_j)$

$\Gamma_i \vdash T(A_i, A_j)$  は  $\Gamma_{T; T}$  のタイ  $T$  の枝である。(b)  $A_i \neq A_j$  且  
 $A_i, A_j \subset S$  且  $f(A_i) = f(A_j)$  は  $\Gamma_i \vdash T(A_i, A_j)$  はタイ  $T$  の枝である。  
(c)  $(\exists a \in \Sigma)(A_i, a \subset A_j)$  は  $\Gamma_i \vdash T(A_i, A_j)$  はタイ  $T$  の枝である。

$\Gamma_{T; T}$  の閉路でタイ  $T$  の枝を含むものを I-閉路 (Inconsistent loop) と呼ぶ。

定理 5.4 [4] ddp  $\Sigma = (\Sigma, S, f)$  が pmsdp に強表現可能  $\Leftrightarrow$  条件(i),  $\inf \{f(x) \mid x \in S\} > -\infty$  且, カウチの条件を満たす  $T \in J_F(S)$  の存在であることを示す。 (i)  $T$  はオペラの  $p \in E$  に対する  $T_p \in J$ -分離である。 (ii) 各  $C_j \in \Sigma^*/T$  は閉じ単調。 (iii)  $\Gamma_{T; T}$  は I-閉路を持たない。

定理 5.5 [4] ddp  $\Sigma = (\Sigma, S, f)$  が lmsdp に強表現可能  $\Leftrightarrow$  条件(i),  $S$ : Finite を示す。

6. r-sdp とその Subclasses に関する弱表現定理 [5][6]  
sdp, msdp, ... は r-sdp, r-msdp, ... とあると, 3.4 で述べた弱表現定理の条件も変化する。 r-sdp, r-msdp, r-pmsdp, r-lmsdp に対して, 多くの定理とそのままで張り通すが, r-sdp, r-msdp に対して直接の張り通し行はできない。

定理 5.1 r-ddp が r-sdp によって弱表現可能  $\Leftrightarrow$  条件は,  $\sqcup, R_\Sigma, \sqcup \equiv \sqcup(\Gamma)$ ,  $\in J$ -分離  $\forall T \in J_F(\Sigma^*)$  の存在す

3こと2の3。

定理 6.2  $r\text{-ddp } \Sigma = (\Sigma, S, f)$  かつ  $r\text{-msdp}$  は  $\Rightarrow 2$  弱表現工法の必要十分条件は  $\cap(\equiv D(\Sigma)) = \emptyset$  の3つ<sup>2</sup>の条件と以下  
帰納的関数  $h': \Sigma^* \rightarrow \mathbb{Z}$  の存在すら  $\Rightarrow 2$  の3。 (i)  $(\forall x, y \in \Sigma^*)$   
 $(x \sqcap y \wedge h'(x) \leq h'(y) \Rightarrow (\forall z \in \Sigma^*) (h'(xz) \leq h'(yz)))$ , (ii)  $(\forall x \in \Sigma)$   
 $(h'(x) = h^*) \wedge (\forall x, y \in \Sigma^*) (x \in \Sigma \wedge y \notin \Sigma \wedge x \sqcap y \Rightarrow h'(x) < h'(y))$ 。  
ただし、  $h^*$  は定数。

定理 6.3  $r\text{-ddp } \Sigma$  かつ  $r\text{-smsdp}$  ( $r\text{-pmsdp}$ ) は  $\Rightarrow 2$  弱表現工法の必要十分条件は  $D(\Sigma)$ : 正規集合,  $\Rightarrow 2$  の3。

定理 6.4  $r\text{-ddp } \Sigma$  かつ  $r\text{-lmsdp}$  は  $\Rightarrow 2$  弱表現工法の必要十分条件は  $D(\Sigma)$ : Finite,  $\Rightarrow 2$  の3。

## 7. $r\text{-sdp}$ の Subclasses に対する強表現定理[5][6]

強表現の場合、  $r\text{-sdp}$ ,  $r\text{-smsdp}$ ,  $r\text{-lmsdp}$  は  $\Rightarrow 2$  の3の結果をそのまま拡張すら  $\Rightarrow 2$  の3,  $r\text{-msdp}$ ,  $r\text{-pmsdp}$  は  
 $\Rightarrow 2$  の直接の拡張  $\Rightarrow 2$  の3。

定理 7.1  $r\text{-ddp } \Sigma = (\Sigma, S, f)$  かつ  $r\text{-sdp}$  は  $\Rightarrow 2$  強表現工法の必要十分条件は、  $\exists p \in \mathbb{Z}$  に対し  $\exists_{p \in T}$  分離すら  $\exists$   
 $\exists T \in \Lambda_F(S)$  の存在すら  $\Rightarrow 2$  の3。

定理 7.2  $r\text{-ddp } \Sigma = (\Sigma, S, f)$  かつ  $r\text{-msdp}$  は  $\Rightarrow 2$  強表現工法の必要十分条件は、 つぎの条件と以下  $\exists T \in \Lambda_F(S)$  かつ  $\exists$  帰納的

関数  $h': \Sigma^* \rightarrow \mathbb{Z}$  の存在する  $\exists$  と  $\exists'$  ある。  
(i)  $(\forall x, y \in \Sigma^*)(xTy \wedge h'(x) \leq h'(y)) \Rightarrow (\forall z \in \Sigma^*)(h'(xz) \leq h'(yz)))$ ,  
(ii)  $(\forall x \in S)(h'(x) = f(x))$ .

定理 7.3  $r\text{-ddp } \mathcal{I} = (\Sigma, S, f)$  は  $r\text{-msdp}$  に  $\exists$  と  $\exists'$  強表現され  
必要十分条件は、つぎの条件を満たす  $T \in I_F(S)$  の存在する  
と  $\exists$  ある。  
(i)  $T$  は  $\Delta$  の  $p \in \mathbb{Z}$  に対する、重  $\pi_T$  が  $\exists$ -分離する。  
(ii) 各  $C_j \in \Sigma^*$  に  $\exists$  し強半調である。

定理 7.4  $r\text{-ddp } \mathcal{I} = (\Sigma, S, f)$  は  $r\text{-pmsdp}$  に  $\exists$  と  $\exists'$  強表現され  
必要十分条件は、つぎの条件を満たす  $T \in I_F(S)$  とび帰納的  
関数  $h': \Sigma^* \rightarrow \mathbb{Z}$  の存在する  $\exists$  と  $\exists'$  ある。  
(i)  $(\forall x, y \in \Sigma^*)(xTy \wedge h'(x) \leq h'(y)) \Rightarrow (\forall z \in \Sigma^*)(h'(xz) \leq h'(yz)))$ .  
(ii)  $(\forall x, z \in \Sigma^*)(h'(x) \leq h'(xz))$ .  
(iii)  $(\forall x \in S)(h'(x) = f(x))$ .

定理 7.5  $r\text{-ddp } \mathcal{I} = (\Sigma, S, f)$  は  $r\text{-lmsdp}$  に  $\exists$  と  $\exists'$  強表現され  
必要十分条件は、 $S: \text{Finite}$ ,  $\exists$  ある。

## 8. 最適方策の集合の性質 [4][5][6]

$\Omega_{\text{sdp}}$ ,  $\Omega_{\text{msdp}}$ , ... 等と形式言語のクラスとの関係を図 2 に示す。  
 $\Omega_{\text{r-sdp}} = \Omega_{\text{sdp}} \cap (\text{帰納的集合のクラス})$  が成立するが,  
 $\Omega_{\text{r-msdp}} \subseteq \Omega_{\text{msdp}} \cap (\text{帰納的集合のクラス})$  であることに注意  
し  $\exists$  PD: う。また,  $\Omega_{\text{smsdp}} = \Omega_{\text{pmsdp}} = \Omega_{\text{r-msdp}} = \Omega_{\text{r-pmsdp}} = (\text{正規集合のクラス})$ ,  $\Omega_{\text{lmsdp}} = \Omega_{\text{r-lmsdp}} = (\text{有限集合のクラス})$  である。




図2 最適方策の集合と形式言語のクラスとの関係

## 9. 最適方策決定のアルゴリズム

本節では  $n\text{-sdp}$  の各クラスに対する 2 種のアルゴリズムの存在を議論する。アルゴリズム A はそのクラスの任意の  $n\text{-sdp}$   $\Pi$  に対する  $O(\Pi) \neq \emptyset$  かどうかを決定し、 $O(\Pi) \neq \emptyset$  ならば  $x \in O(\Pi)$  を少々多くとも 1 個見出すもの、アルゴリズム B は  $O(\Pi) \neq \emptyset$  かどうかの決定の後、オペラの  $x \in O(\Pi)$  ( $O(\Pi)$  の正規表現) を与えるものである。アルゴリズムの存在するものに対する、具体的なアルゴリズムは [26] に記されてる。TjF, sdp, msdp, ... 等につけては  $\bar{h}(x)$  の計算可能性を之深証されてる所以の事、アルゴリズムの存在を論することは無意味である。

定理 9.1 [5] 任意の  $n\text{-sdp}$  ( $n\text{-msdp}$ )  $\Pi$  に対するアルゴリズム  $A$  およびアルゴリズム  $B$  はいずれも存在しない。

定理 9.2 [6] 任意の  $n\text{-smsdp}$  ( $n\text{-pmsdp}$  or  $n\text{-lmsdp}$ )  $\Pi$  に対してアルゴリズム  $A$ , アルゴリズム  $B$  の両者が存在する。

この種のアルゴリズムを議論するとき, 文献[5]に定義された  $n\text{-msdp}$  の部分クラス  $n\text{-imsdp}$  (Invertible  $n\text{-msdp}$ ) が興味深い。 $n\text{-imsdp}$   $\Pi$  に対しては,  $\mathcal{O}(\Pi) = \emptyset$  のときだけ決定不可能であるが,  $\mathcal{O}(\Pi) \neq \emptyset$  の次元の下で  $x \in \mathcal{O}(\Pi)$  を求めるアルゴリズムが存在する。

実際の最適化問題におけるとき, 通常, 最適方策を求めることが第一の目的である。以下のように, 平野の結果から, シンボルも  $n\text{-smsdp}$ ,  $n\text{-pmsdp}$ ,  $n\text{-lmsdp}$  程度に表現しておけば意味があることが分かる。 $n\text{-msdp}$  に対して, アルゴリズム  $A, B$  が存在しないことと, 動的計画法に達式化することと, 最適方策を計算する手段とは別物であることを示唆している。

## 10. 最小弱表現と最小強表現[7]

一般に最適方策を求めるアルゴリズム、存在する場合) は, 状態数の小より程早めに収束する。この意味で最小弱(強)表現を求めることは实用上重要である。以下では, 最小弱(強)表現を求めるアルゴリズムを, すなはて  $n\text{-sdp}$  のクラスの

$\Pi$  と弱(強)等価な同じクラスの最小 sdp を求めるアルゴリズムを考えよう。

定理 10.1 任意の r-sdp (r-msdp)  $\Pi$  に対して最小弱表現を与えるアルゴリズムは存在しない。

定理 10.2 任意の r-smmdp (r-pmsdp or r-lmsdp)  $\Pi$  に対して最小弱表現を与えるアルゴリズムが存在する。

定理 10.3 任意の r-sdp (r-msdp, r-smmdp or r-pmsdp)  $\Pi$  に対して最小強表現を与えるアルゴリズムは存在しない。

定理 10.4 任意の r-lmsdp  $\Pi$  に対して最小強表現を与えるアルゴリズムが存在する。

## 11. その他の決定問題[5]

すでに述べたように決定問題のいくつかを表 1 にまとめる。

たとえば、1, 2 の結果は与えられた任意の最適化問題に動的計画法が使えるかどうかを決定する一般的なアルゴリズムが存在しないことを示している。

表 1. r-sdp の各クラスに対する決定問題

	決定問題				
	r-sdp	r-msdp	r-smmdp	r-pmsdp	r-lmsdp
1 $\Pi$ は弱表現する $\Pi$ 存在?	u	u	u	u	u
2 $\Pi$ は強表現する $\Pi$ 存在?	u	u	u	u	s
3 $\Pi$ は $\Pi$ 弱表現するか?	u	u	u	u	u

4	$\Pi$ は正を強表現するか？	U	U	U	U	S
5	$\Pi_1$ と正弱等価？	U	U	S	S	S
6	$\Pi_1$ と $\Pi_2$ 強等価？	U	U	U	U	S
7	$n\text{-msdp } \Pi_1$ と弱等価な正序位？	T	T	U	U	U
8	$n\text{-msdp } \Pi_1$ と強等価な正序位？	T	T	U	U	S

注 U: 決定不可能, S: 決定可能, T: Trivial 行為, 文中の正は  $n\text{-ddp}$ , 指定の  $\Pi_1$ ,  $\Pi_2$  等は右欄の名前に対応するクラスの  $n\text{-sdp}$  を指す。

### 謝辞

日頃ご指導のK.K.  
京都大学三根久教授に深謝いたします。

### 文献

- [1] R. E. Bellman, Dynamic Programming, Princeton University Press., 1957.
- [2] R. M. Karp and M. Held, "Finite-state processes and dynamic programming," SIAM J. of Applied Math. 15, 693-718, 1967.
- [3] T. Ibaraki, "Algorithms for finding shortest paths visiting specified nodes," to appear in SIAM Review.
- [4] ——, "Representation theorems for equivalent optimization problems," to appear in Information

and Control.

- [5] ——, "Classes of discrete optimization problems and their decision problems," to be published.
- [6] ——, "Discrete optimization problems for which optimal policies are computable: solvable classes of dynamic programming," to be published.
- [7] ——, "Minimal representations of some classes of dynamic programming," to be published.