

Storohod に対する Remark
 [harmonic coordinate をとり直す事に関して]
 小林道正

1 Storohod の研究において, rank 1 の process は, drift の変換を通じて, harmonic coordinate をとり直すことができ, それと, rank 0 の process とは表わされること示されている。しかしながら, これに対して Motoo が次のような反例を示した。即ち, 負の方向では吸収壁 Brown 運動を, 正の方向では反射壁 Brown 運動をするような Markov 過程である。

この process は rank 1 であるが, 原点において, harmonic coordinate が, drift の変換で, とり直せないことが示された。

そこで, このような特異な点を characterize する事が問題になる。この場合に, ある関数族の中のすべての関数に対して drift の変換で harmonic にできない点として, 特異な点を定めることが考えられるか, と"のように関数族を定めれば, 有意味であるか。" または, 誤りしないため, 問題は解決されてない。

ここでは, あるクラスの関数を一つ固定した時に, それを drift の変換で harmonic にできる点とできない点を区別し, それらの点の性質を考えよ。

$$2 \quad \mathcal{E} = \left\{ u(\cdot); u_1 - u_2 = u \quad u_k \text{ is class(D) of regular } \right. \\ \left. \text{excessive function} \right\}$$

とおく。 u_k に対して harmonic function $u_{k,1}$ と potential

$$u_{k,2} \text{ が存在して。 } u_k(x) = u_{k,1}(x) + u_{k,2}(x)$$

さらに $u_{k,2}$ に対して, positive continuous additive functional

$$A_t^{[u_k]} \text{ を } E_x(A_t^{[u_k]}) = u_{k,2}(x)$$

をみたすものが存在する。

$$\text{そこで, } A_t^{[u]} = A_t^{[u_1]} - A_t^{[u_2]} \text{ とおく。}$$

$$u(x_t(\omega)) - u(x_0(\omega)) + A_t^{[u]}$$

は平均 0 の additive functional であることがわかりこれを

\hat{u}_t と記す。次に

$$\mathcal{E}_2 = \left\{ u(\cdot); u \in \mathcal{E}, \hat{u}_t \text{ が 2乗可積分} \right\}$$

とおく。 non negative additive functional $\langle \hat{u} \rangle_t$

$$\text{を } E_x \langle \hat{u} \rangle_t = E_x \hat{u}_t^2 \text{ なるものが存在する。}$$

従って, $u \in \mathcal{E}_2$ に対して,

$$u(x_t) - u(x_0) = \hat{u}_t - A_t^{[u]} \text{ と存してゐる。}$$

ここで, 次の事を仮定する。

$A_t^{[u]}$ は $\langle \hat{u} \rangle_t$ に関して絶対連続である。即ち, $f(s)$

measurable 関数 $a(x)$ が存在して,

$$A_t^{[u]} = \int_0^t a(x_s) d\langle \hat{u} \rangle_s \text{ と存してゐる。}$$

$$B[0,t] = B_t^{[u]} = \int_0^t a(x_s)^2 d\langle \hat{u} \rangle_s \quad \text{とある.}$$

$B_t^{[u]}$ は non-negative additive functional である。

[定義1] $\theta = \theta^{[u]} = \sup \{ t > 0 : B[0,t] < \infty \}$

θ は Markov time であることがわかる。

Blumenthal の 0-1 law により

$$P_x \{ \theta = 0 \} = 0 \quad \text{or} \quad 1$$

であるから次の定義が使える。

[定義2]

x が $[u]$ -regular point とは $P_x(\theta^{[u]} = 0) = 0$

x が $[u]$ -singular point とは $P_x(\theta^{[u]} = 0) = 1$

regular point の全体を K とし singular point の全体を K^c とする。

3

すなわち, regular point から出れば, θ まで drift の変換で harmonic にできる事を示す。

[定理1]

$u \in \mathcal{E}_2$ とし, x を regular point とする。このとき,

functional β_x と $T_n \uparrow \theta$ なる Markov time の sequence が存在し, β_{x+1T_n} が M-functional になり,

$$\mathbb{E}_x \beta_{x+1T_n}^{-\frac{1}{2}} \langle \beta \rangle_{x+1T_n} = 1 \quad \text{かつ}$$

$$\mathbb{E}_x e^{\beta_{x+1T_n}^{-\frac{1}{2}} \langle \beta \rangle_{x+1T_n}} u(x_{x+1T_n}) = u(x) \quad \text{が成り立つ。}$$

証明には次の [Lemma] を用いる。

[Lemma]

β_t, γ_t を bounded M-functional とし、さらに $\langle \beta \rangle_t$ が "bounded" とする。このとき、

$$\mathbb{E}_x \beta_t - \frac{1}{2} \langle \beta \rangle_t = 1$$

$$\mathbb{E}_x e^{\beta_t - \frac{1}{2} \langle \beta \rangle_t} (\gamma_t - \langle \gamma, \beta \rangle_t) = 0$$

この Lemma は '確率積分の変換公式' によって示される。

T_n の作り方を示しておく。

$$\sigma_n = \sup \{ t : B[0, t] \leq n \} \quad \text{とおく}$$

$$\beta_t^n = \int_0^t a(x_s) dx_s + \hat{u}_s \quad \text{が"存在する。}$$

$t < \sigma(\omega)$ なる t に対しては $t < \sigma_n(\omega)$ なる n が"存在し、 $m \geq n$

なる任意の m に対して、 $\beta_t^m = \beta_t^n$ なるからこの値を

β_t とおく。すると

$$\beta_t \wedge \sigma_n = \beta_t^n \quad \text{が"わかる。}$$

$$\sigma(m, n) = \sup \left\{ t : t \leq \sigma_n, \sup_{s \leq t} |\beta_s| \leq m, \sup_{s \leq t} |\hat{u}_s| \leq m, A_t^{[u]} \leq m \right\}$$

とおく。

n に対して 次のような m が"存在する。

$$P_x \left(\sigma(m, n) < \sigma_n - \frac{1}{n} \right) \leq \frac{1}{n^2}$$

この m をとって、 $T_n = \sigma(m, n)$ とおけば"よい。

あとは Lemma の γ を \hat{u} で"おきかえれば"

定理が"容易に示される。

4 ここで K が "fine open" であることを示す。

即ち regular point から τ だけは、しほら τ は singular point \wedge は達し存して、 K の中を τ 動く。

[定理 2]

x を regular point とするとき、次のような $\mathcal{B}(S)$ -可測集合 $V(x)$ が存在する。 $V(x) \ni x$, $V(x) \subset K$

$$P_x(\tau(V(x)) \leq \theta < \zeta) = P_x(\theta < \zeta) \quad \dots (4.1)$$

$$P_x(\tau(V(x)) > 0) = 1 \quad \dots (4.2)$$

ここで τ は first exit time

[証明の概略]

[I] $V(x)$ の定義と可測性。

$$U_n = \left\{ x : P_x(\theta \leq \frac{1}{n}) \geq 1 - \frac{1}{n} \right\}$$

とおくと、 $U_{n+1} \subset U_n$

x が "regular 存らば" ある n が存在して $P_x(\theta > \frac{1}{n}) > \frac{1}{n}$

$\therefore x \in U_n^c$ よって $V(x) \subseteq U_n^c$ とおくと。

可測性は、まず有界連続関数 φ に対して、

$$g(x) = E_x(\varphi(B_{\frac{1}{n}})) \quad \text{とし。}$$

$\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta g(x) = g(x)$ を示し、 $g(x)$ は $\mathcal{B}(S)$ -可測であることを示す。

あることがわかり、次に一般の有界可測関数 φ に対しては

同じことがいえる。 $\varphi(a) = \chi_{\{a=\infty\}}$ とおけば、

$V(x)$ の可測性がわかる。

(4.1) の証明は略し. (4.2) を証明する.

[II] path が "continuous" であるから, $\sigma(U_n(x)) = \tau(V(x))$

$$\text{よって. } P_x(\sigma(U_n) = 0) = 0 \quad \dots \dots \dots (4.3)$$

を示せばよい. まず, compact sets の increasing sequence $\{\pi_n\}$ が存在して $\pi_n \uparrow U_n(x)$.

$$P_x(\sigma_{\pi_m} \downarrow \sigma_{U_n(x)}) = 1$$

$$(4.3) \text{ を否定すると. } P_x(\sigma_{\pi_m} \downarrow 0) = 1$$

$$\sigma_{\pi_m} < \zeta \text{ ならば } \exists \sigma_{\pi_m} \in U_n(x) \text{ なるから}$$

$$P_{x_{\sigma_{\pi_m}}}(\sigma \leq \frac{1}{n(x)}) \geq 1 - \frac{1}{n(x)}$$

$$\text{故に } E_x \left\{ P_{x_{\sigma_{\pi_m}}}(\sigma \leq \frac{1}{n(x)}); \sigma(\pi_m) < \zeta \right\} \geq (1 - \frac{1}{n(x)}) P_x \left\{ \sigma(\pi_m) < \zeta \right\}$$

$$\text{左辺} = P_x \left\{ \sigma(W_{\sigma_{\pi_m}}^+) \leq \frac{1}{n(x)}; \sigma(\pi_m) < \zeta \right\}$$

$$\leq P_x \left\{ B[\sigma(\pi_m), \sigma(\pi_m) + \frac{1}{n(x)} + \frac{\delta}{2}] = 0, \sigma(\pi_m) < \zeta \right\}$$

$$\leq P_x \left\{ B[0, \frac{1}{n(x)} + \delta] = 0 \right\} + P_x \left\{ \sigma(\pi_m) \geq \frac{\delta}{2} \right\}$$

$$\leq P_x \left\{ \sigma \leq \frac{1}{n(x)} + \delta \right\} + P_x \left\{ \sigma(\pi_m) \geq \frac{\delta}{2} \right\}$$

$$\text{ここで } m \text{ は任意であり, } P_x(\sigma(\pi_m) \downarrow 0) = 1$$

$$\text{を仮定して} P_x(\sigma(\pi_m) \geq \frac{\delta}{2}) \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty)$$

$$\text{又 } P_x(\sigma(\pi_m) < \zeta) \rightarrow 1$$

従って.

$$P_x \left\{ 0 \leq \frac{1}{n(x)} + \delta \right\} \geq 1 - \frac{1}{n(x)}$$

が任意の δ に対して成り立つ。

$$\therefore P_x \left\{ 0 \leq \frac{1}{n(x)} \right\} \geq 1 - \frac{1}{n(x)}$$

これは $x \in U_{n(x)}$ を意味し、平均である。(証明終り)

5. [例1]

regular point, singular point を $(0, 1)$ 上の吸収壁 Brown 運動を例に挙げてみる。

Green function $g(x, y)$ は次式で与えられる。

$$g(x, y) = \begin{cases} 2(1-x)y & 0 < y \leq x < 1 \\ 2(1-y)x & 0 < x \leq y < 1 \end{cases}$$

$$u(x) = \int_0^1 g(x, y) f(y) dy \quad \text{と表せる。}$$

確率積分の変換公式により

$$\hat{u}_t = \int_0^t u'(x_s) dx_s, \quad A_t^{[u]} = -\frac{1}{2} \int_0^t u''(x_s) ds$$



$$\langle \hat{u} \rangle_t = \int_0^t u'(x_s)^2 ds \quad \text{がわかる。また}$$

$$B[0, t] = \int_0^t a(x_s)^2 d\langle \hat{u} \rangle_s = \int_0^t b(x_s) ds$$

$$\text{ここ} \quad b(x) = \begin{cases} \frac{f(x)^2}{u'(x)^2} & \text{if } u'(x) \neq 0 \\ 0 & \text{if } u'(x) = 0 \end{cases}$$

従って、 f が bounded の時は $u'(a) \neq 0$ なる a は regular point であることがわかる。

又 $u'(a) = 0$ なる a は次の二つの場合がある。



(1) の a は singular point である。存在する。これは regular

とすれば $\exists T_n \uparrow \infty \quad \mathbb{E}_a e^{\beta \times 1 T_n - \frac{1}{2} \langle \beta \rangle T_n} (u(X_{t+T_n}) - u(a)) = 0$

$\therefore u(a) = u(X_{t+T_n}) \quad a.e. P_a$ である。

(2) では、 a は regular point である。 b, d は singular point であることがわかる。

6

今まで一つの u を固定して話をしたが、ここで異なる u を考え、ある点 x が regular にあったり、singular にあったりする場合は、^{(0,1)上の} Brown 運動によって考える。即ち、0-1 の hitting time が ∞ にある u と、存在する u を区別する必要十分条件を与える。はじめに $(0,1)$ 上の Lemma を準備する。

[Lemma 1]

$g(x)$ を $(0,1)$ の境界上の関数とする。

α' を $x=1$ の hitting time とする。

$$v(x) = \mathbb{E}_x \left(e^{-\int_0^{\alpha'} V(x_s) ds} g(x_{\alpha'}) \right) \quad \text{とおくと}$$

$v(x)$ は $\frac{1}{2} f''(x) - V(x)f(x) = 0$

の有界な解である。

[Lemma 2]

$$\frac{1}{2}f''(x) - V(x)f(x) = 0$$

$$f(x) \geq 0 \quad x \in [0, 1]$$

かゝる $f(1) = 0$ なる有界な解をもつ事と、次の事は同値である。

$$0 < a < 1.$$

$$\int_0^a x V(x) dx = \infty$$

[Lemma 3]

$$P_x \left(\int_0^{\delta_0} V(x_s) ds = \infty, \delta' = \delta_0 \right) = P_x (\delta' = \delta_0)$$

である事と次の事が同値である。

$$\int_0^a x V(x) dx = \infty$$

[Proposition]

(0, 1) における Brown 運動において、0 への hitting time が ∞ になるための必要十分条件は、

$$0 < a < 1 \quad \int_0^a x \frac{U''(x)^2}{U'(x)^2} dx = \infty.$$

次に regular point であるか、他点からその点に hit すると ∞ になる例を与える。

[-1, 0] で反射壁 Brown 運動

(0, 1) で吸収壁 Brown 運動 を考え。

$$u(x) = \begin{cases} 1 - \sqrt{x} & 1 > x > 0 \\ 1 & 0 \geq x \geq -1 \end{cases} \quad \text{とおく。}$$

これは、0 ^は明らか regular point であるか、上の [Proposition] より、0 に hit すると ∞ になってしまう。

□ 次に上の例で示されたような集を characterize する。

[定理3]

Hunt の条件 (F) の下で, 次のような thin Borel set

$L \subset \mathbb{R}$ が存在する。

任意の regular point に対して,

$$P_x(\sigma = \sigma_{\mathbb{R} \setminus L} : \sigma < \zeta) = P_x(\sigma < \zeta)$$

が成立する。

この証明には Blumenthal - Gettoor [fifth Berkeley]

による次の Lemma を用いる。

[Lemma]

Hunt の条件 (F) の下で, T を thin accessible terminal time とし, $P_x(\zeta \leq T < \infty) = 0$ とするとき,

thin Borel set $B \subset \mathbb{R}$ が存在して,

$T = T_B$ が almost surely on $\{\zeta < \infty\}$ と

成立する。

Lemma, 定理と証明は略す。

具体的に L がどのような集合であるかを示すのが次の

Proposition で, L は $\cup_n = \{x : P_x(\sigma \leq \frac{1}{n}) \geq 1 - \frac{1}{n}\}$

の $n \rightarrow \infty$ の極限として表されることを示す。

[Proposition]

任意の x に対して $P_x(\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{\cup_n} = \sigma < \zeta) = P_x(\sigma < \zeta)$ が成立し, 特に x を regular point とすれば

$$P_x(\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{\cup_n} = \sigma_L, \sigma = \sigma_L < \zeta) = P_x(\sigma = \sigma_L < \zeta)$$

また L はある n に対して translation line に似た性質を
 持つことを見るのが n 次の Proposition である。

[Proposition]

x を regular point とすると、ある n が存在して

$$P_x(\sigma_{\sigma_n} > 0) = 1.$$

以上のことを、模型的に図で示せば次のようになる。

