

原「オムナヂン」ト二十分煮「オムナヂン」トノ 抗原能働力ノ差ハ毒力ノ差ニ歸スベキカ

京都帝國大學醫學部外科學研究室(鳥瀨教授指導)

黃 文 陶

Ist der Unterschied zwischen dem originalen und dem 20 Min. abgekochten Omnadin in der Antigenavidität dem der Toxizität zurückzuführen?


Von

Dr. Bunto Koh.

[Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Universitätsklinik Kyoto
(Prof. Dr. R. Torikata).]

Die minimale letale Dosis für Mäuse stellte sich beim originalen Omnadin (Orig) als 0,4 ccm und die beim 20 Min. abgekochten (Omn K 20') als 0,5 ccm heraus. Die Toxizität von Orig verhielt sich somit zu der von Omn K 20' wie 1,25 : 1.

Normalen Meerschweinchen injizierten wir 0,5, 1,0, 2,0, 3,0 und 4,0 ccm von Orig bzw. Omn K 20' und stellten die Schwankung der Leukozytenzahl im Blute in Vermehrungskoeffizienten kurvenförmig dar. Ueber die Ergebnisse der Versuche geben die Kurven I und II Aufschluss.



Daraus ging hervor, dass 2,0 ccm von Orig und 2,5 ccm von Omn K 20' denselben Grad der Hyperleukozytose sowie 3,0 ccm von Orig und 3,7 ccm von Omn K 20' ebenfalls denselben Grad der Leukopenie herbeiführten. Somit ist ersichtlich, dass sich die Toxizität von Orig zu der von Omn K 20' zueinander wie 1,25 bzw. 1,23

: 1 verhält. Der Vergleich von Orig mit dem Omn K 20' in der die normale Phagozytose im zirkulierenden Blute der Meerschweinchen fördernden Wirkung fiel wie in folgender Tabelle angegeben aus.

| Testmaterial | Menge ccm | Toxizität | Zahl der weissen Zellen im Blute | Koeffizient der Hyperleukozytose | Phagozytat | % | Koeffizient der Phagozytose |
|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|-----------------------------|
| Orig | 0,2 | $\frac{1}{2}$ D.l.m. | 6915 | 1,16 | 60,4 | 100 | 8,7 |
| Omn K 20' | 0,25 | $\frac{1}{2}$ D.l.m. | 7253 | 1,13 | 114,1 | 189 | 15,7 |
| Orig | 0,4 | 1 D.l.m. | 7272 | 1,56 | 105,6 | 100 | 14,7 |
| Omn K 20' | 0,5 | 1 D.l.m. | 6988 | 1,23 | 165,2 | 155 | 23,6 |
| Orig | 0,8 | 2 D.l.m. | 5372 | 0,90 | 102,2 | 100 | 19,0 |
| Omn K 20' | 1,0 | 2 D.l.m. | 5777 | 0,93 | 138,8 | 136 | 24,0 |

Zusammenfassung.

1. Trotz der durch D.l.m. und die Schwankung der Leukozytenzahl im Blute kontrollierten Testdosen der gleichen Toxizität der beidem Testmaterialien, Orig bzw. Omn K 20', erfuhren die Orig-Tiere immer etwas grössere Toxizität als Omn K 20'-Tieren.
2. Die durch $\frac{1}{2}$ D.l.m. sowie 2 D.l.m. experimentierten Tiergruppen ergaben fast dieselbe Schwankung in der Leukozytenzahl im Blute. Der Koeffizient der Hyperleukozytose betrug 1,16 bzw. 0,90 bei Orig und 1,13 bzw. 0,93 bei Omn-K 20', ein Beweis dafür, dass die Toxizität dabei fast die gleiche war.
3. Dabei zeigte jedoch ihre Antigenavidität, die sich in der Förderung der normalen Phagozytose dokumentierte, einen ziemlich markanten Unterschied. Das Phagozytat bei Orig verhielte sich nämlich zu dem bei Omn K 20' wie 60,4 : 114,1 = 100 : 189 oder 102,2 : 138,8 = 100 : 136.
4. Somit ist bewiesen, dass die Antigenavidität mit der Toxizität nicht identisch ist. Die Erhöhung der Antigenavidität bei der Inaktivierung des Impedins durch Siedehitze ist also von der Aenderung der Toxizität total unabhängig.

(Autoreferat)

目次

1. 緒言
2. 供試材料
3. 實驗方法
4. 原並ビニ20分煮_Lオムナヂン_Lノ毒力ノ測定
 - 第1, _Lマウス_L 最小致死量ヲ指標トセル毒力ノ比較
 - 第2, 海狸白血球像ノ變化ヲ指標トセル毒力ノ比較
5. 同一毒力(不同用量)ヲ以テセル原並ビニ

- 20分煮_Lオムナヂン_Lノ喰菌作用促進能動力
- 第1, 對_Lマウス_L 最小致死量 $\frac{1}{2}$ 量 (原 $\frac{0.2}{20}$ 煮
0.25 兎) 兎ヲ注射セシ場合
- 第2, 對_Lマウス_L 最小致死量 (原 $\frac{0.4}{20}$ 煮 $\frac{0.5}{0.5}$ 兎)
兎ヲ注射セシ場合
- 第3, 對_Lマウス_L 最小致死量2倍量 (原 $\frac{0.8}{20}$ 煮
1.0 兎) 兎ヲ注射セシ場合
6. 所見總括
7. 結論

1. 緒 言

一般ニ_L毒性¹ト_L免疫元性¹トハ同格 (identisch) ナルモノナルカノ如ク考ヘラレ、免疫元性大ナルモノハ毒性モ亦タ大ニシテ、毒性小ナルモノハ免疫元性モ亦タ小ナリト解釋セラレ居タレドモ、鳥瀉教授ハ1917年來此ノ二ツハ全然別事項ナルコトヲ説破セラレタリ。近時_Lアナトキシ¹ノ研究結果ニヨリテ_L毒力即免疫力¹、_L免疫力即毒力¹ナル從來ノ考ヘ方ノ誤謬ナルコトガ辛ウジテ諒解セラレツアルガ如シ。然レドモ_Lアナトキシ¹ノ事實ニヨリテ_L免疫力ト毒力トハ全く無關係ノモノナリ¹ト斷定スルガ如キハ早計ナリ、此點ニ關シテハ早く既ニ鳥瀉教授ハ下ノ如ク述べラレタリ。

_L毒力ハ免疫力ヲ意味セズ、免疫力ハ亦タ毒力ヲ意味セズ、然レドモ免疫力ト毒力トノ間ニハ一定ノ關係アリ。即チ毒力過大ニテモ過少ニテモ免疫ノ獲得ニハ不利ニシテ、最大ノ免疫獲得ニハ一定ノ毒力ヲ必要トス¹ト。故ニ_Lアナトキシ¹ハ全然無毒ニシテ全く生理的食鹽水ト一般ナルカノ如ク考ヘ、或ハ免疫ノ發生ニハ毒力ハ全く不必要ナルカノ如クニ考フル者アラバ、ソハ大ナル謬見ナリ。

此故ニ一定ノ抗原性物質ノ抗原性能働力ノ大小ヲ比較セント欲セバ、其ノ際ニ於テ_L同一毒力¹ノ立場ヨリ結果ヲ觀察スルコトヲ要スルモノナリ、何トナレバ免疫ノ効果ハ_L抗原性能働力¹ト_L毒力¹トノ二ツノ要約ニヨリテ發生スルモノナレバナリ。

余等ハ_L嚙菌作用¹ヲ指標トシ、第1報(本誌前文參照)ニハ原_Lオムナヂン¹ハ30分煮_Lオムナヂン¹ヨリモ一面抗原性能働力小ニシテ他面毒力大ナルコトヲ立證シ、第2報(同ジク本誌前文參照)ニハ原_Lオムナヂン¹ノ含有スル_Lイムベヂン¹ヲ完全ニ破却スルタメニ必要ナル煮沸時間ハ20分間ニシテ、而シテ20分煮_Lオムナヂン¹ガ一面ニハ最大嚙菌作用ヲ惹起シ、他面ニハ原_Lオムナヂン¹ヨリモ毒力小ナルコトヲ確メタリ。

本研究ニアリテハ毒力同一ノ條件ノ下ニ於テ原_Lオムナヂン¹ト20分煮_Lオムナヂン¹ト果シテ何レガ大ナル抗原能働力ヲ有スルモノナルヤヲ實驗結果ニ匡シ、以テ抗原能働力ノ差ハ毒力ノ差ニ關係スルヤ否ヤヲ吟味セント欲ス。而シテ抗原能働力ヲ判定スルノ指標トシテハ_L正常嚙菌作用促進能力¹ヲ採用セリ。

2. 供 試 材 料

1. 原_Lオムナヂン¹並ビニ20分煮_Lオムナヂン¹

_Lオムナヂン¹ノ大量ヲ一個ノ消毒_Lコルベン¹ニ入レ、ソレヲ平等ニ混和攪拌シタル後ニ折半シテ一部ヲ其ノ儘原_Lオムナヂン¹ (Orig) トナシ、他ノ一部ヲ攝氏100度ニテ沸騰シツ・アル重湯煎中ニテ20分間煮沸シテ20分煮_Lオムナヂン¹ (OmnK20') ト爲ス。原、煮_Lオムナヂン¹ハ何レモ色澤性状共ニ同様ニシテ沈澱等ヲ認メズ。

2. 標準葡萄狀菌浮游液

24時間寒天培養ノ菌苔ヲ0.5%石炭酸加0.85%食鹽水ニ浮游セシメ、攝氏60度30分加熱ニヨリテ殺菌ス。ソノ1.0坵中ノ菌量ハ1分間2500廻轉30分間遠心シテ鳥瀉教授ノ沈澱計ニテ計測スルニ4度目、即チ0.0028坵ナリキ。

3. 試驗動物

甲、「マウス」。約二百數十疋中ヨリ體重8、或ハ9、或ハ10瓦ヲ有スル三通リノ活潑ナル同一種族ノモノ18群(體重8,9,10各1頭宛即チ3頭ヨリ編成)計54疋ヲ使用セリ。

乙、海狸。體重300瓦内外ヲ有スル健全ノモノ16群(2頭宛ヨリ編成)ヲ使用セリ。

3. 實驗方法

全實驗ヲ甲乙ニ大別シ、實驗甲ヲ更ニ第1、第2ニ區別シ、第1ニ於テハ「マウス」16群ヲ2分シ、各8段ニ分チテ原並ビニ20分煮「オムナデン」各0.1坵、0.2坵、0.3坵、0.4坵、0.5坵、0.6坵、0.7坵、0.8坵宛ヲ其ノ腹腔内ニ注射シテ24時間内ノ轉歸ヲ觀察比較セリ。第2ニ於テハ海狸10群ヲ折半シ、各5段ニ分チテ原並ビニ20分煮「オムナデン」各0.5坵、1.0坵、2.0坵、3.0坵、4.0坵宛ヲ其ノ腹腔内ニ注射シ、注射前及ビ注射後30分、60分、120分、240分、480分、計6回實驗乙ノ方法ト同様ニ採血シ、染色標本ヲ作製シテ白血球像ノ變化ヲ追究セリ。

實驗乙ヲ第1、第2、第3ニ區別シ、原並ビニ20分煮「オムナデン」ヲ對「マウス」最小致死量ノ1/2量(原^{0.2}/₂₀煮0.25坵)、同一量(原^{0.4}/₂₀煮0.5坵)、2倍量(原^{0.8}/₂₀煮1.0坵)宛ヲ其ノ腹腔内ニ注射シ、30分經過後更ニ頸靜脈内ヘ各1.0坵宛ノ標準黃色葡萄狀菌液ヲ注射セリ。原、煮「オムナデン」ノ注射前及ビ菌液ノ追加後15分、30分、60分、120分、240分、480分(計7回)ニ於テ試獸ノ後肢大腿皮下靜脈ヨリ採血シテ白血球數ノ増減ヲ計算シ、血液塗抹標本ヲギームザ氏液ニテ染色シ鏡檢ニ供ス。任意ノ視野ニ現ハレタル白血球200個ヲ計上シテソノ種類及ビ100分率ノ推移並ビニ喰細胞數「喰」、被喰菌數「菌」、及ビ喰菌子數「子」ヲ検査シ喰菌作用ノ強弱ヲ觀察決定セリ。

4. 原並ビニ20分煮「オムナデン」ノ毒力ノ測定

第1、「マウス」最小致死量ヲ指標トセル毒力ノ比較

所見ハ第1表ニ示スガ如シ。

第1表 原並ビニ20分煮「オムナデン」ノ對「マウス」最小致死量

| 動物番號 | 第1群 | | | 第2群 | | | 第3群 | | | 第4群 | | | 第5群 | | | 第6群 | | | 第7群 | | | 第8群 | | |
|--------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 體重(瓦) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 注射量(坵) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 轉歸 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 死 | 生 | 生 | 死 | 死 | 生 | 死 | 死 | 死 | 死 | 死 | 死 | 死 | 死 | 死 | 死 | 死 | 死 |

| 二十分煮 動物 番號 | 第1群 | | | 第2群 | | | 第3群 | | | 第4群 | | | 第5群 | | | 第6群 | | | 第7群 | | | 第8群 | | |
|--------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 體重 (五) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 注射量 (_L ト) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 轉歸 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 死 | 生 | 生 | 死 | 死 | 生 | 死 | 死 | 生 | 死 | 死 | 死 | 死 | 死 | 死 |

原_Lオムナヂン¹ノ「マウス」最小致死量:20'煮_Lオムナヂン¹ノ「マウス」最小致死量=0.4_L:0.5_L
 .20'煮_Lオムナヂン¹ノ毒力:原_Lオムナヂン¹ノ毒力=1:1.25

所見概括

1. 原並ビニ20分煮_Lオムナヂン¹ノ0.1_L—0.2_L宛ヲ注射スルニ何等ノ反應ヲ呈セズ, 4群計12頭ノ試獸ハ悉ク異常ナク, 24時間ヲ經過スルモ尙ホ健存セリ。
2. 注射量ヲ各0.3_L宛增加スルニ及ビ, 各試獸ハ共ニ輕度ノ中毒症狀ヲ惹起シ, 短キハ2,3分間長キハ10數分間歩行蹣跚シ運動活潑ナラズ, 24時間ノ經過中終ニ原_Lオムナヂン¹注射群ニ1頭ノ斃死ヲ見タリ。
3. 更ニ分量ヲ増加シテ各0.4_L宛ヲ注射スルニ各試獸ノ中毒症狀ハ增強シ, 中一ハ痙攣ヲ起スモノアリ, 24時間内ニ原_Lオムナヂン¹ヲ注射セルモノハ2頭, 20分煮_Lオムナヂン¹ヲ注射セルモノハ1頭斃レタリ。
4. 注射分量ヲ0.5_Lニ増加セルニ原_Lオムナヂン¹ノ場合ハ3頭共ニ始メヨリ強キ痙攣ヲ起シ, 次ギニ昏睡状態ニ陥リテソノ儘死ノ轉歸ヲ取りタリ。20分煮_Lオムナヂン¹ノ場合ハ同ジク3頭共ニ痙攣昏睡ヲ起セルモノノ中1頭ハ2, 3時間ニテ元氣恢復シ, 24時間ヲ經過スルモ尙ホ生存セリ, 然レドモ他ノ2頭ハ原_Lオムナヂン¹ヲ注射セシモノト同様ニ中毒状態ノ儘ニテ死亡セリ。
5. 使用量ヲ0.6_L—0.8_Lニ増加セルニ原_Lオムナヂン¹又ハ20分煮_Lオムナヂン¹ノ何レカヲ問ハズ, 全部ニ中毒症狀ヲ起シ終リニ亦全部斃レタリ。
6. 即チ對「マウス」最小致死量ハ原_Lオムナヂン¹ニテハ0.4_L, 煮_Lオムナヂン¹ニテハ0.5_Lトナリタリ。故ニ毒力ノ比ハ原:煮=1.25:1ナリ。

第2. 海狸白血球像ノ變化ヲ指標トセル毒力ノ比較

所見ハ第2表—第12表及ビ第1圖ニ示スガ如シ。

所見概括

原_Lオムナヂン¹ト煮_Lオムナヂン¹トガ健常海狸血中ニ於テ惹起セル白血球增加率ノ推移ヲ觀察スルニ, 第1圖ニ於ケルガ如ク曲線ノ走行ヨリスレバ原_Lオムナヂン¹ノ2.0_Lト煮_Lオムナヂン¹ノ2.5_Lトハ殆ド同一程度ノ白血球過多症ヲ來セリ, (第1圖曲線點H, H₂参照)

第 2 表 原_Lオムナヂン^{70.5cc}注射ノ場合ニ於ケル白血球像(2頭平均)

| 檢 査 | 實數 | 増減率 | 百 分 率 (計上喰細胞數400個平均) | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|----------|-------|-------|
| | | | 中 性 多 型 核 | | | | | | 大單核 (移行 型) | エオヂ ン嗜好 細胞 | 肥胖細 胞 | 淋巴球 | |
| | | | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | 合計 | | | | | |
| 注射前 | 4020 | 100 | 2.25 | 5.5 | 6.75 | 7.25 | 3.0 | 24.75 | 5.0 | 0 | 0 | 70.25 | |
| 抗血 原迄 注射 時間 後檢 | 30' | 4340 | 108 | 2.75 | 12.25 | 11.0 | 9.0 | 8.25 | 43.25 | 9.75 | 0.75 | 0 | 46.25 |
| | 60' | 4400 | 109 | 4.75 | 50.5 | 16.0 | 7.25 | 6.5 | 55.0 | 9.25 | 0 | 0 | 35.75 |
| | 120' | 7400 | 184 | 10.25 | 23.0 | 23.5 | 8.5 | 4.75 | 70.0 | 6.5 | 0.75 | 0.25 | 22.5 |
| | 240' | 5440 | 135 | 9.25 | 27.5 | 20.25 | 15.25 | 7.25 | 79.5 | 9.5 | 0 | 1.25 | 9.75 |
| | 480' | 5320 | 132 | 4.5 | 18.75 | 18.25 | 15.25 | 7.5 | 64.25 | 6.0 | 0 | 0.25 | 29.5 |
| 平均 | 5380 | 134 | 6.3 | 20.4 | 17.8 | 11.05 | 6.85 | 62.4 | 8.2 | 0.3 | 0.35 | 28.75 | |

第 3 表 20'煮_Lオムナヂン^{70.5cc}注射ノ場合ニ於ケル白血球像(2頭平均)

| 檢 査 | 實數 | 増減率 | 百 分 率 (計上喰細胞數400個平均) | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|----------------------|-------|-------|-------|-------|------|------------------|------------------|----------|------|-------|
| | | | 中 性 多 型 核 | | | | | | 大單核 (移行 型) | エオヂ ン嗜好 細胞 | 肥胖細 胞 | 淋巴球 | |
| | | | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | 合計 | | | | | |
| 注射前 | 4240 | 100 | 3.75 | 17.75 | 18.5 | 9.25 | 5.75 | 55.0 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 35.0 | |
| 抗血 原迄 注射 時間 後檢 | 30' | 4540 | 107 | 5.5 | 18.25 | 15.25 | 8.75 | 3.25 | 51.0 | 8.25 | 1.0 | 0.25 | 39.5 |
| | 60' | 4840 | 114 | 6.5 | 25.5 | 21.25 | 8.75 | 6.5 | 68.5 | 7.0 | 0.5 | 0 | 24.0 |
| | 120' | 5520 | 130 | 8.25 | 25.5 | 20.25 | 9.25 | 7.75 | 71.0 | 9.75 | 1.0 | 0.5 | 17.75 |
| | 240' | 4820 | 114 | 7.25 | 24.5 | 25.0 | 11.25 | 5.75 | 73.75 | 8.5 | 1.25 | 0 | 16.5 |
| | 480' | 4560 | 108 | 3.25 | 12.75 | 21.5 | 17.75 | 12.5 | 67.75 | 8.5 | 0 | 0 | 23.75 |
| 平均 | 4856 | 115 | 6.15 | 21.3 | 20.65 | 11.15 | 7.15 | 66.4 | 8.4 | 0.75 | 0.15 | 24.3 | |

第 4 表 原_Lオムナヂン^{71.0 c}注射ノ場合ニ於ケル白血球像(2頭平均)

| 檢 査 | 實數 | 増減率 | 百 分 率 (計上喰細胞數400個平均) | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|----------------------|-------|-------|------|-------|-------|------------------|------------------|----------|-------|-------|
| | | | 中 性 多 型 核 | | | | | | 大單核 (移行 型) | エオヂ ン嗜好 細胞 | 肥胖細 胞 | 淋巴球 | |
| | | | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | 合計 | | | | | |
| 注射前 | 4160 | 100 | 1.0 | 5.5 | 5.25 | 3.5 | 3.0 | 18.25 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 74.25 | |
| 抗血 原迄 注射 時間 後檢 | 30' | 4960 | 119 | 1.25 | 6.25 | 9.5 | 9.0 | 3.75 | 29.75 | 5.75 | 1.5 | 0.25 | 62.75 |
| | 60' | 5860 | 141 | 1.25 | 7.25 | 5.25 | 4.25 | 3.25 | 21.25 | 7.0 | 2.25 | 0 | 69.5 |
| | 120' | 6620 | 159 | 10.5 | 16.5 | 11.0 | 5.0 | 3.5 | 46.5 | 6.0 | 0.75 | 0.25 | 46.5 |
| | 240' | 5860 | 141 | 9.25 | 18.0 | 16.5 | 12.0 | 3.5 | 59.25 | 8.5 | 0.25 | 0 | 32.0 |
| | 480' | 5040 | 121 | 6.0 | 14.75 | 19.5 | 11.75 | 12.75 | 64.75 | 5.5 | 0.25 | 0 | 29.5 |
| 平均 | 5668 | 136 | 5.65 | 12.55 | 12.55 | 8.4 | 5.35 | 44.3 | 6.55 | 1.0 | 0.1 | 48.05 | |

第 5 表 20'煮_Lオムナデン⁷1.0cc注射ノ場合ニ於ケル白血球像(2頭平均)

| 檢 査 | 實數 | 増減率 | 百 分 率 (計上喰細胞數400個平均) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|----------------------|-------|-------|-------|-------|------|------------------|------------------|----------|-------|-------|
| | | | 中 性 多 型 核 | | | | | | 大單核 (移行 型) | エオチ ン嗜好 細胞 | 肥胖細 胞 | 淋巴球 | |
| | | | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | 合計 | | | | | |
| 注射前 | 5700 | 100 | 2.25 | 7.5 | 12.5 | 6.5 | 2.25 | 31.0 | 4.75 | 0.5 | 1.25 | 62.5 | |
| 抗血 原迄 注射 時間 後 檢 | 30' | 6440 | 113 | 3.5 | 22.75 | 16.75 | 7.25 | 3.75 | 54.0 | 7.25 | 1.25 | 1.25 | 36.25 |
| | 60' | 6660 | 117 | 2.75 | 11.25 | 14.25 | 8.0 | 3.75 | 40.0 | 3.5 | 1.5 | 0.75 | 54.25 |
| | 120' | 8800 | 154 | 10.75 | 27.75 | 17.75 | 8.25 | 3.0 | 67.5 | 4.75 | 0 | 0 | 27.75 |
| | 240' | 6620 | 116 | 8.5 | 26.5 | 18.5 | 8.0 | 6.5 | 68.0 | 8.25 | 0.5 | 0.25 | 23.0 |
| | 480' | 6640 | 116 | 3.75 | 16.5 | 18.5 | 11.75 | 7.0 | 57.5 | 7.5 | 0 | 0 | 35.0 |
| 平 均 | 7032 | 123 | 5.85 | 20.95 | 17.15 | 8.65 | 4.8 | 57.4 | 6.25 | 0.65 | 0.45 | 35.25 | |

第 6 表 原_Lオムナデン⁷2.0cc注射ノ場合ニ於ケル白血球像(2頭平均)

| 檢 査 | 實數 | 増減率 | 百 分 率 (計上喰細胞數400個平均) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|----------|-------|-------|
| | | | 中 性 多 型 核 | | | | | | 大單核 (移行 型) | エオチ ン嗜好 細胞 | 肥胖細 胞 | 淋巴球 | |
| | | | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | 合計 | | | | | |
| 注射前 | 4520 | 100 | 1.0 | 11.25 | 14.75 | 11.25 | 6.0 | 44.25 | 7.75 | 0.5 | 0.25 | 47.25 | |
| 抗血 原迄 注射 時間 後 檢 | 30' | 4760 | 105 | 3.5 | 15.5 | 18.5 | 10.0 | 5.25 | 52.75 | 5.25 | 1.0 | 0.25 | 40.75 |
| | 60' | 8100 | 179 | 5.0 | 19.0 | 18.25 | 10.0 | 3.75 | 56.0 | 6.25 | 1.0 | 0.25 | 36.5 |
| | 120' | 9740 | 215 | 11.0 | 22.0 | 22.25 | 13.25 | 5.25 | 73.75 | 8.25 | 0.25 | 0.25 | 17.5 |
| | 240' | 9820 | 217 | 9.0 | 24.5 | 20.0 | 15.25 | 6.5 | 75.25 | 9.25 | 0.25 | 0 | 15.25 |
| | 480' | 6720 | 149 | 3.75 | 18.25 | 19.75 | 17.0 | 11.5 | 70.25 | 7.0 | 0 | 0 | 22.75 |
| 平 均 | 7828 | 173 | 6.45 | 19.85 | 19.75 | 13.1 | 6.45 | 65.6 | 7.2 | 0.5 | 0.15 | 26.55 | |

第 7 表 20'煮_Lオムナデン⁷2.0cc注射ノ場合ニ於ケル白血球像(2頭平均)

| 檢 査 | 實數 | 増減率 | 百 分 率 (計上喰細胞數400個平均) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|----------------------|-------|-------|-------|-------|------|------------------|------------------|----------|------|-------|
| | | | 中 性 多 型 核 | | | | | | 大單核 (移行 型) | エオチ ン嗜好 細胞 | 肥胖細 胞 | 淋巴球 | |
| | | | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | 合計 | | | | | |
| 注射前 | 3500 | 100 | 1.0 | 3.75 | 8.25 | 6.75 | 4.75 | 24.5 | 4.5 | 0.75 | 0.75 | 69.5 | |
| 抗血 原迄 注射 時間 後 檢 | 30' | 3700 | 106 | 0.5 | 5.5 | 11.75 | 9.25 | 6.75 | 33.75 | 5.0 | 0.5 | 0.75 | 60.0 |
| | 60' | 3860 | 110 | 1.0 | 11.0 | 9.5 | 7.0 | 6.0 | 34.5 | 5.75 | 1.25 | 0.25 | 58.25 |
| | 120' | 6200 | 177 | 6.5 | 18.25 | 12.75 | 7.0 | 4.25 | 48.75 | 6.5 | 1.25 | 0.75 | 42.75 |
| | 240' | 6200 | 177 | 7.0 | 24.5 | 25.5 | 16.0 | 6.25 | 79.25 | 3.0 | 0 | 0.5 | 17.25 |
| | 480' | 4740 | 135 | 6.25 | 22.5 | 22.25 | 13.25 | 9.5 | 73.75 | 4.75 | 0 | 0.25 | 21.25 |
| 平 均 | 4940 | 141 | 4.25 | 16.35 | 16.35 | 10.5 | 6.55 | 54.0 | 5.0 | 0.6 | 0.5 | 39.9 | |

第 8 表 原Lオムナデン73.0cc注射ノ場合ニ於ケル白血球像(2頭平均)

| 檢 査 | 實數 | 増減率 | 百 分 率 (計上喰細胞數400個平均) | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|------|-------|-------|
| | | | 中 性 多 型 核 | | | | | | 大單核 (移行 型) | エオヂ ン嗜好 細胞 | 肥胖細胞 | 淋巴球 | |
| | | | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | 合計 | | | | | |
| 注射前 | 3940 | 100 | 1.0 | 4.5 | 8.0 | 7.25 | 4.25 | 25.0 | 2.0 | 1.25 | 0 | 71.75 | |
| 抗血 原注 射時 間 後檢 | 30' | 3620 | 92 | 2.75 | 8.25 | 14.75 | 13.75 | 5.0 | 44.5 | 5.0 | 1.25 | 0.5 | 48.75 |
| | 60' | 3800 | 96 | 3.25 | 13.75 | 18.25 | 9.25 | 4.75 | 49.25 | 5.75 | 1.75 | 0.5 | 42.75 |
| | 120' | 6920 | 176 | 10.5 | 25.5 | 20.75 | 10.25 | 4.25 | 71.25 | 6.5 | 1.75 | 0.5 | 20.0 |
| | 240' | 6500 | 165 | 11.25 | 22.75 | 17.75 | 11.25 | 7.0 | 70.0 | 6.25 | 0 | 0 | 23.75 |
| | 480' | 9760 | 248 | 6.0 | 14.75 | 20.25 | 16.75 | 10.25 | 68.0 | 10.25 | 0 | 0.5 | 21.25 |
| 平 均 | 6120 | 155 | 6.75 | 17.0 | 18.35 | 12.25 | 6.25 | 60.6 | 6.75 | 0.95 | 0.4 | 31.3 | |

第 9 表 20'煮Lオムナデン73.0cc注射ノ場合ニ於ケル白血球像(2頭平均)

| 檢 査 | 實數 | 増減率 | 百 分 率 (計上喰細胞數400個平均) | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|------|------|-------|
| | | | 中 性 多 型 核 | | | | | | 大單核 (移行 型) | エオヂ ン嗜好 細胞 | 肥胖細胞 | 淋巴球 | |
| | | | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | 合計 | | | | | |
| 注射前 | 4540 | 100 | 0.5 | 7.75 | 13.25 | 10.75 | 9.0 | 41.25 | 5.25 | 3.0 | 1.0 | 49.5 | |
| 抗血 原注 射時 間 後檢 | 30' | 4320 | 95 | 2.0 | 12.25 | 12.75 | 11.75 | 5.75 | 44.5 | 11.75 | 2.25 | 0.5 | 41.0 |
| | 60' | 9900 | 218 | 4.0 | 20.5 | 21.75 | 13.25 | 7.75 | 67.25 | 9.25 | 1.5 | 0.25 | 21.75 |
| | 120' | 8700 | 192 | 4.75 | 25.25 | 20.0 | 12.25 | 8.75 | 71.0 | 8.0 | 1.0 | 0.75 | 19.25 |
| | 240' | 12500 | 275 | 5.75 | 22.25 | 18.0 | 17.5 | 11.0 | 74.5 | 10.0 | 0.25 | 0.5 | 14.75 |
| | 480' | 10900 | 240 | 3.0 | 14.0 | 25.0 | 19.75 | 12.25 | 74.0 | 3.25 | 0 | 0 | 22.75 |
| 平 均 | 9264 | 204 | 3.9 | 18.85 | 19.5 | 14.9 | 9.1 | 66.25 | 8.45 | 1.0 | 0.4 | 23.9 | |

第 10 表 原Lオムナデン74.0cc注射ノ場合ニ於ケル白血球像(2頭平均)

| 檢 査 | 實數 | 増減率 | 百 分 率 (計上喰細胞數400個平均) | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|------|-------|-------|
| | | | 中 性 多 型 核 | | | | | | 大單核 (移行 型) | エオヂ ン嗜好 細胞 | 肥胖細胞 | 淋巴球 | |
| | | | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | 合計 | | | | | |
| 注射前 | 5600 | 100 | 1.0 | 7.5 | 11.25 | 14.5 | 6.0 | 40.25 | 5.25 | 1.25 | 1.5 | 51.75 | |
| 抗血 原注 射時 間 後檢 | 30' | 4300 | 77 | 1.0 | 4.0 | 9.25 | 9.5 | 7.5 | 31.25 | 4.5 | 0.5 | 0.75 | 63.0 |
| | 60' | 5260 | 94 | 4.0 | 11.25 | 16.0 | 13.75 | 8.0 | 53.0 | 4.0 | 1.25 | 0.25 | 41.5 |
| | 120' | 6860 | 123 | 8.75 | 19.75 | 20.5 | 10.75 | 8.0 | 67.75 | 2.75 | 0.5 | 0.25 | 28.75 |
| | 240' | 9160 | 164 | 9.75 | 19.25 | 23.75 | 15.0 | 7.25 | 75.0 | 3.0 | 0 | 0.25 | 21.75 |
| | 480' | 9960 | 178 | 4.0 | 17.25 | 24.75 | 21.0 | 11.25 | 78.25 | 6.0 | 0 | 0 | 15.75 |
| 平 均 | 7108 | 127 | 5.5 | 14.3 | 18.85 | 14.0 | 8.4 | 61.05 | 4.05 | 0.45 | 0.3 | 34.15 | |


第11表 20'煮_Lオムナヂン¹4.0cc注射ノ場合ニ於ケル白血球像(2頭平均)

| 検査 | 實數 | 増減率 | 百分率 (計上喰細胞數400個平均) | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|------|-------|-------|
| | | | 中性多型核 | | | | | | 大單核 (移行型) | エオチン 嗜好細胞 | 肥胖細胞 | 淋巴球 | |
| | | | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | 合計 | | | | | |
| 注射前 | 4120 | 100 | 0.75 | 3.75 | 12.75 | 9.25 | 7.25 | 33.75 | 7.75 | 0.25 | 0.5 | 57.75 | |
| 抗 原 迄 ノ 注 射 時 間 後 檢 | 30' | 3320 | 81 | 1.0 | 6.5 | 9.75 | 9.25 | 6.25 | 32.75 | 5.75 | 0.75 | 1.0 | 59.75 |
| | 60' | 4000 | 97 | 4.25 | 13.75 | 19.75 | 9.25 | 6.75 | 53.75 | 7.0 | 0.25 | 0.25 | 38.75 |
| | 120' | 6360 | 154 | 8.25 | 21.25 | 19.75 | 17.75 | 8.25 | 75.25 | 4.75 | 0.5 | 0.25 | 19.25 |
| | 240' | 8300 | 201 | 7.75 | 20.75 | 24.75 | 16.5 | 9.5 | 79.25 | 3.75 | 0 | 0.25 | 16.75 |
| | 480' | 4960 | 120 | 5.0 | 10.5 | 16.5 | 21.25 | 18.5 | 71.75 | 4.25 | 0 | 0 | 24.0 |
| 平均 | 5388 | 131 | 5.25 | 14.55 | 18.1 | 14.8 | 9.85 | 62.55 | 5.1 | 0.3 | 0.35 | 31.7 | |

第12表 各抗原注射ニ依ツテ惹起セル白血球像ノ總括的所見(第1圖参照)

| 抗原用量 (兎) | 單位容積白血球數 | | 白血球増減率 | | 中性多型核白血球% | | 原表 |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|
| | 原 _L オムナヂン ¹ | 20'煮 _L オムナヂン ¹ | 原 _L オムナヂン ¹ | 20'煮 _L オムナヂン ¹ | 原 _L オムナヂン ¹ | 20'煮 _L オムナヂン ¹ | |
| 0.5 | 5380 | 4856 | 134 | 115 | 62.4 | 66.4 | 2-3 |
| 1.0 | 5668 | 7032 | 136 | 123 | 44.3 | 57.4 | 4-5 |
| 2.0 | 7828 | 4940 | 173 | 141 | 65.6 | 54.0 | 6-7 |
| 3.0 | 6120 | 9264 | 155 | 204 | 60.6 | 66.25 | 8-9 |
| 4.0 | 7108 | 5388 | 127 | 131 | 61.05 | 62.55 | 10-11 |

第1圖 原_Lオムナヂン¹注射量ト血中白血球増加率(第12表参照)



毒力ノ判定: 曲線ノ走行ヨリスレバ
 1) 點 H_1 及 P_1 ニ於テ原_Lオムナヂン¹ 2.0兎ト煮_Lオムナヂン¹ 2.5兎トハ殆ンド同一ノ白血球過多ヲ來セリ。
 2) 點 P_1 及 P_2 ニ於テ原_Lオムナヂン¹ 3.0兎ト煮_Lオムナヂン¹ 3.7兎トハ殆ンド同一ノ白血球過少ヲ來セリ。
 故ニ毒力ノ比ハ原: 煮=2.5: 2.0=1.25: 1(白血球過多ヲ基トス)
 或ハ原: 煮=3.7: 3.0=1.23: 1(白血球過少ヲ基トス)ニ該當ス。

故ニ此ノ兩者ハ同一毒力ナリト認メ得可シ。即チ此ノ所見ニヨレバ原, 煮_Lオムナヂン¹毒力ノ比ハ2.5: 2.0=1.25: 1トナリテ煮ノ1.0ニ對シ原ノ毒力ハ1.25ナリ。

同様ニ曲線ノ走行ヨリスレバ原_Lオムナヂン¹ノ3.0兎ト煮_Lオムナヂン¹ノ3.7兎トハ兩々

殆ンド同一程度ノ白血球過少症ヲ惹起セリ、(第1圖曲線點P₁P₂參照) 故ニ毒力ノ比ハ下ノ如クナルベシ。

生：煮=3.7：3.0=1.23：1

即チ煮ノ1.)ニ對シ原ノ毒力ハ1.23ナリ。即チ白血球過多症ノ程度ヨリスレバ毒力ハ1(煮)對1.25(生)，マタ白血球過少症ノ程度ヨリスレバ毒力ハ1(煮)對1.23(生)トナリテ何レモ殆ンド相一致セリ。

故ニ前實驗ニ於ケル對_Lマウス⁷最小致死量ヨリ觀タル毒力ト海獺流血中ノ白血球數ノ動搖ヲ指標ト爲シタル場合ノ毒力トハ略ボ一致セリ。

5. 同一毒力(不同用量)ヲ以テセル原並ビニ20分煮_Lオムナチン⁷ノ喰菌作用促進能働力

第1. 對_Lマウス⁷最小致死量1/2量(原^{0.2}/₂₀煮^{0.25}坵)宛ヲ注射セシ場合

所見ハ第13, 14表及ビ第2, 3圖ニ示スガ如シ。

第13表 _Lマウス⁷最小致死量1/2量ノ原_Lオムナチン⁷(0.2cc)=ヨル喰菌作用(2頭平均)

| 檢 査 | | 總 喰 | | 白 血 球 200 個 中 | | | | | |
|------------------------|------|------|-----|---------------|------|------|------|------|------|
| | | 絶對數 | 比 率 | 中 性 多 型 核 | | | 喰細胞數 | 被喰菌數 | 喰菌子數 |
| | | | | % | 喰 | 菌 | | | |
| 前 注 射 | | 6000 | 100 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菌液ノ 注入時間 後 檢血 | 15' | 5450 | 91 | 13.0 | 9.0 | 22.5 | 10.0 | 26.5 | 36.5 |
| | 30' | 6420 | 107 | 23.7 | 10.5 | 42.0 | 12.0 | 51.0 | 63.0 |
| | 60' | 8550 | 143 | 55.0 | 10.5 | 44.0 | 13.5 | 65.0 | 78.5 |
| | 120' | 9400 | 157 | 72.2 | 11.5 | 61.0 | 11.5 | 61.0 | 72.5 |
| | 240' | 6570 | 110 | 70.2 | 14.5 | 62.0 | 15.0 | 65.0 | 80.0 |
| | 480' | 5100 | 85 | 52.0 | 5.5 | 22.5 | 6.5 | 25.5 | 32.0 |
| 平 均 | | 6915 | 116 | 47.7 | 10.3 | 42.3 | 11.4 | 49.0 | 60.4 |

喰菌率=8.7

第14表 _Lマウス⁷最小致死量1/2量ノ20'煮_Lオムナチン⁷(0.25cc)=ヨル喰菌作用(2頭平均)

| 檢 査 | | 總 喰 | | 白 血 球 200 個 中 | | | | | |
|-------------|-----|------|-----|---------------|------|-------|------|-------|-------|
| | | 絶對數 | 比 率 | 中 性 多 型 核 | | | 喰細胞數 | 被喰菌數 | 喰菌子數 |
| | | | | % | 喰 | 菌 | | | |
| 注 射 前 | | 6400 | 100 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菌液ノ 注入時間 | 15' | 5500 | 86 | 33.2 | 11.0 | 25.5 | 13.5 | 44.5 | 58.0 |
| | 30' | 6720 | 105 | 35.5 | 16.5 | 58.0 | 17.0 | 59.0 | 76.0 |
| | 60' | 9000 | 141 | 60.7 | 27.0 | 183.5 | 28.5 | 185.0 | 213.5 |


| | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|-----|------|------|-------|------|-------|-------|
| 後 檢 血 迄 | 120' | 8250 | 129 | 77.7 | 29.0 | 162.0 | 30.0 | 164.5 | 194.5 |
| | 240' | 7750 | 121 | 62.5 | 15.0 | 46.5 | 15.5 | 47.0 | 62.5 |
| | 480' | 6300 | 98 | 60.0 | 16.5 | 63.5 | 16.5 | 63.5 | 80.0 |
| 平 均 | | 7253 | 113 | 54.9 | 19.2 | 89.8 | 20.2 | 93.9 | 114.1 |

喰菌率=15.7


所見 概 括

1. 現ニ菌體ヲ包喰シ居ル喰細胞數_L喰⁷ハ原_Lオムナデン⁷ニテハ15分目ヨリ次第ニ増加

第2圖 各抗原ノ_Lマウス⁷最小致死量_L量ヲ注射シタル場合ニ於ケル喰菌子數_L子⁷ノ關係



第3圖 各抗原ノ_Lマウス⁷最小致死量_L量ヲ注射シタル場合ニ於ケル白血球增加率ノ推移



シテ4時間目=15.0ヲ以テ最大價ニ達シ、而シテ減少ス。20分煮_Lオムナデン⁷ニテハ同ジク15分目ヨリ漸次ニ増加シテ2時間目=30.0ヲ以テ最大價ヲ示シ其後ハ下降セリ。6回ノ平均數前者ハ11.4ニシテ後者ハ20.2ナリキ。

2. 被喰菌數_L菌⁷ハ比較的急速ニ増大シ而シテ緩徐ニ遞下ス。原_Lオムナデン⁷ノ場合ハ1時間目及ビ4時間目ノ65.0ヲ以テ最高價ニ達シ平均數ハ49.0ヲ示セリ。20分煮_Lオムナデン⁷ノ場合ハ1時間目=185.0ヲ以テ最高値ヲ示シ、平均數ハ93.9ニ達セリ。

3. 喰菌子數_L子⁷ハ原_Lオムナデン⁷ヲ注射スル動物群ニテハ緩慢ニ増大シ、15分目—2時間目迄ハ36.5、63.0、78.5、72.5ノ順ニ4時間目=80.0

ヲ以テ最大價ニ達シ、而シテ8時間目—ハ急ニ32.0ニ下降セリ。

20分煮_Lオムナデン⁷ヲ注射セル動物ニテハ反對ニ急角度ニ増大シ15分目、30分目ハ58.0、76.0ナレドモ1時間目ニ一躍シテ213.5ニ増加シテ最大價ヲ示シ、而シテ2時間目—8時間目ハ194.5、62.5、80.0ニ減少セリ。平均數ハ前者ノ60.4ニ對シテ後者ハ頗ル強大ニシテ114.1ナリキ。

4. 單位容積内白血球數100分率ニ就テ見ルニ各検査時間中ハ夫々減少症増多症交々ニ

現ハレ、兩者間ニ著大ノ差違ヲ認メ得ザリキ。原_Lオムナヂン⁷ニテハ2時間目ニ157%ヲ以テ最大値ヲ示シ、平均116%ノ比率ヲ現セリ。20分煮_Lオムナヂン⁷ニテハ1時間目ニ141%ヲ以テ最大値ニ達シ、平均113%ノ比率ナリキ。即チ原_Lオムナヂン⁷動物ハ煮_Lオムナヂン⁷動物ヨリモ多少大ナル毒作用ヲ示シタリ。

5. 中性多型核白血球ノ平均%數ハ原_Lオムナヂン⁷ニテハ47.7%, 20分煮_Lオムナヂン⁷ニテハ54.9%ニシテ後者ハヤ、大ナリキ。

6. 喰菌率ハ原_Lオムナヂン⁷ハ8.7, 20分煮_Lオムナヂン⁷ハ15.7ニシテ前者ハ著シク小ナリキ。

第2. 對_Lマウス⁷最小致死量<sup>(原_L0.4
20分煮_L0.5 兪)</sup>宛ヲ注射セシ場合

所見ハ第15, 16表及ビ第4, 5圖ニ示スガ如シ。

第15表 _Lマウス⁷最小致死量同量ノ原_Lオムナヂン⁷(0.4cc)ニヨル喰菌作用(2頭平均)

| 檢 査 | 總 喰 | | 白 血 球 200 個 中 | | | 喰細胞數 | 被喰菌數 | 喰菌子數 | |
|-------------------------------------|------|------|---------------|------|------|-------|------|-------|-------|
| | 絶對數 | 比 率 | 中 性 多 型 核 | | | | | | |
| | | | % | 喰 | 菌 | | | | |
| 注 射 前 | 4670 | 100 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菌 迄 液ノ 注 射 時 間 後 檢 査 | 15' | 6750 | 147 | 25.7 | 13.5 | 47.5 | 17.5 | 63.5 | 81.0 |
| | 30' | 8170 | 175 | 38.7 | 16.5 | 54.5 | 21.0 | 69.0 | 90.0 |
| | 60' | 7170 | 154 | 48.2 | 21.0 | 100.5 | 27.0 | 113.0 | 140.0 |
| | 120' | 9170 | 196 | 70.2 | 25.5 | 109.0 | 26.5 | 114.0 | 140.5 |
| | 240' | 7870 | 169 | 65.7 | 20.5 | 95.5 | 21.5 | 96.5 | 118.0 |
| 480' | 4500 | 96 | 65.7 | 17.0 | 53.0 | 17.0 | 53.0 | 70.0 | |
| 平 均 | 7272 | 156 | 52.4 | 19.0 | 76.7 | 21.8 | 84.8 | 106.6 | |


喰菌率=14.7

第16表 _Lマウス⁷最小致死量同量ノ20分煮_Lオムナヂン⁷(0.5cc)ニヨル喰菌作用(2頭平均)


| 檢 査 | 總 喰 | | 白 血 球 200 個 中 | | | 喰細胞數 | 被喰菌數 | 喰菌子數 | |
|-------------------------------------|------|------|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 絶對數 | 比 率 | 中 性 多 型 核 | | | | | | |
| | | | % | 喰 | 菌 | | | | |
| 注 射 前 | 5670 | 100 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菌 迄 液ノ 注 射 時 間 後 檢 査 | 15' | 6420 | 113 | 37.2 | 24.5 | 86.5 | 28.5 | 95.5 | 124.0 |
| | 30' | 7870 | 139 | 54.5 | 27.0 | 130.0 | 31.0 | 145.5 | 176.5 |
| | 60' | 8100 | 143 | 57.5 | 32.0 | 212.0 | 34.0 | 217.0 | 251.0 |
| | 120' | 7070 | 125 | 83.7 | 40.5 | 185.5 | 41.0 | 186.5 | 227.5 |
| | 240' | 7050 | 124 | 74.7 | 26.5 | 99.5 | 27.0 | 100.0 | 127.0 |
| 480' | 5420 | 96 | 68.0 | 20.0 | 63.0 | 21.0 | 64.0 | 85.0 | |
| 平 均 | 6988 | 123 | 62.6 | 28.4 | 129.4 | 30.4 | 134.8 | 165.2 | |

喰菌率=23.6

第4圖 各抗原ノ_Lマウス¹最小致死量同量ヲ注射シタル場合ニ於ケル喰菌子數_L子¹ノ關係



第5圖 各抗原ノ_Lマウス¹最小致死量同量ヲ注射シタル場合ニ於ケル白血球增加率ノ推移



ムナデン¹動物群ニテハ124.0, 176.5, 251.0, 227.5, 127.0, 85.0 等ニシテ夫々2時間目ニ最大價ナリキ。平均數ハ前實驗ニ比較シテ著ク大, 就中後者ハ165.2ヲ以テ前者ノ106.6ヨリ顯著ニ優勢ニシテ最大ノ喰菌子價ヲ現レタリ。

4. 白血球數100分率ニテハ菌液注射後15分目ヨリ4時間目迄ハ過多症ヲ現シ, 8時間目ハ亦同様ニ減少症ヲ惹起セリ。而シテ原_Lオムナデン¹ノ場合ハ2時間目ニ196%, 20分煮_Lオムナデン¹ノ場合ハ1時間目ニ143%ニテ最大價ニ達シ, 平均數ハ前者ハ156%, 後者ハ123%ヲ示シタリ。即チ此際原_Lオムナデン¹動物ハ煮_Lオムナデン¹動物ヨリモ大ナル毒作用ヲ蒙リ居ルコトヲ示セリ。

5. 中性多型核白血球%數ヲ觀察スルニ共ニ第1實驗ヨリ稍々大ニシテ, 平均數ハ20分煮_Lオムナデン¹ニテハ62.6%, 原_Lオムナデン¹ニテハ52.4%ニシテ後者ハ比較的小ナリキ。

6. 喰菌率ハ原_Lオムナデン¹ハ14.7, 20分煮_Lオムナデン¹ハ23.6ニシテ後者ハ頗ル強大ナリキ。

所見概括

1. 喰細胞數_L喰¹ハ原_Lオムナデン¹ニテハ階段的ニ昇降シテ1時間目ニ27.0ヲ以テ最大値ヲ示シ, 20分煮_Lオムナデン¹ニテモ同ジク階段的ニ増減シテ2時間目ニ41.0ヲ以テ最大價ニ達ス。6回計上ノ平均數前者ハ21.8後者ハ30.4ニシテ前實驗ヨリ兩々顯著ニ増大セリ。

2. 被喰菌數_L菌¹ハ亦_L喰¹ト同様ニ前實驗ニ比較シテ頗ル強大ニシテ, 原_Lオムナデン¹ノ場合ハ2時間目ニ114.0ニテ最高價ヲ示シ, 而シテ84.8ノ平均數ヲ得, 20分煮_Lオムナデン¹ノ場合ハ217.0ニテ最高價ニ達シ, 且ツ134.8ノ平均數ヲ得タリ。

3. 喰菌子數_L子¹ハ跳躍的ニ増大シ検査時間順ニソレヲ列擧スレバ原_Lオムナデン¹動物群ニテハ81.0, 90.0, 140.0, 140.5, 118.0, 70.0等, 20分煮_Lオムナデン¹動物群ニテハ124.0, 176.5, 251.0, 227.5, 127.0, 85.0 等ニシテ夫々2時間目ニ最大價ナリキ。

平均數ハ前實驗ニ比較シテ著ク大, 就中後者ハ165.2ヲ以テ前者ノ106.6ヨリ顯著ニ優勢ニシテ最大ノ喰菌子價ヲ現レタリ。

第3. 對_Lマウス⁷最小致死量2倍量^(原^{0.8}₂₀煮^{1.0} 庇)宛ヲ注射セシ場合

所見ハ第17, 18表及ビ第6, 7圖ニ示スガ如シ。

第17表 _Lマウス⁷最小致死量2倍量ノ原_Lオムナヂン⁷(0.8cc)ニヨル喰菌作用(2頭平均)

| 檢 査 | 總 喰 | | 白 血 球 200 個 中 | | | | | | |
|----------------------------|------|------|---------------|------|------|-------|------|-------|-------|
| | 絶對數 | 比 率 | 中 性 多 型 核 | | | 喰細胞數 | 被喰菌數 | 喰菌子數 | |
| | | | % | 喰 | 菌 | | | | |
| 注 射 前 | 6020 | 100 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菌迄 液ノ 法時 入後 檢血 | 15' | 4370 | 73 | 27.0 | 14.5 | 41.0 | 16.5 | 52.5 | 69.0 |
| | 30' | 3320 | 55 | 33.7 | 19.0 | 66.5 | 19.0 | 66.5 | 85.5 |
| | 60' | 4860 | 81 | 50.7 | 16.0 | 107.5 | 17.0 | 111.0 | 128.0 |
| | 120' | 6900 | 115 | 70.5 | 24.5 | 156.0 | 25.0 | 156.5 | 181.5 |
| | 240' | 6360 | 106 | 78.0 | 16.0 | 65.5 | 16.5 | 65.5 | 82.0 |
| | 480' | 6420 | 107 | 74.5 | 15.0 | 52.0 | 15.0 | 52.0 | 67.0 |
| 平 均 | 5372 | 90 | 55.7 | 17.5 | 81.4 | 18.2 | 84.0 | 102.2 | |


喰菌率=19.0

第18表 _Lマウス⁷最小致死量2倍量ノ20'煮_Lオムナヂン⁷(1.0cc)ニヨル喰菌作用(2頭平均)

| 檢 査 | 總 喰 | | 白 血 球 200 個 中 | | | | | | |
|----------------------------|------|------|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 絶對數 | 比 率 | 中 性 多 型 核 | | | 喰細胞數 | 被喰菌數 | 喰菌子數 | |
| | | | % | 喰 | 菌 | | | | |
| 注 射 前 | 6220 | 100 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菌迄 液ノ 注時 入後 檢血 | 15' | 5000 | 80 | 46.0 | 25.0 | 55.5 | 27.5 | 61.0 | 88.5 |
| | 30' | 5000 | 80 | 41.0 | 25.0 | 139.0 | 28.5 | 148.5 | 177.0 |
| | 60' | 4320 | 69 | 55.5 | 25.5 | 141.0 | 27.5 | 148.0 | 175.5 |
| | 120' | 7470 | 120 | 68.7 | 30.0 | 165.5 | 30.5 | 166.5 | 197.0 |
| | 240' | 5970 | 96 | 69.2 | 23.0 | 85.0 | 24.0 | 86.0 | 110.0 |
| | 480' | 6900 | 111 | 82.5 | 18.5 | 66.5 | 18.5 | 66.5 | 85.0 |
| 平 均 | 5777 | 93 | 60.5 | 24.5 | 108.8 | 26.1 | 112.8 | 138.8 | |

喰菌率=24.0


第6圖 各抗原ノ_Lマウス⁷最小致死量2倍量ヲ注射シタル場合ニ於ケル喰菌子數_L子⁷ノ關係



所 見 概 括

1. 喰細胞數_L喰⁷ハ原_Lオムナヂン⁷ニテハ25.0, 20分煮_Lオムナヂン⁷ニテハ30.5ヲ以テ各々2時間目ニ最大價ニ達シ, ソノ平均數ハ前者ハ18.2, 後者ハ26.1ニシテ兩々實驗第1ヨリハ頗ル

第7圖 各抗原_Lマウス⁷最小致死量2倍量ヲ注射シタル場合ニ於ケル白血球増加率ノ推移



大ナレドモ實驗第2ヨリハヤ、小ナリキ。

2. 被喰菌數_L菌⁷モ_L喰⁷ト同様ニ前實驗ノ成績ヨリハ僅カニ弱小ニシテ前々實驗ヨリハ著ク強大ナリ。原_Lオムナゼン⁷ノ場合ハ2時間目ニ156.5, 20分煮_Lオムナゼン⁷ノ場合モ同ジク2時間目ニ165.5ニテ最大價ヲ

示シ前者ハ平均84.0, 後者ハ平均134.8ニ達セリ。

3. 喰菌子數_L子⁷ノ關係モ亦略ボ_L喰⁷及ビ_L菌⁷ニ一致シ, 各々2時間目ニ原_Lオムナゼン⁷ヲ注射セシ動物群ハ181.5, 20分煮_Lオムナゼン⁷ヲ注射セシ動物群ハ197.0ニテ最大價ニ達シ, 前者ノ平均數ハ102.2, 後者ノ平均數ハ138.8ヲ示セリ。此レヲ第1, 第2ノ實驗成績ニ比較シテ夫々ノ喰菌作用ノ程度ハ恰モソノ中間ニ位セルヲ見タリ。即チ反應ノ下行位相ニ入りタルモノナリ。

4. 單位容積白血球數ニ就テ見ルニ, 何レモ15分目ヨリ1時間目迄ハ強度ノ減少症ヲ惹起セシタメニ6回計上ノ平均100分率ハ原_Lオムナゼン⁷ニテハ92%, 20分煮_Lオムナゼン⁷ニテハ93%ニ低下シ毒力大ナルコトヲ示セリ(白血球過少症)。而シテ白血球數ノ動搖ニ就テハ原, 煮間ニハ大差ヲ認メ得ザリキ, 換言スレバ兩者ノ毒力ハ大體一致セリ。(第7圖参照)

5. 中性多型核白血球%ヲ見ルニソノ平均値ハ原_Lオムナゼン⁷ノ場合ハ55.7, 第1, 2實驗ヨリハヤ、大ニシテ, 20分煮_Lオムナゼン⁷ノ場合ハ60.5, 第1實驗ヨリハ高値ナレドモ第2實驗ヨリハ小ナリ。而シテ原, 煮抗原間ノ關係ヲ比較スルニ後者ハ亦ヤ、大ナリキ。

6. 喰菌率ハ原_Lオムナゼン⁷ハ19.0, 20分煮_Lオムナゼン⁷ハ24.0ニシテ前者ハ小ナリキ。即チ毒力略ボ同一ナルコトノ立證(第7圖)ヲ得タル場合ニ於テ原_Lオムナゼン⁷ヨリモ20'煮_Lオムナゼン⁷ノ抗原能働力大ナルコトガ明白トナレリ。

6. 所見總括

實驗ノ成績ヲ總括シテ第19表及ビ第8圖ヲ得タリ。即チ下記ノ諸項ヲ認識スベシ。

1. 對_Lマウス⁷最小致死量ヲ基トシタル原, 煮_Lオムナゼン⁷ノ毒力ノ割合ハ1.25對1.0ナリシガ, 海猿流血中ノ白血球數ノ移動ヲ目標ト爲シタル場合ニ於ケル原, 煮_Lオムナゼン⁷ノ毒力ノ割合ハ同一白血球過多症ノ觀察ニテハ1.25對1.0, 同一白血球過少症ノ觀察ニテハ1.23對1.0ノ比トナリテ何レモ大略一致シタリ。

2. 此ノ如ク_Lマウス⁷乃至海猿ニ對スル毒力ヨリ出發シ, 同一毒力ノ割合ヲ以テ他ノ海猿ニ就テ實驗シタルニ, 血中白血球數ノ移動ニ於テハ爾他同一條件ノ下ニテ原_Lオムナゼン⁷


第19表 同一毒力(不同用量)ノ各抗原=依ル喰菌作用ノ總括的所見

| 實驗 | 注射材料 | 用量 (マウス 死量ノ最 小) | 對小致毒力ノ比 | 白血球 | | 中性多型核(%) | 喰菌子 | % | 喰菌率 | 原表 |
|----|--|--------------------------|---------|------|--------------------|----------|-------|-----|-------|----|
| | | | | 實數 | 增加率 | | | | | |
| 第1 | 原 _L オムナヂン ¹ | 0.2 | 1/2 | 6915 | 1.16 ¹⁾ | 47.7 | 60.4 | 100 | 8.7 | 13 |
| | 20 ¹⁾ 煮 _L オムナヂン ¹ | 0.2 | 1/2 | 7253 | 1.13 ¹⁾ | 54.9 | 114.1 | 189 | 157.7 | 14 |
| 第2 | 原 _L オムナヂン ¹ | 0.4 | 1 | 7272 | 1.56 ²⁾ | 52.4 | 106.6 | 100 | 14.7 | 15 |
| | 20 ²⁾ 煮 _L オムナヂン ¹ | 0.5 | 1 | 6988 | 1.23 ²⁾ | 62.6 | 165.2 | 155 | 23.6 | 16 |
| 第3 | 原 _L オムナヂン ¹ | 0.8 | 2 | 5372 | 0.90 ¹⁾ | 55.7 | 102.2 | 100 | 19.0 | 17 |
| | 20 ¹⁾ 煮 _L オムナヂン ¹ | 1.0 | 2 | 5777 | 0.95 ¹⁾ | 60.5 | 138.8 | 136 | 24.0 | 18 |

1) 試獸=向ツテ毒力略ボ同一ナリシコトヲ示ス。而シテ此際煮_Lオムナヂン¹ニテハ原_Lオムナヂン¹ヨリモ大ナル喰菌作用促進能働カヲ證シ得タリ。

2) 此際原_Lオムナヂン¹動物=向ツテノ毒力ハ煮_Lオムナヂン¹動物=向ツテノソレヨリモ明白ニ大ナリキ。

第8圖 各抗原注射量ノ變化ト喰菌子數_L子¹ノ平均値トノ關係



海_Lノ方ガ煮_Lオムナヂン¹海_Lヨリモ多少大ナル毒力ヲ感受セルガ如クニ示サレタリ。何トナレバ原_Lオムナヂン¹海_Lノ方ガ用量1/2 D. l. m. ニテモ、又ハ1 D. l. m. ニテモ何レモ煮_Lオムナヂン¹海_Lヨリモ大ナル白血球過多症ヲ起シ、マタ用量2D. l. m. ニテハ原_Lオムナヂン¹海_Lハ煮_Lオムナヂン¹海_Lヨリモ大ナル白血球過多症ヲ惹起シタルガ故ナリ。

3. 然レドモ相互ノ差ハ非常ニ小ニシテ用量1/2 D. l. m. ト2 D. l. m. トノ場合ニ於テハ殆ンド同一毒力ヲ與ヘタリシモノト見做シ得可シ。(第19表白血球增加率参照)

4. 此ノ如ク試獸=對シ殆ンド同一毒力ヲ與ヘタルコトガ確證セラレタリシ場合ニ於テモ、亦タ原_L煮_Lオムナヂン¹ノ抗原性能働カハ顯著ノ差ヲ示シタリ。即チ用量1/2 D. l. m. ニテハ60.4對114.1(100對189), 用量2 D. l. m. ニテハ102.2對138.8(100對136)ノ比ニ於テ喰菌子ハ大トナリタリ。

5. 即チ喰菌作用ヲ促進スルコトニ於テ表顯セラレタル原_L煮_Lオムナヂン¹ 抗原能働カノ相違ハ毒力ノ相違トハ全然無關係ニ發起スルモノナルコトガ立證セラレタリ。

7. 結 論

1. 原_Lオムナゼン⁷ト20分煮_Lオムナゼン⁷トラ_Lマウス⁷ニ就テ最小致死量ヲ測定シ比較セシニ、毒力ノ比ハ原1.25對煮1トナレリ。海猿血中白血球數ノ動搖ニ就テ比較セシニ、同一白血球過多症ニテハ原1.25對煮1ノ毒力ノ比トナリ、同一白血球過少症ノ觀察ニテハ原1.23對煮1ノ毒力ノ比トナレリ、即チ何レモ殆ンド相一致セリ。

2. _Lマウス⁷乃至海猿ニ向ツテノ毒力ヲ基礎トナシ、同一毒力トナルガ如ク用量ヲ加減シ、更ニ他ノ健常海猿ニ就テ實驗シタルニ原_Lオムナゼン⁷ノ方ガ煮_Lオムナゼン⁷ニ比シ多少大ナル毒力(白血球過多症乃至白血球過少症ノ程度大)ヲ示シタリ。然レドモ其ノ差ハ非常ニ微少ニシテ原1.16煮1.13, 原0.90煮0.93ノ如キ比ナリキ。

3. 此ノ如ク毒作用殆ンド同一ナリシニモ拘ラズ、喰菌作用促進能力ハ明白ニ原_Lオムナゼン⁷ヨリモ煮_Lオムナゼン⁷ノ方ニ於テ大ナリキ。即チ原60.4煮114.1(100:189), 原102.2煮138.8(100:136)ノ如キ差ヲ示シタリ。

4. 以上ノ實驗ノ結果ニヨリテ原、煮兩_Lオムナゼン⁷ノ抗原性能働力ノ差別ハ毒力ノ差別トハ無關係ノモノナルコトガ證明セラレタリ、而シテ是亦タ_Lイムベゼン⁷學說ノ主張スル一般的原則ノ一ツナリ。

5. _Lオムナゼン⁷モ亦タ_Lイムベゼン⁷學說ニヨリテ改良セラレザルベカラザル抗原ノ一ニ屬ス。其ノ好適煮沸時間ハ20分ナリ。此際一面ニハ毒力小トナリ、他面ニハ抗原能働力大トナルモノナレドモ抗原能働力ノ増強ハ毒力ノ減弱トハ全然無關係ナルモノナリ。

文 献

- 1) 林文、赤痢本型菌_Lアナワクチン⁷ノ含有スル_Lイムベゼン⁷ノ立證。日本外科資函、第8巻、第6號。
- 2) 石本義彦、非特殊性非病原性細菌性免疫元モ亦免疫阻止物質タル_Lイムベゼン⁷ヲ含有スルヤ。鳥潟疫研究所免疫研究業報、第45號。
- 3) 五十嵐修三、非特異性_Lオムナゼン⁷ノ含有セル白血球喰菌作用阻止物質ノ立證。日本外科學會雜誌、第30回、第7號。
- 4) 黒田倭民、非特異性抗原ニ關スル生物學的研究、第1報、日本外科學會雜誌、第28回、第8號。
- 5) 黒田倭民、同上第2報、第28回、第10號。
- 6) 黒田倭民、同上第3報、東京醫事新誌、第2552號。
- 7) Much, Hans, Pathologische Biologie. 1922.
- 8) Much, Hans, Unabgestimmte Schutzimpfung, Deutsche Medizinische Wochenschrift. Nr. 26, 1919.
- 9) Much, Hans, Ueber die unabgestimmte Immunität. D. M. Wochenschrift. Nr. 18, 1920.
- 10) Much, Hans, Weiteres zur unabgestimmten Immunität. D. M. Wochenschrift. Nr. 29, 1920.
- 11) 勝呂譽、細菌純培養無菌體濾液ノ異種細菌喰菌作用ニ及ボス影響ニ就テ。東京醫學會雜誌、第38巻、第9號。
- 12) Torikata R., Koktopräzipitogene und Koktoimmunogene. Bern. 1917.
- 13) 鳥瀧隆三、煮沸沈澱元及ビ煮沸免疫元。第6回日本醫學會誌。
- 14) Torikata R., Die Impedimentscheinung. Jena. 1930.
- 15) 高松石雄、非特異性抗體及ビ非特異性免疫ニ就テ。東京醫學會雜誌、第37巻、第3號。