

Quasi-Gorenstein Fano 3-folds with isolated non-rational singularities

九大理 石井志保子 (Shihoko Ishii)

Quasi-Gorenstein Fano n -fold とは n 次元の normal projective variety X 上 $\mathcal{O}_X(-K_X)$ が ample Cartier divisor であるものを意味する。

X 上の non-rational locus Σ_X を $\Sigma_X := \{x \in X \mid x \text{ is non-rational \& singular point i.e. } (Rf_* \mathcal{O}_{\tilde{X}}) \not\cong \mathcal{O}_{X,x} \text{ for a resolution } f: \tilde{X} \rightarrow X\}$ と定義すると Σ_X は

X の closed subset になる。ここで quasi-Gorenstein

Fano n -fold X 上 $\Sigma_X \neq \emptyset$, $\dim \Sigma_X = 0$ となるものを

すべて決定する という問題と考える。 例えは

abelian surface 上の projective cone や normal $K3$ -surface 上の projective cone は その方が

X の例になる。 逆に quasi-Gorenstein Fano

3-fold 上 $\Sigma_X \neq \emptyset$, $\dim \Sigma_X = 0$ となるものはすべて

の例で与えられる というのが 2つの小稿の主張である。

定理. X を quasi-Gorenstein Fano 3-fold with $\Sigma_X \neq \emptyset$ $\dim \Sigma_X = 0$

とすると、次が成立

(i) 高々 rational singularities L が $\tau: T \rightarrow X$ normal surface

S 上 $\mathcal{O}(K_S) \cong \mathcal{O}_S$ と満たすものが存在し、さらに

S 上 ample invertible sheaf \mathcal{L} が存在し、

X は S 上 projective cone w.r. to \mathcal{L} に T である。

(i.e. X は $\mathbb{P}(\mathcal{O}_S \oplus \mathcal{L})$ の negative section の contraction)

(ii) $J_H K \geq 0$ とす。

X : Gorenstein $\Leftrightarrow S$ は normal K3-surface.

($\Leftrightarrow S$ は normal surface $\tau: \mathcal{O}(K_S) \cong \mathcal{O}_S$

$H^1(S, \mathcal{O}_S) = 0$, S a minimal resolution

of K3-surface)

X : non-Gorenstein $\Leftrightarrow S$ は Abelian surface.

定理は、次の基本的な命題から導かれる。

命題. X を quasi-Gorenstein Fano n -fold with $\Sigma_X \neq \emptyset$ $\dim \Sigma_X = 0$

とする。さらに X の resolution $f: \hat{X} \rightarrow X$ に対し、

$\bigoplus_{m \geq 0} f_* \mathcal{O}_{\hat{X}}(mK_{\hat{X}})$ が有限生成 \mathcal{O}_X -algebra に T であると仮定

すると、高々 rational singularity L が $\tau: T \rightarrow X$ $(n-1)$ -

fold S 上 $\mathcal{O}(K_S) \cong \mathcal{O}_S$ と満たすものが存在し、さらに

S 上の ample invertible sheaf \mathcal{L} が存在して,

X は S 上の projective cone w.r. to \mathcal{L} になっている.

[定理の証明] 命題の条件は, minimal model conjecture が正しい場合は, 必然的に成立する. $n=3$ の場合は, 森氏, 川又氏, Shokurov 氏 らによ, τ (最終的には森氏 [M] に F, τ) minimal model conjecture が肯定的に解決されたので, 定理の (i) が従う.

(ii) については, $\mathcal{O}_S(K_S) \cong \mathcal{O}_S$ を満たす normal surfaces の分類が [U] で述べられている. その中で, 高次元 rational singularities を持つものは, Abelian surface が normal $K3$ -surface であることが示されている. $g: P(\mathcal{O}_S \oplus \mathcal{L}) \rightarrow X$ とし, $R^i g_* \mathcal{O}_{P(\mathcal{O}_S \oplus \mathcal{L})}$ を考えれば, S が Abelian の場合 $\neq 0$ となり, normal $K3$ の場合 $= 0$ になる. それぞれ, not Gorenstein 及び Gorenstein になる.

命題の証明に入る前に, 証明に必要な Lemma を準備する.

Lemma の証明は, [M, §1] と同じなので, ここでは省略する.

Lemma. Y : 高次元 canonical singularities を持つ n -dimensional projective n -fold ($n \geq 2$)

$R \subset \overline{NE}(Y)$ extremal ray s.t. φ_R : birational

D : φ_R の exceptional set

$\varphi_R|_D : D \rightarrow \varphi_R(D)$ の任意の fiber の次元 ≤ 1 .

$D \not\subset (Y \text{ の non-quasi-Gorenstein locus})$

の仮定のもとに次が成立する.

(i) $\varphi_R|_D$ の各 fiber は \mathbb{P}^1 a tree

(ii) $\ell \in$ general fiber a component と可なり $K_Y \cdot \ell \geq -1$

[命題の証明] 命題の仮定により $Y = \text{Proj} \bigoplus_{m \geq 0} f_* \mathcal{O}_X(mK_X)$ は projective variety $K \text{ は } Y$. $g: Y \rightarrow X$ は canonical morphism と可なり. 次が成立する.

(1) Y は高々 canonical singularities L を持つ K である.

(2) $E := g^{-1}(\Sigma_X)_{\text{red}}$ と可なり. E は pure codimension 1 に可なり. $g|_{Y-E}: Y-E \xrightarrow{\sim} X-\Sigma_X$ isom.

(3) K_Y は relatively ample with respect to g .

(4) $K_Y = g^*K_X - \Delta$ と可なり. $E = \sum_{i=1}^n E_i$ と既約分解 K と可なり. $\Delta = \sum_{i=1}^n a_i E_i$ ($a_i \in \mathbb{N}$) と表わされる.

J は (3) の Δ を用いて次のように表わされる.

(3') 任意の irreducible curve $C \subset E$ に対し $\Delta \cdot C < 0$

Claim 1 $\overline{NE}(Y)$ の中 に extremal ray R \exists : $\Delta \cdot R > 0$
 を満たすものが存在する。

(i) $\overline{NE}_{K_Y}(Y) := \{C \in \overline{NE}(Y) \mid K_Y \cdot C \geq 0\}$ とおくと、 \mathbb{R} の cone theorem (cf. [K1]) より、

$$\overline{NE}(Y) = \sum R_i + \overline{NE}_{K_Y}(Y)$$

と表わす。 \exists \exists R_i は extremal ray ($\neq 0$)。

Y 上の irreducible curve \exists : E と交わり E に含まれていないもの C \exists \exists $\Delta \cdot C > 0$ を満たす。

\rightarrow $\overline{NE}(Y)$ の中の C の class $[C]$ は $\sum l_i + a$ ($l_i \in R_i$, $a \in \overline{NE}_{K_Y}(Y)$) と表わす。この表示を用いて、次の不等式を得る。

$$(5) \quad 0 < \Delta \cdot C = \sum (\Delta \cdot l_i) + \Delta \cdot a.$$

\exists \exists a の定義により $0 \leq K_Y \cdot a = \sum K_X \cdot a - \Delta \cdot a$

だから、 $-K_X \cdot a \geq 0$ である \exists \exists $\Delta \cdot a \leq 0$

(\exists \exists $\Delta \cdot C > 0$ の不等式 (5) により)。 \exists \exists i が存在して $\Delta \cdot l_i > 0$

\exists \exists l_i の属する ray $R_i \in R$ と表わす。

Claim 2 $R \in$ Claim 1 の extremal ray とする。

$\varphi_R: Y \rightarrow S$ \exists R の contraction とする。次の成立 \exists 。

$$(6) \quad \dim S = n-1$$

$$(7) \quad \Delta = E = E_1 \quad (\text{i.e. } \Delta \text{ is irreducible reduced})$$

- $\tau: \varphi_R|_E: E \xrightarrow{\sim} S$ isom
 (8) $\sum_x = \{x\}$ one point set である. x を通る直線
 $| -K_x |$ a member H がある. $\tau^{-1}(x)$ である.
 (9) $\tilde{H} := g^*H$ とすると. $\varphi_R|_{\tilde{H}}: \tilde{H} \xrightarrow{\sim} S$ isom.

(i) (b) の証明: まず $\dim S \geq n-1$ を示そう.

E 上の任意の curve C をとると (3) より. $\Delta \cdot C < 0$
 $f, \tau [C] \notin R$ i.e. C は φ_R による $\frac{1}{2}$ に τ されること
 はない. $\tau^{-1}(x)$ である. $\varphi_R|_E: E \rightarrow \varphi_R(E)$ は finite
 morphism である. $\dim S \geq \dim \varphi_R(E) = n-1$ より. 仮
 定より $\dim S = n$ と仮定して矛盾を導く. この場合 φ_R は
 birational に τ である. D は exceptional set であると
 $\varphi_R|_D: D \rightarrow \varphi_R(D)$ の τ^{-1} による fiber は 1 次元に τ である.
 事実. 直前の議論より. 任意の $A \in \varphi_R(D)$ に対し.
 $\varphi_R^{-1}(A) \cap E$ は \wedge finite points set に τ である. $\tau^{-1}(A)$
 の次元 $\dim \tau^{-1}(A) \geq 2$ 以上である. $\tau^{-1}(A)$ の τ による curve
 $C \subset \varphi_R^{-1}(A)$ がある. $\tau^{-1}(A)$ は φ_R による $\frac{1}{2}$ の τ
 $\tau^{-1}(A)$ による τ である. $[C] \in R$ である. $\Delta \cdot C > 0$
 $\tau^{-1}(A)$ による τ である. $\tau^{-1}(A)$ の τ による $(E \cap C = \emptyset)$
 $\tau^{-1}(A)$ より $\Delta \cdot C = 0$ と τ による τ である. $f, \tau \varphi_R^{-1}(A)$ の次元は
 1 次元である. $\tau^{-1}(A)$ は τ による τ である. $\tau^{-1}(A)$ は τ による τ である.

w.r.to φ 1-1. 実際 $C \in \varphi^{-1}$ fiber of irreducible comp.
 とすると $[C] \in R$ T -から $\Delta \cdot C > 0$ かつ $C \notin E$. $H \cdot C = -g^*K_X \cdot C > 0$ なる L は φ の fiber 上
 ample である. φ の fiber 上 L は φ に対して relatively ample w.r.to φ
 である. Y の \mathbb{P}^1 の exact sequence: $0 \rightarrow \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_H \rightarrow 0$
 の φ による direct images をとると

$$(11) \quad 0 \rightarrow \underbrace{\varphi_* \mathcal{O}_Y}_{\mathcal{O}_S} \rightarrow \varphi_* \mathcal{L} \rightarrow \varphi_* (\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_H) \rightarrow R^1 \underbrace{\varphi_* \mathcal{O}_Y}_0$$

を得る. この右端が 0 であるのは φ が extremal ray of
 contraction τ からである. ([K2] Th 1.2).

H に制限すると φ は同型であるから $\varphi_* (\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_H)$ は
 S 上の invertible sheaf である. したがって $\varphi_* \mathcal{L}$ は rank 2
 の locally free sheaf である.

可換図式:
$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \mathcal{O}_Y & \rightarrow & \mathcal{L} & \rightarrow & \mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_H \rightarrow 0 \\ & & \parallel & & \uparrow \gamma & & \uparrow \\ & & \varphi^* \varphi_* \mathcal{O}_Y & \rightarrow & \varphi^* \varphi_* \mathcal{L} & \rightarrow & \varphi^* \varphi_* (\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_H) \rightarrow 0 \end{array}$$

により $\gamma: \varphi^* \varphi_* \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}$ は surjective である. \mathbb{P}^1 上の
 \mathcal{L} に対して S 上の morphism $\mathbb{P}^1_{|S}: Y \rightarrow \mathbb{P}(\varphi_* \mathcal{L})$
 が定義できる. \mathcal{L} は relatively ample τ であるから $\mathbb{P}^1_{|S}$ は
 finite morphism である. τ の general fiber $l = \varphi^{-1}(s)$ への
 制限 $\deg \mathcal{L}|_l = H \cdot l = 1$ T -から $\mathbb{P}^1_{|S}$ は birational

$\bar{Y} = P(\mathcal{O}_S \oplus \mathcal{L}_S)$ は, normal $(n-1)$ -fold S 上の locally trivial P^1 -bundle $\pi: \bar{Y} \rightarrow S$ である. \bar{Y} は normal である. \bar{Y} は $Z.M.T$ を満たす. \bar{Y} は isomorphism に同値である. $\bar{Y} \cong P(\mathcal{O}_S \oplus \mathcal{L}_S)$ に \hat{H} と disjoint な section E が存在する (by (7), (8)) ので exact sequence (11) は split する. \bar{Y} は $\bar{Y} = P(\mathcal{O}_S \oplus \mathcal{L}_S)$ と同値である. $\mathcal{L}_S = \mathcal{O}_S \otimes \mathcal{O}_{\hat{H}}$. X は \bar{Y} の negative section E を π^{-1} して得られるものである. \bar{Y} は S の singularity に non-rational である. Σ_X の次元が $n-1$ 以上である. \bar{Y} は \bar{Y} の π^{-1} である. \bar{Y} は \bar{Y} の π^{-1} である. \bar{Y} は \bar{Y} の π^{-1} である.

References.

- [K1] Kawamata, Y.: The cone of curves of algebraic varieties, *Ann. of Math.* 119 (1984) 603-633.
- [K2] ———: Crepant blowings up of 3-dimensional canonical singularities and its application to degenerations of surfaces.
- [M] Mori, S.: Flip theorem and the existence of minimal models for 3-folds. *J. of AMS.* 1 (1988) 117-253.
- [U] Umezumi, Y.: On normal projective surface with trivial dualizing sheaf. *Tokyo J. of Math.* 4 (1981) 343-354