

双対共鳴模型のK-P系の解による実現

日大・文理 鈴木 理 (Osamu Suzuki)

(要約) D.R.模型の頂点作用素はK-P系のそれと同じものと考えられる。この事をもとにしてD.R.模型を \mathbb{C}^* 上の左ルミ場に相互作用するボソンとして実現する。この実現は或る種のクリストード群の元((3.24))をボーズ・フェルミ対応によりボソンと考えて真空期待値をとると Koba-Nilsen の式となること、他方同じ元を左ルミ場として真空期待値をとり K-P 系の解を作ると左ルミ場の間の相互作用を与えることを示すことによりなされる。

序：Koba-Nilsen の式

ここでは序として Koba-Nilsen の式についてのべ、本稿でとりあつかう問題について説明する。

1968年に強()相互作用をあらわす散乱振幅の式として Veneziano の式([1]) と()うものが提案された。これは強

(i) 相互作用の理論に波紋を投げかけたようである。実際に翌年に Koba-Nilsen の式と (i) うものがあらわれ、たちに N- 矢相互作用に拡張され、1970 年にはこの力学模型として双対共鳴模型が Fubini-Veneziano により考察された ([2], [4])。又南部-Suskind によりこれが弦模型として理解されると示されるとワーカー理論との関係が問題にされて多くの人々をひきつけることとなった ([3])。これらのゆきさつ及びその後の量子化、アーノフリの理論については数多く出版されて (i) るサーベイを参照された () (例えば [5], [6], etc …)。本稿でとり上げられる弦模型はごく初期の所でありそれからの展開についてはのべな ()。

本稿では双対共鳴模型を C^* 上のフレミ場に相互作用するボソンとして実現することを考える。今までにとりあつかわれたのは散乱振幅のみであり、相互作用のラグランジ形式等はとり上げられなかつた様に思える。ここでは双対共鳴模型の頂点作用素と K.-P. 系のそれとが極めてよく似て (i) ることに着目して、K.-P. 系の特別な解として双対共鳴模型がえられるることを示す。又 K.-P. 系の解はゲージ接続をなすことから、ラグランジ形式に相当するものも求めることができることをのべる ([10])。双対共鳴模型を含むより一般な共形的場の理論を K.-P. 系を用いてより一般なリーマン面上の

場として実現する方法も得られてくる([7])。本稿で与えられる考察はこれらにより一般の理論の理解の助けとなるであろう。

以上のまえあきのあとで本稿でとりあつかわれる問題を述べることにする。まず発端となったVenezianoの式について説明する。Venezianoは4点相互作用の散乱振幅と予想される式を天下り式に与えた。次の図式に対応する相互作用を考える。

$$(1-1) \quad \begin{array}{c} a_1 \\ \diagdown \\ \text{---} \\ \diagup \quad \diagdown \\ a_2 \quad a_3 \\ \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad a_4 \end{array} \quad \Leftrightarrow \quad a_1 + a_2 \rightarrow a_3 + a_4$$

これは粒子 a_1, a_2 が相互作用して粒子 a_3 と a_4 を生じると考えるものである。各々の運動量を p_i ($i=1, 2, 3, 4$) とし、

$$(1-2) \quad s = (p_1 + p_2)^2 \quad t = (p_2 + p_3)^2$$

とおき Mandelstam 変数といふ。ここでは粒子は一次元空間上のスカラーフィールドと考える。一次式

$$(1-3) \quad \alpha(s) = \alpha'(0)s + \alpha(0)$$

を考え、次の式を Veneziano 振幅といふ：

$$(1-4) \quad f(s, t) = B(-\alpha(s), -\alpha(t)) \\ = \int_0^1 x^{-\alpha(s)-1} (1-x)^{-\alpha(t)-1} dx.$$

上の積分は $\operatorname{Re}(\alpha(s)) < 0$, $\operatorname{Re}(\alpha(t)) < 0$ の所でのみ有限確定を値をもつが、解析接続して \mathbb{C} 全体の有理型関数として考えるものとする。これだけでは単にベータ関数を与えていけるにすぎないが、Venezianoはこの式が物理的要請をよく満足していることを示した。これについてふれる：

(1) Regge極：相互作用によりある共鳴粒子が生じると、内部量子数は同じであるがスピンの異った粒子も同時に生じて相互作用することが知られている。このとき質量 M とスピン J との間に $J = \alpha(0) + \alpha'(0)M^2 (= \alpha(M^2))$ という関係がある。これを Regge の軌跡という。Regge極というのとは散乱振幅に(1位の)極としてあらわれることである。

(2) Reggeの振()：散乱振幅の $s \rightarrow \infty$ (t, \bar{t} fix) (或は $t \rightarrow \infty$ (s, \bar{s} fix)) に於ける振()をいう。 $|f(s, t)| \sim t^{\beta(s)}$ ($s \approx \infty$) という多項式型のふるま()をもつことが知られて()る。これを Regge の振()という。

(3) $s-t$ 交叉性：次の2通りの相互作用は同等とみなさなくてはならぬ()という原則をいう。

(1-5)



以上の3つの規則は理論的なものではなくて実験的なものの様である([8]を参照せよ)。Venezianoはこれらの性質を次の事柄を用いて示している:

$$(1-6) \quad \begin{aligned} (i) \quad & B(p, q) = \Gamma(p) \Gamma(q) / \Gamma(p+q) \\ (ii) \quad & \Gamma(z) \Gamma(1-z) = \pi / \sin \pi z \\ (iii) \quad & \Gamma(z+1) \sim \sqrt{2\pi} z^{z+\frac{1}{2}} e^{-z} \quad (z \neq \infty) \end{aligned}$$

Venezianoの式をN-点相互作用に拡張したものをKoba-Nilsenの式とこう。次の相互作用を考える:

$$(1-7) \quad \begin{array}{c|c|c|c|c} a_1 & | & a_3 & \cdots & | a_{N-1} \\ \hline a_1 & & & & a_N \end{array}$$

前と同様に各粒子の運動量を p_i ($i=1, 2, \dots, N$) として Mandelstam変数を $S_{ij} = (p_i + p_{i+1} + \dots + p_j)^2$ ($i < j$) $S_i = (p_0 + p_1 + \dots + p_i)^2$ とし $\alpha_{ij} = \alpha(S_{ij})$ とおく、 $\alpha_i = \alpha(S_i)$ とおく。Koba-Nilsenの式は

$$(1-8) \quad B^{(N)} = \int_0^1 \cdots \int_0^1 \prod_{i=1}^{N-3} dx_i x_i^{A_i} (1-x_i)^{B_i} \prod_{i<j} (1-x_i \cdots x_j)^{C_{ij}}$$

とあらわされる。ここで A_i, B_j, C_k 達は α_{ij}, α_j の一次結合であらわされる定数である。最も重要な項は最も右側の項である。

次に重要なのは散乱振幅を実現する力学系を定める事柄である。これに答えるのが Fubini - Veneziano による双対共鳴模型である。彼らは量子化された場の演算子として

$$(1-9) \quad Q(z) = a_0 + i a_0^+ \log z + \sum_{n>0} \frac{a_n^+}{\sqrt{n}} z^n + \sum_{n>0} \frac{a_n}{\sqrt{n}} z^{-n}$$

を導入してある、ここで $[a_0, a_0^+] = i, [a_n, a_m] = \delta_{nm}$ ($m, n \in \mathbb{N}$)、他は互に可換なボーズ場であり $z \in \mathbb{C}^*$ である。上の $Q(z)$ を用いて 頂点作用素を

$$(1-10) \quad V(\alpha, z) = : e^{i\alpha Q(z)} :$$

により定めるとこれらの有限個の積の真空期待値をとると、

$$(1-11) \quad \langle 0 | V(\alpha_1, p_1) V(\alpha_2, p_2) \cdots V(\alpha_n, p_n) | 0 \rangle$$

$$= \prod_{i < j} (1 - x_i x_{i+1} \cdots x_j)^{\alpha_i \alpha_j}$$

がなりたつことを示してある、ここで $p_i = x_i x_{i+1} \cdots x_{n-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$)、 $p_n = 1$ である。

以上が本稿でとりあつかわれるテーマの物理的背景である。ここでは次の 2 つの問題がとりあつかわれる：

[問題 I] 波動関数 $Q(z)$ を(1-9)と定める数学的な根拠は何か?

[問題 II] Koba-Nilsenの式を実現するラグランジ形式は何か?

§2に於いて $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ の表現空間になりうるボーズ場と
()う立場で $Q(z)$ が得られることを示し、 §3で K.-P. 系の
解により双対共鳴模型がえられることよりこの実現をとりあ
つかう。

§2. $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ の表現とボーズ場

ここではまず縮退のない場と()う概念を導入し、 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$
の表現から縮退のない場を作る方法を述べる。次にボーズ場
としてのオニ量化を考えるが、 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ の表現空間になり
うるボーズ場はつよ()制限をうける。これより、唯1つ可能
なものが (1-9) の波動関数を与えることを示す。

縮退のない場を定める。 $\mathbb{H} = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathbb{H}_n$ を線形空間 \mathbb{H}_n の
直和とし、 演算子の列 $\alpha_n^+, \alpha_n^- (n \in \mathbb{Z})$ を考える：

$$(2-1) \quad \alpha_n^+ : \mathbb{H}_n \rightarrow \mathbb{H}_{n+1}, \quad \alpha_n^- : \mathbb{H}_n \rightarrow \mathbb{H}_{n-1}.$$

α_n^+ を生成演算子と(), α_n を消滅演算子と()う。 (2-1)
 を $\alpha^+ : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}$, $\alpha : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}$ と略記することにする。
 α^+ と α から生成される代数をのとく。 $\xi_0 \in \mathbb{H}_0$ をとり
 $\xi = (\dots, 0, 0, \xi_0, 0, 0, \dots) \in \mathbb{H}$ とおき ξ を基本ベクトル
 とするフォック空間を

$$(2-2) \quad \mathcal{F}(\xi) = \{x\xi : x \in \mathbb{C}\},$$

と定める。 $\mathcal{F}_n(\xi) = \mathbb{H}_n \cap \mathcal{F}(\xi)$ とおき n -粒子系と()う。
 以下 $\mathcal{F}(\xi), \mathcal{F}_n(\xi)$ を \mathbb{C} -ベクトル空間と考えることにする。

定義 (2-3) (i) $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{F}_n(\xi) \leq 1$ ($n \in \mathbb{Z}^*$) となる
 とき, $\mathcal{F}(\xi)$ を縮退のな()フォック空間という。 (ii) $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{F}_n(\xi)$
 ≤ 1 ($n \in \mathbb{Z}$) となるとき完全に縮退のな()フォック空間と()
 う。

以下 $\psi_n = \alpha^{+n} \xi$, $\psi_{-n} = \alpha^{-n} \xi$ ($n \in \mathbb{N}$)
 とおくこととする。 $\mathcal{F}(\xi)$ が縮退がな()とき,

$$(2-4) \quad \mathcal{F}(\xi) = \mathcal{F}_0(\xi) \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} \mathbb{C} \psi_n$$

となる。このとき, $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{F}_0(\xi) \leq 3$ であり, $\alpha^+ \alpha \xi$, $\alpha \alpha^+ \xi$,
 ξ が基底になりうる。

次に $sl(2, \mathbb{C})$ の表現から縮退のな()場を作ろう。 $sl(2, \mathbb{C})$

の基底を

$$(2-5) \quad l_+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad l_- = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad l_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

にとることにする。次に線形表現 $\rho: \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \times V \rightarrow V$ が与えられてくるとする。 $(2-5)$ の ρ による像を $\hat{l}_+, \hat{l}_-, \hat{l}_3$ とおくと。

$$(2-6) \quad [\hat{l}_+, \hat{l}_-] = -\hat{l}_3, \quad [\hat{l}_-, \hat{l}_3] = 2\hat{l}_-, \quad [\hat{l}_+, \hat{l}_3] = -2\hat{l}_+$$

となる。これより、 ψ を \hat{l}_3 の固有値 λ に対する固有ベクトルとすると、 $\psi_+ = \hat{l}_+ \psi$, $\psi_- = \hat{l}_- \psi$ は

$$(2-7) \quad \hat{l}_3 \psi_+ = (\lambda + 2) \psi_+, \quad \hat{l}_3 \psi_- = (\lambda - 2) \psi_-$$

となることが分かる。そこで ξ_0 を $\psi_1 = \hat{l}_+ \xi_0$, $\psi_{-1} = \hat{l}_- \xi_0$ が \hat{l}_3 の固有ベクトルになる様にとるなら、 $\psi_n = \hat{l}_+^n \xi_0$, $\psi_{-n} = \hat{l}_-^n \xi_0$ は \hat{l}_3 の固有ベクトルになる。このとき、 ξ_0 は一般に \hat{l}_3 の固有ベクトルとは限らないことに注意する。これより、 \hat{l}_+, \hat{l}_- を生成、消滅演算子とする縮退のな(ア)オツク空間がえられる：

$$(2-8) \quad \left\{ \begin{array}{l} F(\xi) = \mathbb{C} \xi_0 \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} \mathbb{C} \psi_n \quad (\xi_0: \hat{l}_3 \text{ の固有ベクトル}) \\ F(\xi) = \mathbb{C} \xi_0 + \mathbb{C} \hat{l}_- \hat{l}_+ \xi_0 \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^*} \mathbb{C} \psi_n \quad (\text{そうでないとき}) \end{array} \right.$$

次に上の場に対してオニ量子化を定めることにする。通常おこなう様に $\hat{a}_+^n \Leftrightarrow a_n^+$, $\hat{a}_-^n \Leftrightarrow a_n^-$ とおきかえて、(2-8)に対して各々

$$(2-9) \quad \psi = \sum_{n>0} a_n^+ \psi_n + \sum_{n>0} a_n^- \psi_{-n}$$

$$\psi = a_0 \xi_0 + a_0^+ \xi'_0 + \sum_{n>0} a_n^+ \psi_n + \sum_{n>0} a_n^- \psi_{-n}$$

と定めることにする。 $\{a_n, a_m^+\}$ はボソンとしてオニ量子化するかアーリミ場としてオニ量子化するかによって $[a_n, a_m^+]_{\pm} = \delta_{nm}$ をとするものとする。

次に表現を具体的に与えて縮退のない場を求めてみる。Vとして \mathbb{C}^* 上の(多価)正則実数の作る関数空間をとり、ここに $SL(2, \mathbb{C})$ の正則表現を考える。以下

$$(2-10) \quad g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{C}) \Leftrightarrow z \rightarrow \frac{az+b}{cz+d} (= gz)$$

として、表現

$$(2-11) \quad U : f(z) \longrightarrow f(g^{-1}z)$$

を考える。この微分表現を φ_0 とする。(2-5)の φ_0 による像を $\hat{a}_+, \hat{a}_-, \hat{a}_3$ とかくと、

$$(2-12) \quad \hat{L}_+ = z^2 \frac{d}{dz}, \quad \hat{L}_- = -\frac{d}{dz} \quad \hat{L}_3 = -2z \frac{d}{dz}$$

となる。縮退のない場を求めるために、固有値問題

$$(2-13) \quad \frac{1}{2} \hat{L}_3 \psi = \lambda \psi$$

を考える。この解は $\psi = C z^\lambda$ (C :定数)となるから、 λ により縮退のないオック空間は次の様に分れる：

(i) $\lambda \notin \mathbb{Z}$ のとき、このとき、完全に縮退をもたない場となり

$$(2-14) \quad \Phi(\xi_0) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathbb{C} z^{n+\lambda} \quad (\xi_0 = z^\lambda)$$

となる。(ii) $\lambda \in \mathbb{Z}$ のとき。

$$(2-15) \quad \xi_0 = \begin{cases} \log z & (\lambda = 1) \\ \frac{1}{\lambda-1} z^{\lambda-1} & (\lambda \neq 1) \end{cases}$$

となり、前者からは縮退はないが $\Phi(\xi_0) = \mathbb{C} \cdot 1 + \mathbb{C} \log z$ となる場がえられる。後者からは何回か生成(or 消滅)演算子を施すと零となる場がえられる。以上まとめると次の定理をうる：

定理 I：表現(2-11)から得られる $\hat{L}_3 \psi_n = \lambda_n \psi_n$ ($n \in \mathbb{Z}^*$)をみたす縮退のない場は次の4通りである。

$$(2-16) \quad \begin{aligned} \text{(I)} \quad \mathcal{F}_\lambda &= \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathbb{C} z^{n+\lambda} \\ \text{(II)} \quad \mathcal{F}_{n_0}^+ &= \bigoplus_{n \geq n_0} \mathbb{C} z^n \\ \text{(III)} \quad \mathcal{F}_{n_0}^- &= \bigoplus_{n \leq n_0} \mathbb{C} z^n \\ \text{(IV)} \quad \mathcal{F} &= \mathbb{C} \cdot 1 + \mathbb{C} \log z + \sum_{n \in \mathbb{Z}^*} \mathbb{C} z^n \end{aligned}$$

次に以上の各々の場のオニ量化を(2-9)に従って定める。各々につけて得られた波動関数を $\psi(z)$ とかく。 $x \in \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ に対して、次の様に $\hat{x}\psi$ を定める。

$$(2-17) \quad \hat{x}\psi = \sum a_n^+ \hat{x}\psi_n + \sum a_n^- \hat{x}\psi_n$$

これより、 $[\hat{x}, a_n^+]$, $[\hat{x}, a_n^-]$ を

$$(2-18) \quad \hat{x}\psi = \sum [\hat{x}, a_n^+] \psi_n + \sum [\hat{x}, a_n^-] \psi_{-n}$$

により定める。ここに重要な注意をする。まず上のすべての場合につけて(2-17)が定義されるとは限らない()ということである。実際、(I)~(III)では基本ベクトル \hat{x} が除かれて()るから $\hat{x}\psi$ はすべての $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ の元につけては定義されない。さらに(2-18)により定めた演算が $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ の P から導びかれた表現を与えるかどうかも分らぬ()。これが可能であるためには少し一般なボーズ交換関係を仮定しなくてはならぬ()。

そこで(2-9)を定義するのに交換関係

$$(2-19) \quad [a_n, a_m^+] = c_{nm} \delta_{n,m}$$

を仮定する、ここで c_{nm} はスカラー ($\neq 0$) とする。このとき次の定理がなりたつ：

定理 II([4]) 表現 P_0 の表現空間になりうるボーズ場を定める縮退のない場合は (IV) 型のみであり、このときボーズの交換関係は

$$(2-20) \quad [a_n, a_m^+] = \frac{1}{n} \delta_{n,m}$$

に限る。

証明は Jacobi の恒等式を用いてなされる。そこで量子化された場の演算子を $[a_0, a_0^+] = i, [a_n, a_m^+] = \delta_{n,m}$ として

$$(2-21) \quad Q(z) = a_0 + ia_0^+ \log z + \sum_{n>0} \frac{a_n^+}{\sqrt{n}} z^n + \sum_{n>0} \frac{a_n}{\sqrt{n}} z^{-n}$$

とかくことにする。最後に 頂点作用素 を

$$(2-22) \quad V(\alpha, z) = : e^{i\alpha Q(z)} :^{(+)}$$

により定めることにする。ここで $:$ $:$ は正規積を意味する。

(+) 正規積は a_n, a_m^+ ($n, m \in \mathbb{N}$) についてとるものとする。

(注意) 正規積を用いずに具体的にかくと

$$(2-23) \quad V(\alpha, z) = e^{i\alpha a_0 + i\alpha a_0^+ \log z} \\ \times e^{i\alpha \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^+}{\sqrt{n}} z^n \right)} e^{i\alpha \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}} z^{-n} \right)}$$

となり、次節でのべる K.-P. 系の頂点作用素と非常によく似た形をしていることが分かる (3-14) を参照せよ)。

§3. K.-P 系による双対共鳴模型の実現

ここでは \mathbb{C}^* 上に自由ルミ場を考え、双対共鳴模型をその間で相互作用するボーズ粒子とみなせることを示す。まず伊達-神保-柏原-三輪の理論 (以下 D.T.K.M-理論という) を思いだそう ([9])。ここでは次のラグランジ形式から出発する:

$$(3-1) \quad \mathcal{L} = \int_{\mathbb{C}^*} \bar{\psi} \partial \psi dz d\bar{z},$$

ここで $\partial = \partial/\partial \bar{z}$ であり $\psi, \bar{\psi}$ は複素スカラーフ場であり

$$(3-2) \quad \psi = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n z^n + \sum_{n \in \mathbb{Z}} b_n \bar{z}^n \\ \Rightarrow \bar{\psi} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \bar{a}_n z^{-n} + \sum_{n \in \mathbb{Z}} \bar{b}_n \bar{z}^{-n}$$

により ψ の共役 $\hat{\psi}$ を定めるものとする。このオイラー方程式の解は $\bar{\psi} = 0$ より。

$$(3-3) \quad \psi = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n z^n, \quad \hat{\psi} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \bar{a}_n z^{-n}$$

となることが分かる。次にこの場をエルミ場としてオニ量化する: $\psi_n, \psi_n^* (n \in \mathbb{Z})$ を $[\psi_n, \psi_m]_+ = \delta_{m,n}$ をみたすエルミ演算子とし、

$$(3-4) \quad \psi = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \psi_n z^n \quad \psi^* = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \psi_n^* z^{-n}$$

とかくことにする。次にクリアード群を導入する:

$$(3-5) \quad V = \bigoplus \mathbb{C} \psi_n, \quad V^* = \bigoplus \mathbb{C} \psi_n^*$$

とおく。 $\{\psi_n, \psi_n^*\}$ から生成されるエルミ代数をのとかく。

$$(3-6) \quad G(V, V^*) = \{g \in \mathcal{O}, \exists g^{-1}, gVg^{-1} \subseteq V, gV^*g^{-1} \subseteq V\}$$

をクリアード群と(う)。ここで幾つか基本的な事柄をのべる。の真空ベクトル $|0\rangle$ を

$$(3-7) \quad \psi_n |0\rangle = 0 \quad (n < 0), \quad \psi_n^* |0\rangle = 0 \quad (n > 0)$$

をみたし $\langle 0|11|0\rangle = 1$ となるものをとることにする。

$\{x|0\rangle : x \in \mathcal{O}\}$ をフック空間という。我々の考える力学系のハミルトニアンは

$$(3-8) \quad H(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \Lambda^n \quad (\Lambda = \sum \psi_n \psi_n^*)$$

であり無限個の時間発展のパラメタ $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ をもつてくる。 $a \in \mathcal{O}$ に対して

$$(3-9) \quad a(x) = e^{H(x)} a e^{-H(x)}$$

により定める。 $(3-9)$ は

$$(3-10) \quad \frac{\partial a(x)}{\partial x_n} = [\Lambda^n, a(x)] \quad (n=1, 2, \dots)$$

をみたし、K-P 系の解はこの積分可能条件として得られる。

以上の準備のもとでボーズ-フェルミ対応及びK-P 系のゲージ理論をのべる。

(I) ボーズ-フェルミ対応： \mathcal{O} の元 α が n 個の生成演算子 ψ_n^* 及び m 個の消滅演算子 ψ_m の積としてあらわされているとき、 α は位数が $n-m$ であると $(\text{deg } \alpha = n-m)$ とかく。位数 N の元のなす線形空間を $\mathcal{O}(N)$ とかく。 $\mathcal{O}(0)$ は特に重要な役割を果す。次の対応を考える：

$$(3-11) \quad \iota : \mathcal{O}(0)|0\rangle \longmapsto \mathbb{C}[x_1, x_2, \dots, x_n, \dots]$$

を $\langle(\alpha|0\rangle) = \langle 0|\alpha(x)|0\rangle$ によって定めると 1:1 の対応を与える。又 $\mathcal{O}(0)$ は積について閉じて居るから $\alpha \in \mathcal{O}(0)$, $\beta \in \mathcal{O}(0)$ に対して $\beta\alpha = \beta \cdot \alpha (\in \mathcal{O}(0))$ が定義される。これより, $\beta \in \mathcal{O}(0)$ を与えて

$$(3-12) \quad \bar{\chi}(\beta) : \mathbb{C}[x_1, x_2, \dots] \longrightarrow \mathbb{C}[x_1, x_2, \dots]$$

を $\bar{\chi}(\beta)\langle 0|\alpha(x)|0\rangle = \langle 0|\beta\alpha(x)|0\rangle$ によって定める。これより準同型写像

$$(3-13) \quad \bar{\chi} : \mathcal{O}(0) \longrightarrow \text{End}(\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n, \dots])$$

が $\beta \in \mathcal{O}(0) \rightarrow \bar{\chi}(\beta) \in \text{End}(\mathbb{C}[x_1, x_2, \dots])$ により定められる。この写像を具体的に書き下すことができる。このために頂点作用素を次のように定める:

$$(3-14) \quad X_{k,p}(\alpha, z) = e^{\alpha \xi(x, z)} e^{-\alpha \xi(\tilde{z}, \frac{1}{z})}$$

ここで

$$(3-15) \quad \xi(x, z) = \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n z^n, \quad \xi(\tilde{z}, \frac{1}{z}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n z^n} \frac{\partial}{\partial x_n},$$

であり, $\alpha \in \mathbb{R}$, $z \in \mathbb{C}^*$ である。

(注意) 前節の頂点作用素(2-23)とは a_0, a_0^+ の項を無視すると $x_n \Leftrightarrow a_n^+ \quad \frac{\partial}{\partial x_n} \Leftrightarrow a_n$

により同一視される。

次の作用素

$$(3-16) \quad \mathbb{X}(z, z') = \frac{z}{z-z'}, \quad \mathbb{X}_{K.P}(1, z) \mathbb{X}_{K.P}(-1, z')$$

を考える。微分作用素 $Z_{n,m}$ を

$$(3-17) \quad \mathbb{X}(z, z') = \sum Z_{n,m} z^n z'^{-m}$$

により定めると

$$(3-18) \quad \text{重}(:\psi_n \psi_m^*:) = Z_{n,m}$$

となる([9])。さらに

$$(3-19) \quad l t_l = \sum_{n \in \mathbb{Z}} Z_{n,n+l}, \quad \frac{\partial}{\partial t_l} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} Z_{n,n-l}$$

が存在する。そこで

$$(3-20) \quad \psi_\alpha(z) = e^{\alpha \sum_{n \in \mathbb{Z}} : \psi_n \psi_{n+l}^* : z^n} \cdot e^{-\alpha \sum_{n \in \mathbb{Z}} : \psi_n \psi_{n-l}^* : \frac{1}{n} z^n}$$

とおくと、 $\psi_\alpha(z) \in G(V, V^*)$ であり。

$$(3-21) \quad \mathbb{X}(\psi_\alpha(z)) = \mathbb{X}_{K.P}(\alpha, z)$$

となる。これをボーズ-フェルミ対応と(1)って()る。物理的にはフェルミ粒子に相互作用するボーズ粒子になるものがクリア

ード群の内に見(い)だされることを示して()ると理解してかまわぬ()であろう。我々の主張はこの様な相互作用として双方共鳴模型が理解できると(い)うものである。(3-12)及び(3-21)より、次の命題がありたつ：

命題(3-22)

$$(3-23) \quad \begin{aligned} & \langle 0 | \psi_{\alpha_1}(z_1, x) \cdots \psi_{\alpha_N}(z_N, x) a(x) | 0 \rangle \\ & = \sum_{K.P}(\alpha_1, z_1) \cdots \sum_{K.P}(\alpha_N, z_N) \langle 0 | a(x) | 0 \rangle \end{aligned}$$

がありたつ、ここで $\psi_{\alpha}(z, x)$ は $\psi_{\alpha}(z)$ の(3-9)による時間発展であり $a \in \mathcal{O}(0)$ である。

これにより、ワリオード群の元と頂点作用素(3-14), (2-23)の間に

$$(3-24) \quad \begin{aligned} & \psi_{\alpha_1}(z_1) \cdots \psi_{\alpha_N}(z_N) \\ & \Leftrightarrow \sum_{K.P}(\alpha_1, z_1) \cdots \sum_{K.P}(\alpha_N, z_N) \\ & \Leftrightarrow V(\alpha_1, z_1) \cdots V(\alpha_N, z_N) \end{aligned}$$

といふ対応があることが分かる。ここで次の事柄に注意する：

命題(3-25) 次の等式がありたつ：

$$(3-26) \quad \langle\langle 0 | V(\alpha_1, z_1) \cdots V(\alpha_N, z_N) | 0 \rangle\rangle = \prod_{i=1}^N z_i^{\alpha_i} \\ \times \langle\langle 0 | \bar{X}_{K.P.}(\alpha_1, z_1) \cdots \bar{X}_{K.P.}(\alpha_N, z_N) | 0 \rangle\rangle^*$$

ここで、左辺の $\langle\langle 0 | 0 \rangle\rangle$ は共鳴模型に対して定義されるボーズ真空であり、右辺の $\langle\langle 0 | 0 \rangle\rangle^*$ はボーズ-フェルミ対応により定義されるボーズ真空である。

(注意) この2つの真空は(3-15)の後でのべた注意にある対応 $a_n^+ \Leftrightarrow x_n$, $a_n \Leftrightarrow \partial/\partial x_n$ により同一視される。

(II) K.-P. 系のゲージ理論: ここでは K.-P. 系を ϑ についてのスペクトル保存変形という立場で定式化し、その解の構成と解の定めるゲージ接続についてのべる。普通にやる $\vartheta (= \partial/\partial x)$ の場合と何ちかわる所はない。この様に定式化するのは ϑ が C^* 上のフェルミ場を定める演算子とみなせるからである。 ϑ の中からなる擬微分作用素

$$(3-27) \quad W(x) = 1 + w_1(x) \bar{\partial}^{-1} + w_2(x) \bar{\partial}^{-2} + \cdots + \cdots$$

を考える。ここで $x = (x_1, x_2, \dots)$ である((3-9)を参照せよ)。この様な $W(x)$ の全体は群をなし、これを G_- とかくことにする。 $L = W(x) \bar{\partial} W(x)^{-1}$ のみたす次の方程式を($\bar{\partial}$ -)K.-P. 系といふ:

$$(3-28) \quad \frac{\partial L}{\partial x_n} = [(L^n)_+, L] \quad (n=1, 2, 3, \dots),$$

ここで $(L^n)_+$ は L^n の非負巾部分をとったものである。この方程式は従来個々に知られていたソリトン方程式を一挙に導びく、versalなソリトン方程式とてもよぶべきものである。まず解の構成を D.J.K.M. に沿ってのべる。彼らはクリオード群の元 $g \in G(V, V^*)$ が与えられるとこれから解がえられる事を示している。 g の (3-8)による時間発展 $g(x)$ を作り。

$$(3-29) \quad w(x, k) = \sum_{k,p} (1, k) \langle 0 | g(x) | 0 \rangle / \langle 0 | g | 0 \rangle$$

とおき

$$(3-30) \quad w(x, k) = W(x) e^{\xi(x, k)}$$

により演算子 $W(x)$ を定めると $W \in G_-$ となり、これより $L = W \bar{\partial} W^{-1}$ とおくと、(3-28)をみたす。すなわち K-P 系の解となる。次に K-P 系の解から G_- をゲージ群にもつゲージ接続がえられることを示そう。これにより K-P 系は $\bar{\partial}\psi = 0$ となる左レミ場に相互作用する粒子とみなせることが分かる。実際、

$$(3-31) \quad L = \bar{\partial} - [\bar{\partial}, W] W^{-1}$$

となり、

$$(3-32) \quad \Omega(w) = [\bar{\partial}, w]^{-1} d\bar{z}$$

とおくと、 G_- -平坦なゲージ接続となる。これは $\Omega = -(L)_-$
 $d\bar{z}$ ともかけことに注意する。一般に

$$(3-33) \quad \hat{\Omega}(w) = -\sum_{n=1}^{\infty} (L^n)_- dt_n$$

とおくと、 $x_1 = \bar{z}$ と同一視することにより $\hat{\Omega}$ は Ω の拡張であり、これもゲージ接続になっていることが示せる ([10])。

以上をまとめると次の命題をうる：

命題(3-34) クリフオード群の元より、K-P系の解が得られ、又これはゲージ群と G_- にもつ平坦なゲージ接続を定める。このとき、相互作用のラグランジアン形式は

$$(3-35) \quad \int_{\mathbb{C}^*} \hat{\psi} \Omega \psi dz d\bar{z}$$

とあらわされる。

以上の(I), (II)の議論をまとめると次の定理がえられる。

定理 III. クリフオード群の元 $\psi_{a_1}(z_1) \dots \psi_{a_N}(z_N)$ ((3-24), (3-20)を見よ) に対してボーズ-フェルミ対応により頂点作用素

$\sum_{K_P} (d_1, z_1) \sum_{K_P} (d_2, z_2) \cdots \sum_{K_P} (d_N, z_N)$ を対応させこの真空間待値をとると Koba-Nilsen の式の被積分関数がえられる。又同じ元の(3-9)による時間発展をとるとこれより K-P 系の解がえられ、 G_- をゲージ群とするゲージ接続がえられ、フェルミ場の相互作用を与える。

以上により、双対共鳴模型の散乱振幅を与える Koba-Nilsen の式と K-P 系の特殊解との間の関係が明らかになった。以上の対応(ボーズ-フェルミ対応)により K-P 系の解として双対共鳴模型が実現されていると考えてよいであろう。

引用文献

- [1] Veneziano, G., Nuovo Cimento 57A (1968) 190,
- [2] Koba, Z. & Nilsen, H.B., Nuclear Phys. B10 (1969) 633,
- [3] Nambu, Y., Proc. Intern. Conf. on Symmetries and Quark Models, Wayne Univ. 1969 (Gordon and Breach, 1970), 269.
- [4] Fubini, S. and Veneziano, G., Nuovo Ciemento 67A (1970) 29,
- [5] Scherk, J., An introduction to the theory of

dual models and strings, Reviews of Modern Physics, 47 (1975) 123,

- [6] Schwarz, J.H., Dual Resonance Theory, Physics Reports, 8 no 4 (1973) 269,
 - [7] Kawamoto, N., Namikawa, Y., Tschiya, A. and Yamada, Y., Commun. Math. Phys. 116 (1988) 247,
 - [8] 素粒子論(岩波講座・現代物理学の基礎 10) (1978),
 - [9] Date, E., Jimbo, M., Kashiwara, M. & Miwa, T., Transformation groups for soliton equations, Proc. of RIMS Symposium on non-linear integrable systems - classical theory and quantum theory, 34-120, Singapore, World Scientific (1983)
 - [10] Kanemaki, S., Królikowski, W. and Suzuki, O., A gauge theory for Kadomtsev-Petviashvili system, Publ. R.I.M.S., Kyoto Univ., 22 (1986) 1119-1128.
-