

## Lambシフトの数学的基礎について

東京工業大学理学部数学科 新井朝雄

### 1. はじめに

よく知られているように、量子電磁力学(QED)——電子場(一般には電荷をもった素粒子の場)と電磁場との相互作用を記述する場の量子論——は、実験値をきわめて高い精度で予言する。<sup>(1)</sup> このこととゲージ不变性の原理にもとづくその理論構成の美しさ、単純さによって、QEDは素粒子物理学の現実的な基礎理論のひとつと考えられている。

そうしたQEDの輝かしい成功のひとつにLambシフトの理論がある。Lambシフトとは、実験的には、水素原子のふたつの励起状態 $2S_{1/2}$ と $2P_{1/2}$ との間のエネルギー準位の差のことである。<sup>(2)</sup>これは、1947年に、従来の光学的方法では到達しなかったマイクロ波の技術による精密な測定の結果、LambとRutherfordによって発見された。

水素原子のエネルギー準位に対するそれまでの理論的説明

は、定常的な Schrödinger 方程式と Dirac 方程式によるものであった。前者は正確に解くことができ、エネルギー準位に対する Bohr の公式を与える。これは、しかし、いわば第 1 近似にすぎない。後者は、電子を相対論的にあつかうことによって前者による理論を改良したものであり、Bohr の公式だけでは説明できないエネルギー準位の 2 次的微細構造をよい精度で説明する。しかし、Lamb シフトをも含む微細構造を説明するまでには到らなかつた。<sup>(3)</sup>

Lamb シフトの理論的説明を最初におこなったのは Bethe [8] であった。彼は、Lamb シフトは、電子の量子化された電磁場との相互作用に起因するものと考え、さらに、その相互作用によって生じる電子の電磁的質量はすでに観測質量の中に含まれているべきであるという質量のくりこみの概念を導入し、形式的な摂動計算によって、実験値をみごとに説明した。彼の計算は、電子を非相対論的にあつかうものであったが——そのために相互作用する光子の運動量を物理的に妥当な上限、すなはち、電子の静止質量以下に押えなければならなかつた——、それまで、発散の困難に悩んでいた QED をくりこみの概念を導入することによって再生させ得る可能性を指摘した点において、重要な意味をもつた。實際、その後の Tomonaga, Schwinger, Feynman によるくりこみ理論の展開によって、QED

は再び命をふきかえし、Lambシフトの計算も相対論的に精密化され、また、多くのほかの現象にも適用されて、その“正しい”が実証されていったのであった。

ところが、Lambシフトを含むこうした数々の成功にもむかわらず、QEDに対する厳密な数学的基礎づけはいまだにできてはいない<sup>(4)</sup>。Lambシフトのような系の物理的性質を数学的にきちんと議論する以前の基本的な枠組さえ、数学的に厳密な形では構成されていないのが現状である。物理量の値を具体的に求める通常の計算はすべて、形式的な枠組の中で、数学的基礎づけを欠く形式的振動論によっているにすぎず、また、無限大の量をあたかも有限のごとくとりあつかうくり込み理論も数学的には大いに問題があるといわねばならない。そんなわけで、(時空4次元の相対論的)QEDの厳密な数学的基礎づけは、構成的場の量子論のひとつの目標となっている<sup>(5)</sup>。

この小論では、ひとまず相対論的共変性は犠牲にして、Bethe[8]の理論およびこれに続くいくつかの非相対論的理論([25],[30])の厳密な数学的基礎づけを目標とし、非相対論的なQEDに注意を限って、Lambシフトおよびこれに関連した数学的问题を議論したい。

そこでまず、Lambシフトについての数学的问题の要点を与

えておこう。

その第1は、 Bethe の計算もそうであるか、 Lamb シフトを、 量子化された電磁場との相互作用によって生じる、 非摂動系 = 原子のハミルトニアンの点スペクトルのずれとしてどうえいたがって、 暗に相互作用系のハミルトニアンも点スペクトルをもつものと仮定して一形式的摂動論を適用している点である。しかし、 原子の励起状態が有限の寿命をもつという実験的事実 —— これは、 光の自然放出によるもので、 スペクトル線の自然幅の存在に対応している —— に照らして考えると、 また、 QED が “ 正しい ” 理論であると仮定するならば、 相互作用系のハミルトニアンは、 基底状態に対応する点スペクトル以外には点スペクトルをもたないことが期待され、 したがって、 Lamb シフトは点スペクトルのずれとしては記述できなくて “ あろうことか予想される ” 。 そして、 もしこうした予想が正しいとすれば、 形式的摂動論による Lamb シフトの計算は — その摂動級数の収束性の問題は別としても — 何とかの再解釈をすることなしにはそのままで意味をなさないであろう。 実際、 原子が調和振動子型である場合には、 いま述べた予想の正しいことが示されるのである（ 3.2 節を見よ）。

第2の問題として、 いま少しふれたが、 光の自然放出の問題がある。 光の自然放出は、 原子の励起状態の間の遷移をひき起こし

励起状態に有限の寿命を与えるものである。その遷移確率の計算には、時間依存型の形式的摂動論が使われる。しかし、上に述べたように、相互作用系では、励起状態に対応する点スペクトルの存在は期待しかたいので、こうした計算の数学的に厳密な意味づけが必要とされる。これは、一般化すれば時間依存型の形式的摂動論の数学的基礎づけの問題である。

以上の2点がLambシフトに関連した問題の主要な点である。最後にこの小論の構成を述べよう。まず第2節では、一般性をもたせるために、非相対論的QEDの一般的な数学的枠組を与える。最初に述べたように、QEDは電子場と電磁場との相互作用を記述する場の量子論であるか、非相対論的なQEDは電子場を非相対論的にあつかうものである。すなち、相互作用のないときの電子場は自由なde Broglie場の方程式（自由な1個の電子の状態ベクトルに対するSchrödinger方程式と同じ形の方程式）にしたがい<sup>(6)</sup>、相互作用はゲージ不变性の原理によって導入される<sup>(7)</sup>。電磁場の量子化にあたっては、Coulombゲージを用いる。また、相互作用を数学的にきちんと定義するために大きな運動量をもった光子の、相互作用への寄与は小さくなるようにする。すなち光子の運動量の紫外切断(uv cutoff)を行なう。相互作用系の状態ベクトルのHilbert空間は、電子のFock空間と光子のそれとのテンソル積であるが<sup>(8)</sup>、電荷の保存という超選択則によつて、全Hilbert空間は電荷演算子Qの固

有空間  $\mathcal{H}^{(z)}$  ( $z=0, 1, 2, \dots$ ) — 電荷  $z$  のセクター — とよばれる — の直和に分解される (すなはち,  $\Psi \in \mathcal{H}^{(z)}$  に対して  $Q\Psi = z\Psi$ ). 全ハミルトニアンは  $\mathcal{H}^{(z)}$  によって約され,  $\mathcal{H}^{(z)}$  上に  $z$  電子の相互作用ハミルトニアンが定義される. Lambシフトの理論の数学的基礎づけは, Betheの理論の観点からは, 1電子の相互作用ハミルトニアンの解析によって遂行されねばならない.

第3節では, 1電子のハミルトニアンに注意を限って, いくつかの厳密な結果を述べる: 3.1節では, 電子が置かれているポテンシャルが Coulomb ポテンシャルをも含む一般の場合について, 3.2節では, そのポテンシャルが調和振動子型の場合についての結果を与える. 後者の場合, 双極近似を用いることによって, 場の方程式を正確に解くことができて, ハミルトニアンのスペクトルおよび Lamb シフトの数学的構造を明らかにすることができる. 最後の節では, まだ解決されていないいくつかの興味ある問題を提出する. 付録においては, ボソン Fock 空間とそれに関連した基本的事実を与える.

## 2. 非相対論的量子電磁力学の一般的な数学的構造

非相対論的 QED は, 電子場を非相対論的にあつかう. すなはち, 相互作用のないときの電子場  $\psi(\vec{x}, t)$  は, de Broglie 場の方程式

$$\left( i \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\Delta_x}{2m_0} \right) \psi(\vec{x}, t) = 0, \quad (\vec{x}, t) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^1, \quad (2.1)$$

にしたがい<sup>(1)</sup> 同時刻反交換関係<sup>(2)</sup>

$$\{ \psi(\vec{x}, t), \psi^*(\vec{y}, t) \} = \delta(\vec{x} - \vec{y}), \quad (2.2)$$

$$\{ \psi(\vec{x}, t), \psi(\vec{y}, t) \} = \{ \psi^*(\vec{x}, t), \psi^*(\vec{y}, t) \} = 0 \quad (2.3)$$

をみたす，演算子函数である。ここで， $m_0 > 0$  は電子の裸の質量で，記号 { } は

$$\{ A, B \} = AB + BA \quad (2.4)$$

によって定義される。このような場  $\psi(\vec{x}, t)$  とそれが作用する Hilbert 空間を数学的に厳密な形で構成することは容易である（後述参照）。

電子場  $\psi(\vec{x}, t)$  と電磁場（輻射場） $\vec{A}(\vec{x}, t)$  との相互作用は，ゲージ不变性の原理にもとづいて導入される。<sup>(3)</sup> したがって，非相対論的 QED における場の方程式は，形式的には，次の形で与えられる：

$$\left\{ i \frac{\partial}{\partial t} + \frac{1}{2m_0} (-i \vec{\nabla}_x + e \vec{A}(\vec{x}, t))^2 \right\} \psi(\vec{x}, t) = \{-e A_0(\vec{x}, t) + V(\vec{x})\} \psi(\vec{x}, t), \quad (2.5)$$

$$\left( \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta_x \right) \vec{A}(\vec{x}, t) + \vec{\nabla}_x \frac{\partial A_0(\vec{x}, t)}{\partial t} = \vec{j}(\vec{x}, t). \quad (2.6)$$

さて、

$$A_0(\vec{r}, t) = - \int d\vec{y} \frac{e \Psi^*(\vec{y}, t) \Psi(\vec{y}, t)}{4\pi |\vec{r} - \vec{y}|}, \quad (2.7)$$

$$\vec{j}(\vec{r}, t) = \frac{ie}{2m_e} \left\{ (\vec{\nabla}_x - ie\vec{A}(\vec{r}, t)) \Psi^*(\vec{r}, t) \cdot \Psi(\vec{r}, t) - \Psi^*(\vec{r}, t) (\vec{\nabla}_x + ie\vec{A}(\vec{r}, t)) \Psi(\vec{r}, t) \right\}, \quad (2.8)$$

$-e < 0$  は電子の電荷であり、 $V(\vec{r})$  は古典的な外場（たとえば Coulomb ポテンシャル）を表す実数値関数である。なお、電磁場のゲージ条件として、Coulomb ゲージ

$$\vec{\nabla}_x \cdot \vec{A}(\vec{r}, t) = 0 \quad (2.9)$$

をとった。

$\Psi(\vec{r}, t)$  は、(2.2), (2.3) と同じ反交換関係をみたすものとし、  
 $\vec{A}(\vec{r}, t)$  は、交換関係

$$[A_\mu(\vec{r}, t), \frac{\partial}{\partial t} A_\nu(\vec{y}, t)] = i \left\{ \delta_{\mu\nu} - \Delta_x^{-1} \frac{\partial^2}{\partial x_\mu \partial x_\nu} \right\} \delta(\vec{r} - \vec{y}), \quad (2.10)$$

$$[A_\mu(\vec{r}, t), A_\nu(\vec{y}, t)] = [\frac{\partial}{\partial t} A_\mu(\vec{r}, t), \frac{\partial}{\partial t} A_\nu(\vec{y}, t)] = 0, \quad (2.11)$$

$\mu, \nu = 1, 2, 3,$

をみたすとする。さて、〔 , 〕は

$$[A, B] = AB - BA \quad (2.12)$$

によって定義される。また、 $A_\mu(\vec{r}, t)$  と  $\Psi(\vec{y}, t)$ ,  $\Psi^*(\vec{y}, t)$  との交換

関係あるいは  $\frac{\partial}{\partial t} A_\mu(\vec{r}, t)$  と  $\psi(\vec{r}, t), \psi^*(\vec{r}, t)$  との交換関係は 0 とする。

非相対論的 QED の数学的基礎づけには、まず、上述のよう  
な性質をもつ、演算子直超関数としての場とそれが作用する  
Hilbert 空間を厳密な仕方で構成することが必要である。Lamb  
シフトのような、物理的性質を論じるのは、それからあとのこととしなければならない。

そこで、まず、自由な、相互作用のない電子場の理論から  
始めよう。状態ベクトルの Hilbert 空間として、電子の Fock 空間

$$\mathcal{F}_{el} = \bigoplus_{Z=0}^{\infty} \mathcal{F}_{el}^{(Z)} \quad (2.13)$$

をとる。ここで、

$$\mathcal{F}_{el}^{(Z)} = \begin{cases} \bigotimes_{as}^{Z} L^2(\mathbb{R}^3) & (Z \geq 1) : L^2(\mathbb{R}^3) の Z 個の反対称テンソル積 \\ \mathbb{C} & (Z=0) : 複素数全体. \end{cases} \quad (2.14)$$

$\mathcal{F}_{el}^{(Z)}$  は Z 電子空間 とよばれる。

時刻 0 の電子場  $\psi(f), \psi^*(f)$  ( $f \in L^2(\mathbb{R}^3)$ ) は、 $\Psi \in \mathcal{F}_{el}$  に対して、漸化的に次のように定義される：

$$(\psi(f)\Psi)^{(Z)}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_Z) = \sqrt{Z+1} \int d\vec{x} f(\vec{x}) \Psi^{(Z+1)}(\vec{x}, \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_Z) \quad (Z \geq 0) \quad (2.15)$$

$$(\psi^*(f)\Psi)^{(Z)}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_Z) = \frac{1}{\sqrt{Z}} \sum_{j=1}^Z (-1)^{j-1} f(\vec{x}_j) \Psi^{(Z-1)}(\vec{x}_1, \hat{\vec{x}}_j, \dots, \vec{x}_Z) \quad (Z \geq 1) \quad (2.16)$$

$$(\psi^*(f)\Psi)^{(0)} = 0. \quad (2.17)$$

ここで、(2.16)の右辺にあらわれる  $\hat{\psi}_j$  は  $\psi_j$  をのそくことを示す記号である。

$\psi(f)$ ,  $\psi^*(f)$  は,  $\mathcal{F}_{\text{el}}$  上の有界演算子であり,

$$(\Psi, \psi(f)\Psi) = (\psi^*(\bar{x})\Psi, \Psi), \quad \Psi, \bar{x} \in \mathcal{F}_{\text{el}}, \quad (2.18)$$

$$\{\psi(f), \psi(g)\} = \langle f, g \rangle \quad (2.19)$$

$$\{\psi(f), \psi^*(g)\} = \{\psi^*(f), \psi^*(g)\} = 0 \quad (2.20)$$

$$\|\psi(f)\Psi\| \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^3)} \|\Psi\| \quad (2.21)$$

をみたす。ここで、

$$\langle f, g \rangle = \int d\vec{x} f(\vec{x}) g(\vec{x}). \quad (2.22)$$

これらのことばは、定義から、容易に証明される。特に、(2.21)から、写像  $\delta(\mathbb{R}^3) \ni f \rightarrow \psi(f)$  は演算子値超関数を与える。その記号的核を  $\psi(\vec{x})$ 、すなわち、

$$\psi(f) = \int d\vec{x} \psi(\vec{x}) f(\vec{x}) \quad (2.23)$$

とすれば、記号的な演算子としての  $\psi(\vec{x})$  の作用は、

$$(\psi(\vec{x})\Psi)^{(z)}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_z) = \sqrt{z+1} \Psi^{(z+1)}(\vec{x}, \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_z) \quad (z \geq 0), \quad (2.24)$$

$$(\psi^*(\vec{x})\Psi)^{(z)}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_z) = \frac{1}{\sqrt{z}} \sum_{j=1}^z (-1)^{j-1} \delta(\vec{x} - \vec{x}_j) \Psi^{(z-1)}(\vec{x}_1, \dots, \hat{\vec{x}_j}, \dots, \vec{x}_z) \quad (z \geq 1), \quad (2.25)$$

$$(\psi^*(\vec{x})\Psi)^{(0)} = 0, \quad (2.26)$$

となる。

自由な電子場のハミルトニアン  $H_{0,\text{el}}$  は、

$$H_{0,el} = \bigoplus_{z=0}^{\infty} H_{0,el}^{(z)} \quad (2.27)$$

によって定義される。ここで、 $H_{0,el}^{(z)}$  は、 $\mathcal{F}_{el}^{(z)}$  において

$$H_{0,el}^{(z)} = \begin{cases} -\sum_{j=1}^z \frac{\Delta x_j}{2m_0} & (z \geq 1) \\ 0 & (z=0) \end{cases} \quad (2.28)$$

によって定義される正値な自己共役演算子である。したがって  $H_{0,el}$  は、その自然な定義域上で正値な自己共役演算子となる。

(2.24), (2.25) によって、 $H_{0,el}$  は、記号的に、

$$H_{0,el} = - \int d\vec{x} \Psi^*(\vec{x}) \frac{\Delta_x}{2m_0} \Psi(\vec{x}) \quad (2.29)$$

と書くことができる。

定義から、容易に、交換関係

$$[H_{0,el}, \Psi(f)]\Psi = \Psi\left(\frac{\Delta f}{2m_0}\right)\Psi, \quad f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3), \Psi \in D(H_{0,el}), \quad (2.30)$$

を導くことができる。自由な電子の Heisenberg 場  $\Psi_{free}(f, t)$  は

$$\Psi_{free}(f, t) = e^{itH_{0,el}} \Psi(f) e^{-itH_{0,el}} \quad (2.31)$$

によって定義されるが、(2.30) を用いると

$$\Psi_{free}(f, t) = \Psi(e^{it\Delta/2m_0} f), \quad f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3) \quad (2.32)$$

となることが示される。したがって、 $\Psi_{\text{free}}(f, t)$ ,  $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ , は  $t$  について強微分可能であって、

$$\imath \frac{\partial}{\partial t} \Psi_{\text{free}}(f, t) = \Psi_{\text{free}}\left(-\frac{\Delta f}{2m_0}, t\right) \quad (2.33)$$

となる。テスト関数  $f$  をはずした形で書けば、これは、方程式 (2.1) にほかならぬ。 $\Psi_{\text{free}}(f, t)$  が、演算子値超関数として、(2.2), (2.3) をみたすことも容易に確かめられる。こうして、量子化された自由な電子場  $\Psi_{\text{free}}(f, t)$  を得ることができた。

電子場に付随したもうひとつの重要な演算子として 電荷演算子  $Q$  がある。これは、

$$(Q\Psi)^{(Z)}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n) = Z\Psi^{(Z)}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n) \quad (Z \geq 0) \quad (2.34)$$

によって定義される。すなはち、 $Q$  は多電子系の全電荷の総対値を固有値とする演算子であって、 $\Psi_e^{(Z)}$  は、 $Q$  の固有値  $Z$  に属する固有空間である。 $Q$  は、記号的には、

$$Q = \int d\vec{r} \Psi^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}) \quad (2.35)$$

で与えられる。

次に、電磁場に関する基本的な事柄を述べよう。状態ベクトルの Hilbert 空間として、Coulomb ケージにおける、光子の Fock 空間

$$\mathcal{F}_{\text{em}} = \mathcal{F}_b \otimes \mathcal{F}_b \quad (2.36)$$

をとる。ここで、 $\mathcal{F}_b$ はボルツマン Fock 空間である（付録を参照）。

光子の生成演算子  $a^{(r)*}(f)$  やび消滅演算子  $a^{(r)}(f)$ ,  $r=1,2$ ,  $f \in L^2(\mathbb{R}^3)$  は

$$a^{(1)\#}(f) = a^\#(f) \otimes I, \quad a^{(2)\#}(f) = I \otimes a^\#(f), \quad (2.37)$$

によって定義される。ここで、 $a^\#(f)$ は、ボルツマンの生成演算子または消滅演算子を表わす。 $a^{(r)\#}(f)$ は、有限光子ベクトル  $V$  の空間

$$\mathcal{F}_{em,0} = \mathcal{F}_b \otimes \mathcal{F}_b \quad (2.38)$$

上で定義され（ $\mathcal{F}_b$ は  $\mathcal{F}_b$ における有限粒子ベクトルの空間），それを不变にし，

$$(a^{(r)}(f)\Psi, \Psi) = (\Psi, a^{(r)*}(\bar{f})\Psi), \quad \Psi, \bar{\Psi} \in \mathcal{F}_{em,0}, \quad (2.39)$$

$$[a^{(r)}(f), a^{(s)*}(g)] = S_{rs} \langle f, g \rangle \quad (2.40)$$

$$[a^{(r)}(f), a^{(s)}(g)] = [a^{(r)*}(f), a^{(s)*}(g)] = 0 \quad (2.41)$$

をみたす。

時刻 0 の電磁場（輻射場） $\vec{A}(f)$ は，

$$A_\mu(f) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{r=1}^2 \left\{ a^{(r)*}\left(\frac{\hat{k}}{\sqrt{\omega}} e_\mu^{(r)}\right) + a^{(r)}\left(\frac{\hat{k}}{\sqrt{\omega}} e_\mu^{(r)}\right) \right\} \quad (2.42)$$

$\mu=1,2,3, \quad \hat{k}/\sqrt{\omega} \in L^2(\mathbb{R}^3)$

によって定義される。ここで、 $\hat{k}$ は  $f$  の Fourier 変換で

$$\hat{k}(\vec{k}) = \hat{k}(-\vec{k}). \quad (2.43)$$

$\omega(\vec{k})$ は、運動量  $\vec{k}$  の、1 個の自由な光子のエネルギーである：

$$\omega(\vec{r}) = |\vec{r}|. \quad (2.44)$$

ベクトル  $\vec{e}^{(n)}(\vec{r}) \in \mathbb{R}^3$  は、光子の偏極ベクトルで、

$$\left. \begin{aligned} |\vec{e}^{(n)}(\vec{r})| &= 1, \quad \vec{e}^{(1)}(\vec{r}) \times \vec{e}^{(2)}(\vec{r}) = \vec{r} / |\vec{r}|, \\ \vec{e}^{(1)}(\vec{r}) \cdot \vec{r} &= 0, \quad \vec{e}^{(n)}(\vec{r}) = (-1)^{n-1} \vec{e}^{(n)}(-\vec{r}), \quad n=1,2, \end{aligned} \right\} \quad (2.45)$$

をみたすものとし、その大きさに依らず、方向のみに依るとする。

自由な電磁場のハミルトニアン  $H_{0,\text{em}}$  は、 $H_{0,b}$  を質量 0 の、自由な中性子スカラー場のハミルトニアン（付録参照）とするとき、

$$H_{0,\text{em}} = H_{0,b} \otimes I + I \otimes H_{0,b} \quad (2.46)$$

として定義される。 $H_{0,\text{em}}$  は、正直な自己共役演算子である。

付録において与えられた評議 (A.18), (A.19) を用いると、不等式

$$\|a^{(n)}(f)\Psi\| \leq \left\| \frac{f}{\sqrt{\omega}} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^3)} \|H_{0,\text{em}}^{1/2}\Psi\|, \quad (2.47)$$

$$\begin{aligned} \|a^{(n)*}(f)\Psi\| &\leq \left\| \frac{f}{\sqrt{\omega}} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^3)} \|H_{0,\text{em}}^{1/2}\Psi\| + \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^3)} \|\Psi\|, \\ n &= 1, 2, \quad f, f/\sqrt{\omega} \in L^2(\mathbb{R}^3), \\ \Psi &\in D(H_{0,\text{em}}^{1/2}) \end{aligned} \quad (2.48)$$

を示すことができる ([2, Lemma 3.1]). これらの中等式を使えば、

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$  におけるあるセミノルム  $\|\cdot\|$  が存在して、

$$\begin{aligned} \|A_\mu(f)\Psi\| &\leq \|f\| \| (H_{0,\text{em}} + 1)^{1/2} \Psi \|, \\ \mu &= 1, 2, 3, \quad f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3), \quad \Psi \in D(H_{0,\text{em}}^{1/2}) \end{aligned} \quad (2.49)$$

となることがわかる。したがって、 $A_\mu(f)$ は演算子値起関数である。  
その記号的核を  $A_\mu(\vec{x})$ 、すなわち、

$$A_\mu(f) = \int d\vec{r} A_\mu(\vec{r}) f(\vec{r}) \quad (2.50)$$

とすれば、(2.42)から、

$$A_\mu(\vec{x}) = \sum_{n=1}^{\infty} \int d\vec{r} \frac{e_\mu^{(n)}(\vec{r})}{\sqrt{2(2\pi)^3 |\vec{r}|}} \left\{ a^{(n)*}(\vec{r}) e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}} + a^{(n)}(\vec{r}) e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}} \right\} \quad (2.51)$$

となる。<sup>(4)</sup> したがし、 $a^{(n)*}(\vec{r})$  は、 $a^{(n)}(f)$  の記号的核である：

$$a^{(n)}(f) = \int d\vec{r} a^{(n)}(\vec{r}) f(\vec{r}). \quad (2.52)$$

以上の準備のもとに、相互作用のはいった理論の構成に進もう。  
状態ベクトルの Hilbert 空間  $\mathcal{H}$  は、電子の Fock 空間と光子のそれとのテンソル積である：

$$\mathcal{H} = \mathcal{F}_{el} \otimes \mathcal{F}_{em}. \quad (2.53)$$

$\mathcal{F}_{el}$  ( $\mathcal{F}_{em}$ ) で稠密に定義された可閉演算子  $A$  ( $B$ ) は、 $A \otimes I$  ( $I \otimes B$ ) として、 $\mathcal{H}$  において稠密に定義された閉演算子へと自然に拡張される。その拡張も單に同じ記号  $A$  ( $B$ ) で書くことにする。

$\mathcal{H}$  は  $\mathbb{Q}$  の固有空間  $\mathcal{H}^{(z)}$  の直和に分解される：

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{Z=0}^{\infty} \mathcal{H}^{(Z)} \quad (2.54)$$

ここで、

$$\mathcal{H}^{(Z)} = \mathcal{F}_{el}^{(Z)} \otimes \mathcal{F}_{em}. \quad (2.55)$$

分解 (2.54) は、電荷の保存というひとつの超選択則の表現である。 $\mathcal{H}^{(Z)}$  を超選択セクターまたは電荷 Z のセクターとよぶ。

相互作用系の全ハミルトニアン H は

$$H = \bigoplus_{Z=0}^{\infty} H^{(Z)} \quad (2.56)$$

によって定義される。ここで、 $H^{(Z)}$  は、 $\mathcal{H}^{(Z)}$  における演算子で、形式的で、

$$H^{(0)} = 0 \quad (2.57)$$

$$H^{(1)} = \frac{1}{2m_0} : (-i\vec{\nabla}_x + e\vec{A}_p(\vec{x}))^2 : + V(\vec{x}) + H_{0,em}, \quad (2.58)$$

$$H^{(Z)} = \sum_{j=1}^Z \left\{ \frac{1}{2m_0} : (-i\vec{\nabla}_{x_j} + e\vec{A}_p(\vec{x}_j))^2 : + V(\vec{x}_j) \right\} \\ + \sum_{1 \leq j < k \leq Z} \frac{e^2}{4\pi | \vec{x}_j - \vec{x}_k |} + H_{0,em}, \quad (Z \geq 2) \quad (2.59)$$

として与えられる。ここで、 $\vec{A}_p(\vec{x})$  は、 $\vec{A}(r)$  をおいて、 $\hat{P}(k)$  を  $\hat{P}(k) \times \exp(-i\vec{k} \cdot \vec{x})$  で置き換えることによって得られる演算子であり、

記号的には、

$$\vec{A}_\rho(\vec{x}) = \int d\vec{y} \rho(\vec{x}-\vec{y}) \vec{A}(\vec{y}) \quad (2.60)$$

によって定義されるものである。 $\rho$ は  $\mathbb{R}^3$  上の実数値関数で、ここで簡単のため、

$$\left. \begin{aligned} \rho &\text{は } |\vec{x}| \text{ に依存する } \delta(\mathbb{R}^3) \text{ の関数で} \\ \hat{\rho} &> 0, \quad \int \rho(\vec{x}) d\vec{x} = 1 \end{aligned} \right\} \quad (2.61)$$

と仮定する。 $\rho$ は、物理的には、電磁場と相互作用する電子の“ひろがり”を記述するものであり、運動量空間で考えるならば、 $\hat{\rho}$ は、電子の、大きな運動量をもつ光子との相互作用を小さくする働きをする。すなわち、 $\hat{\rho}$ は光子の運動量の紫外切断 (ultraviolet cutoff) 関数である。また、 $\vdots$  は Wick 積<sup>(5)</sup>を表わす。

外場  $V(\vec{x})$  に対しては、Coulomb ポテンシャルの場合から含まれるように

$$V \in L^\infty(\mathbb{R}^3) + L^2(\mathbb{R}^3) \quad (2.62)$$

と仮定しておく。

注意：  $\rho$  は  $H^{(2)}$  が  $\mathcal{H}^{(2)}$  において、数学的にきちんと定義されるために必要とされる（後述参照）。場の方程式 (2.5), (2.6) のように、真に局所的、すなわち、同一時空点での場の相互作用を考えるならば、 $\rho(\vec{x}) = \delta(\vec{x})$  としなければならない。しかし、 $\rho(\vec{x}) = \delta(\vec{x})$  の場合、すなわち、局所場の理論は、現在までの

ところ、直接つくることはできず、まず、 $\rho$ を含む“準局所的”理論をつくっておき、しかるのちに、 $P(\vec{x}) \rightarrow S(\vec{x})$  の“極限”を与ることによって、 $P(\vec{x}) = S(\vec{x})$  の理論を定義するという手続きをとらなければならぬ。 $P(\vec{x}) \rightarrow S(\vec{x})$  という“極限”を与えるときに、くりこみが必要とされるのである。

ハミルトニアン  $H$  は、記号的には、

$$H = \int d\vec{x} \psi^*(\vec{x}) \left\{ \frac{1}{2m_0} (-i\vec{\nabla}_x + e\vec{A}_p(\vec{x}))^2 + V(\vec{x}) \right\} \psi(\vec{x}) \\ + \frac{1}{2} \int d\vec{x} d\vec{y} \psi^*(\vec{x}) \psi^*(\vec{y}) \frac{e^2}{4\pi|\vec{x}-\vec{y}|} \psi(\vec{y}) \psi(\vec{x}) + H_{0,\text{em}} \quad (2.63)$$

と書くことができる。

ハミルトニアン  $H$  に対する第 1 の数学的问题は、それが本質的に自己共役かどうか、あるいは、少なくともひとつ以上の自己共役拡張をもつかどうかを調べることである。

不等式 (2.47), (2.48) を使うと、 $\psi/\omega, \psi \omega \in L^2(\mathbb{R}^3)$  となるような  $f$  に対して、

$$\| A_\mu(f)^2 \psi \| \leq \alpha(f) \| H_{0,\text{em}} \psi \| + \beta(f) \| \psi \|, \quad \psi \in D(H_{0,\text{em}}), \quad (2.64)$$

$$\| \nabla_\mu \cdot A_\mu(f) \psi \| \leq \gamma(f) \| (-\Delta + H_{0,\text{em}}) \psi \| + \delta(f) \| \psi \|, \quad \psi \in D(-\Delta) \cap D(H_{0,\text{em}}) \subset \mathcal{H}^{(1)} \quad (2.65)$$

が示される。ここで、 $\alpha(f), \beta(f), \gamma(f), \delta(f)$  は  $f$  に依存する正定数である。

$$V^{(z)} = \sum_{j=1}^{\infty} V(\vec{x}_j) \quad (z \geq 1) \quad (2.66)$$

$$T^{(z)} = \sum_{1 \leq j < k \leq z} \frac{e^2}{4\pi |\vec{x}_j - \vec{x}_k|} \quad (z \geq 2) \quad (2.67)$$

とおけば、

$$\|V^{(z)}\psi\| \leq a \|H_{0,\text{el}}^{(z)}\psi\| + b \|\psi\|, \quad \psi \in D(H_{0,\text{el}}^{(z)}), \quad (2.68)$$

$$\|T^{(z)}\psi\| \leq a \|H_{0,\text{el}}^{(z)}\psi\| + b \|\psi\|, \quad \psi \in D(H_{0,\text{el}}^{(z)}), \quad (2.69)$$

が成立する。ここで、 $0 < a < 1$  とするとわかる（たとえば、[26, X.2]を見よ）。したがって、 $H^{(z)}$  ( $z \geq 1$ ) は、 $D(H_{0,\text{el}}^{(z)}) \cap D(H_{0,\text{em}})$  で定義され、しかも、対称な演算子であることがわかる。したがって、全ハミルトニアン  $H$  は、その自然な定義域上で対称な演算子である。

さて、 $H^{(z)}$  および  $H$  の自己共役性の問題に対しては、次の結果を証明することができる。

定理 2.1.  $V$  は、仮定 (2.62) に加えて、下に有界であるとする。このとき、 $H^{(z)}$  ( $z \geq 1$ ) は Friedrichs 扩張  $\hat{H}^{(z)}$  をもち、ある定数  $C > 0$  が存在して

$$\hat{H}^{(z)} \geq -c z \quad (2.70)$$

をみたす。さらには、

$$D((\hat{H}^{(z)} + cz)^{1/2}) = D(H_{0,el}^{(z)1/2}) \cap D(H_{0,em}^{1/2}). \quad (2.71)$$

証明  $H^{(z)}$  ( $z \geq 1$ ) が Friedrichs 扩張をもち、それから (2.70)

をみたすこととは、 $H^{(z)}$  の下界性

$$H^{(z)} \geq -(\alpha + \frac{e^2}{z m_0} \|\frac{\hat{p}}{\sqrt{\omega}}\|_{L^2(R^3)}^2) z \quad (2.72)$$

からわかる。ここで、 $V \geq -\alpha$  ( $\alpha \geq 0$ ) とした。したがて、たとえば、  
 $C = [\alpha + (e^2 \|\frac{\hat{p}}{\sqrt{\omega}}\|_{L^2(R^3)}^2 / z m_0)]$  とすればよい。問題は (2.71)  
 を示すことである。そのためには、Friedrichs 扩張の方法にもどる。す  
 なわち、2次形式

$$q(\Psi, \Psi) = (\Psi, H^{(z)} \Psi) + (\alpha + \frac{e^2}{z m_0} \|\frac{\hat{p}}{\sqrt{\omega}}\|_{L^2(R^3)}^2) z (\Psi, \Psi),$$

$$\Psi, \Psi \in D(H_{0,el}^{(z)1/2}) \cap D(H_{0,em}), \quad (2.73)$$

を考え、その閉包を具体的に求める。 $(2.68), (2.69)$  とから、

$$\|(V^{(z)} + \alpha z)^{1/2} \Psi\| \leq a \|H_{0,el}^{(z)1/2} \Psi\| + b' \|\Psi\|, \quad (2.74)$$

$$\|U^{(z)1/2} \Psi\| \leq a \|H_{0,el}^{(z)1/2} \Psi\| + b' \|\Psi\|, \quad (2.75)$$

$$\Psi \in D(H_{0,el}^{(z)1/2})$$

が導かれる ([26, X.2, 定理 X.18] の応用)。さて、 $\Psi_n \in D(H_{0,el}^{(z)})$

$\cap D(H_{0,em})$  かつ  $\Psi_m \rightarrow \Psi \in \mathcal{H}^{(z)}$ ,  $q_f(\Psi_n - \Psi_m, \Psi_n - \Psi_m) \rightarrow 0$  ( $n, m \rightarrow \infty$ ) をみたすとする. このとき,  $(-\imath \vec{\nabla}_{x_j, \mu} + e \vec{A}_\rho(\vec{x}_j)) \Psi_m$ ,  $(V^{(z)} + \alpha Z)^{1/2} \Psi_m$ ,  $\Gamma^{(z)} \Psi_m$ ,  $H_{0,em}^{1/2} \Psi_m$  は、いずれも,  $\mathcal{H}^{(z)}$  における Cauchy 列をなす.  $(V^{(z)} + \alpha Z)^{1/2}$ ,  $\Gamma^{(z)} \Psi_m$ ,  $H_{0,em}^{1/2} \Psi_m$  は自己共役演算子, かつて, 閉演算子であるので,  $\Psi \in D((V^{(z)} + \alpha Z)^{1/2}) \cap D(\Gamma^{(z)}) \cap D(H_{0,em}^{1/2})$  であり,

$$(V^{(z)} + \alpha Z)^{1/2} \Psi_m \rightarrow (V^{(z)} + \alpha Z)^{1/2} \Psi, \quad \Gamma^{(z)} \Psi_m \rightarrow \Gamma^{(z)} \Psi \quad (2.76)$$

$$H_{0,em}^{1/2} \Psi_m \rightarrow H_{0,em}^{1/2} \Psi \quad (2.77)$$

となる. (2.49) と (2.77) によると,  $A_{\rho, \mu}(x_j) \Psi_m \rightarrow A_{\rho, \mu}(x_j) \Psi$ , かつて,  $-\imath \vec{B}_{j, \mu} \Psi_m$  も Cauchy 列をなし,  $-\imath \vec{B}_{j, \mu}$  の閉性によると,  $\Psi \in D(H_{0,el}^{(z)1/2})$  であること, および  $-\imath \vec{\nabla}_{x_j, \mu} \Psi_m \rightarrow -\imath \vec{\nabla}_{x_j, \mu} \Psi$  となることがわかる. こうして,  $\Psi \in D(H_{0,el}^{(z)1/2}) \cap D(H_{0,em}^{1/2})$  かつ  $\hat{f}(\Psi_n - \Psi, \Psi_n - \Psi) \rightarrow 0$  であることがわかった. ここで,  $\hat{f}$  は  $D(H_{0,el}^{(z)1/2}) \cap D(H_{0,em}^{1/2})$  上の 2 次形式で,

$$\begin{aligned} \hat{f}(\Psi, \Psi) &= \sum_{j=1}^N \frac{1}{2m_0} ((-\imath \vec{\nabla}_{x_j} + e \vec{A}_\rho(\vec{x}_j)) \Psi, (-\imath \vec{\nabla}_{x_j} + e \vec{A}_\rho(\vec{x}_j)) \Psi) \\ &\quad + ((V^{(z)} + \alpha Z)^{1/2} \Psi, (V^{(z)} + \alpha Z)^{1/2} \Psi) \\ &\quad + (\Gamma^{(z)} \Psi, \Gamma^{(z)} \Psi) + (H_{0,em}^{1/2} \Psi, H_{0,em}^{1/2} \Psi), \\ &\quad \Psi, \bar{\Psi} \in D(H_{0,el}^{(z)1/2}) \cap D(H_{0,em}^{1/2}). \end{aligned} \quad (2.78)$$

によって定義される. 一方, 任意の  $\Psi \in D(H_{0,el}^{(z)1/2}) \cap D(H_{0,em}^{1/2})$  に対して

$\Psi_n \rightarrow \Psi$ ,  $H_{0,el}^{(z)1/2} \Psi_n \rightarrow H_{0,el}^{(z)1/2} \Psi$ ,  $H_{0,em}^{1/2} \Psi_n \rightarrow H_{0,em}^{1/2} \Psi$  となる  
 点列  $\{\Psi_n\} \subset D(H_{0,el}^{(z)}) \cap D(H_{0,em})$  がとれる。このとき, (2.74), (2.75)  
 (2.49) によって,  $(V^{(z)} + \alpha z)^{1/2}(\Psi_n - \Psi) \rightarrow 0$ ,  $\Gamma^{(z)1/2}(\Psi_n - \Psi) \rightarrow 0$ ,  
 $(-\imath \nabla_{j,\mu} + e A_{\mu,\mu}(z_j))(\Psi_n - \Psi) \rightarrow 0$  となるので,  $q(\Psi_n - \Psi_m, \Psi_n - \Psi_m) \rightarrow 0$  ( $n, m \rightarrow \infty$ ) である。したがって,  $\hat{\Psi}$  は  $\Psi$  の閉包であることがわかる。  
 ゆえに,  $H^{(z)} + C$  の Friedrichs 拡張は, 閉 2 次形式  $\hat{\Psi}$  から定まる自己共役演算子である。したがって, (2.71) が成立する。 ■

この定理から, たたちに次が得られる。

系 2.1.  $V$  は定理 3.1 と同じ仮定をみたすとする。このとき,  $H$  は  
 自己共役拡張

$$\hat{H} = \bigoplus_{z=0}^{\infty} \hat{H}^{(z)} \quad (2.79)$$

をもつ。

注意. (1)  $\rho$  と  $z$  に依存する正数  $\gamma(\rho, z)$  が存在して,  $|\epsilon| < \gamma(\rho, z)$   
 なれば,  $H^{(z)}$  ( $z \geq 1$ ) は,  $D(H_{0,el}^{(z)}) \cap D(H_{0,em})$  上で“自己共役”  
 あり, 下に有界であることが示される ( $V$  の下界性の仮定は必要ない)。  
 これは, 不等式 (2.64), (2.65), (2.68), (2.69) と Kato-Rellich  
 の定理を応用することによって証明される。しかし, この証明では,  $z \rightarrow \infty$   
 のとき,  $\gamma(\rho, z) \rightarrow 0$  となってしまうので,  $H$  の自己共役性はいえない。

(2) 双極近似のハミルトン  $H_{dp}$  は

$$H_{dp} = \bigoplus_{z=0}^{\infty} H_{dp}^{(z)} \quad (2.80)$$

$$H_{dp}^{(0)} = 0$$

$$H_{dp}^{(1)} = \frac{1}{2m_0} : (-i\vec{\nabla}_x + e\vec{A}(p))^2 : + V(\vec{x}) + H_{0,em}, \quad (2.81)$$

$$H_{dp}^{(z)} = \sum_{j=1}^z \frac{1}{2m_0} : (-i\vec{\nabla}_{x_j} + e\vec{A}(p))^2 : + V^{(z)} + U^{(z)} + H_{0,em}, \quad (z \geq 2), \quad (2.82)$$

によって定義される。これに対しては、[3] と同様な仕方で、 $V$ に対する 仮定(2.62)のもとで、 $H_{dp}^{(z)}$  ( $z \geq 1$ ) は  $D(H_{0,el}^{(z)}) \cap D(H_{0,em})$  上で 自己共役である、下に有界であること、 $H_{0,el}^{(z)} + H_{0,em}$  の 固有の核 (core) 上で本質的に自己共役であることをすべての  $e$  に対して 証明できる。したがって、 $H_{dp}$  は本質的に自己共役である。

次に、相互作用場の構成を与えよう。 $V$  は定理 3.1 の仮定をみたすとし、

$$\hat{H}_R^{(z)} = \hat{H}^{(z)} - E(p)z \geq 0 \quad (2.83)$$

とおく。ここで、 $E(p) \geq 0$  は、(2.70) をみたす C の下限である。そして、全ハミルトニアンを

$$\hat{H}_R = \bigoplus_{z=0}^{\infty} \hat{H}_R^{(z)} \quad (2.84)$$

と定義しなおす。 $\hat{H}_R$  は正値な自己共役演算子である。このハミルトニアンを用いて、Heisenberg 場—相互作用場— は、

$$\psi(f, t) = e^{it\hat{H}_R} \psi(f) e^{-it\hat{H}_R}, \quad (2.85)$$

$$\vec{A}(f, t) = e^{it\hat{H}_R} \vec{A}(f) e^{-it\hat{H}_R}, \quad f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3), \quad (2.86)$$

によって定義される。 $(2.49)$ を用いると、ある $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ のセミルム $\| \cdot \|$ から存在して、2次形式の意味で、

$$|A_\mu(f)| \leq \|f\| (\hat{H}_R + 1) \quad (2.87)$$

となることが示せるので、 $\vec{A}(f, t)$ は  $D(\hat{H}_R^{1/2})$  上で定義される。 $\psi(f, t)$ ,  $A_\mu(f, t)$ ともに演算子値超関数であるか、その記号的核を  $\psi(\vec{r}, t)$ ,  $A_\mu(\vec{r}, t)$ とすれば、それらは演算子値超関数の意味で、適当な定義域上で、 $P(\vec{r}) \rightarrow S(\vec{r})$  の本延限で $(2.5)$ ,  $(2.6)$ に形式的に一致するような類似の場の方程式をみたすことか示される(ただし、 $(2.5)$ に対応する場の方程式の右辺に、 $-E(P)\psi(\vec{r}, t)$ という補正項がつく)。

以上が非相対論的QEDの概略である。しかし、Lambシフトの理論の数学的基礎づけの問題は、Betheの理論の観点からは、全空間上で考える必要はなく、電荷1のセクター $\mathcal{H}^{(1)}$ 上で考えればよい。すなわち、ハミルトニアン $H^{(1)}$ の解析が主な問題となる。

最後に、Lambシフトの問題のひとつの数学的特徴を述べておこう。1電子のくりこまれたハミルトニアン $H_{ren}^{(1)}$ は

$$H_{ren}^{(1)} = \frac{1}{2(m - \delta m)} : (-i\vec{\nabla}_x + e\vec{A}_p(\vec{r}))^2 : + V(\vec{r}) + H_0, em \quad (2.89)$$

によって定義される。ここで、 $\delta m$ は質量のくりこみて、

$$Sm = \frac{2}{3} e^2 \int d\vec{r} \frac{\hat{\rho}(\vec{r})^2}{|\vec{r}|^2} \quad (2.90)$$

によって与えられる。 $H_{ren}^{(1)}$ は、 $H^{(1)}$ において  $m_0 \rightarrow m - Sm$  とおきかえて得られるもので、 $m > 0$  は電子の 物理的（観測）質量 を表す。

注意：  $\frac{1}{m - Sm} = \frac{1}{m} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{Sm}{m}\right)^n$

と形式的に展開し、 $e^2$  のオーダーまでとった、双極近似のハミルトニアン

$$\begin{aligned} H_{ren}^{(1)'} &= \frac{1}{2m} : (-i\vec{\nabla}_x + e\vec{A}_p(r))^2 : + V(\vec{r}) + H_0, em \\ &\quad + \frac{Sm}{2m^2} (-\Delta_x) \end{aligned} \quad (2.91)$$

は、 $\vec{A}_p(r)^2$  の項をのぞけば、Bethe [8] の計算に使われたハミルトニアンと同じである。ただし、 $V$  は Coulomb ポテンシャル  $V$  とし、 $\hat{\rho}(\vec{r}) = (2\pi)^{-3/2} \chi_{[0, m]}(|\vec{r}|)$  とする ( $\chi_{[0, m]}$  は、閉区間  $[0, m]$  上の定義関数)。

$H_{ren}^{(1)}$  は、

$$H_{ren}^{(1)} = H_0 + H_I + R, \quad (2.92)$$

$$H_0 = -\frac{\Delta_x}{2m} + V + H_{0, em} \quad (2.93)$$

$$H_I = \frac{e}{m} (-i\vec{\nabla}_x) \cdot \vec{A}_p(\vec{r}) + : \frac{e^2}{2m} \vec{A}_p(\vec{r})^2 :, \quad (2.94)$$

$$R = \frac{Sm}{2m(m-Sm)} : (-i\vec{\nabla}_x + e\vec{A}_p(\vec{r}))^2 : \quad (2.95)$$

という形に書くことでき、 $H_0$  を非擾動系 = 原子のハミルトニアン、

$H_I$  を電子と場との相互作用,  $R$  をくりこみの補正項とみなせる。

いま、水素原子の場合のように、非摂動原子が

$$\sigma_d\left(-\frac{\Delta}{2m} + V\right) = \left\{ E_n^{(0)} \right\}_{n=0}^N \quad (E_0^{(0)} < E_1^{(0)} < \dots) \quad (2.96)$$

( $N = \infty$  も許す)

$$\sigma_{ess}\left(-\frac{\Delta}{2m} + V\right) = [a, \infty), \quad (2.97)$$

というスペクトルの構造をもつとしよう。ここで,  $\sigma_d$ ,  $\sigma_{ess}$  は、それぞれ、離散スペクトル、真性スペクトルを表わし,  $a \geq \sup_m E_m$  で,  $\sup_m E_m = \infty$  のときは,  $\sigma_{ess}\left(-\frac{\Delta}{2m} + V\right) = \emptyset$  とする。このとき,

$$\sigma(H_0^{(1)}) = [E_0^{(0)}, \infty), \quad \sigma_p(H_0^{(1)}) = \left\{ E_m^{(0)} \right\}_{m=0}^{\infty} \quad (2.98)$$

となる。ここで,  $\sigma_p$  は点スペクトルを表わす。これは,  $\sigma(H_0, em) = [0, \infty)$ ,  $\sigma_p(H_0, em) = \{0\}$  であることをよみ、自己共役演算子のテンソル積についてのスペクトルの性質から導かれる。(2.98)において注目すべきことは、 $H_0$  の点スペクトル—非摂動系、=原子のエネルギー準位—は連続スペクトルの中に埋めこまれているということである。したがって、 $H_{ren}^{(1)}$  のスペクトル解析は、数学的には、連続スペクトルの中に埋めこまれた固有值に対する摂動の問題という形をとる。この問題は、一般的に解析することは難しく、これまでのところ、摂動の演算子が単純な場合とか、有限自由度の量子力学のいくつかのモデルにおいてのみ詳しく解析されているだけである。(たとえば、[9], [14], [15], [28], [27, XII. 6] を見よ),  $H_{ren}^{(1)}$  に適用できるだけの一般論はつくられてはいないようである。われわれの

モデルのもつ難点のひとつは、それが無限自由度の量子力学系に関するものであるということにある。

### 3. 1電子問題におけるいくつかの結果

前節の終わりで述べたように、Lambシフトの問題のひとつの定式化は、電荷1のセクター上でなされる。解析的基本的对象は(2.89)によつて与えられた、くりこまれた、1電子に対するハミルトニアントン  $H_{ren}^{(1)}$  である。

#### 3.1. 一般的な結果

赤外切断  $K > 0$  を入れたハミルトニアントン  $H_{ren,K}^{(1)}$  を

$$H_{ren,K}^{(1)} = \frac{1}{2(m - \delta m(K))} : (-i\vec{v} + e\vec{A}_p(\vec{r}; K))^2 : + V + H_{c,em}$$
(3.1)

によって定義する。ここで、 $\vec{A}_p(\vec{r}; K)$  は  $\vec{A}_p(\vec{r})$  において、 $\hat{\psi}(\vec{r})$  を  $\hat{\psi}(\vec{r})$   $\times \chi_{[K, \infty)}(|\vec{r}|)$  ( $\chi_{[K, \infty)}$  は  $[K, \infty)$  上の定義関数)で置きかえることによって得られる演算子、 $\delta m(K)$  は  $\delta m$  において、 $\hat{\psi}(\vec{r})$  を  $\hat{\psi}(\vec{r})$   $\times \chi_{[K, \infty)}(|\vec{r}|)$  としたものである。 $H_{ren,K}^{(1)}$  は、運動量の大きさが  $K$  よりも小さい光子の相互作用を切り落としたハミルトニアントンである。このとき、 $H_{ren,K}^{(1)}$  のスペクトルの基本的性質として、次の定理が得られる。

定理 3.1.  $m > \delta m$  とする。 $V$  は、仮定(2.62)をみなし、しかも、 $-\frac{\Delta}{2m} + V$  のスペクトルの下部構造が(2.96)のようであるとし、各  $E_j^{(0)}$  の多重度を  $m_j$  とする。このとき、 $E_j^{(0)} < E_0^{(0)} + K$  となる各  $E_j^{(0)}$  に対して、 $p, K$  に依存する正数  $r_j(p, K)$  が存在して、 $|e| < r_j(p, K)$

ならば;  $H_{ren, K}^{(1)}$  は,  $E_j^{(0)}$  の近くに  $m_j$  個の(必ずしも異なうない)固有値をもつ; それらの固有値は  $\epsilon$  について解析的である. さらに,

$$E_0(\beta, K) = \inf \sigma(H_{ren, K}^{(1)}) \quad (3.2)$$

とすれば, これは,  $|\epsilon| < r_0(\beta, K)$  のとき,  $H_{ren, K}^{(1)}$  の固有値であって,

$$\sigma(H_{ren, K}^{(1)}) = \sigma_{a.c.}(H_{ren, K}^{(1)}) = [E_0(\beta, K), \infty) \quad (3.3)$$

が成立する. ここで,  $\sigma_{a.c.}(H_{ren, K}^{(1)})$  は,  $H_{ren, K}^{(1)}$  の系色対連続スペクトルを表わす.

この定理の証明は, [20], [16], [1] によって展開された漸近場の方法 および 電子と質量  $0$  のボソンが相互作用する系の“衣をつけた 1 電子状態.”(dressed one electron states) の証明 ([10, 11]) に使われるテクニックとを応用することによって達成される. 詳細は [2], [3] を見よ (これらの文献では, 双極近似のハミルトニアンが使われているが, 証明の方法は全く同様である).

### 3.2. 調和振動子型原子の場合

この場合は, 振動子のハネ定数を  $\omega_0 > 0$  とすれば,

$$V(\vec{x}) = \frac{1}{2} m \omega_0^2 \vec{x}^2 \quad (3.4)$$

である. この節では, 双極近似を用いることにして, 双極近似のハミルトニアンをあらためて  $H_{ren}$  と書くことにする:

$$H_{ren} = \frac{1}{2(m - \gamma m)} : (-i\vec{p} + e\vec{A}(\beta))^2 : + \frac{1}{2} m \omega_0^2 \vec{x}^2 + H_{0, \text{em.}} \quad (3.5)$$

また,

$$H_0 = \frac{-\Delta}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_0^2 \vec{x}^2 + H_{0,\text{em}} \quad (3.6)$$

とおく。

注意：双極近似を用いる本質的な点は、 $H_{\text{ren}}$ に対する Heisenberg 方程式を正確に解けること——これは、 $H_{\text{ren}}$ が力学変数について2次形式となることによる——、したがて、 $H_{\text{ren}}$ の詳しいスペクトル解析が可能となる点にある。

$H_{\text{ren}}$ の自己共役性については、次の定理が成立する。

定理 3.2.  $H_{\text{ren}}$ は  $H_0$ の任意の核上で本質的に自己共役である。特に、 $m > 8m$  ならば、 $H_{\text{ren}}$ は  $D(H_0)$ 上で自己共役であって、しかも、下に有界である。 $m < 8m$  ならば、 $H_{\text{ren}}$ は下に有界ではない。

証明は [6] を見よ。

上の定理の最後の主張は、 $m < 8m$  の場合、 $H_{\text{ren}}$ の基底状態が存在しないことを示す。

$H_{\text{ren}}$ のスペクトルについては、次の定理が得られる。

定理 3.3.

(1)  $m > 8m$  のとき、

$$E_0 = \inf \sigma(H_{\text{ren}}) \quad (3.7)$$

とおく。このとき、

$$\sigma(H_{\text{ren}}) = \sigma_{\text{a.c.}}(H_{\text{ren}}) = [E_0, \infty), \quad \sigma_p(H_{\text{ren}}) = \{E_0\} \quad (3.8)$$

固有値  $E_0$  の多重度は 1 である。

(2)  $m < \delta m$  のときは、

$$\sigma(H_{ren}) = \sigma_{a.c.}(H_{ren}) = R^1, \quad \sigma_p(H_{ren}) = \emptyset. \quad (3.9)$$

証明は [6] を見よ。

$$E_n^{(0)} = (m + \frac{3}{2})\omega_0, \quad m=0, 1, 2, \dots \quad (3.10)$$

とおけば、

$$\sigma(H_0) = [E_0^{(0)}, \infty), \quad \sigma_p(H_0) = \{E_n^{(0)}\} \quad (3.11)$$

であるので、定理 3.3 は、電磁場の擾動のもとで、 $H_0$  のすべての点スペクトル ( $m > \delta m$  の場合は、最小の点スペクトル以外の) が消えてしまうことを示している。したがって、第 1 節で述べたように、Lamb シフトを与える形式的擾動論は、そのままでには、意味をなさず、何らかの再解釈が必要となる。

さて、まず、形式的擾動論に関連したいくつかの事実を述べよう。 $\Psi_{m,j}^{(0)}$ ,  $m \geq 0$ ,  $j = 1, \dots, M_m \equiv (m+1)(m+2)/2$  ( $M_m$  は  $E_m^{(0)}$  の多重度) を固有値  $E_m^{(0)}$  に属する  $H_0$  の固有ベクトル,  $\{P^{(0)}(E)\}$  を  $H_0$  に対するスペクトル射影の方族とし、

$$\varepsilon_{m,j}(z) = -(\Psi_{m,j}^{(0)}, H_I^{(1)}(H_0 - z)^{-1}(I - P^{(0)}(E_m^{(0)}))H_I^{(1)}\Psi_{m,j}^{(0)}) \quad (3.12)$$

とおく。さて、

$$H_I^{(1)} = \frac{e}{m}(-i\vec{V}) \cdot \vec{A}(r) \quad (3.13)$$

である。 $\varepsilon_{m,j}(z)$  は、 $C \setminus \sigma(H_0)$  において解析的であり、

$$\varepsilon_{n,j} \equiv \lim_{\substack{z \rightarrow E_n^{(0)} \\ \operatorname{Im} z > 0}} \varepsilon_{n,j}(z), \quad n \geq 0, \quad j=1, \dots, M_n, \quad (3.14)$$

が存在することがわかる。そこで、

$$\begin{aligned} E_{n,j}^{(2)}(e) = & E_n^{(0)} + \operatorname{Re} \varepsilon_{n,j} + (\Psi_{n,j}^{(0)}, H_I^{(2)} \Psi_{n,j}^{(0)}) \\ & + (\Psi_{n,j}^{(0)}, \frac{\delta m}{2m^2} (-\Delta) \Psi_{n,j}^{(0)}) \end{aligned} \quad (3.15)$$

とおく。さて、

$$H_I^{(2)} = \frac{e^2}{2m} : \vec{A}(P)^2 :. \quad (3.16)$$

$E_{n,j}^{(2)}(e)$  は、“擾動されたエネルギー準位”に対する、 $e^2$ のオーダーまで、形式的擾動展開である（たとえば、[19, 第2章]）。このオーダーまでの“エネルギー準位のずれ”（Lambシフト）は

$$\delta E_{n,j}^{(2)}(e) = E_{n,j}^{(2)}(e) - E_n^{(0)} \quad (3.17)$$

によって与えられる。一方、時間依存型の形式的擾動論（“黄金法則”）（たとえば、[22]）は、

$$P_n^{(2)} \equiv -2 \operatorname{Im} \varepsilon_{n,j} > 0 \quad (3.18)$$

を、 $\Psi_{n,j}$  の  $-e^2$  のオーダーまでの “崩壊確率” として与える。この崩壊は、光の自然放出によるものである。

さて、Heisenberg 場

$$\vec{A}(f, t) = e^{i t H_{\text{ren}}} \vec{A}(f) e^{-i t H_{\text{ren}}}, \quad f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3), t \in \mathbb{R}, \quad (3.19)$$

$$\vec{x}(t) = e^{itH_{\text{ren}}} \vec{x} e^{-itH_{\text{ren}}}, \quad (3.20)$$

$$\vec{p}(t) = e^{itH_{\text{ren}}} (-i\vec{v}) e^{-itH_{\text{ren}}} \quad (3.21)$$

ところで、2点  $\pi$ -関数 ( $m > sm$  の場合)

$$\bar{\tau}_{\mu\nu}^{(h)}(t-s) = (\Omega, T[x_\mu(t)x_\nu(s)]\Omega), \quad (3.22)$$

$$\bar{\tau}_{\mu\nu}^{(\text{EM})}(f, g; t-s) = (\Omega, T[A_\mu(f, t)A_\nu(g, s)]\Omega), \quad (3.23)$$

$$\bar{\tau}_{\mu\nu}^{(\text{EM}, h)}(f; t-s) = (\Omega, T[A_\mu(f, t)P_\nu(s)]\Omega) \quad (3.24)$$

を考える。ここで、 $\Omega$  は  $H_{\text{ren}}$  の基底状態、 $T(\cdot)$  は 時間順序積を表わす：

$$T(A(t)B(s)) = \Theta(t-s)A(t)B(s) + \Theta(s-t)B(s)A(t). \quad (3.25)$$

( $\Theta(\cdot)$  は Heaviside 関数)

$\bar{\tau}_{\mu\nu}^{(\text{EM})}(f, g; t)$  は、各  $t$  に対して、 $\mathcal{S}(R^3) \times \mathcal{S}(R^3)$  上の連続線形汎関数である。したがって、 $\mathcal{S}(R^6)$  上のそれに拡張され、 $\bar{\tau}_{\mu\nu}^{(\text{EM}, h)}(f; t)$  は、 $\mathcal{S}(R^3)$  上の連続線形汎関数である。それらの核を  $\bar{\tau}_{\mu\nu}^{(\text{EM})}(\vec{x}, \vec{y}; t)$ 、 $\bar{\tau}_{\mu\nu}^{(\text{EM}, h)}(\vec{x}; t)$  と書き、その  $t$  についての Fourier 変換を  $\hat{\tau}_{\mu\nu}^{(\text{EM})}(\vec{x}, \vec{y}; E)$ 、 $\hat{\tau}_{\mu\nu}^{(\text{EM}, h)}(\vec{x}; E)$  とする。また、

$$\mathbb{C}_+ = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z > 0\}, \quad (3.26)$$

$$\Pi_- = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z > 0, \operatorname{Im} z < 0\} \quad (3.27)$$

とおく。このとき、次の定理を得る([6])。

定理 3.4.  $m > sm < 1$ ,  $\mathfrak{F}$  は、仮定(2.61)に加えて、

$$\left. \begin{aligned} \hat{p}(\text{復}) &\text{は } \Pi_- \text{ の上へ解析接続をもち} \\ \hat{p}(z) &= O(|z|^{-3/2}) \quad (|z| \rightarrow \infty) \end{aligned} \right\} \quad (3.28)$$

をみたすとしよう。このとき、 $\Pi_{n2}^{(h)}(E)$ ,  $\Pi_{n2}^{(EM)}(\vec{r}, \vec{s}; E)$ ,  $\Pi_{n2}^{(EM,h)}(\vec{r}; E)$  は  $(\vec{r}, \vec{s}; \text{固定})$   $E$  の 関数として、 $(0, \infty)$  から  $\mathbb{C}_+$  へ有理型の角界  
折接続をもち、ある定数  $\lambda > 0$  が存在して、 $|e| < \lambda$  ならば、  
これらの接続関数は、共通に、 $\Pi_-$  において たたゞひとつの 1 位の極  $\zeta(e)$   
をもつ。 $\zeta(e)$  は  $e$  の解析関数で、 $e \rightarrow 0$  のとき、 $\zeta(e) \rightarrow \omega_0$  となる。 $\zeta(e)$   
の Taylor 展開を

$$\zeta(e) = \omega_0 + a_1 e + a_2 e^2 + \dots, \quad |e| < \lambda$$

とすれば、次が成立する。

$$(1) \quad a_1 = 0, \quad \operatorname{Im} a_2 < 0.$$

$$(2) \quad P_m^{(2)}(e) = -2ne^2 \operatorname{Im} a_2, \quad m \geq 0$$

$$(3) \quad \delta E_{n,j}^{(2)}(e) = \delta E_{0,1}^{(2)}(e) + ne^2 \operatorname{Re} a_2, \quad m \geq 0, \quad j=1, \dots, M_m.$$

この定理は、“エネルギーのずれ”(Lamb シフト)と“崩壊確率”  
に対する形式的摂動展開が——少なくとも  $n$  の 2 次のオーダーまで——  
は 2 点  $\Gamma$ -関数のエネルギー変数についての解析性を通して  
意味づけられることを示している。<sup>(1)</sup>

注意：一般的の  $n$  点  $\Gamma$ -関数は、2 点  $\Gamma$ -関数の積の和として書けるので、2 点  $\Gamma$ -関数について議論しておけば十分である。

#### 4. おわりに

おわりにあたって、いくつかの問題を述べておく。

##### (1) ハミルトニアン $H^{(2)}$ の解析

定理2.1よりさらに強く、 $H^{(2)}$ の本質的自己共役性はいえるか。また、 $H^{(2)}$ のスペクトルの性質はどうか。 $H^{(2)}$ で定義される系の統計力学はどうなむのか（これについては、Fröhlich-Park [13] の研究がある）。 $P \rightarrow S(\vec{r})$ の極限はとれるか。

(2) くりこまれたハミルトニアン  $H_{\text{ren}}^{(1)}$  (2.89) のさらに詳しい解析。

$V=0$ の場合に，“衣をつけた1電子状態”(dressed one electron states)の存在を証明し、散乱理論を構成できるか。その際、 $\epsilon$ 散乱の全断面積は、低エネルギー極限で、Thomsonの断面積となるか。これに対して、双極近似の場合については、Arai [7] の研究がある。

$V$ が調和振動子型でない場合についても、定理3.4と同様なことかいえないか？

\*

\*

\*

### 付録. ホソン Fock 空間に関連した基本的な事実

#### 1. $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上のホソン Fock 空間 $\mathcal{F}_b$ :

$$\mathcal{F}_b = \bigoplus_{m=0}^{\infty} \mathcal{F}_b^{(m)}, \quad (\text{A.1})$$

ここで、

$$\mathcal{F}_b^{(m)} = \begin{cases} \bigotimes_1^n L^2(\mathbb{R}^3) \ (n \geq 1) : L^2(\mathbb{R}^3) の n 個の対称テンソリ  
積 \\ \mathbb{C} \ (m=0) : 複素数全体 \end{cases} \quad (\text{A.2})$$

$\mathcal{F}_b^{(m)}$ は、m ホソン空間とよばれる。

#### 2. ホソン消滅演算子 (annihilation operator) $a(f)$ および生成演算子 $a^*(f)$ :

130

$f \in L^2(\mathbb{R}^3)$ ,  $\Psi = \{\Psi^{(n)}\} \in \mathcal{F}$  に対して,

$$(a(f)\Psi)^{(n)}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_m) = \sqrt{n+1} \int d\vec{r} f(\vec{r}) \Psi^{(n+1)}(\vec{r}, \vec{r}_1, \dots, \vec{r}_m), n \geq 0 \quad (\text{A.3})$$

$$(a^*(f)\Psi)^{(n)}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_m) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^n f(\vec{r}_j) \Psi^{(n-1)}(\vec{r}_1, \dots, \hat{\vec{r}}_j, \dots, \vec{r}_m), n \geq 1, \quad (\text{A.4})$$

$$(a^*(f)\Psi)^{(0)} = 0. \quad (\text{A.5})$$

として定義される。ここで、(A.4)の右辺において、 $\hat{\vec{r}}_j$  は  $\vec{r}_j$  をのぞくことを示す記号である。

$\mathcal{F}_0 = \{\Psi \in \mathcal{F} \mid \text{十分大きな } n \text{ に対して } \Psi^{(n)} = 0\}$   
 は、有限粒子ベクトルの空間とよばれ、 $\mathcal{F}_0$  で稠密である。

$a(f)$  と  $a^*(f)$  は、 $\mathcal{F}_0$  上で定義される可閉演算子であり、 $\mathcal{F}_0$  を不变にし、

$$(a(f)\Psi, \Phi) = (\Psi, a^*(f)\Phi), \quad \Psi, \Phi \in \mathcal{F}_0, \quad (\text{A.7})$$

$$[a(f), a^*(g)] = \langle f, g \rangle \quad (\text{A.8})$$

$$[a(f), a(g)] = [a^*(f), a^*(g)] = 0 \quad (\text{A.9})$$

をみたす。ここで、

$$[A, B] = AB - BA. \quad (\text{A.10})$$

### 3. 粒子数演算子 (number operator) $N$ :

$$(N\Psi)^{(n)}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_m) = n \Psi^{(n)}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_m), n \geq 0. \quad (\text{A.11})$$

$N$  は、その自然な定義域上で正値な自己共役演算子である。

Schwarz の不等式を使って、次の不等式を得ることができる：

$$\| \alpha(f)\Psi \| \leq \| f \|_{L^2(\mathbb{R}^3)} \| N^{\frac{1}{2}}\Psi \|, \quad (\text{A.12})$$

$$\| \alpha^*(f)\Psi \| \leq \| f \|_{L^2(\mathbb{R}^3)} \| (N+1)^{1/2}\Psi \|, \quad \Psi \in \mathcal{F}_0. \quad (\text{A.13})$$

4. 質量  $m > 0$  の自由な中性スカラーフィールドに対するハミルトニアン  $H_{0,b}$ :

$$(H_{0,b}\Psi)^{(m)}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_m) = \left( \sum_{j=1}^m (\vec{r}_j^2 + m^2)^{\frac{1}{2}} \right) \Psi^{(m)}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_m) \quad (\text{A.14})$$

$$(H_{0,b}\Psi)^{(0)} = 0. \quad (\text{A.15})$$

$H_{0,b}$  は自己共役であり、そのスペクトルは、

$$\begin{aligned} \sigma(H_{0,b}) &= \{0\} \cup [m, \infty), \quad \sigma_p(H_{0,b}) = \{0\} \\ \sigma_{a.c.}(H_{0,b}) &= [m, \infty) \end{aligned} \quad \left. \right\} \quad (\text{A.16})$$

で与えられる。なお、固有値 0 の多重度は 1 で、それに応する  $H_{0,b}$  の、1 つずつ 1 の固有ベクトルを Fock 真空 とよぶ。これを  $\Omega_0$  と言ひせば、

$$\begin{aligned} \Omega_0^{(n)} &= 0; \quad n \geq 1, \\ \Omega_0^{(0)} &= 1. \end{aligned} \quad (\text{A.17})$$

次の不等式が成立する ([2, Lemma A.1]).

$$\| \alpha(f)\Psi \| \leq \| \frac{f}{\sqrt{\omega}} \|_{L^2(\mathbb{R}^3)} \| H_{0,b}^{1/2}\Psi \|, \quad (\text{A.18})$$

$$\| \alpha^*(f)\Psi \| \leq \| \frac{f}{\sqrt{\omega}} \|_{L^2(\mathbb{R}^3)} \| H_{0,b}^{1/2}\Psi \| + \| f \|_{L^2(\mathbb{R}^3)} \| \Psi \|, \quad (\text{A.19})$$

$$f, f/\sqrt{\omega} \in L^2(\mathbb{R}^3), \quad \Psi \in D(H_{0,b}^{1/2}).$$

ここで、

$$\omega(\vec{r}) = (\vec{r}^2 + m^2)^{1/2} \quad (\text{A.20})$$

132

注意:  $m \neq 0$  のときは,  $f \in L^3(\mathbb{R}^3)$  ならば,  $f/\sqrt{m} \in L^2(\mathbb{R}^3)$  であるが,  
 $m = 0$  のときは, 必ずしもそうにはならない.

## 第1節

(1) 文献 [21] を見よ。

(2)  $2S_{1/2}$  の方が  $2P_{1/2}$  よりも高い。最近の実験値については、文献 [21] を見よ。

(3) de Broglie 流の物質波動場の理論論（これは、純然たる古典論である）の観点からすれば、Dirac 方程式は一確率解釈を許す状態ベクトルに対する方程式ではなく——古典電子場に対する場の方程式である。したがて、Dirac 方程式を用いた、水素原子のエネルギー準位の計算は、Coulomb ポテンシャルという外場と相対論的な電子場との相互作用系に対する古典場の理論論である。それによつて、Lamb シフトが説明できないうことは、古典場の理論論の限界を示すひとつの例といえるであろう。實際、QED は、古典電子場と電磁場との相互作用系を“量子化”したものであり、これによつてはじめて Lamb シフトを説明してきたのである。なお、物質波動場の理論論が純然たる古典論であること、特に物質場の方程式（たとえば、1 電子問題に対する Schrödinger 方程式と形を同じくする、古典的な de Broglie 場の方程式）と純粹に量子論的な、状態ベクトルに対する Schrödinger 方程式との概念的区別は、朝永振一郎「量子力学 II」、1952、みすず書房にて、ていねいに説明されている。

(4) ここで“の言葉は、時空 4 次元での、相対論的 QED についてである。時空 2 次元の QED については、いくつかの厳密な結果が得られている。たとえば、[7, 18], [12], [29] を見よ。

(5) 構成的場の量子論については、たとえば、[23] を見よ。

(6) 相対論的 QED では Dirac 方程式である。

(7) 電荷をもつ素粒子の場と電磁場との相互作用をケーヌ不变性の原理によって導入する仕方については、たとえば、[24, 3, 4 節] を見よ。

(8) 超選択則については、ボゴリューボフ他「場の量子論の数学的方法」(東京図書、1972) の 2 章 1, 3 節を参照。

### 第2節

(1)  $\hbar$  (Planck 定数) =  $c$  (真空中の光速度) = 1 の単位系で考える。

また、電磁単位は、有理化された Gauss 単位系を用いる。

(2) 簡単のため、電子のスピントルは無視する。

(3) 第1節の注(7)。

(4) これが、物理の文献にあらわれる、標準的な形である。

(5) Wick 積は、生成演算子と消滅演算子の積

$$A^{(Y_1, \dots, Y_n)}(f_1, \dots, f_n) = a^{(Y_1)\#}(f_1) a^{(Y_2)\#}(f_2) \dots a^{(Y_n)\#}(f_n)$$

に対して、

$: A^{(Y_1, \dots, Y_n)}(f_1, \dots, f_n) :$  = [  $A^{(Y_1, \dots, Y_n)}(f_1, \dots, f_n)$  の中に含まれる生成演算子の積 ]

$\times [ A^{(Y_1, \dots, Y_n)}(f_1, \dots, f_n) の中に含まれる 消滅演算子の積 ]$

によって定義され、 $a^{(r)}(f)$  と  $a^{(s)}(f)$  の多項式に対しては、系累形性によつて拡張する。あれひんの場合、

$$: (-i\vec{v} + e\vec{A}_p(\vec{x}))^2 : = (-i\vec{v} + e\vec{A}_p(\vec{x}))^2 - e^2 \left\| \frac{\psi}{\sqrt{w}} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2$$

となる。

### 第3節

(1) 一次元音波と振動子と質量のスカラー場とかの相互作用しているモードについても同様の結果が成立する。[4], [5] を見よ。

REFERENCES

1. S. Albeverio, An introduction to some mathematical aspects of scattering theory in models of quantum fields, in Scattering Theory in Mathematical Physics ( J.A.Lavita and J.P.Marchand eds. ), Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland, 1974, 299-281.
2. A. Arai, Some rigorous results of nonrelativistic quantum electrodynamics, preprint ( Univ. of Tokyo ), 1980.
3. A. Arai, Self-adjointness and spectrum of Hamiltonians in nonrelativistic quantum electrodynamics, J.Math.Phys., 22(1981), 534-537.
4. A. Arai, On a model of a harmonic oscillator coupled to a quantized, massless, scalar field. I, J.Math.Phys., 22(1981), 2539-2548.
5. A. Arai, On a model of a harmonic oscillator coupled to a quantized, massless, scalar field. II, J.Math.Phys., 22(1981), 2549-2552.
6. A. Arai, Rigorous theory of spectra and radiation for a harmonic oscillator atom interacting with a quantized electromagnetic field, to appear in J.Math. Phys.
7. A. Arai, A note on scattering theory in nonrelativistic quantum electrodynamics, preprint (Tokyo Institute of Technology), 1982.
8. H.A. Bethe, the electromagnetic shift of energy levels, Phys.Rev., 72(1947), 339-341.
9. K.O. Friedrichs, On the perturbation of continuous spectra, Commun.Pure Appl.Math., 1(1948), 361-406.
10. J. Fröhlich, Existence of dressed one electron states in a class of persistent models, Fortsch.Phys., 22(1974), 159-198.
11. J. Fröhlich, On the infrared problem in a model of scalar electrons and massless scalar bosons, Ann.Inst.Henri Poincaré, Sec.A, 19(1973), 1-103.
12. J. Fröhlich and E. Seiler, The massive Thirring-Schwinger model ( $QED_2$ ): convergence of perturbation theory and particle, Helv.Phys.Act., 49(1976), 889-924.

13. J. Fröhlich and Y.M. Park, Correlation inequalities and the thermodynamic limit for classical and quantum continuous systems, II Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics, preprint (I.H.E.S.), 1980.
14. J.S. Howland, Perturbations of embedded eigenvalues, Bull.A.M.S., 78(1972), 280-283.
15. J.S. Howland, Puiseux series for resonances at an eigenvalue, Pac.J.Math., 55 (1974), 157-176.
16. R. Hoegh-Krohn, On the spectrum of the space cut-off :P( $\phi$ ): Hamiltonian in two space-time dimensions, Commun.Math.Phys., 21(1971), 256-260.
17. K.R. Ito, Construction of two-dimensional quantum electrodynamics, J.Math. Phys., 21(1980), 1473-1494.
18. K.R. Ito, Construction of Euclidean (QED)<sub>2</sub> via lattice gauge theory, Commun. Math.Phys., 83(1982), 537-561.
19. T. Kato, Perturbation Theory for Linear Operators, Springer, 2nd ed., 1976.
20. Y. Kato and N. Mugibayashi, Regular perturbation and asymptotic limits of operators in quantum field theory, Progr.Theor.Phys., 30(1963), 103-133.
21. 木下東一郎, 量子電磁力学の現状, 江沢・恒藤編「量子物理学の展望 上」(岩波, 1977) の 12 章.
22. L. Landau and E. Lifshitz, Quantum Mechanics: Non-relativistic Theory, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1958.
23. 麦林布道, 場の理論, 江沢・恒藤編「量子物理学の展望 下」(岩波, 1978) の 30 章.
24. 中西襄, 「場の量子論」培風館, 1975.
25. E.A. Power and S. Zienau, Coulomb gauge in non-relativistic quantum electrodynamics and the shape of spectral lines, Trans.R.Phil.Soc.London, A251 (1959), 427-454.

26. M. Reed and B. Simon, Methods of Modern Mathematical Physics Vol.II, Academic, New York, 1975.
27. M. Reed and B. Simon, Methods of Modern Mathematical Physics Vol.IV, Academic, New York, 1978.
28. B. Simon, Resonances in N-body quantum systems with dilatation analytic potentials and the foundations of time-dependent perturbation theory, Ann.Math., 97(1973), 247-274.
29. D.H. Weingarten and J.L. Challifour, Continuum limit of QED<sub>2</sub> on a lattice, Annals of Phys., 123(1979), 61-101.
30. T.A. Welton, Some observable effects of quantum mechanical fluctuations of the electromagnetic field, Phys.Rev., 74(1948), 1157-1167.