

有限群の自己同型と指標について

兵庫教大 松山 廣 (Hiroshi Matuyama)

G を有限群, α を G の自己同型とし, $\Gamma = G \langle \alpha \rangle$ (半直積) とおく。又 $H = G(1)$ とし, $h_1 = 1, h_2, \dots, h_\alpha$ を H の共役類の代表系とする。さらに, $X(h_i) = \{g'h_i g^{-1} \mid g \in G\}, i=1, 2, \dots, \alpha$, とおく。特に $X = X(h_1)$ とする。

定義 $G = \bigcup_{i=1}^{\alpha} X(h_i)$ のとき, α を quasi-coprime automorphism of G とし (以下略して, q.c.a. と書く)。

q.c.a. については, 以下の事実が成立する。

(i) $\alpha = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ を α の P に於ける共役全体とする。 α が G の q.c.a. である条件は $G\alpha = \bigcup_{i=1}^t G(\alpha_i)\alpha_i$ となることである。又 $\alpha = \alpha$ のとき, 和 $\bigcup_{i=1}^t G(\alpha_i)\alpha_i$ は disjoint sum となる。

(ii) α の位数と H の位数が互いに素ならば, α は q.c.a. である (逆は成立しない)。

(iii) α を G の q.c.a. とすると, 次のことが成立する。

(1) 和 $\bigcup_{i=1}^{\alpha} X(h_i)$ は disjoint sum である。

(i) $\langle \alpha^m \rangle = \langle \alpha \rangle$ とする α^m も G の f.c.a. である。

(ii) H の 2 元が G で共役であるならば, H で共役である。

さて $\text{Irr}_n(G)$ が G の複素既約指標の \mathbb{C} -不変系全体の基底集合を表すとする。今, $\text{Irr}_n(G) = \{\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_\rho\}$ とおく。Brauer により, β は \mathbb{C} -不変系 G の共役類の個数と一致する。 α が f.c.a. のとき, $\alpha = \beta$ が示される。

定義 $\chi \in \text{Irr}_n(G)$ の p 上の拡張 χ^* と $\langle \alpha \rangle$ の生成元 α^m によって定まる H 上の類関数 $\chi(\chi^*, \alpha^m)$ を $\chi(\chi^*, \alpha^m)(h) = \chi^*(h\alpha^m)$ ($h \in H$) で定義する。

定義 $\alpha = \beta$ と仮定する。 $\text{Irr}_n(G)$ から $\text{Irr}(H)$ への bijection π が次の条件を満たすとき, Glauberman 対応 (w.r.t. α) という。「 $\chi \in \text{Irr}_n(G)$ とする。 χ の任意の p 上の拡張 χ^* に対して $\chi(\chi^*, \alpha)$ は, $\pi(\chi)$ のスカラー (0 でない) 倍である。」

Glauberman は [1] で, $|N| \geq |G|$ が素数とき (本質的に, $|N| \geq |H|$ が素数とき) Glauberman 対応の存在を示した。しかし, Glauberman 対応の成り立つ自己同型は次の様に特徴づけられる。

定理 A. α が G の f.c.a. である条件は Glauberman 対応が存在することである。

さらに [1] で示された (作用群が巡回群の場合の結果のほとんどが), α が f.c.a. であるという仮定のもとで成り立つ。

定理 B. $\Omega \in G$ の f.c.d. とする。 π を Galois 対応とし $\pi(\lambda_i) = \theta_i, i=1, 2, \dots, \alpha$ とおく。 次のことが成り立つ。

(i) λ_i の P の拡張 λ_i^* が、 $\langle \Omega \rangle$ の生成元の系 \mathcal{A} 集合上一定値 $\varepsilon_i(\theta_i, \nu)$ をとるものが一意に存在する、ここで ε_i は $|\Omega|$ が奇数ならば $|\Omega|$ が偶数ならば 1 である、 $i=1, 2, \dots, \alpha$ 。

各 $\lambda_i \in \text{Irr}_n(G)$ に対して、 (i) により一意に定まる P の拡張を canonical extension ということにする。

(ii) $\chi(\lambda_i^*, \Omega^m)$ は $\pi(\lambda_i)$ の (0 でない) スカラー値である。但し、 Ω^m は $\langle \Omega \rangle$ の生成元で、 λ_i^* は λ_i の拡張とする。

(iii) Ω の位数が素数 P の中とすると、

$$[\lambda_i|_H, \theta_j]_H \equiv \delta_{ij} \varepsilon_i \pmod{P}, \quad 1 \leq i, j \leq \alpha$$
 である。但し、 δ_{ij} は Kronecker の記号、 ε_i は (i) で定まるもの。

(iv) $\lambda_i(\nu)$ は $t(\theta_i, \nu)$ を割り切る、 $i=1, 2, \dots, \alpha$ 。但し、 $t = |G:H|$

(v) λ_i^* を λ_i の canonical extension とし、 R_i^* を λ_i^* を与える P の表現とすると、 $R_i = R_i^*|_G$ とおく、 $i=1, 2, \dots, \alpha$ 。このとき、

$$R_i(\hat{\chi}) = \varepsilon_i t(\theta_i, \nu) / \lambda_i(\nu), \quad R_i^*(\Omega), \quad i=1, 2, \dots, \alpha.$$

が成り立つ。但し、 $\hat{\chi} = \sum_{\chi \in \mathcal{A}} \chi \in \mathbb{C}[G]$ である。

(注意) 定理 B の (i) で定義した canonical extensions は、 Galoisman [1] の意味での canonical extensions とは必ずしも一致しないが、 Ω の位数が奇数で、 $|H|$ と素数 P と異なる場合 Ω の位数が素数のときは一致することが示される。

G の既約指標 χ の Ω -不変かどうかは、次の系 C により判定できる。

系 C. $\chi \in G$ の既約指標とする。 χ が Ω -不変となる条件は、 $\chi(\Omega) \neq 0$ となることである。(組 1. の体 G の $\mathbb{Z}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}$ とする)

以上の証明は [2] で発表する予定です。

[1]. G. Glauberman; *Correspondences of characters for relatively prime operator groups*, *Canad. J. Math.* 20 (1968) 1765-1788.

[2] H. Matsuyama; *Quasi-co-prime automorphisms and the Glauberman correspondence of finite groups*, preprint.