

新しい演算子法と差分方程式

岡山理大 早原四朗 (Sirō Hayabara)

岡山理大 道藤修三 (Shūzō Kondō)

ここでは、新しい演算子法 N.O.M. (New Operator Methods) を紹介する。この新しい方法を用いて定数係数の差分方程式(例1)を解く。さらに、代数的微分、積分について述べる。新しい代数的対数関数を導入し、変数係数の差分方程式(例2)を解く。

§1. N.O.M. (New Operator Methods)

一次元無限数列 $\{a_0, a_1, \dots, a_n, \dots\}$ を代表元 a_n を用いて $\{a_n\}$ で表す。 $\{a_n\}$ と $\{b_m\}$ の和とコーシー積を

$$\{a_n\} + \{b_m\} = \{a_n + b_m\}, \quad \{a_n\} \cdot \{b_m\} = \left\{ \sum_{r=0}^m a_r b_{m-r} \right\}$$

と定める。 $\{a_n\}, \{b_m\} \neq \{0\}$ に対して、コーシー積

$$\{x_n\} \cdot \{b_m\} = \{a_n\}$$

の逆算としてコーシー商

$$\{x_n\} = \{a_n\} / \{b_m\}$$

は、数列になる場合とならない場合がある。いずれの場合も順序対 $\{a_n\}/\{b_n\}$ を演算子とする。一次元数列全体の集合 E を数列空間、演算子全体の集合 Q を演算子空間とする。

2つの演算子 a/b と c/d は

$$a \cdot d = b \cdot c$$

で、かつそれに限るとき、2つは同値であるといふ

$$a/b = c/d$$

で表す。演算子の和、差、積、商はつきの通り定義する。

$$\text{I). } (a/b) \pm (c/d) = (a \cdot d \pm b \cdot c) / (b \cdot d)$$

$$\text{II). } (a/b)(c/d) = (a \cdot c) / (b \cdot d)$$

$$\text{III). } (a/b)/(c/d) = (a \cdot d) / (b \cdot c), (c \neq \{0\})$$

よく用いる演算子として数値演算子と変位演算子などがある。

数値演算子 $[a] = \{a, 0, \dots; 0, \dots\}$ に対して

$$[a] \cdot \{b_n\} = \{ab_0, ab_1, \dots; ab_n, \dots\}.$$

変位演算子 $U = \{0, 1, 0, \dots; 0, \dots\}$ に対して

$$U \cdot \{b_n\} = \{0, a_0, a_1, \dots; a_{n-1}, \dots\}.$$

$$U^k = \overbrace{\{0, \dots, 0, 1, 0, \dots\}}^{k \text{ 回}}$$

$$U^k \cdot \{b_n\} = \overbrace{\{0, \dots, 0, a_0, a_1, \dots, a_{n-k}, \dots\}}^{k \text{ 回}}.$$

数列 $\{a_n\}$ は変位演算子 U を用いて

$$\begin{aligned}\{a_n\} &= a_0[1] + a_1u + \cdots + a_nu^n + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n u^n\end{aligned}$$

で表される。右辺を u の関数 $a_n(u)$ で表せば

$$\begin{aligned}a_n(u)b_m(u) &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n u^n\right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} b_m u^m\right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{r=0}^n a_r b_{m-r} \right) u^n \\ &= \left\{ \sum_{r=0}^m a_r b_{m-r} \right\} \\ &= \{a_m\} \cdot \{b_m\}.\end{aligned}$$

このことから E におけるコーシー積は Q における普通積に対応している。これが N.O.M. の原理である。

n 項がそれぞれ a_n, a_{n+1}, a_{n+2} である数列 $\{a_n\}, \{a_{n+1}\}, \{a_{n+2}\}$ を $\{\}$ を外して a_n, a_{n+1}, a_{n+2} と略記すれば n 成分について

$$\begin{aligned}a_n &= u a_{n+1} + [a_0] \\ &= u^2 a_{n+2} + u[a_1] + [a_0].\end{aligned}$$

これから演算子 $P = 1/u$ に関して次の公式 I, II を得る。

公式 I ($E \rightarrow Q$)

$$a_{n+1} = P a_n - P[a_0]$$

$$a_{n+2} = P^2 a_n - P^2[a_0] - P[a_1]$$

公式 II ($Q \rightarrow E$)

$$P(p-\alpha) = \{\alpha^n\} \quad (\alpha; \text{定数})$$

$$P/(p-\alpha)^{k+1} = \begin{cases} \binom{n}{k} \alpha^{n-k} & (k \leq n) \\ 0 & (n < k) \end{cases}$$

$$\text{例 1. } f(x+2) - 5f(x+1) + 6f(x) = 0 \quad \cdots (1)$$

をみたす $f(x)$ を求める。

解) x の整数部 $[x] = n$ とおき、区分的に定数である関数

$$f(x) = f_n \quad (n \leq x < n+1, n=0, 1, \dots)$$

を考えると、 $f(x)$ の全体の \mathbb{X} 空間と f_n 全体の E 空間のそれぞれの元が 1 対 1 に対応する。よって (1) は

$$f_{n+2} - 5f_{n+1} + 6f_n = 0$$

に対応する。この方程式を Q に移すと

$$P^2 f_n - P[f_0] - P[f_1] - 5(Pf_n - Pf_0) + 6f_n = 0,$$

$$f_n = (3[f_0] - [f_1]) \frac{P}{P-2} - (2[f_0] - [f_1]) \frac{P}{P-3}.$$

E に戻して

$$f_n = (3f_0 - f_1) 2^n - (2f_0 - f_1) 3^n.$$

2^n と 3^n は一次独立だから一般解は

$$f_n = c_1 2^n + c_2 3^n.$$

もとの \mathbb{X} の関数空間に戻せば

$$f(x) = c_1 2^x + c_2 3^x.$$

§ 2. 代数的微分、積分と差分方程式

$n x_n$ は数列空間 E においてコーシー積分ではないので直ちに演算子空間 Q の元では表せない。よってつきの演算子 D を導入して利用する。

定義1. 数列空間Eにおいて

$$D\{a_n\} = \{-n a_n\} \quad \text{つまり}$$

$$D\{a_n\} = \{0, -a_1, -2a_2, \dots, -na_n, \dots\}$$

となるDは一種の微分法の作用をもつから代数的微分という。

定理1. Eにおいて

$$D\{a_n + b_n\} = D\{a_n\} + D\{b_n\}$$

$$D(\{a_n\} \cdot \{b_n\}) = (D\{a_n\}) \cdot \{b_n\} + \{a_n\} \cdot (D\{b_n\}).$$

紛れがなければ以下では $\{a_n\} = a_n$ と略記する。

定義2. 演算子に対する演算Dはつきのように定義する。

$$D(a_n/b_n) = [(Da_n) \cdot b_n - a_n \cdot (Db_n)] / (b_n \cdot b_n), (b_n \neq 0)$$

定理2. Qにおいて

$$D(a_n/b_n + c_n/d_n) = D(a_n/b_n) + D(c_n/d_n)$$

$$D[(a_n/b_n)(c_n/d_n)] = [D(a_n/b_n)](c_n/d_n) + (a_n/b_n)[D(c_n/d_n)]$$

$$D[\alpha] = 0, (\alpha \text{ は数値演算子}).$$

定理3.

i) Eにおいて $Dx^r = r x^{(r-1)} \cdot (Dx),$

Qにおいて $Dx^r = r x^{(r-1)} (Dx)$

(rは正整数, $x^r = \overbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}^{r \text{回}}$)

ii) 変位演算子uおよびP=[!]/uに対して, Qにおいて

$$Du = -u, Du^r = -ru^r, D^k u^r = (-r)^k u^r \quad (k; \text{正整数})$$

$$DP = P, D^k P^r = r^k P^r, D^k P^r = r^k P^r. \quad (r; \text{正, 負の整数})$$

定義3. E において

$$\exp\{a_n\} = e^{\{a_n\}} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\{a_n\}^r}{r!}$$

を指數関数列といふ。

定理4.

i) E において $e^{\{a_m\}} \cdot e^{\{b_m\}} = e^{\{a_m + b_m\}}$

ii) Q において $D e^{\{a_m\}} = e^{\{a_m\}} (D\{a_m\})$.

ベキ級数 $\sum_{r=0}^{\infty} a_r s^r$ の係数の作る数列は $\{a_m\}$ であるからこのベキ級数の表す関数を数列 $\{a_m\}$ の母関数といふ。ここに s は実数でも複素数でもよい。実際電子工学の理論に用いられる Z 変換では $s = Z$ (複素数) である。数列 $\{a_m\} = \sum_{r=0}^{\infty} a_r u^r$ であるから $\{a_m\}$ の演算子表示を $a_m(p)$ とすれば“これは $\{a_m\}$ の母関数である。ゆんにこれまでの u または p を E に関係なく Q においては実数の領域に拡張して考えてよい。(例えば P^α , $\log P$ 等)。

定義4. 与えられた $x \in Q$ に対して

$$Dy = x$$

である演算子 $y \in Q$ が存在すれば、 y を x の 代数的積分といふ。

$$y = \int x + [c]$$

て表す。

定義5. 拡張した領域の整関数 $y(x)$ に対して

$$D \log f(x) = \frac{f'(x)}{f(x)} (Dx) = g(x)$$

となる $\log f(x)$ が存在する。これを 代数的対数関数といふ

$$\log f(x) = \int g(x) + [c] = \int g(x) (Dx)^r dx + [c]$$

と表す。

定理5. \mathbb{Q} においてつきの等式がなりたつ。 $(a_n = \{a_m\})$.

$$1) \log(a_n b_n) = \log a_n + \log b_n, \quad \log a_n^r = r \log a_n$$

$$2) D \log a_n = (D a_n) / a_n$$

$$3) D \log u^r = -r, \quad D \log p^r = r$$

$$D \log(u-\alpha)^r = -r u / (u-\alpha)$$

$$D \log(p-\alpha)^r = r p / (p-\alpha) \quad (\alpha, r; \text{実数}).$$

4) 一般に $f(u), f(p)$ がそれそれ u または p に関して普通

の意味で微分可能ならば、

$$D f(u) = -f'(u) u = -\frac{df}{du} u$$

$$D f(p) = f'(p) p = \frac{df}{dp} p.$$

定理6. 積分定数を略して次の公式がなりたつ。

$$\int (Df)g = fg - \int f(Dg)$$

$$\int f'(u)u = -f(u), \quad \int f'(p)p = f(p)$$

$$\int [\alpha] = -[\alpha] \log u = [\alpha] \log p$$

$$\int \frac{P}{P-\alpha} = \log(P-\alpha)$$

$$\int \frac{P}{(P-\alpha)^k} = -k^{-1}(P-\alpha)^{-k}.$$

例2. 差分方程式

$$a(x+1)f(x) - xf(x+1) = a^{x+1}, \quad f(0) = 1, \quad (a; \text{定数}) \quad ①$$

をみたす $f(x)$ の一般式を求めよ。

解) $[x] = n$ とおくと, ①に対応する数列方程式は

$$a(n+1)f_n - nf_{n+1} = a^{n+1} \quad ②$$

$$-nf_n = Df_n, \quad f_{n+1} = Pf_n - P, \quad a^n = P/(P-\alpha) \quad \text{により}$$

$$a(-Df_n) + af_n + D(Pf_n - P) = ap/(P-\alpha)$$

$$Df_n + (P+a)(P-\alpha)^{-1}f_n = P(P-\alpha)^{-1} + ap(P-\alpha)^{-2}. \quad ③$$

③に関する同次方程式

$$Df_n + (P+a)(P-\alpha)^{-1}f_n = 0 \quad ④$$

に対して

$$Df_n/f_n = -(P+a)(P-\alpha)^{-1} = 1 - 2P(P-\alpha)^{-1}.$$

代数的積分して

$$\log f = \log P - 2 \log(P-\alpha) + C.$$

$$\tilde{f} = C P (P-\alpha)^{-2} \quad ⑤$$

③に対する特解は

$$f_p = \tilde{f} \int \tilde{f}^{-1} [P(P-\alpha)^{-1} + ap(P-\alpha)^{-2}]$$

$$\begin{aligned}
 &= p(p-a)^{-2} \int p \\
 &= p^2(p-a)^{-2} \\
 &= p(p-a)^{-1} + ap(p-a)^{-2}. \tag{6}
 \end{aligned}$$

⑤, ⑥により E における ② の一般解は

$$f_n = c n a^{n-1} + (n+1) a^n.$$

対応する ① の一般解は

$$f(x) = c x a^{x-1} + (x+1) a^x.$$

$c = -a$ とおけば ① の特解 $f(x) = a^x$ を得る。

同様に, 2 階以上の代数的常微分方程式や偏微分方程式が解ける。

参考文献

- [1] 早原四朗, 春木茂, 新しい演算子法と離散解析関数論, 横書店 (1981).
- [2] S. Hayabara, Z-Transformation by the New Operator Methods, Proc. Japan Acad. 58A (1982) 182-185.
- [3] S. Hayabara, Algebraic Derivative, Integral and Difference Equations (in Japanese), Bull. Okayama Univ. Sci. No. 18 (1983), 17-30.