

Title	強さ 2ℓ の均斉配列と分解能 2ℓ の 2^m 釣合い型一部実施要因計画 (デザインの構成と解析)
Author(s)	白倉, 暉弘
Citation	数理解析研究所講究録 (1977), 311: 67-75
Issue Date	1977-10
URL	http://hdl.handle.net/2433/103897
Right	
Type	Departmental Bulletin Paper
Textversion	publisher

強さ 2^l の均斉配列と分解能 2^l の
 2^m 釣合型一部実施要因計画

神戸大 教育 白倉暉弘

1. 序及び準備

m 個の因子で各々 2 水準で施される実験を考える。効果として θ_ϕ を一般平均, θ_t を t 番目の因子の主効果, $\theta_{t_1 t_2}$ を t_1, t_2 番目の因子間の 2-因子交互作用, \dots , $\theta_{t_1 \dots t_l}$ を相当する因子間の l -因子交互作用とする。ここで $2 \leq l \leq \frac{m}{2}$ を満たす整数 l に対して $(l+1)$ -因子交互作用以上の効果は無視可能であるという一般的状态を考える。ベクトル

$$\underline{\theta}' = (\theta_\phi; \{\theta_t\}; \{\theta_{t_1 t_2}\}; \dots; \{\theta_{t_1 \dots t_l}\}), \quad (1 \times \nu_l),$$

$$\underline{\theta}'_0 = (\{\theta_t\}; \{\theta_{t_1 t_2}\}; \dots; \{\theta_{t_1 \dots t_{l-1}}\}), \quad (1 \times p),$$

を考える。ただし $\nu_l = \sum_{\beta=0}^l \binom{m}{\beta}$, $p = \nu_{l-1} - 1$.

T を N 個の処理組合わせ数を持つ計画とし (T を $m \times N$ の $(0,1)$ 行列として考える), \underline{y}_T を T に関する $N \times 1$ の観測値ベクトルとする (\underline{y}_T の α 番目の要素は T の α 番目の処理組合わせにおける観測値からなる)。つぎの線形モデルを考える。

$$(1) \quad Y_T = E_T \theta + e$$

ただし E_T は要素 ± 1 を持つ T に関する $N \times k$ 計数行列, e は $E(e) = 0_N$, $E(e e') = \sigma^2 I_N$ とする $N \times 1$ 確率ベクトル.

定義 1. モデル (1) の下で θ_0 が推定可能となるとき, i.e., $E(A Y_T) = \theta_0$ となるような且に無関係な $p \times N$ 行列 A が存在するとき T を分解能 2^l の 2^m -部実施要因計画 (2^m -FFD) という.

定義 2. モデル (1) の下で θ_0 が推定可能かつ θ_0 の最良不偏推定量 (BLUE) $\hat{\theta}_0$ の共分散行列 $\text{Var}[\hat{\theta}_0]$ が m 個の因子周りの任意の置換に対して不変となるとき T を分解能 2^l の 2^m 釣合型一部実施要因計画 (2^m -BFFD) という.

定義 3. $m \times N$ の $(0, 1)$ 行列 T において, T の任意の t 個の行からなる部分行列 T_t ($t \times N$) の列に i 個の 1 の要素を持つベクトルが各々 μ_i 回現われるとき T を強さ t , 制約数 m , 大きさ $N (= \sum_{i=0}^t \binom{t}{i} \mu_i)$, 指標 μ_i ($i=0, 1, \dots, t$) の均斉配列 (B-array) という.

白倉 [1], [2] は強さ $t=2^l$, 制約数 m , 指標 μ_i ($i=0, \dots, 2^l$) の

B -array T が分解能 $2l$ の 2^m -BFFD とするための十分条件を与えた。ここでは上記の B -array T が分解能 $2l$ の 2^m -BFFD とするための必要十分条件を与える。一方山本, 白倉, 栗田 [3] はある計画 T が分解能 $2l+1$ の 2^m -BFFD とするための必要十分条件は T が $|M_T| \neq 0$ (M_T は T に関する母の情報行列で $M_T = ET^tET$ で与えられる) とする強さ $2l$, 制約数 m , 指標 μ_i の B -array であることを示した。明らかに分解能 $2l+1$ の 2^m -BFFD は分解能 $2l$ の 2^m -BFFD である。よってここでは $|M_T| = 0$ とする強さ $2l$ の B -array に限定する。

上記の強さ $2l$ の B -array に対して, 山本, 白倉, 栗田 [4] によって導入された l 個の $(l-\beta+1) \times (l-\beta+1)$ 対称行列 ($\beta = 0, 1, \dots, l$) を考える。

$$(2) \quad K_\beta = \| \kappa_\beta^{i,j} \|$$

ただし

$$(3) \quad \kappa_\beta^{i,j} = \kappa_\beta^{j,i} = \sum_{\alpha=0}^{\beta+i} \gamma_{j-i+\alpha} z_{\beta\alpha}^{(\beta+i, \beta+j)}, \quad (0 \leq i \leq j \leq l-\beta),$$

$$\gamma_k = \sum_{j=0}^{2l} \sum_{p=0}^k (-1)^j \binom{2l-k}{j-k+p} \mu_j,$$

$$(4) \quad z_{\beta\alpha}^{(u,v)} = \sum_{b=0}^{\alpha} (-1)^{\alpha-b} \frac{\binom{u-\beta}{b} \binom{u-b}{u-\alpha} \binom{m-u-\beta+b}{b} \{ \binom{m-u-\beta}{v-u} \binom{v-\beta}{v-u} \}^{\frac{1}{2}}}{\binom{v-u+b}{b}},$$

2. 分解能 $2l$ の 2^m -BFFD

$0_{p \times q}$ をすべて 0 の要素からなる $p \times q$ 行列, 特に $0_p = 0_{p \times 1}$

とする。

補題 1. ある計画 T が分解能 $2l$ の 2^m -FFD であるための必要十分条件は $X_1 M_T = C_1$ となる $p \times 2l$ 行列 X_1 が存在することである。ただし C_1 は

$$C_1 = [0_p : I_p : 0_{p \times 2l}] \quad (l = \binom{m}{2})$$

で与えられる $p \times 2l$ 行列。

証明. (必要) 定義 1 より $E(A\hat{y}_T) = AE_T \theta = \theta_0 = C_1 \theta$.
故に $AE_T = C_1$ となる A が存在する。よって $\text{rank } E_T' = \text{rank}[E_T' : C_1']$. よって $\text{rank } M_T = \text{rank}[M_T : C_1']$.

(十分) (1) より $E(X_1 E_T' \hat{y}_T) = X_1 E_T' E_T \theta = X_1 M_T \theta = C_1 \theta = \theta_0$.

補題 2. T を分解能 $2l$ の 2^m -FFD とする。そのとき θ_0 の BLUE $\hat{\theta}_0$ とその共分散行列 $\text{Var}[\hat{\theta}_0]$ はつぎで与えられる。

$$\hat{\theta}_0 = X_1 E_T' \hat{y}_T,$$

$$\text{Var}[\hat{\theta}_0] = X_1 M_T X_1' \sigma^2 = X_1 C_1' \sigma^2 = X_{11} \sigma^2.$$

ただし X_1, C_1 は補題 1 の行列, X_{11} は $X_1 = [X_{11} : X_{12}]$ となる $p \times p$ 行列。

証明. Gauss-Markov の定理より明らか。

$K_\beta^{(0)}$ ($\beta < l$) を K_β の最後の行と列を除いて得られる行列
 が \underline{k}_1 と \underline{k}_2 をそれぞれ K_0 の最初と最後の列からなるベ
 クトルとする ($\underline{k}_1 = (x_0^{0,0}, x_0^{1,0}, \dots, x_0^{l,0})$, $\underline{k}_2 = (x_0^{0,l}, \dots, x_0^{l,l})$).

定理 強さ $2l$, 制約数 m , 指標 μ_i ($i=0, \dots, 2l$) の B -array
 T が分解能 $2l$ の 2^m -BFFD であるための必要十分条件は T がつ
 ぎの条件を満たすことである. $|K_{\beta_i}| = 0$ ($0 \leq \beta_1 < \dots < \beta_r \leq l$) が
 つ $|K_\alpha| \neq 0$ ($\alpha \neq \beta_1, \dots, \beta_r; 0 \leq \alpha \leq l$) とする r 個の整数 β_i に対して,

(i) $\beta_i = 0$ のとき

$|K_0^{(0)}| \neq 0$ が $\underline{k}_2 = d\underline{k}_1$ とする $d (\geq 0)$ が存在する,

$$(5a) \quad x_{\beta_i}^{l-\beta_i, l-\beta_i} = 0, \quad (1 \leq \beta_i \leq l),$$

$$|K_{\beta_i}^{(0)}| \neq 0, \quad (1 \leq \beta_i \leq l-1),$$

(ii) $\beta_i \geq 1$ のとき

$$(5b) \quad x_{\beta_i}^{l-\beta_i, l-\beta_i} = 0, \quad (1 \leq \beta_i \leq l),$$

$$|K_{\beta_i}^{(0)}| \neq 0, \quad (1 \leq \beta_i \leq l-1).$$

注意 ここでは $|M_T| = 0$ とする B -array T を考えているの
 で, 定理において $|K_\beta| = 0$ とする β の個数 r は必ず $r \geq 1$
 である (M_T と K_β との関係については [4] を参照).

定理の証明 (必要) 補題1より

$$(6) \quad X M_T = C$$

となる $l \times l$ 行列 X が存在する。ただし $C = C' C_l = \text{diag}(0, I_p, 0_{q \times q})$ 。 B -array T に対して $M_T \in \mathcal{O}$, $C \in \mathcal{O}$ 。 したがって \mathcal{O} は $l+1$ sets triangular type multidimensional partially balanced association algebra で詳細は [2], [3], [4] 参照。

このことは

$$(7) \quad \begin{aligned} Q' M_T Q &= \text{diag}(K_0, K_1, \dots, K_1, \dots, K_l, \dots, K_l) \equiv K \\ Q' C Q &= \text{diag}(\Gamma_0, \underbrace{\Gamma_1, \dots, \Gamma_1}_{\phi_1}, \dots, \underbrace{\Gamma_l, \dots, \Gamma_l}_{\phi_l}) \equiv \Gamma \end{aligned}$$

となる直交行列 Q が存在することを意味する。ただし

$$(8) \quad \begin{aligned} \phi_\beta &= \binom{m}{\beta} - \binom{m}{\beta-1}, \\ \Gamma_0 &= \text{diag}(0, I_{l-1}, 0), \quad \Gamma_l = 0 \\ \Gamma_\beta &= \text{diag}(I_{l-\beta}, 0), \quad (\beta=1, 2, \dots, l-1). \end{aligned}$$

\therefore (6) より

$$X^* K = \Gamma, \quad (X^* = Q' X Q).$$

故に $X_\beta K_\beta = \Gamma_\beta$ ($\beta=0, 1, \dots, l$) となる $(l-\beta+1) \times (l-\beta+1)$ 行列 X_β が存在する。 \therefore

$$(9) \quad \text{rank } K_\beta = \text{rank} [K_\beta : \Gamma_\beta], \quad (\beta=0, \dots, l).$$

(i) $\beta=0$ のとき

(9) より

$$(12) \quad Q'XQ = \text{diag} (X_0, \underbrace{X_1, \dots, X_1}_{\phi_1}, \dots, \underbrace{X_l, \dots, X_l}_{\phi_l})$$

この X は $Q'XQK = I$ より $XM_T = C$ を満たす。故に

$$(13) \quad X_1 M_T = C_1$$

となる $p \times \nu_l$ 行列 X_1 が存在する。よって補題1より T は分解能 2^l の 2^m -FFD である。補題2より

$$\text{Var}[\hat{\theta}_0] = X_{11} \sigma^2$$

この $p \times p$ 行列 X_{11} は

$$(14) \quad X = \begin{bmatrix} * & * & * \\ * & X_{11} & * \\ * & * & * \end{bmatrix} \in \mathcal{O}$$

であり algebra \mathcal{O} の性質より m 個の因子間の任意の置換に対して不変である。よって T は分解能 2^l の 2^m -BFFD である。

注意 条件 (5a, b) は $d=0$ (i.e., $x_0^{l,l} = 0$) のとき [2] で与えた十分条件と一致する。又 $r=1$ で $\beta_1 = l$ (i.e., $|K_\alpha| \neq 0$ ($\alpha=0, \dots, l-1$), $k_p = 0$) のときこの条件は [1] で与えた十分条件と一致する。

3. 例

ここで強さ $t=4$ ($l=2$) の β -array に対して条件 (5a, b) を

満足するものを与える。

(i) $m \geq 4$, $\mu_0 = \lambda_0 + (m-4)\lambda_1$, $\mu_1 = \lambda_1$, $\mu_2 = 0$, $\mu_3 = \lambda_2$, $\mu_4 = (m-4)\lambda_2 + \lambda_3$ (λ_i は $\lambda_0 + \lambda_3 \geq 1$, $\lambda_1 \geq 1$, $\lambda_2 \geq 1$ を満足する整数) に対し τ , $|K_\alpha| \neq 0$ ($\alpha = 0, 1$), $K_2 = \kappa_2^{0,0} = 0$ (i.e., $r=1; \beta_1=2$).

(ii) $m \geq 4$, $\mu_0 = (m-4)$, $\mu_1 = 1$, $\mu_2 = 0$, $\mu_3 = 1$, $\mu_4 = (m-4)$ に対し τ , $|K_0| = 0$, $|K_1| \neq 0$, $K_2 = \kappa_2^{0,0} = 0$, $|K_0^{(0)}| \neq 0$ (i.e., $r=2; \beta_1=0, \beta_2=2$), $\underline{k}'_1 = (2m, 0, 2(m-4)\sqrt{\binom{m}{2}})$, $\underline{k}'_2 = (2(m-4)\sqrt{\binom{m}{2}}, 0, (m-1)(m-4)^2)$ 且 $\tau d = (m-4)\sqrt{m-1}/\sqrt{2m}$.

(iii) $m=4$, $\mu_0=2$, $\mu_1=0$, $\mu_2=1$, $\mu_3=0$, $\mu_4=1$ に対し τ $|K_0| \neq 0$, $|K_1|=0$, $|K_2| \neq 0$ (i.e., $r=1; \beta_1=1$), $\kappa_1^{1,1} = 0$, $|K_1^{(0)}| = 0$

References

- [1] Shirakura, T. (1976). Balanced fractional 2^m factorial designs of even resolution obtained from balanced arrays of strength 2ℓ with index $\mu_\ell = 0$. Ann. Statist. 4 723-735.
- [2] Shirakura, T. (1977). Contributions to balanced fractional 2^m factorial designs derived from balanced arrays of strength 2ℓ . Hiroshima Math. J. 7 217-285.
- [3] Yamamoto, S., Shirakura, T. & Kuwada, M. (1975). Balanced arrays of strength 2ℓ and balanced fractional 2^m factorial designs. Ann. Inst. Statist. Math. 27 143-157.
- [4] Yamamoto, S., Shirakura, T. & Kuwada, M. (1976). Characteristic polynomials of the information matrices of balanced fractional 2^m factorial designs of higher $(2\ell+1)$ resolution. Essays in Prob. & Statist., Ogawa Volume (Ed., S. Ikeda et al.) 73-94.