

熱核に対する Hadamard 变分公式
と Laplacian の固有値

東大 理 小沢 真

§ Introduction

$\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界領域。 $\gamma = \partial\Omega \cdots C^\infty$ boundary

$f(x) \in C^\infty(\gamma)$ fix, $D_x \cdots \gamma_x$ での外向き単位法線vector

$$\gamma_\varepsilon = \{ x + \varepsilon f(x) D_x : x \in \gamma \}$$

$\Omega_\varepsilon \cdots \gamma_\varepsilon$ が互に有界領域 (ε :十分小) とする。

Hadamard は [3] に於いて次の命題を示した。

$G_\varepsilon(x, y) \cdots$ the Green function of Laplacian with

Dirichlet boundary condition at γ_ε

とする。

命題1 [3]

$x, y \in \Omega$ とする。

$$\delta G(x, y) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon^{-1} (G_\varepsilon(x, y) - G(x, y))$$

とおくと

$$\delta G(x, y) = - \int_Y \frac{\partial G(x, z)}{\partial \nu_z} \frac{\partial G(y, z)}{\partial \nu_z} f(z) d\sigma_z$$

$\cdots \cdots$
 $= \cdots \cdots d\sigma_z$ は Y 上の面素。

注意 上の命題は $\rho \leq 0$ の場合 Hadamard の $\rho \neq 0$

一般の場合には Garabedian-Schiffer [2] が証明した。

[2] の証明は, $\varphi_\varepsilon : \Omega \rightarrow \Omega_\varepsilon$ を Ω の diffeomorphism

の family $\{\varphi_\varepsilon\}$ を構成し, $\varphi_\varepsilon = \varphi_\varepsilon \circ \varphi_\varepsilon : \Omega_\varepsilon \rightarrow \text{Laplacian } E$

Ω での変数係数の 2 階椭円型作用素に変換し、固定された

領域 Ω での作用素の振動論に話を reduce する所謂

interior variational method である。

Fujiwara-Ozawa [4] はむしろ Hadamard の idea
を忠実な方法で一般の場合も、証明が可能である事を

Whitney's extension theorem を用いて示した。

詳述が Ozawa [7] の中にあるから参照して下さい。

この Note では Hadamard の変分公式を熱方程式の
基本解の場合に示し、それを出発点として固有
値問題について調べる。証明の大半は省略するが、Trace
 $T(t)$ の変分公式については詳しく述べる。

熱方程式の基本解に対する変分公式

$U_\varepsilon(x, y, t)$ で $\Omega_\varepsilon = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, 0 < y < \varepsilon\}$ における熱方程式の基本解とする。

境界条件は Dirichlet condition, または Neumann, Robin condition とする。

$$x, y \in \Omega, t > 0 \text{ と fix し。}$$

$$\delta U(x, y, t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon^{-1} (U_\varepsilon(x, y, t) - U(x, y, t))$$

とおく。ここで $U(x, y, t)$ を $U(x, y, t)$ と書いた。

定理 1

(1) Dirichlet 条件の場合 [5], [7]

$$\delta U(x, y, t) = \int_0^t \int_{\gamma} \frac{\partial U(x, z, t-\tau)}{\partial \nu_z} \frac{\partial U(y, z, \tau)}{\partial \nu_z} \rho(z) d\sigma_z d\tau$$

(2) 第3種境界条件の場合 [6]

$$\begin{cases} k \geq 0 \text{ とき} \\ \left(\frac{\partial}{\partial \nu_x} + k \right) U_\varepsilon(x, y, t) = 0 \quad x \in \gamma_\varepsilon \end{cases}$$

$\gamma_\varepsilon = \gamma^\varepsilon$, $x + \gamma_\varepsilon$ は γ の 単位外向き法線 vector

γ の x, y

$$\begin{aligned} \delta U(x, y, t) = & - \int_0^t d\tau \int_{\gamma} \langle \nabla_x U(x, z, t-\tau), \nabla_y U(y, z, \tau) \rangle \rho(z) d\sigma_z \\ & - \frac{\partial}{\partial t} \int_0^t d\tau \int_{\gamma} U(x, z, t-\tau) U(y, z, \tau) \rho(z) d\sigma_z \\ & + \int_0^t d\tau \int_{\gamma} (k^2 - (n-1)k H_1(z)) U(x, z, t-\tau) U(y, z, \tau) \\ & \quad \rho(z) d\sigma_z \end{aligned}$$

$= \gamma$. $H_1(z)$ は $z \in \gamma$ における γ の first mean

curvature.

$$a(x), b(x) \in C^\infty(\gamma) \quad \forall t = x$$

$$\langle \nabla_x a(x), \nabla_x b(x) \rangle = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial a}{\partial x_i}(x) \frac{\partial b}{\partial x_i}(x)$$

$= \gamma$. x_1, \dots, x_{n-1} は $T_x \gamma$ 上の coordinate

(2) の 証明の rough sketch を 述べよう。 [6] 参照。

(1) の 証明は [7] を 参照の事。

Proof of (2)

$\gamma \subset \Omega$ を fix す。 $\tilde{U}(z, y, \tau)$ を z, y 変数に

付けて $\underbrace{\text{extension}}_{U(z, y, \tau)} \text{ で 次の性質を 保たすものとする}.$

⊕

- o $\lim_{\tau \rightarrow 0} \tilde{U}(z, y, \tau) = 0 \quad \text{for } z \notin \bar{\Omega}.$
- o $\tilde{U}(z, y, \tau)$ は $\Omega \times (0, \infty)$ の C^∞ 関数
- o $\tilde{U}(z, y, \tau) = U(z, y, \tau) \quad \text{for } z \in \Omega, \tau \in (0, \infty)$

そのとき

$$\begin{aligned}
 & U_\varepsilon(x, y, t) - U(x, y, t) \\
 &= - \int_0^t d\tau \left(\frac{\partial}{\partial \tau} \int_{\Omega_\varepsilon} U_\varepsilon(x, z, t-\tau) \tilde{U}(z, y, \tau) dz \right) \\
 &= \int_0^t d\tau \int_{\Omega_\varepsilon} \Delta_z U_\varepsilon(x, z, t-\tau) \cdot \tilde{U}(z, y, \tau) dz \\
 &\quad - \int_0^t d\tau \int_{\Omega_\varepsilon} U_\varepsilon(x, z, t-\tau) \cdot \Delta_z \tilde{U}(z, y, \tau) dz \\
 &\quad + O(\varepsilon^2)
 \end{aligned}$$

$$z = \gamma$$

$$\left| \left(\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_z \right) \tilde{U}(z, y, t) \right| \leq C \operatorname{dist}(z, \gamma)^2$$

を用いた。 C は $t =$ 関係なしとする $\odot y \in \Omega$ と
 y とは距離が positive $t = \gamma$

(Green の 公式 より)

$$U_\varepsilon(x, y, t) - U(x, y, t)$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^t d\tau \int_{\gamma_\varepsilon} \left(-\frac{\partial U_\varepsilon}{\partial D_2^\varepsilon}(x, z, t-\tau) + k \tilde{U}_\varepsilon(x, z, t-\tau) \right) \tilde{U}(z, y, \tau) d\sigma_2^\varepsilon \\
&\quad - \int_0^t d\tau \int_{\gamma_\varepsilon} U_\varepsilon(x, z, t-\tau) \left(-\frac{\partial \tilde{U}}{\partial D_2^\varepsilon}(z, y, \tau) + k \tilde{U}(z, y, \tau) \right) d\sigma_2^\varepsilon \\
&\quad + O(\varepsilon^2) \\
&= - \int_0^t d\tau \int_{\gamma_\varepsilon} U_\varepsilon(x, z, t-\tau) \left(\frac{\partial \tilde{U}}{\partial D_2^\varepsilon}(z, y, \tau) + k \tilde{U}(z, y, \tau) \right) d\sigma_2^\varepsilon + O(\varepsilon^2)
\end{aligned}$$

少しばかり、幾何学的な議論を行なおう。

今 $\gamma_2 z = 0$ にて exterior normal 方向が Z_n 座標であり、

Z における γ の tangent hyperplane 上に z_1, \dots, z_{n-1} 座標を

互いに直交するようにとり、これが \mathbb{R}^n の流通座標とする。

そうすれば、

$$\frac{\partial}{\partial D_2^\varepsilon} = \frac{\partial z_1}{\partial D_2^\varepsilon} \frac{\partial}{\partial z_1} + \cdots + \frac{\partial z_{n-1}}{\partial D_2^\varepsilon} \frac{\partial}{\partial z_{n-1}} + \frac{\partial z_n}{\partial D_2^\varepsilon} \frac{\partial}{\partial z_n}$$

簡単な計算により

$$\begin{cases} \frac{\partial z_j}{\partial D_2^\varepsilon} = -\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial z_j} \mu_\varepsilon + O(\varepsilon^2) & (j=1, \dots, n-1) \\ \frac{\partial z_n}{\partial D_2^\varepsilon} = \mu_\varepsilon + O(\varepsilon^2) \end{cases}$$

$$== \varphi \quad \mu_\varepsilon = \left(1 + \varepsilon^2 \sum_{j=1}^{n-1} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial z_j} \right)^2 \right)^{-1/2}.$$

したがつて、今 $v \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ とすると

$$\frac{\partial v}{\partial z_j} \Big|_{z+\varepsilon f(z)D_z} = M\varepsilon \left\{ \left(-\varepsilon \frac{\partial p}{\partial z_1} \frac{\partial v}{\partial z_1} + \cdots + \frac{\partial p}{\partial z_{n-1}} \frac{\partial v}{\partial z_{n-1}} \right) \Big|_{z+\varepsilon f(z)D_z} \right. \\ \left. + \frac{\partial v}{\partial z_n} \Big|_{z+\varepsilon f(z)D_z} \right\} + O(\varepsilon^2)$$

∴

$$\frac{\partial v}{\partial z_n} \Big|_{z+\varepsilon f(z)D_z} = - \frac{\partial v}{\partial z_n} \Big|_z + \varepsilon f(z) \frac{\partial^2 v}{\partial z_n^2} \Big|_z + O(\varepsilon^2)$$

$$\frac{\partial v}{\partial z_j} \Big|_{z+\varepsilon f(z)D_z} = - \frac{\partial v}{\partial z_j} \Big|_z + O(\varepsilon) \quad (j=1, \dots, n-1)$$

故 1. $v \in C^q(\mathbb{R}^n)$ 1 = $\bar{x} + \bar{y}$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon^{-1} \left(\frac{\partial v}{\partial z_j} \Big|_{z+\varepsilon f(z)D_z} - \frac{\partial v}{\partial z_j} \Big|_z \right) \\ = - \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\partial p}{\partial z_j} \frac{\partial v}{\partial z_j} \Big|_z + p(z) \frac{\partial^2 v}{\partial z_n^2} \Big|_z$$

∴

$$\frac{\partial \tilde{v}}{\partial z_j} (z, y, \tau) + k \tilde{U}(z, y, \tau) \Big|_{z+\varepsilon f(z)D_z} \\ = \frac{\partial U}{\partial z_j} (z, y, \tau) + k U(z, y, \tau) \Big|_z \\ + \varepsilon \left(\frac{\partial^2 U}{\partial z_n^2} (z, y, \tau) + k \frac{\partial U}{\partial z_n} (z, y, \tau) \right) p(z) \\ + \varepsilon \left(- \langle \nabla_y p(z), \nabla_y U(z, y, \tau) \rangle \right) + O(\varepsilon^2)$$

故 1.

①

$$\begin{aligned}\delta U(x, y, t) = & - \int_0^t d\tau \int_{\gamma} \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}(z, y, \tau) U(x, z, t-\tau) \rho(z) d\Omega_z \\ & + k^2 \int_0^t d\tau \int_{\gamma} U(x, z, t-\tau) U(z, y, \tau) \rho(z) d\Omega_z \\ & + \int_0^t d\tau \int_{\gamma} \langle \nabla_y \rho(z), \nabla_y U(z, y, \tau) \rangle d\Omega_z\end{aligned}$$

もちろん精密な Schauder estimate を用いての事だが! [] 参照。

$\tau = 3^{-1} \gamma$ 上では $U(x, z, \tau)$ は次の方程式を

満たす。

$$\left(-\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \Delta_y^2 + (n-1) H_1(z) \frac{\partial}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial \tau} \right) U(x, z, \tau) = 0$$

$\tau = \tau$ Δ_y^2 is Tangent hyperplane \pm の Laplacian である。

故に

$$\begin{aligned}(A) \quad \delta U(x, y, t) = & - \int_0^t d\tau \int_{\gamma} \langle \nabla_y U(x, z, t-\tau), \nabla_y U(z, y, \tau) \rangle \rho(z) d\Omega_z \\ & - \int_0^t d\tau \int_{\gamma} U(x, z, t-\tau) \frac{\partial}{\partial \tau} U(z, y, \tau) \rho(z) d\Omega_z \\ & + \int_0^t d\tau \int_{\gamma} (k^2 - k(n-1) H_1(z)) U(x, z, t-\tau) U(z, y, \tau) \\ & \quad \rho(z) d\Omega_z\end{aligned}$$

さて, $x, y \in \Omega$ 故

$$0 = \int_0^t d\tau \left(-\frac{\partial}{\partial \tau} \int_{\gamma} U(x, z, t-\tau) U(z, y, \tau) \rho(z) d\Omega_z \right)$$

\int_0^t

$$\begin{aligned}
 & - \int_0^t d\tau \left(\int_Y U(x, z, t-\tau) \frac{\partial}{\partial \tau} U(z, y, \tau) \varphi(z) d\Omega_z \right) \\
 (B) \quad & = \int_0^t d\tau \left(\int_Y \frac{\partial}{\partial \tau} U(x, z, t-\tau) U(z, y, \tau) \varphi(z) d\Omega_z \right) \\
 & = - \frac{\partial}{\partial t} \int_0^t d\tau \left(\int_Y U(x, z, t-\tau) U(z, y, \tau) \varphi(z) d\Omega_z \right)
 \end{aligned}$$

(A), (B) なり, Th 1 の (2) を得る。 (証明あり)

§

Trace $T_{r(t)}$ に対する変分公式

$$T_r(t; \varepsilon) = \int_{\Omega_\varepsilon} U_\varepsilon(x, x, t) dx$$

とおく。この時、

$$\delta T_{r(t)} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon^{-1} (T_r(t; \varepsilon) - T_r(t; 0)) \quad \text{とする}$$

定理 2

(1) Dirichlet 条件の場合 [5], [7]

$$\delta T_r(t) = \int_{\Omega} \delta U(x, x, t) dx$$

(2) 第3種境界条件 (定理 1 参照) の場合 [6]

$$\delta T_r(t) = \int_{\Omega} \delta U(x, x, t) dx + \int_Y U(x, x, t) \varphi(x) d\Omega_x$$

①

$\equiv = \tau^*$.

$$\int_{\Omega} \delta U(x, x-t) dx$$

は $(0, \infty)$ における t 变数の distribution である。


$$\varphi(t) \in C_c^\infty(0, \infty) \text{ に対し }$$

$$\int_{\Omega} dx \left(\int_0^\infty \delta U(x-x, t) \varphi(t) dt \right)$$

を対応させた汎函数として define する。

証明)) (1) の場合は [7] を参照のこと。

delicate と (2) の場合について考みる。



適当に選ぶ事とする。 ε^k order とは、距離度量が

ε^k と $2\varepsilon^k$ の間にあることしよう。もちろん $\tilde{\gamma}_\varepsilon$ は $\partial(\Omega \cap \Omega_\varepsilon)$

と homeo (連結成分の個数も同じ) とする。

$\tilde{\gamma}_\varepsilon$ の周も有界領域を I_ε しよう。

$$Tr(t; \varepsilon) = \int_{\Omega_\varepsilon} U_\varepsilon(x, x, t) dx \quad \text{故}$$

$$(C) \quad \begin{aligned} & \varepsilon^{-1} (Tr(t; \varepsilon) - Tr(t; 0)) \\ &= \varepsilon^{-1} \left\{ \int_{\Omega_\varepsilon \setminus \Omega} U_\varepsilon(x, x, t) dx - \int_{\Omega \setminus \Omega_\varepsilon} U(x, x, t) dx \right\} \\ &+ \varepsilon^{-1} \left\{ \int_{(\Omega_\varepsilon \cap \Omega) \setminus I_\varepsilon} U_\varepsilon(x, x, t) dx - \int_{(\Omega_\varepsilon \cap \Omega) \setminus I_\varepsilon} U(x, x, t) dx \right\} \\ &+ \varepsilon^{-1} \int_{I_\varepsilon} (U_\varepsilon(x, x, t) - U(x, x, t)) dx \end{aligned}$$

さて、 $\varepsilon \rightarrow 0$ のとき、第一項は

$$\int_Y U(x, x, t) p(x) d\sigma_x$$

$I =$ 収束する。第二項は O $I =$ 収束する。

問題は第三項であるが、二つの処理は大変難しい。

今 $x \in I_\varepsilon$ とする。 $x \in \Omega$ 故

$$U_\varepsilon(x, x, t) - U(x, x, t) = \varepsilon \int_{\Omega_\varepsilon \setminus \Omega} U_{\varepsilon \theta(\varepsilon, x, t)}(x, x, t)$$

T_ε は如き $0 < \theta(\varepsilon, x, t) < 1$ が存在する。

今 $\varphi(t) \in C_0^\infty(0, \infty)$ をとてまで $\mapsto f_{tx}$ しよう。

$\langle \varepsilon^{-1} (Tr(t; \varepsilon) - Tr(t; 0)), \varphi(t) \rangle \dots \varphi(t)$ を Test function と t ときの値。

$$= \sum_{k=1}^3 \langle (C) \text{ 式右辺第 } k \text{ 項}, \varphi(t) \rangle$$

とするが、第1項、2項は、 $\varepsilon \rightarrow 0$ のときの処理が“すでに終わっているので、 $\langle \text{第3項}, \varphi(t) \rangle$ のみを問題にしう。

$$\begin{aligned} & \left\langle \varepsilon^{-1} \int_{I_\varepsilon} (\bar{U}_\varepsilon(x, x, t) - U(x, x, t)) dx, \varphi(t) \right\rangle \\ &= \underset{\text{Fubini}}{\int_{I_\varepsilon}} dx \left\langle \varepsilon^{-1} (\bar{U}_\varepsilon(x, x, t) - U(x, x, t)), \varphi(t) \right\rangle \\ &= \int_{I_\varepsilon} dx \left\langle \delta \bar{U}_{\varepsilon 0}(\varepsilon, x, t), \varphi(t) \right\rangle \end{aligned}$$

さて、 $\delta \bar{U}_{\varepsilon 0}(\varepsilon, x, t)$ は \mathbb{R} のような表示式をもつ。

$$\begin{aligned} & \delta \bar{U}_{\varepsilon 0}(\varepsilon, x, t) \\ &= - \int_0^t d\tau \int_{\gamma_{\varepsilon 0}} \left\langle \nabla_{\gamma_{\varepsilon 0}} \bar{U}_{\varepsilon 0}(x, z, t-\tau), \nabla_{\gamma_{\varepsilon 0}} \bar{U}_{\varepsilon 0}(x, z, \tau) \right\rangle \\ & \quad \int_{\varepsilon 0}(z) d\gamma_z^\varepsilon \\ & - \frac{\partial}{\partial t} \int_0^t d\tau \int_{\gamma_{\varepsilon 0}} \bar{U}_{\varepsilon 0}(x, z, t-\tau) \bar{U}_{\varepsilon 0}(x, z, \tau) \rho_{\varepsilon 0}(z) d\gamma_z^\varepsilon \\ & + \int_0^t d\tau \int_{\gamma_{\varepsilon 0}} \bar{U}_{\varepsilon 0}(x, z, t-\tau) \bar{U}_{\varepsilon 0}(x, z, \tau) (k^2 - (n-1)kH_1(z)) \rho_{\varepsilon 0}(z) d\gamma_z^\varepsilon \end{aligned}$$

$= \tau$ 、 $\nabla_{\gamma_{\varepsilon 0}}$ は $\gamma_{\varepsilon 0}$ 上の tangential gradient operator
 $d\gamma_z^\varepsilon$ は $\gamma_{\varepsilon 0}$ 上の面素。

$f_{\varepsilon 0}(z)$ は、以下で define される。

$\Omega \rightarrow \Omega_\varepsilon$ たる領域運動 は $\Omega_{\varepsilon 0} \rightarrow \Omega_{\varepsilon 0 + \tilde{\varepsilon}}$

たる領域運動を induce していき考慮する。

$\gamma_{\varepsilon 0 + \tilde{\varepsilon}}$ の全体は $y + \gamma_{\varepsilon 0}$ の normal vector $Dy^{\varepsilon 0}$

$$= \{ y + \tilde{\varepsilon} Dy^{\varepsilon 0} \cdot f_{\varepsilon 0}(y; \tilde{\varepsilon}) \mid y \in \gamma_{\varepsilon 0} \}$$

と represent される。 $\zeta = z - \lim_{\tilde{\varepsilon} \rightarrow 0} f_{\varepsilon 0}(y; \tilde{\varepsilon}) = f_{\varepsilon 0}(y)$

すなはち

$$\langle \delta U_{\varepsilon 0}(x, x, t), \varphi(t) \rangle$$

$$(D) = \left\langle - \int_0^t d\tau \int_{\gamma_{\varepsilon 0}} \langle \nabla_{\partial_z} U_{\varepsilon 0}(x, z, t-\tau), \nabla_{\partial_z} U_{\varepsilon 0}(x, z, \tau) \rangle f_{\varepsilon 0}(z) dz \right\rangle$$

$$+ \left\langle \int_0^t d\tau \int_{\gamma_{\varepsilon 0}} U_{\varepsilon 0}(x, z, t-\tau) U_{\varepsilon 0}(x, z, \tau) f_{\varepsilon 0}(z) dz, \varphi(t) \right\rangle$$

$$+ \langle \dots, \varphi(t) \rangle$$

ここで 上式の右辺第二項は 方向 $\frac{\partial}{\partial t}$ の test function

$\varphi(t)$ の微分は 級項として注意する。このよう t_0 が t_1

で t_1 estimate され 非常に やりに < 10 何故 t_0 は

$\Theta(\varepsilon, z, t)$ は $t = z - \varepsilon$ 可微分かつ ε が t_0 に近い。

ε は $\chi_{\varepsilon(x)} \in I_\varepsilon$ の characteristic function である。

$$Q^\varphi(x) = \sup_{0 < \varepsilon < \varepsilon_0} \langle \delta U_{\varepsilon 0(\varepsilon, x, t)}(x, x, t), \varphi(t) \rangle \chi_\varepsilon(x)$$

とおき。

Claim. $Q^\varphi(x) < +\infty$, $\int_{\Omega} Q^\varphi(x) dx < +\infty$

もし、上の claim が証明されれば、Lebesgue dominated convergence theorem はなり。

$$\begin{aligned} & \int_{I_\varepsilon} dx \langle \delta U_{\varepsilon 0}(x, x, t), \varphi(t) \rangle \\ & \longrightarrow \int_{\Omega} dx \langle \delta U(x, x, t), \varphi(t) \rangle \end{aligned}$$

故に

$$\begin{aligned} & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon^{-1} (T_r(t; \varepsilon) - T_r(t; 0)) \\ & = \int_{\Omega} \delta U(x, x, t) dx + \int_{\gamma} U(x, x, t) \varphi(x) d\sigma_x \end{aligned}$$

より、Th 2, (2) の証明がわかる。そこで、上記 Claim を証明しよう。

Claim の証明; $Z \in \Omega_\varepsilon$ たゞ γ の垂線。足を $d_\varepsilon(x) \times \pm 30^\circ$ とす。任意の $x \in I_\varepsilon$, $Z \in \gamma_{\varepsilon 0} = \gamma \cap \gamma$ たゞ如き。

(14)

ε は無関係な定数 \tilde{C} が存在する。 (図を書いて考えて下さい)。

以下の証明に於いては、熱方程式の基本解に対する pointwise estimate (with parameter ε) を用いる。
それはよく知り出でる事なので、一々補題として述べない。

(D)式右辺 第1項のみを評価する。第2項の評価は部分積分のおかげで、第1項より易しくなってしまった。
第3項も易しい。

$$\begin{aligned} & \left| \left\langle - \int_0^t d\tau \int_{\gamma_{\varepsilon_0}} \left\langle \nabla_{x_0} U_{\varepsilon_0}(x, z, t-\tau), \nabla_{x_0} U_{\varepsilon_0}(x, z, \tau) \right\rangle P_{30}(z) \right. \right. \\ & \quad \left. \left. d\sigma_z^{\varepsilon_0}, g(t) \right\rangle \right| \\ & \leq M \sup_{t \in \mathbb{R}^n} \int_0^t d\tau \int_{\gamma_{\varepsilon_0}} \frac{1}{(t-\tau)^{\frac{n}{2} + \frac{1}{2}} \tau^{\frac{n}{2} + \frac{1}{2}}} e^{-\frac{|x-z|^2}{4(t-\tau)}} e^{-\frac{|x-z|^2}{\tau}} d\sigma_z^{\varepsilon_0} \\ & \text{さて, } e^{-\frac{|x-z|^2}{4(t-\tau)}} \leq e^{-\tilde{C}^2 \frac{|x-d_\varepsilon(z)|^2}{4(t-\tau)}} \end{aligned}$$

γ_{ε_0} に注意して考えよ。一方、 $\gamma_{\varepsilon_0} \rightsquigarrow \gamma$ differ だから。

$$\int_0^t d\tau \int_{\gamma_{\varepsilon_0}} \frac{e^{-\tilde{C}^2 \frac{1}{4} (\frac{1}{t-\tau} + \frac{1}{\tau}) |x-d_\varepsilon(z)|^2}}{(t-\tau)^\frac{n}{2} \tau^{\frac{n}{2}}} d\sigma_z^{\varepsilon_0}$$

$$\leq k \int_0^t d\tau \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-\tilde{C}^2 \frac{1}{4} (\frac{1}{\tau} + \frac{1}{t-\tau}) |x-z|^{2h}}}{\{(t-\tau)\tau\}^{\frac{n}{2} + \frac{1}{2}}} d\Omega_z$$

よって $Q^\varphi(x) < +\infty$ が証明できた。

$$\int_{\Omega} Q^\varphi(x) dx < \int_{\mathbb{R}^n} Q^\varphi(x) dx$$

$$\leq M \int_{\mathbb{R}^n} d\Omega_z \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{\{(t-\tau)\tau\}^{\frac{n}{2} + \frac{1}{2}}} e^{-\left(\frac{1}{t-\tau} + \frac{1}{\tau}\right) \frac{\tilde{C}^2}{4} |x-z|^{2h}} dx$$

$\Rightarrow 1 < h < \frac{n}{n-1}$ とき右辺は有界。

だから $h = \frac{n-1}{n-1}$ とおけば良い。 (証明終わり)

§ 固有値問題に対する応用

今、領域 Ω に方々にて考える

$$0 \geq \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3 \geq \dots$$

を Laplacian with Dirichlet (Neumann or Robin) condition に対する固有値とする。重複度に応じて並べておく。

$\{\varphi_j(x)\}_{j=1}^{\infty}$ で $L^2(\Omega)$ の完全正規直交系とし、

$\varphi_j(x)$ は λ_j の固有空間に属する固有函数とする。

$$U(x, y, t) = \sum_{j=1}^{\infty} e^{\lambda_j t} \varphi_j(x) \varphi_j(y)$$

であった。

と $Tk_1, 2$ により

Th 3

(1) Dirichlet 条件の場合 [5], [7]

$$\delta T_r(t) = t \sum_{j=1}^{\infty} e^{\lambda_j t} \int_{\gamma} \left(\frac{\partial \varphi_j}{\partial \nu_2}(z) \right)^2 p(z) d\sigma_2$$

(2) 第3種境界条件の場合 [6]

$$\delta T_r(t) = t \sum_{j=1}^{\infty} e^{\lambda_j t} \int_{\gamma} Q_j(z) p(z) d\sigma_2$$

$= = \tau$

$$Q_j(z) = -|\nabla_{\bar{z}} \varphi_j(z)|^2 + (k^2 - (n-1)k + h_j(z) - \lambda_j) \varphi_j(z)^2.$$

$= = 1$

$$|\nabla_{\bar{z}} \varphi_j(z)|^2 = \langle \nabla_{\bar{z}} \varphi_j(z), \nabla_{\bar{z}} \varphi_j(z) \rangle.$$

次の結果は良く知られている。

命題 Courant-Hilbert [1]

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 有界領域とする, $\lambda_j(\Omega)$ で $-\Delta$ の j 番目の固有値 with Dirichlet condition とする。またを任意の Ω の subdomain ω に対して

$$\lambda_j(\Omega) \leq \lambda_j(\omega)$$

上の命題は Δ with Dirichlet condition $i = \text{対す} 3$
固有値が領域 $i =$ 単調に depend していふ事を示していふ。

Uchiyama [8] は、 Neumann 条件の場合 固有値は
領域 $i =$ 非単調に依存する事を示した。我々の Th3 の
(2) に於いても $Q_{j(2)}$ の 定符号性は分かるまい。
これが 固有値の 領域 $i = \text{対す} 3$ non monotonous dependence
の本質的理由であるように思われる。

Th3 の 証明は 困るが、 定理 2 の (2) の 事情を
よく考慮して計算する交事がある。

§ もはや時間がない。

研究集会に於いては、さうい $\delta T_r(t)$ の $t \downarrow 0$ での
漸近展開と hyperplane & geometry を結びつけ。
local geometric invariant の意義を強調した。これらの
テーマは、Ozawa [5], [7] はすでに書かれているので
興味のある方は参照して下さい。

おしまい。

参考文献

- [1] Courant - Hilbert Methods of mathematical physics, I
Interscience, New York, 1953
- [2] Garabedian - Schiffer J. Anal. Math., 2, 281-368 (1952-53)
- [3] Hadamard Oeuvre, C.N.R.S., 2, 515-631 (1968)
- [4] Fujiwara - Ozawa Proc. Japan. Acad., 54 A No 8
215-220 (1978)
- [5] Ozawa Proc. Japan. Acad., 54 A, 322-325 (1978)
- [6] — Perturbation of domains -- II, to appear in Proc. Jap. Acad.
- [7] — 東京大学修士論文 (1979) 129p
- [8] Uchiyama J. Fac. Sci. Univ. Tokyo. 24, 281-299
(1977)