

従属確率変数列が与えられたときの Robbins-Monro 型 確率近似法

福岡大 理学部 渡辺 正文

S 1. 序

Robbins-Monro 型確率近似法； $\{W_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ を $x \in \mathbb{R}$ をパラメータとする確率変数の列とし，分布関数は x に依存し未知とする。 $E(W_n(x)) = M_n(x)$, $n=1, 2, \dots$ とき，十分大きな正の整数 n に対して方程式

$$(1.1) \quad M_n(x) = 0$$

の解 $x = \theta_n$ (存在すると仮定) を推定する逐次的な手法は次の形で与えられる (Robbins-Monro procedure)；

$$(1.2) \quad \begin{cases} X_0 = \text{任意の定数} \\ X_{n+1} = X_n - a_n W_n(X_n), \quad n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

ここで $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は正の実数列で

$$(1.3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$$

を満たす。このとき

$$(1.4) \quad E(W_n(X_n) | X_1, \dots, X_n) = M_n(X_n) \quad a.s., \quad n = 1, 2, \dots$$

なる仮定のもとで

$$(1.5) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |X_n - \theta_n| = 0 \quad a.s. ,$$

$$(1.6) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} E|X_n - \theta_n|^2 = 0$$

等が成り立ったための十分条件が色々と研究されている([6]).

特に、上の確率近似法を応用しようとするとき、例えばパターン分類問題における(統計的)識別関数の学習とか与えられた入力と出力の組の列を用いて未知関数を学習する問題等([3])においては、仮定(1.4)が満たされなければ直接確率近似法の収束定理を適用出来ない。すなわち(1.4)が満たされる自然な仮定として観測列(学習列)は独立な確率変数列であることが要求される。独立でない場合には(1.4)がかなりずしも満たさぬとは限らない。本報告は(1.4)がかなりずしも成り立たぬときの Robbins-Monro 型確率近似法を考察する。すなわち従属確率変数列が与えられたときの確率近似法の収束定理を与える。前回の報告(1977.1.26, 「数理計画と決定過程論」 数理研究録 299, [8])において筆者は(1.4)が成り立たぬときの R-M 型確率近似法を与えた。[8]においてはある「大数の法則」が成り立つ条件(ある mixing-条件)のもとで考察した。本報告においても同様の仮定のもとでさらに一般化したものを考える。すなわち、[8]においては

$$(1.7) \quad W_n(x) = (x - \theta_n) A_n(Y_n) + \Gamma_n(Y_n), \quad n=1,2,\dots$$

ここで、 $\{Y_n\}_{n=1}^{\infty}$ は従属確率変数の列、と展開出来ることを仮定した。今回は次のように展開出来る場合を仮定する。

$$(1.8) \quad W_n(x) = (x - \theta_n) A_n(x, Y_n) + \Gamma_n(x, Y_n), \quad n=1,2,\dots$$

また、収束は [8] と同様に a.s. 収束（確率 1 での収束）を考察する。

§ 2. 問題設定と Lemma

- \mathbb{R}^k ; k 次元 Euclid 空間 (k は正の整数)。
- $\{Y_n\}_{n=1}^{\infty}$; \mathbb{R}^m -valued random vectors の列で独立とは限らぬし、またその分布は未知とする。
- $\Phi_n(x, y) = (\Phi_n^{(1)}(x, y), \dots, \Phi_n^{(m)}(x, y))$, $n=1,2,\dots$; $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ なる可測写像 (i.e. $\Phi_n^{(i)}(\cdot, \cdot)$ は Borel 関数)。

Problem 十分大なる n (正の整数) に対して 方程式

$$(2.1) \quad E[\Phi_n(x, Y_n)] = \mathbf{0}$$

の解 $x = \theta_n$ を求めよ。ここで $\mathbf{0}$ は \mathbb{R}^n のゼロベクトル。

上の問題に対し、各 $n=1,2,\dots$ と (x, Y_n) に対して

$$(2.2) \quad W_n(x) = \Phi_n(x, Y_n)$$

なる $\mu, v: s$ の \exists $\{W_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ ($x \in \mathbb{R}^n$) を利用出来るとする。

Procedure

$$(2.3) \quad \begin{cases} X_1 \equiv \text{任意の } \mathbb{R}^n \text{ の定数ベクトル} \\ X_{n+1} = X_n - \alpha_n W_n(X_n), \quad n=1,2,\dots \end{cases}$$

ここで

$$(2.4) \quad W_n(x_n) = \Phi_n(x_n, Y_n),$$

$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は正の実数列とする。

記号

- $\langle \cdot, \cdot \rangle$; \mathbb{R}^N の内積, i.e. $x = (x_1, \dots, x_N)$, $x' = (x'_1, \dots, x'_N)$

$$\langle x, x' \rangle = \sum_{i=1}^N x_i x'_i.$$

- $\|\cdot\|$; \mathbb{R}^N のノルム, i.e. $\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2}$.

- $\|\cdot\|_N$; $N \times N$ -行列の operator norm, i.e. $\|A\|_N = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|$.

- I ; $N \times N$ -単位行列。

さらに, ベクトルは全て 横ベクトル とする。

Lemma 1 (クロネッカーの補題)

$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$; 実数列で $\sum x_n$ が有限な値を収束。

$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$; 0 に収束する正の単調減少列。

とすると次のことが成り立つ。

$$(2.5) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \sum_{k=1}^n x_k / a_k = 0.$$

Lemma 2 ([7])

$\{d_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{\beta_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{K_n\}_{n=1}^{\infty}$ は非負の実数列とし, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ は非負の実数列で次の不等式を満たす。

$$(2.6) \quad x_{n+1} \leq (1-d_{n+1})x_n + d_n \beta_n + K_n, \quad n=1, 2, \dots$$

さらには

$$(i) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0, \quad \sum_{n=1}^{\infty} d_n = \infty$$

$$(ii) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0 \quad (\sup_n \beta_n < \infty)$$

$$(iii) \quad \sum_{n=1}^{\infty} K_n < \infty$$

が成り立つならば $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ($\sup_n x_n < \infty$) .

Lemma 3 ([5])

$\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{d_n\}_{n=1}^{\infty}$ を非負の実数列とし, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ は非負実数列で次の不等式を満たす

$$x_{n+1} \leq \max \{a, (1+b_n)x_n + d_n\}, \quad n=1, 2, \dots$$

ここで

$$(i) \quad a > 0, \quad (ii) \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n < \infty, \quad (iii) \quad \sum_{n=1}^{\infty} d_n < \infty$$

が成り立つならば $\sup_n x_n < \infty$.

Lemma 4

$\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{d_n\}_{n=1}^{\infty}$ を実数列とし次のことを満たす

$$(i) \quad 0 \leq h_n \quad (n \geq 1), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0 \quad (\sup_n h_n < \infty)$$

$$(ii) \quad 0 < a_n < 1 \quad (n \geq 1), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty,$$

$$\sup_n |1/a_n - 1/a_{n+1}| < \infty$$

$$(iii) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c_n/a_n = 0 \quad (\sup_n |c_n/a_n| < \infty)$$

$$(iv) \quad \sum_{n=1}^{\infty} d_n < \infty$$

$$(v) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \sum_{k=1}^n b_k/a_k = 0 \quad (\sup_n |a_n \sum_{k=1}^n b_k/a_k| < \infty)$$

こうして, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ は非負実数列で次の不等式を満たす

$$(2.7) \quad x_{n+1} \leq \max \{h_n, (1-a_n)x_n + b_n + c_n + d_n\}, \quad n=1, 2, \dots$$

このとき、次のことが成り立つ

$$(2.8) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \quad (\sup_{n \in \mathbb{N}} x_n < \infty).$$

略証)

N, n を任意の整数とし $N < n$ とする。また, $A_{m,n} \equiv 1$,

$$A_{k,n} = \prod_{t=k}^n (1 - a_t) \quad (k \leq n) \quad \text{とおくと次のことが成立。}$$

$$x_{n+1} \leq \max_{N \leq k \leq n} \{ A_{k+1,n} h_k \} + A_{N,n} x_N + 2 \max_{N \leq k \leq n} \left| \sum_{j=k}^n A_{j+1,n} b_j \right|$$

ここで $B_n = b_n + c_n + d_n \quad (n \geq 1)$ とする。このとき,

$$(1) \quad \max_{N \leq k \leq n} \{ A_{k+1,n} h_k \} \leq \sup_{N \leq k} \{ h_k \}$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} A_{N,n} = 0 \quad (\forall \text{fixed } N)$$

$$(3) \quad \left| \sum_{j=k}^n A_{j+1,n} b_j \right| \\ \leq \sum_{j=1}^n A_{j+1,n} (|c_j| + |d_j|) + \left| \sum_{j=k}^n A_{j+1,n} b_j \right|$$

ここで Lemma 2 より $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n A_{j+1,n} (|c_j| + |d_j|) = 0$

(布署). 従, 2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{N \leq k \leq n} \left| \sum_{j=k}^n A_{j+1,n} b_j \right| = 0 \in \mathbb{R}$

となる。

$$\begin{cases} d_n = a_n \sum_{j=1}^n b_j / a_j \quad (n \geq 1) \\ d_0 = 0, \quad a_0 \neq 0 \end{cases}$$

とおこうと, $b_j/a_j = a_j/a_j - a_{j-1}/a_{j-1} \quad (j \geq 1)$

$$\text{従, 2} \quad \sum_{j=k}^n A_{j+1,n} b_j = a_n A_{n,n} \frac{d_n}{a_n} - a_{n-1} A_{n,n} \frac{d_{n-1}}{a_{n-1}} \\ + \sum_{j=k}^{n-1} \frac{a_j}{a_j} (a_j A_{j+1,n} - a_{j+1} A_{j+2,n})$$

; Abel の変換.

$$\text{よ, 2,} \quad \left| \sum_{j=k}^n A_{j+1,n} b_j \right| \leq |d_n| + C_0 |d_{n-1}| + C_1 \sum_{j=k}^{n-1} |a_j| |b_j| A_{j+1,n}$$

従で、 $\max_{N \in \mathbb{N}, n} \left| \sum_{j=1}^n A_{j+n, m} b_j \right| \leq (C_0 + 1) \sup_{N \leq k} |A_{k+1}| + C_1 \sum_{j=1}^{n-1} c_{j+1} |A_{j+m}|$
 ここで、 C_0, C_1 は正の定数。したがって Lemma 2 と
 $\lim_{n \rightarrow \infty} |A_n| = 0$ より証明終わり。□

Lemma 5 (A strong law of large numbers ([2]))

(Ω, \mathcal{A}, P) ; 確率空間。

$\{\mathcal{B}_n\}_{n=1}^{\infty}$; \mathcal{A} の sup-\$\sigma\$-fields の 3・

$\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$; 実数値 RV's の 3・を各 X_n は \mathcal{B}_n -可測

(i) \exists 正の整数 n_0 , $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi(\bigvee_{i=1}^n \mathcal{B}_i, \bigvee_{i=n+n_0}^{\infty} \mathcal{B}_i) < 1$

ここで $\phi(A_1, A_2) = \sup_{B \in \mathcal{A}_2} \{ \text{ess.sup } |P(B|A_1) - P(B)| \}$

(A_1, A_2 の従属度数)

(ii) $\sum_{n=1}^{\infty} p_n^{1/2} < \infty$, ここで $p_n = \sup_m \phi(\mathcal{B}_m, \mathcal{B}_{m+n})$

(iii) $\{k_n\}_{n=1}^{\infty}$ を単調増加な正の実数列と $\lim_{n \rightarrow \infty} k_n = \infty$

とし, $\sum_{n=1}^{\infty} E(X_n - EX_n)^2 / k_n^2 < \infty$ が成り立つ。

このとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} k_n^{-1} \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i) = 0$ a.s.

が成り立つ。

Lemma 6

$T_n, n=1, 2, \dots$ を $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ なる可測変換とし

(2.9) $\|T_n(r)\|^2 \leq \max \{ f_n, (1-d_n) \|r\|^2 \}$, $r \in \mathbb{R}^n, n=1, 2, \dots$

を満たす。ここで $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{d_n\}_{n=1}^{\infty}$ は実数列で

(i) $f_n \geq 0$ ($n \geq 1$), $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = 0$

(ii) $0 < d_n < 1$ ($n \geq 1$), $d_n \downarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \infty, \quad \sup_n |\alpha_n - \alpha_n^-| < \infty$$

また, X_1 を \mathbb{R}^N -valued r.v. とし X_2, X_3, \dots を次の様に定義

すなはち; $X_{n+1} = T_n(X_n) + U_n + V_n, \quad n = 1, 2, \dots$,

ここで $\{U_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{V_n\}_{n=1}^{\infty}$ は \mathbb{R}^N -valued r.v.'s である.

(iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n^- \|U_n\| = 0 \quad \text{a.s.}$

(iv) \exists 正の単調非増加数列 $\{\beta_n\}_{n=1}^{\infty}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \beta_n^- \left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k^- V_k \right\| = 0 \quad \text{a.s.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^- \beta_n^- \|V_n\|^2 < \infty \quad \text{a.s.} \quad (\text{or } \sup_n \alpha_n^- \beta_n^- \|V_n\| < \infty \text{ a.s.})$$

(v) $\sum_{n=1}^{\infty} \beta_n^- \|T_n(X_n) - T_{n+1}(X_{n+1})\| < \infty \quad \text{a.s.}$.

以上が成り立つならば $\lim_{n \rightarrow \infty} \|X_n\| = 0 \quad \text{a.s.}$ となる。

3.

略証)

$$\begin{aligned} \|X_{n+1}\|^2 &\leq \max \left\{ Z_n, \left(1 - \frac{\alpha_n}{2}\right) \|X_n\|^2 + 2\alpha_n \langle T_n(X_n), V_n' \rangle \right. \\ &\quad \left. + 2\alpha_n^2 \|V_n'\|^2 + 4\alpha_n \|U_n'\|^2 \right\} \end{aligned}$$

$$\left(\leq \max \left\{ Z_n, \left(1 - \frac{\alpha_n}{4}\right) \|X_n\|^2 + 6\alpha_n \|V_n'\|^2 + 4\alpha_n \|U_n'\|^2 \right\} \right)$$

$$\text{ここで, } Z_n = 2(\beta_n + \|U_n + V_n\|^2), \quad V_n' = \alpha_n^- V_n, \quad U_n' = \alpha_n^- U_n.$$

このとき, 次の (1) ~ (3) が仮定より成り立つ.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} Z_n = 0 \quad \text{a.s.}$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \|U_n'\|^2 = 0 \quad \text{a.s.}$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \|V_n'\|^2 = 0 \quad \text{a.s.}$

これら

$$(4) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} d_n \sum_{k=1}^n \langle T_k(X_k), V'_k \rangle = 0 \quad a.s.$$

が成り立つと Lemma 4 に於り定理は証明済み。

(4) の証明；

$$T_n = d_n \sum_{k=1}^n \langle T_k(X_k), V'_k \rangle$$

$$S_n = 0, \quad S_n = d_n \beta_n' \sum_{k=1}^n V'_k$$

とおくと Abel の変換により次式を得る。

$$\|T_n\| \leq \beta_n \|S_n\| \|T_n\| + d_n \sum_{k=1}^n \|T_{k+1} - T_k\| \beta_k' \beta_k \|S_k\|$$

ここで

$$\begin{aligned} \beta_{n+1} \|X_{n+1}\|^2 &\leq \max \left\{ \beta_n \beta_n, (1 - \frac{d_n}{4}) \beta_n^2 \|X_n\|^2 + G d_n \beta_n^2 \|V'_n\|^2 \right. \\ &\quad \left. + 4 d_n \beta_n^2 \|U'_n\|^2 \right\}. \end{aligned}$$

したがって Lemma 4 に於く

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n^2 \|T_n\|^2 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n^2 \|X_n\|^2 + \beta_n^2 \beta_n = 0 \quad a.s.$$

(有界 a.s.) より Lemma 1 に於く $\lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| = 0 \quad a.s.$

したがって (4) が示された。□

例 $a_n = n^2, \quad X_{n+1} = T_n(X_n) + n^2 U'_n + n^2 V'_n, \quad n=1,2,\dots$

$$(iii)' \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|U'_n\| = 0 \quad a.s.$$

$$(iv)' \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|n^2 \sum_{k=1}^n V'_k\| = 0 \quad a.s.$$

$$\sup_n n^2 \|V'_n\| < \infty \quad a.s.$$

$$(v)' \quad \sum_{n=1}^{\infty} \|T_n(X_n) - T_{n+1}(X_{n+1})\| < \infty \quad a.s.$$

が成り立つことは Lemma 6 に於く $\beta_n = 1$ と 1 条件を満たす。従って $\lim_{n \rightarrow \infty} \|X_n\| = 0 \quad a.s.$ となる。

§ 3. Main Result

Assumptions 以下において δ は正の実数で $0 < \delta \leq \frac{1}{11}$ とする. $\{\theta_n\}_{n=1}^{\infty}$ は \mathbb{R}^N のベクトル列とする. さらに, $\{\beta_n f_n\}_{n=1}^{\infty}$ は σ -fields の列とし, $\beta_n = \sigma(Y_n)$ ($n=1, 2, \dots$) とする.

$$(A0) \quad 0 < a_n < 1 \quad (n \geq 1), \quad a_n \downarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

$$(A1) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty.$$

$$(A2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1+\delta} < \infty.$$

$$(A3) \quad \sup_n |a_n - a_{n+1}| < \infty.$$

(H0) $\Phi_n(x, y) = (x - \theta_n) A_n(x, y) + T_n(x, y)$, $n=1, 2, \dots$, $x \in \mathbb{R}^N$, $y \in \mathbb{R}^M$. ここで, 各 n に対し $A_n(x, y)$ は $N \times N$ -行列とし (i, j) 成分 = $\sum_{p=1}^{M_1} f_n^{ijp}(x) g_n^{jp}(y)$, M_1 は正の整数.

$T_n(x, y)$ は $\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M \rightarrow \mathbb{R}^N$ なる可測写像で, オイ成分は $\sum_{p=1}^{M_2} \delta_n^{ijp}(x) E_n^{ip}(y)$, M_2 は正の整数. ここで $f_n^{ijp}, g_n^{jp}, \delta_n^{ijp}$, E_n^{ip} は全て実数値 Borel 関数とする.

$$(H1) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1+\delta} E \left(\max_{i,j,p} \{g_n^{ijp}(Y_n)\}^2 \right) < \infty.$$

$$(H2) \quad \sup_{n,i,j,p} |f_n^{ijp}(x)| \leq K_1 < \infty.$$

$$(H3) \quad \exists K_2 > 0; \sup_{n,i,j,p} |f_n^{ijp}(x) - f_n^{ijp}(x')| \\ \leq K_2 \|x - x'\| \quad (x, x' \in \mathbb{R}^N).$$

$$(H4) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1+\delta} \sup_{i,j,p} |f_n^{ijp}(x) - f_{n+1}^{ijp}(x)| < \infty.$$

$$(H5) \quad \exists d_0 > 0; \langle x - \theta_n, (x - \theta_n) A_n(x, y) \rangle \geq 0$$

$$(y \in \mathbb{R}^M, \|x - \theta_n\| > d_0).$$

(H 6) $\exists d_1 > 0$, \exists 非負実数列 $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0$;

$$\langle x - \theta_n, (x - \theta_n) E[A_n(x, Y_n)] \rangle \geq d_1 \|x - \theta_n\|^2$$

$$\text{if } \|x - \theta_n\|^2 > h_n$$

$$(H 7) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1+\delta} E[\max_{i,p} E_n^{ip}(Y_n)]^2 < \infty$$

$$(H 8) \quad E[E_n^{ip}(Y_n)] = 0 \quad (1 \leq i \leq N, 1 \leq p \leq M_i, i \leq n)$$

$$(H 9) \quad \sup_{\substack{x, n \\ x, i, p}} |\gamma_n^{ip}(x)| \leq K_3 < \infty$$

$$(H 10) \quad \exists K_4 > 0 ; \sup_{n, i, p} |\gamma_n^{ip}(x) - \gamma_n^{ip}(x')| \leq K_4 \|x - x'\|$$

$$(H 11) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{2\delta} \sup_{x, i, p} |\gamma_n^{ip}(x) - \gamma_{n+1}^{ip}(x)| < \infty$$

$$(H 12) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{-1} \|\theta_n - \theta_{n+1}\| = 0$$

$$(H 13) \quad \exists n_0 \text{ (正の整数)} ; \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \phi(\bigvee_{i=1}^n B_i, \bigvee_{i=n+n_0}^{\infty} B_i) < 1$$

$$(H 14) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \sup_m \phi(B_m, B_{mn})^{\frac{1}{2}} < \infty$$

[注] 假定 (A 0) と (H 8) より θ_n は 方程式

$$E[\Phi_n(x, Y_n)] = 0$$

の解となる。

THEOREM

假定 (A 0) ~ (A 3), (H 0) ~ (H 14) が成り立つなら 3.2 で定義された procedure のもとで次のことが成り立つ。

$$(3.1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|X_n - \theta_n\| = 0 \quad \text{a.s.}$$

上の定理は以下の補題と 3.2 の Lemma を用いて示される。

補題1

(i) (H1), (H2) が成り立つならば次のことが成り立つ.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^{1+\delta} E \|A_n(X_n, Y_n)\|_N^2 < \infty,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^{1+\delta} \sup_x E \|A_n(x, Y_n)\|_N^2 < \infty.$$

(ii) (H7), (H9) が成り立つならば次のことが成り立つ.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^{1+\delta} E \|T_n(X_n, Y_n)\|_N^2 < \infty$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^{1+\delta} \sup_x E \|T_n(x, Y_n)\|_N^2 < \infty$$

証) 省略.

補題2 仮定 (H0) ~ (H2), (H5), (H7), (H9), (H12)

が成り立つならば次のことが成り立つ;

\exists a.s. finite r.v. $L_0 > 0$; $\|X_n - \theta_n\| \leq \alpha_n^{-\delta} L_0$ a.s.

略証) (2.3) と (H5) より

$$\begin{aligned} \|X_{n+1} - \theta_{n+1}\| &\leq \max \left\{ \alpha_0 (1 + \alpha_n \|A_n(X_n, Y_n)\|_N) + \alpha_n \|T_n(X_n, Y_n)\|_N \right. \\ &\quad \left. + \|\theta_n - \theta_{n+1}\|, (1 + \alpha_n^2 \|A_n(X_n, Y_n)\|_N^2) \|X_n - \theta_n\| + \alpha_n \|T_n(X_n, Y_n)\|_N \right. \\ &\quad \left. + \|\theta_n - \theta_{n+1}\| \right\} \end{aligned}$$

従って, Lemma 3 と補題1 により $\alpha_n^\delta \|X_n - \theta_n\|$ は a.s. 有界となる. \square

補題3 補題2の仮定が成立しそうに (A3) が成り立つ
ならば次の(i), (ii) が成り立つ.

$$(i) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^{2\delta} \|X_n - X_{n+1}\| < \infty \quad \text{a.s.},$$

$$(ii) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^{2\delta} \|T_n(X_n) - T_{n+1}(X_{n+1})\| < \infty \quad \text{a.s.},$$

ここで, $T_n(x) = (x - \theta_n)(I - a_n \hat{A}_n(x))$, $\hat{A}_n(x) = E(A_n(x, Y_n))$.

証明)

$$\begin{aligned} \|X_n - X_{n+1}\| &\leq a_n \|X_n - \theta_n\| \|A_n(X_n, Y_n)\|_N + a_n \|T_n(X_n, Y_n)\| \\ &\leq L_0 a_n^{\delta} \|A_n(X_n, Y_n)\|_N + a_n \|T_n(X_n, Y_n)\|. \end{aligned}$$

従って (i) が成り立つ。 - 方

$$\begin{aligned} \|T_n(X_n) - T_{n+1}(X_{n+1})\| &\leq \|X_n - X_{n+1}\| + \|\theta_n - \theta_{n+1}\| + a_n \|X_n - \theta_n\| \|\hat{A}_n(X_n)\|_N \\ &\quad + a_{n+1} \|X_{n+1} - \theta_{n+1}\| \|\hat{A}_{n+1}(X_{n+1})\|_N. \end{aligned}$$

ここで $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1+2\delta} \|X_n - \theta_n\| \|\hat{A}_n(X_n)\|_N \leq L_0 \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1+\delta} \|\hat{A}_n(X_n)\|_N < \infty$ a.s.

$$a_n^{2\delta} a_{n+1} \|X_{n+1} - \theta_{n+1}\| \|\hat{A}_{n+1}(X_{n+1})\|_N = a_{n+1}^{1+2\delta} \|X_{n+1} - \theta_{n+1}\| \|\hat{A}_{n+1}(X_{n+1})\|_N \left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)^{\delta}.$$

仮定 (A3) より $\sup_n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)^{\delta} < \infty$. 従って, (i) が成り立つことより (ii) も成り立つ. \square

補題4

(i) (H1) ~ (H6), (H12) ~ (H14), (A0) ~ (A3) が成り立つ

ならば $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{1+2\delta} \left\| \sum_{k=1}^n V_k \right\| = 0$ a.s.

ここで $V_k = (X_k - \theta_k)(\hat{A}_k(X_k) - A_k(X_k, Y_k))$ ($k=1, 2, \dots$).

(ii) (H7) ~ (H14), (A0) ~ (A3) が成り立つならば

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{1+2\delta} \left\| \sum_{k=1}^n U_k \right\| = 0 \text{ a.s.}$$

ここで $U_k = T_k(X_k, Y_k)$ ($k=1, 2, \dots$).

証明) $X_n - \theta_n \stackrel{d}{=} \chi_n = (\chi_n^1, \dots, \chi_n^n)$, $Z_n \stackrel{d}{=} a_n^{-1} \sum_{k=1}^n V_k$.

V_n の第*i*-成分を V_n^i とすと

$$V_n^i = \sum_{j=1}^n \chi_n^j \sum_{p=1}^{M_j} f_n^{ijp}(X_n) (\hat{g}_n^{ijp} - g_n^{ijp}(Y_n)),$$

ここで $\hat{g}_n^{ijp} = E[g_n^{ijp}(Y_n)]$, Z のオ i 成分を Z_n^i とおくと

$$Z_n^i = a_n^{1-2\delta} \sum_{k=1}^n V_k^i = a_n^{1-2\delta} \sum_{j=1}^M \sum_{p=1}^n \sum_{k=1}^n \left\{ X_k^j f_k^{ijp}(X_k) (\hat{g}_k^{ijp} - g_k^{ijp}(Y_k)) \right\}.$$

さら k , 次の様に Z_n^{ijp}, S_n^{ijp} を定義する.

$$Z_n^{ijp} = a_n^{1-2\delta} \sum_{k=1}^n X_k^i f_k^{ijp}(X_k) (\hat{g}_k^{ijp} - g_k^{ijp}(Y_k)),$$

$$S_n^{ijp} = a_n^{1-\delta} \sum_{k=1}^n (\hat{g}_k^{ijp} - g_k^{ijp}(Y_k)), \quad S_0^{ijp} = 0.$$

ここで, $\hat{\delta} = 5\delta$ とする. このとき, (H1), (H13), (H14)

と $0 < \delta \leq \frac{1}{11}$ ($1+\delta \leq 2-2\hat{\delta}$) より Lemma 5 を用いて

$\lim_{n \rightarrow \infty} |S_n^{ijp}| = 0$ a.s. を得る. 従って, ある正の
a.s. 有限な $R.D. L_1$ が存在して $|S_n^{ijp}| \leq L_1$ a.s.

となる. 一方 Abel の変換より

$$Z_n^{ijp} = a_n^{1-2\delta} X_n^i f_n^{ijp}(X_n) a_n^{\hat{\delta}-1} S_n^{ijp} + a_n^{1-2\delta} \sum_{k=1}^{n-1} a_k^{\hat{\delta}-1} (X_k^i f_k^{ijp}(X_k) - X_{k+1}^i f_{k+1}^{ijp}(X_{k+1})) S_k^{ijp}.$$

$$|Z_n^{ijp}| = a_n^{\hat{\delta}-2\delta} |S_n^{ijp}| |f_n^{ijp}(X_n)| |X_n^i| + a_n^{1-2\delta} \sum_{k=1}^{n-1} a_k^{\hat{\delta}-1} |S_k^{ijp}| |X_k^i f_k^{ijp}(X_k) - X_{k+1}^i f_{k+1}^{ijp}(X_{k+1})|.$$

以下 i, j, p を省略して表す.

$$\begin{aligned} & |X_k f_k(X_k) - X_{k+1} f_{k+1}(X_{k+1})| \\ & \leq |X_k - X_{k+1}| |f_{k+1}(X_{k+1})| + |X_k| (|f_k(X_k) - f_{k+1}(X_k)| + |f_{k+1}(X_k) - f_{k+1}(X_{k+1})|) \\ & \leq K_1 (||X_k - X_{k+1}|| + ||\theta_k - \theta_{k+1}||) + L_0 a_k^{\hat{\delta}} (T_k + K_2 ||X_k - X_{k+1}||) \\ & = (K_1 + K_2 a_k^{\hat{\delta}} L_0) ||X_k - X_{k+1}|| + K_1 ||\theta_k - \theta_{k+1}|| + a_k^{\hat{\delta}} T_k L_0, \end{aligned}$$

ここで $T_k = \sup_{x, i, j, p} |f_k^{ijp}(x) - f_{k+1}^{ijp}(x)|$. 従って

$$\begin{aligned} |Z_n^{ijp}| & \leq K_1 a_n^{\hat{\delta}-2\delta} |S_n^{ijp}| \cdot L_0 + L_1 a_n^{1-2\delta} \left\{ \sum_{k=1}^{n-1} a_k^{\hat{\delta}-1} (K_1 + K_2 a_k^{-\hat{\delta}} L_0) ||X_k - X_{k+1}|| + K_1 \sum_{k=1}^{n-1} a_k^{\hat{\delta}-1} ||\theta_k - \theta_{k+1}|| + L_0 \sum_{k=1}^{n-1} a_k^{\hat{\delta}-\hat{\delta}-1} T_k \right\}. \end{aligned}$$

ここで $\hat{\delta} = 5\delta$ より

$$(3.2) \quad K_1 a_n^{2\delta} |S_n^{\text{hyp}}| L_0 \rightarrow 0 \quad \text{a.s. as } n \rightarrow \infty.$$

補題3(i) と Lemma 1 より

$$(3.3) \quad a_n^{1-2\delta} \sum_{k=1}^n a_k^{\hat{\delta}-1} (K_1 + K_2 a_k^{-\delta} L_0) \|X_k - X_{k+1}\| \rightarrow 0 \quad \text{a.s. as } n \rightarrow \infty.$$

また $\|\theta_k - \theta_{k+1}\| \leq C a_k$ と Lemma 1 より

$$(3.4) \quad a_n^{1-2\delta} \sum_{k=1}^n a_k^{\hat{\delta}-1} \|\theta_k - \theta_{k+1}\| \rightarrow 0 \quad \text{as } n \rightarrow \infty.$$

さらに、仮定(H4)と Lemma 1 より

$$(3.5) \quad a_n^{1-2\delta} \sum_{k=1}^n a_k^{\hat{\delta}-\delta-1} \tau_k \rightarrow 0 \quad \text{as } n \rightarrow \infty$$

以上 (3.2) ~ (3.5) より $\lim_{n \rightarrow \infty} |\Sigma_n^{\text{hyp}}| = 0$ a.s.

いたが、て $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\Sigma_n\| = 0$ a.s. となる。 (ii) もまた同様に 1 て証明出来る。 \square

定理の証明)

(2.3) より

$$X_{n+1} - \theta_{n+1} = (X_n - \theta_n)(I - a_n \widehat{A}_n(X_n)) + U_n + V_n + W_n,$$

ここで $U_n = a_n T_n(X_n, Y_n)$, $V_n = a_n (X_n - \theta_n)(\widehat{A}_n(X_n) - A_n(X_n, Y_n))$,

$W_n = (\theta_n - \theta_{n+1})$ とする。 §2 の Lemma 6 において

$$T_n(x) = (x - \theta_n)(I - a_n \widehat{A}_n(x)), \quad \beta_n = a_n^{2\delta}, \quad \alpha_n = \sigma, a_n$$

とある。 Lemma 6 の条件を満たすことを示すとよい。

$$\|x\|^2 \leq h_n \text{ のとき;}$$

$$\|T_n(x)\|^2 \leq 2h_n (1 + a_n^2 \sup_x \|\widehat{A}_n(x)\|^2) \equiv \widehat{h}_n.$$

$$\|x\|^2 > f_n \text{ のとき};$$

$$\|\bar{T}_n(x)\|^2 \leq (1 - \alpha, a_n) \|x\|^2 \quad (\text{仮定 (H6) より})$$

従って

$$\|\bar{T}_n(x)\|^2 \leq \max \{ \hat{f}_n, (1 - \alpha, a_n) \|x\|^2 \}, \quad n=1, 2, \dots$$

一方、補題1と補題2より $\beta_n = a_n^{1+\delta}$ に注意して

$$\begin{aligned} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{-1} a_n^{1+\delta} a_n^2 \|\bar{T}_n(X_n, Y_n)\|^2 &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1+\delta} \|\bar{T}_n(X_n, Y_n)\|^2 < \infty \quad \text{a.s.} \\ \cdot \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{-1} a_n^{1+\delta} a_n^2 \|X_n - \theta_n\|^2 \|\bar{A}_n(X_n) - A_n(X_n, Y_n)\|_n^2 \\ &\leq L_2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1+\delta} \|A_n(X_n, Y_n)\|_n^2 < \infty \quad \text{a.s.}, \end{aligned}$$

L_2 は a.s. 有限の正の r.v. さらに 補題3(ii) が成り立つ

したがって Lemma 6 の条件が全て満たされ、よって証明

了 \square

References

- [1] Löve, M. ; Probability Theory . Van Nostrand, 1960.
- [2] Iosifescu, M. and Theodoreescu, R. ; Random processes and learning . Springer, 1969.
- [3] Mendel, J.M. and Fu, K.S. ; Adaptive, learning and pattern recognition system, Theory and application . Academic Press, 1970.
- [4] Robbins, H. and Monro, S. ; A stochastic

- approximation method. Ann. Math. Stat., 22
(1951), 400-407.
- [5] Venter, J.H. : On Dvoretzky stochastic approximation theorems. Ann. Math. Stat., 37 (1966), 1534-1544.
- [6] Wasan, M.T. ; Stochastic approximation method. Cambridge Univ. Press, 1969.
- [7] Watanabe, M. ; On asymptotically optimal algorithms for pattern classification problems. Bull. Math. Stat., Vol.15, No.3-4 (1973), 31-48.
- [8] Watanabe, M. ; An almost sure convergence theorem in a stochastic approximation method with dependent random variables. Bull. Math. Stat., Vol. 18, No. 3-4 (1979), 95-112.