

表現のテンソル積と Plancherel formula について

三重大学 教育 土川真夫

0. 序

k を locally compact, non-discrete, totally disconnected topological field とする。 $SL_2(k)$ のある series α への unitary 表現 $\mathcal{R}_{\pi_1}, \mathcal{R}_{\pi_2}$ による tensor 積 $\mathcal{R}_{\pi_1} \otimes \mathcal{R}_{\pi_2}$ の 既約分解の公式を与えることを考へる。他の色々な群の表現に關する類似の問題は、主として Mackey, Neumark, Pukanszky, Williams, Martin, Repka 等により考へられてゐる。特に Martin [1] は $SL_2(k)$ の表現の tensor 積 $\mathcal{R}_{\pi_1} \otimes \mathcal{R}$ で、 \mathcal{R}_{π_1} は principal, \mathcal{R} は任意の既約 unitary 表現という場合を考へ、分解に表われる表現とその重複度と關する公式を与へてゐる。その中には Mackey-Anh の Reciprocity Theorem を使うが、例之は " $\mathcal{R}_{\pi_1}, \mathcal{R}_{\pi_2}$ とともに主系列表現 α とす、

$$\mathcal{R}_{\pi_1} \otimes \mathcal{R}_{\pi_2} \simeq 4 \int_{\pi(-1) = \pi_1 \pi_2(-1)} \mathcal{R}_{\pi} d\mu(\pi) \oplus 4C(\pi_1 \pi_2) \mathcal{R}_{-1} \oplus$$

$$2 \sum_{\tau \in \{E, P, \varepsilon P\}} \sum_{\pm} \sum_{\substack{\pi_{\tau} \in \hat{C}_{\tau}, \text{ord. } \pi_{\tau} \neq 2 \\ \pi_{\tau} \text{ agn}_{\tau}(-1) = \pi_1 \pi_2(-1)}} \mathcal{R}_{\pi_{\tau}}^{\pm} \oplus d(\pi_1 \pi_2) \{ \mathcal{R}_0^{+,1} \oplus \mathcal{R}_0^{+,2} \oplus \mathcal{R}_0^{-,1} \oplus \mathcal{R}_0^{-,2} \}$$

2.5.2.2.13. $\tau = \varepsilon$

$$C(\pi_1 \pi_2) = \begin{cases} 1 & \pi_1 \pi_2(-1) = 1 \\ 0 & \pi_1 \pi_2(-1) = -1 \end{cases}, \quad d(\pi_1 \pi_2) = \begin{cases} 1 & \pi_1 \pi_2(-1) = \pi_{\varepsilon}^{\circ} \text{ agn}_{\varepsilon}(-1) \\ 0 & \pi_1 \pi_2(-1) \neq \pi_{\varepsilon}^{\circ} \text{ agn}_{\varepsilon}(-1) \end{cases}$$

$\pi_{\varepsilon}^{\circ}$ は C_{ε}° の order 2 の指標, $\pi_{\varepsilon}^{\circ} \text{ agn}_{\varepsilon}(-1)$ は $-1 \in (k^{\times})^2$ のとき -1 , $-1 \notin (k^{\times})^2$ のとき $+1$, \mathcal{R}_{π} は principal の, \mathcal{R}_{-1} は special, $\mathcal{R}_{\pi_{\tau}}^{\pm}$ は discrete series の表現で, $\mathcal{R}_0^{+,1} \oplus \mathcal{R}_0^{+,2}$, $\mathcal{R}_0^{-,1} \oplus \mathcal{R}_0^{-,2}$ は split discrete series の表現である。 $\{d\mu, \Sigma\}$ は $SL_2(k)$ の Plancherel measure と同値な measure である。

よって我々は Plancherel 公式そのものを使って, $\mathcal{R}_{\pi_1}, \mathcal{R}_{\pi_2}$ が principal または supplementary series の表現の場合の $\mathcal{R}_{\pi_1} \otimes \mathcal{R}_{\pi_2}$ の分解公式をより explicit に 2.5.2.3.2 を試みるものがある。

1. k に関するよく知られていること

k を上記の位相体, k^{\times} をその乗法群, O を整数環, P をその極大イデアル, $p \in P = pO$ とする元とする。 k 上の付値を v とすると, $|p| = q^{-1} = |O/P|^{-1}$ である。 ε を k^{\times} の 1

の原始 $q-1$ 乗根とする。このとき k の 2 次拡大 $k(\sqrt{\tau})$ は $\tau = \varepsilon, p, \varepsilon p$ で表される。 $z = x + \sqrt{\tau}y \in k(\sqrt{\tau})$ に対して, $\bar{z} = x - \sqrt{\tau}y$, $S(z) = z + \bar{z}$, $N(z) = z\bar{z}$ とする。 $N(k(\sqrt{\tau})^\times) = k_\tau^\times$ とおくと, k_τ^\times は k^\times の subgroup である。

$k^\times \supset k_\tau^\times \supset (k^\times)^2$, $[k^\times : k_\tau^\times] = [k_\tau^\times : (k^\times)^2] = 2$ である。また $k^\times / (k^\times)^2$ の代表系は $\{1, \varepsilon, p, \varepsilon p\}$ である。また k^\times の符号 sgn_τ は次の様に定義される。

$$\text{sgn}_\tau x = \begin{cases} 1 & x \in k_\tau^\times \\ -1 & x \in k^\times - k_\tau^\times \end{cases}$$

$\chi \in k$ の (加法) 指標として $\chi(x) = 1 \Leftrightarrow x \in \mathcal{O}$ となるものとする。また $\pi \in k^\times$ の (乗法) 指標とする。 $k^\times \simeq \mathbb{Z} \times \mathcal{O}^\times$ ($\mathcal{O}^\times = \mathcal{O} - \mathcal{P}$) であるから

$$\pi(x) = |x|^\alpha \pi^\times(x)$$

と表わすことが出来る。ただし, π^\times は \mathcal{O}^\times の指標 $\pi^\times(p) = 1$ によつて k^\times に拡張した指標である。 $\pi^\times \equiv 1$ のとき, π は unramified, $\pi^\times(x) = 1 \Leftrightarrow x \in 1 + \mathcal{P}^h$ (h : 正整数) のとき, π は ramified of degree h である。 π が unitary である必要十分条件は $\text{Re}(\alpha) = 0$ である。 $\alpha = i\lambda$, $\frac{-\pi}{\log q} \leq \lambda \leq \frac{\pi}{\log q}$ としよ。 k^\times のユニタリ指標全体を \hat{k}^\times とする。

\mathcal{S} は k 上の complex-valued, compactly supported, locally constant function 全体とし, \mathcal{S}^\times は k^\times 上の全標

な関数全体とする。 $\hat{f} \in \mathcal{S}$ の Fourier 変換による像とすれば $\hat{\hat{f}} = f$, $\hat{f} \times \in \mathcal{S} \times$ の Fourier 変換 (乗法の Fourier 変換 = Mellin 変換) とする。

右上の Gamma 関数は次のように定義される:

$$\Gamma(\alpha) = P - \int_{\mathbb{R}^{\times}} \pi(x) \chi(x) d^{\times}x = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathfrak{q}^{-n} \leq |x| \leq \mathfrak{q}^n} \pi(x) \chi(x) d^{\times}x$$

π が unramified α とし, つまり $\pi(x) = |x|^{\alpha}$ のとき, 積分は $\operatorname{Re}(\alpha) > 0$ のときで実際に収束し, その値は

$$\Gamma(1-\alpha) = \frac{1-\mathfrak{q}^{\alpha-1}}{1-\mathfrak{q}^{-\alpha}}$$

であり, $\zeta = \zeta^{\alpha}$ につき holomorphic, $\operatorname{Re}(\alpha) \leq 0$ へは meromorphic に接続される。実際 $\alpha = 0$ は singular point, $\alpha = 1$ は zero point である。 π が unramified α とし π に対して積分は収束し, 単値関数ととり, 全域で holomorphic である。

2. $G = \mathrm{SL}_2(k)$ の表現

G の部分群を定義する。

$$D = \{d(a) = \begin{pmatrix} a^{-1} & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a \in k^{\times}\}$$

$$N = \{n(y) = \begin{pmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid y \in k\}, L = \{l(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ x & 1 \end{pmatrix} \mid x \in k\}$$

このとき, $\forall g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$, $\delta \neq 0$ に対して unique 分解がある

$$3. \quad g = \begin{pmatrix} a^{-1} & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ x & 1 \end{pmatrix} = d[g]n[g]l[g]$$

k^x の指標 π に対して, $\pi(dn) = \pi(a)$ により $B = DN$ の指標が定義され, 誘導表現 $\mathcal{R}\pi = \text{Ind}_B^G \pi$ が与えられる。具体的

には

$$\mathcal{S}\pi = \text{l. s. } \{ \varphi(x), \pi \rho^{-\frac{1}{2}}(x) \varphi(x) \mid \varphi, \psi \in \mathcal{S} \}$$

($\rho(x) = |x|^2$) とすると, $\varphi \in \mathcal{S}\pi$ に対して

$$T_g^\pi \varphi(x) = \pi \rho^{-\frac{1}{2}}(\beta x + \delta) \varphi\left(\frac{\alpha x + \gamma}{\beta x + \delta}\right)$$

又は単には

$$T_g^\pi \varphi(l) = \pi \rho^{-\frac{1}{2}}(a[lg]) \varphi(l[lg])$$

で定義される operator によって

$$\mathcal{R}\pi = \{ T_g^\pi, \mathcal{S}\pi \}$$

である。

π が unitary のときは, $\mathcal{R}\pi$ は principal series の表現で $\pi = \text{Agn}_\tau$, $\tau = \varepsilon, \rho, \varepsilon\rho$ であるとき既約, $\pi = \text{Agn}_\tau$ のとき, \Rightarrow の既約表現に split する。

$\pi(x) = |x|^\alpha$, $-1 < \alpha < 0$ のとき, $\mathcal{R}\pi$ は supplementary series の表現である。これは内積

$$\langle \varphi_1, \varphi_2 \rangle = \frac{1}{\Gamma(\pi^{-1})} \int \pi^{-1} \rho^{\frac{1}{2}}(x_1 - x_2) \varphi_1(x_1) \overline{\varphi_2(x_2)} dx_1 dx_2$$

によって既約 unitary 表現である。

supplementary series 表現 \mathbb{R}^n $\alpha \rightarrow -1$ としたとき special 表現が表われる。実際には

$$\mathcal{S}_{-1}^0 = \{ \varphi \in \mathcal{S}_\pi, \pi(x) = |x|^{-1}, \int \varphi(x) dx = 0 \}$$

に対して定義される表現 $\mathcal{R}_{-1} = \{ T^\pi, \mathcal{S}_{-1}^0 \}$ \mathbb{R}^n 内積

$$\langle \varphi_1, \varphi_2 \rangle = \int \ln|x_1 - x_2| \varphi(x_1) \overline{\varphi(x_2)} dx_1 dx_2$$

に関する unitary 表現である。

これらの表現のもう一つの表し方として本稿でも利用する χ -realization がある。それは今述べた表現の Fourier 変換として実現されるものである。それは次の形で見られる。

$\hat{\mathcal{S}}_\pi$ 又は $\hat{\mathcal{S}}_{-1}^0 \ni \varphi(u)$ に対して

$$\hat{T}_g^\pi \varphi(u) = \pi(a) |a| \varphi(a^2 u) \quad g = d(a)$$

$$\hat{T}_g^\pi \varphi(u) = \chi(\chi u) \varphi(u) \quad g = l(x)$$

$$\hat{T}_g^\pi \varphi(u) = \int J_\pi(u, v) \varphi(v) dv \quad g = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ただし $J_\pi(u, v)$ は Bessel 核である

$$J_\pi(u, v) = p - \int_{k^x} \chi(-(ut + vt^{-1})) \pi(t) d^x t$$

である。

G の discrete series の表現は, Weil 表現の既約成分として見られる。具体的に

$$(\mathcal{S}^x)_\tau^+ = \mathcal{S}^x |_{\mathbb{R}^x \tau} \ni \varphi(u)$$

とすると

$$T_g^{\pi_\tau^+} \varphi(u) = \pi_\tau \rho_{\text{gen}}(a) |a| \varphi(a^2 u) \quad g = d(a)$$

$$T_g^{\pi_\tau^+} \varphi(u) = \chi(xu) \varphi(u) \quad g = l(x)$$

$$T_g^{\pi_\tau^+} \varphi(u) = a_\tau s_\tau \int J_{\pi_\tau}(u, v) \varphi(v) dv \quad g = w$$

$$\text{h.t.}, \quad a_\tau = \frac{2(1+g^{-1})}{1+|c|}, \quad s_\tau^{-1} = \int_{k(\sqrt{c})} \chi(N(z)) dz$$

$$J_{\pi_\tau}(u, v) = \int_{t \in \hat{C}_\tau} \chi(ut + vt^{-1}) \pi_\tau(t) d^*t$$

π_τ は $C_\tau = \{z \mid N(z) = 1\}$ の指標を $k(\sqrt{c})$ に拡張したもの
であり、表現は同値なものを除いて、拡張の仕方によるもの
と知られている。また $(\mathcal{S}^x)_\tau^- = \mathcal{S}^x|_{k^x, k_c^x}$ 上と同じ
形の operators による表現が構成される。これらから

$$\mathcal{R}_{\pi_\tau^+} = \{T_g^{\pi_\tau^+}, (\mathcal{S}^x)_\tau^+\}, \quad \mathcal{R}_{\pi_\tau^-} = \{T_g^{\pi_\tau^-}, (\mathcal{S}^x)_\tau^-\}$$

である。 $\pi_\tau \in \hat{C}_\tau$ が order 2 の指標になるとき既約で、 order
2 の指標 π_τ^0 の場合、 $\mathcal{R}_{\pi_\tau^0}^\pm \simeq \mathcal{R}_{\pi_\tau^0}^\pm \simeq \mathcal{R}_{\pi_\tau^0}^\pm$ と split する。

$$\mathcal{R}_{\pi_\tau^0}^+ = \mathcal{R}_0^{+,1} \oplus \mathcal{R}_0^{+,2}, \quad \mathcal{R}_{\pi_\tau^0}^- = \mathcal{R}_0^{-,1} \oplus \mathcal{R}_0^{-,2}$$

と書く。

3. $SL_2(k)$ の表現の tensor 積

我々が取扱う表現の tensor 積 $\mathcal{R}_{\pi_1} \otimes \mathcal{R}_{\pi_2} = \{T^{\pi_1} \otimes T^{\pi_2}, \mathcal{S}_{\pi_1} \otimes \mathcal{S}_{\pi_2}\}$ は次の三つの場合である。

(I) $\mathcal{R}_{\pi_1}, \mathcal{R}_{\pi_2}$ が principal series の表現であるとき、

tensor 積表現は $\varphi(x_1, x_2) \in \mathcal{S}_{\pi_1} \otimes \mathcal{S}_{\pi_2}$ に対して

$$(T_g^{\pi_1} \otimes T_g^{\pi_2}) \varphi(x_1, x_2) = \pi_1 \rho^{-\frac{1}{2}}(\beta x_1 + \delta) \pi_2 \rho^{-\frac{1}{2}}(\beta x_2 + \delta) \\ \times \varphi\left(\frac{\alpha x_1 + \delta}{\beta x_1 + \delta}, \frac{\alpha x_2 + \delta}{\beta x_2 + \delta}\right)$$

で、内積

$$B(\varphi_1, \varphi_2) = \int \varphi_1(x_1, x_2) \overline{\varphi_2(x_1, x_2)} dx_1 dx_2$$

で与えられる unitary 表現である。

(II) \mathcal{R}_{π_1} が supplementary series, \mathcal{R}_{π_2} が principal series 表現の場合, operator は \mathcal{R} と同じ、内積

$$B(\varphi_1, \varphi_2) = \frac{1}{\Gamma(\pi_1^{-1})} \int \pi_1^{-1} \rho^{-\frac{1}{2}}(x_1 - x_1') \varphi_1(x_1, x_2) \overline{\varphi_2(x_1', x_2)} dx_1 dx_1' dx_2$$

で与えられる unitary 表現。

(III) $\mathcal{R}_{\pi_1}, \mathcal{R}_{\pi_2}$ がともに supplementary series 表現で、内積は

$$B(\varphi_1, \varphi_2) = \frac{1}{\Gamma(\pi_1^{-1}) \Gamma(\pi_2^{-1})} \int \pi_1^{-1} \rho^{-\frac{1}{2}}(x_1 - x_1') \pi_2^{-1} \rho^{-\frac{1}{2}}(x_2 - x_2') \\ \overline{\varphi_1(x_1, x_2) \varphi_2(x_1', x_2')} dx_1 dx_1' dx_2 dx_2'$$

で与えられる。

以下に与えられた tensor 積 (I), (II), (III) の case と呼ぶ。

$\mathcal{S}(G)$ は G 上の complex-valued, compactly supported, locally constant function 全体としよ。このとき, 次の写像 $U: \mathcal{S}(G) \rightarrow \mathcal{S}_{\pi_1} \otimes \mathcal{S}_{\pi_2}$ が定義される。

$$\mathcal{S}(G) \ni f(g) \rightarrow \pi_1^{-1} \rho^{-\frac{1}{2}}(d[wn]) \int \pi_1^{-1} \pi_2^{-1}(d) f(d(a)nl) d^*a$$

$$= \varphi(l, l[wn]l)$$

$$= \varphi(x, y^{-1} + x) \in \mathcal{S}_{\pi_1} \otimes \mathcal{S}_{\pi_2}$$

また $g = d(a)n(y)l(x)$ である。 $\Rightarrow z$

$$\mathcal{N}_{\pi_1, \pi_2} = \{ \varphi \mid \varphi \in \mathcal{S}_{\pi_1} \otimes \mathcal{S}_{\pi_2}, \exists \varepsilon > 0$$

$$|x_1 - x_2| = \varepsilon \text{ ならば } \varphi(x_1, x_2) = 0 \}$$

また右正則表現を τ_g とする。即ち $\tau_g f(\cdot) = f(\cdot g)$ 。

このとき次の命題が成立する。

Prop. 1 $U: C_c^\infty(G) \ni f \longmapsto \varphi \in \mathcal{N}_{\pi_1, \pi_2}$

は G -morphism τ surjective continuous である。

$$\text{i.e. } U(\tau_g f) = T_g^{\pi_1} \otimes T_g^{\pi_2} \varphi$$

$$\text{and } f_n \rightarrow f_0 \text{ ならば } \varphi_n \rightarrow \varphi_0$$

今 $B(\varphi_1, \varphi_2) \in \text{(I), (II), (III)}$ の case の tensor 積 の 双線型
形式とする。このとき prop 1 と等式 (連続性)

$$B(\varphi_1, \varphi_2) = B(U\varphi_1, U\varphi_2) = B'(f_1, f_2)$$

より $\mathcal{S}(G)$ 上の 連続双線型形式 B' が定義される。核超函数 h' を使って書くと

$$B'(f_1, f_2) = \int h'(g_1, g_2) f_1(g_1) \overline{f_2(g_2)} dg_1 dg_2$$

$$\text{一方 } B(T_g^{\pi_1} \otimes T_g^{\pi_2} \varphi_1, T_g^{\pi_1} \otimes T_g^{\pi_2} \varphi_2) = B(\varphi_1, \varphi_2)$$

$$\text{より } h'(g, g, g_2, g) = h'(g_1, g_2)$$

核超函数の理論から

$$h'(g_1, g_2) = h(g, g_2^{-1})$$

とある $h \in \mathcal{S}(G)$ が存在する。これから

$$B(\varphi_1, \varphi_2) = \int h(g g_2^{-1}) f_1(g_1) f_2(g_2) dg = \int h(g) f'(g) dg$$

$$\text{where } f(g) = \int f_1(g g_1) \overline{f_2(g_1)} dg_1 = f_1 * f_2^*(g), \quad f^*(g) = \overline{f(g^{-1})}$$

(I), (II), (III) の双線型形式に対応する $h(g)$ は具体的に求まらぬ。

prop. 2 (I), (II), (III) に対応する起関数 $h(g)$ は次の通りである。

$g = d(a) n(y) l(x)$ に對して (Δ は δ -関数)

$$(I) \quad h(g) = \pi_1^{-1} \pi_2(a) \Delta(y) \Delta(x)$$

$$(II) \quad h(g) = \frac{1}{\Gamma(\pi_1^{-1})} \pi_1^{-1} \pi_2(a) \Delta(y) \pi_1^{-1} \rho^{-\frac{1}{2}}(x)$$

$$(III) \quad h(g) = \frac{1}{\Gamma(\pi_1^{-1}) \Gamma(\pi_2^{-1})} \pi_1^{-1} \pi_2(a) \pi_2^{-1} \rho^{-\frac{1}{2}}(y) \pi_1^{-1} \rho^{-\frac{1}{2}}(x)$$

4. Plancherel formula と Plancherel transform

2節では G の表現 Σ について principal series の表現または special 表現の χ -表現や discrete series の表現の係数 Σ を改め積分核 $K_\pi(g|u, v)$ で書くことにする。これとは

$$\hat{T}_\alpha^\pi \varphi(u) = \pi \rho^{\frac{1}{2}}(a) \varphi(a^2 u)$$

$$= \int \pi \rho^{\frac{1}{2}}(a) \Delta(v - a^2 u) \varphi(v) dv = \int K_\pi(d|u, v) \varphi(v) dv$$

と同一である。

$\hat{G}_c = \tilde{\mathbb{R}}^x$, $\hat{G}_s = \{\pi_0(x) = |x|^{-1}\}$, $\hat{G}_d = \bigcup_{\tau = \text{e.p. EP}} \hat{C}_\tau$ (ただし
 order 2 の指標は除く), $\hat{G}_{sd} = \{\pi_\varepsilon^0 : C_\varepsilon \text{ 上 の order 2 の指標}\}$
 $\hat{G} = \hat{G}_c \cup \hat{G}_s \cup \hat{G}_d \cup \hat{G}_{sd}$ とする。

$\hat{G} \rightarrow \hat{g}$ に対して

$$K_{\hat{g}}(f|u, v) = \int f(g) K_{\hat{g}}(g|u, v) dg$$

を $f(g)$ の Plancherel 変換としよう。 $K_{\hat{g}}(f|u, v)$ を特徴づけるための関数空間を構成する。

D は $k^x \times k^x \times \hat{G}$ 上の次の条件をみたす関数 $F(u, v, \hat{g})$ 達の作る位相線型空間である。(位相(2)については省略)

(1) (i) $\pi \in \hat{G}_c$ に対して

$$b(u, v, \pi) = \Gamma(\pi) \pi^{-1}(u), \quad c(u, v, \pi) = \Gamma(\pi^{-1}) \pi(v)$$

とおくとき $F(u, v, \hat{g})$ は $k^x \times k^x \times \hat{G}_c$ 上での

F_1, bF_2, cF_3, bcF_4 ; $F_1, F_2, F_3, F_4 \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{S} \otimes \tilde{\mathcal{S}}^x$
 の形の関数の finite linear combination と書ける。

(ii) $F(u, v, \pi^{-1}) = F(u, v, \pi) \pi(u) \pi(v)^{-1}$

(2) $\pi_0 \in \hat{G}_s$ に対して, $F(u, v, \pi_0)$ は

$$F_1, bF_2; \quad F_1(u, v, \pi_0) \in \mathcal{S}^x \otimes \mathcal{S}^x, \quad F_2 \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{S}^x$$

(3) (i) $\mathcal{F}(\hat{G}_d)$ は discrete set \hat{G}_d の finite sequence 全体

とすると $F(u, v, \hat{g}) \in \mathcal{S}^x \otimes \mathcal{S}^x \otimes \mathcal{F}(\hat{G}_\tau)$

(ii) $F(u, v, \pi_\tau^{-1}) = F(u, v, \pi_\tau) \pi_\tau(u) \pi_\tau(v)^{-1}$

(4) $F(u, v, \pi_\varepsilon^0) \in \mathcal{S}^x \otimes \mathcal{S}^x$

この空間によつて Plancherel 変換 $K_{\hat{g}}(f|u, v)$ の特徴づけを行ふ。

Th. 1 (Paley-Wiener 型の定理)

$f \in \mathcal{S}(G)$ の Plancherel 変換 $K_{\hat{g}}(f|u, v)$ は $k^{\times} \times k^{\times}$ \hat{G} 上の関数であつて D に属する。

また

$$P: \mathcal{S}(G) \ni f \longmapsto K_{\hat{g}}(f|u, v) \in D$$

は bijection である。

注意 この定理はほぼ正しいと思ふが証明は P が surjection であることによつて完全に行われなければならない。以下は

$$\mathcal{S}(G) \subset D, \quad P(\mathcal{S}(G)) = D_1$$

と議論する。

$$D_2 = \{ F(u, v, \hat{g}) \in D, \hat{g} \in \hat{G}_d \text{ かつ } F(u, v, \hat{g}) \in \mathcal{S}^{\times} \otimes \mathcal{S}^{\times} \otimes \tilde{\mathcal{S}}^{\times} \}$$

と $D_2 \subset D_1$ であることは証明される。

G 上の Plancherel formula は次の形に与えられる。

$$cf(e) = \int_{\hat{G}_c} \mu(\pi) T_n T^{\pi}(f) d\pi + 2T_n T^{\pi_0}(f)$$

$$+ \sum_{\tau \in \text{E.P.}} \sum_{h=1}^{\infty} \sum_{\substack{\pi_{\tau} \in \hat{G}_c \\ \text{cond } \pi_{\tau} = C_{\tau}^{(h)}}} \mu(\pi_{\tau}) T_n T^{\pi_{\tau}}(f)$$

$$\text{ただし } C = \frac{2(q+1)}{q^2}, \quad \mu(\pi) = \frac{q+1}{q^2} \frac{1}{|\Gamma(\pi)|^2}, \quad \mu(\pi_{\tau}) = q^h \left(\frac{1+|\tau|^{-1}}{2} \right)$$

and π_τ is π_τ a conductor.

\Rightarrow $\tau^{-1} T^\pi(f)$ is f a Plancherel transform $\tau^{-1} \tau^{-1} \tau^{-1}$.

$$T^{\hat{g}}(f) = \int f(g) K_{\hat{g}}(g|u, v) dg = K_g(f|u, v)$$

Prop. 3 次の命題が成り立つ。

(1) $g \circ f(g) = f(g \circ g)$ とおくと

$$K_{\hat{g}}(g \circ f|u, v) = \int K_{\hat{g}}(g \circ f|u, w) K_{\hat{g}}(f|w, v) dw$$

(2) $f'(g) = f(g^{-1})$, $K'_{\hat{g}}(f|u, v) = K_{\hat{g}}(f|-u, -v)$ とおくと

$$K_{\hat{g}}(f'|u, v) = K'_{\hat{g}}(f|v, u) \frac{\pi(v)}{\pi(u)}$$

(3) $K_{\hat{g}}(\bar{f}|u, v) = \overline{K'_{\hat{g}}(f|v, u)}$

(4) $f^*(g) = \overline{f(g^{-1})}$ とおくと

$$K_{\hat{g}}(f^*|u, v) = \overline{K_{\hat{g}}(f|v, u)} \frac{\pi(v)}{\pi(u)}$$

この命題と trace に関する一般論から Plancherel 公式は次の形に書き直せる。

$$\int f_1(g) \overline{f_2(g)} dg = \int_{\hat{G}_\tau} \mu(\pi) K_\pi(f_1|u, v) \overline{K_\pi(f_2|u, v)} du dv d\pi$$

$$+ 2 \int K_{\pi_0}(f_1|u, v) \overline{K_{\pi_0}(f_2|u, v)} \frac{\pi(u)}{\pi(v)} du dv$$

$$+ \sum_{\tau \in \mathcal{E}, \text{zp} h=1} \sum_{\pi_\tau \in \hat{C}_\tau, \text{cond} \pi_\tau = C_\tau^{(h)}} \mu(\pi_\tau) \int K_{\pi_\tau}(f_1|u, v) \overline{K_{\pi_\tau}(f_2|u, v)} du dv$$

$h(g) \in \mathcal{S}'(G)$ とおくと、Plancherel 公式は使えず、

h の Plancherel 変換 $K_{\hat{g}}(h|u, v) \in D_1$ を定義する z が
 出来る。とく 12 前節 2 進 $t_2 = x$ と組合せると

$$\begin{aligned}
 B(\varphi_1, \varphi_2) &= \int h(g) f'(g) dg & (\star) \\
 &= \int_{\hat{G}_c} \mu(\pi) K_{\pi}(h|u, v) K_{\pi}(f_1|w, u) K_{\pi}(f_2'|w, v) dudvdw d\pi \\
 &\quad + 2 \int K_{\pi_0}(h|u, v) K_{\pi}(f_1'|w, u) \overline{K_{\pi}(f_2'|w, v)} \frac{\pi(w)}{\pi(v)} dudv \\
 &\quad + \sum_{\tau} \sum_h \sum_{\pi_{\tau}} \mu(\pi_{\tau}) \int K_{\pi_{\tau}}(h|u, v) K_{\pi_{\tau}}(f_1'|w, u) K_{\pi_{\tau}}(f_2'|w, v) dudvdw
 \end{aligned}$$

前節 24 は h は具体的に f_2 である。

$$(I) \quad h(g) = \pi_1^{-1} \pi_2(a) \Delta(y) \Delta(x)$$

$$(II) \quad h(g) = \frac{1}{\Gamma(\pi_1^{-1})} \pi_1^{-1} \pi_2(a) \Delta(y) \pi_1^{-1} \rho^{-\frac{1}{2}}(x)$$

$$(III) \quad h(g) = \frac{1}{\Gamma(\pi_1^{-1}) \Gamma(\pi_2^{-1})} \pi_1^{-1} \pi_2(a) \pi_2^{-1} \rho^{-\frac{1}{2}}(y) \pi_1^{-1} \rho^{-\frac{1}{2}}(x)$$

$$t_2 \text{ と } t_1 \text{ の } g = d(a)nc(y)l(x) = \begin{pmatrix} a^{-1} & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ x & 1 \end{pmatrix}$$

これら各々の起関数に対する Plancherel 変換 $K_{\hat{g}}(h|u, v)$
 を求めるのが以後の問題である。

5. $K_{\hat{g}}(h|u, v)$ が non-trivial であるための必要條件

$f \in \mathcal{S}(G)$ に対して $df(g) = f(d^{-1}g)$ である。prop. 3 より、

$$K_{\pi}(df|u, v) = \int K_{\pi}(d|u, u_1) K_{\pi}(f|u_1, v) du$$

$$= \pi \rho^{\frac{1}{2}}(a) K_{\pi}(f|a^2u, v), \quad \pi \in \hat{G}_c, \hat{G}_s$$

$h \in \mathcal{S}'(G)$ であつてもこの等式は成り立つ。

$$K_{\pi}(ah|u, v) = \pi \rho^{-\frac{1}{2}}(a) K_{\pi}(h|a^2u, v) \quad \text{--- (1)}$$

一方 $h(g)$ が (I), (II), (III) のうちのどれにあつても

$$ah(g) = \pi_1^{-1} \pi_2(a) h(g)$$

よつて

$$K_{\pi}(ah|u, v) = \pi_1^{-1} \pi_2(a) K_{\pi}(h|u, v) \quad \text{--- (2)}$$

(1), (2) を組合せて

$$K_{\pi}(h|a^2u, v) = \pi_1^{-1} \pi_2 \pi^{-1} \rho^{-\frac{1}{2}}(a) K_{\pi}(h|u, v)$$

よつて $a = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ と (2) 両辺を比較すると

$$\pi_1^{-1} \pi_2 \pi^{-1}(-1) = \pi_1 \pi_2 \pi(-1) = 1$$

よつて $K_{\pi}(h|u, v) = 0$

$\pi \in \hat{G}_d, \hat{G}_{sd}$ の場合も同様にすれば

$$\pi_1^{-1} \pi_2 \pi^{-1} \rho_{\pi}(-1) = \pi_1 \pi_2 \pi \rho_{\pi}(-1) = 1$$

よつて $K_{\pi}(h|u, v) = 0$ であることがわかる。

Th. 2 $\pi_1 \pi_2 \pi(-1) = \pi_1 \pi_2 \pi \rho_{\pi}(-1) \neq 1$ とする a, e, π, π_c

と; $a, e, (u, v) \in k^x \times k^x$ (2) に対して

$$K_{\pi}(h|u, v) = K_{\pi_c}(h|u, v) = 0$$

注 この Th は Martin の公式の積分範囲や, Σ の範囲に対応する。

またこの条件から

$$(\pi_1 \pi_2^{-1} \pi^{-1} \rho^{-\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}}(a) = (\pi_1 \pi_2^{-1} \pi^{-1} \rho^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \rho^{-\frac{1}{2}}(a)$$

$$(\pi_1 \pi_2^{-1} \pi_{\tau}^{-1} \rho_{\tau}^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}}(a) = (\pi_1 \pi_2^{-1} \pi_{\tau}^{-1} \rho_{\tau}^{-\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \rho^{-\frac{1}{2}}(a)$$

とあることを示す。

6. 分解公式 (I), (II) の場合

11.2.11 分解公式 (I) と (II) の場合を示す。

$$h(g) = h(dn l) = \pi_1^{-1} \pi_2(a) \Delta(y) \Delta(x)$$

Lemma 1 $\pi \in \hat{G}_c, \hat{G}_s$ かつ

$$\begin{aligned} K_{\pi}(h|u, v) &= \int \pi_1^{-1} \pi_2(a) K_{\pi}(dlu, v) d^x a \\ &= \begin{cases} 2(\pi_1 \pi_2^{-1} \pi^{-1} \rho^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \rho^{-\frac{1}{2}}(u) (\pi_1^{-1} \pi_2 \pi \rho^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \rho^{-\frac{1}{2}}(v), & uv^{-1} \in (k^x)^2 \\ 0, & uv^{-1} \notin (k^x)^2 \end{cases} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{s=1, \varepsilon, p, \varepsilon p} (\pi_1 \pi_2^{-1} \pi^{-1} \rho^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \rho_{\tau}^{\frac{1}{2}}(u) (\pi_1^{-1} \pi_2 \pi \rho^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \rho_{\tau}^{-\frac{1}{2}}(v) \end{aligned}$$

Lemma 2 $\pi_{\tau} \in \hat{G}_d$ かつ

$u, v \in k_{\tau}^x$ かつ

$$\begin{aligned} K_{\pi_{\tau}}(h|u, v) &= K_{\pi_{\tau}}^+(h|u, v) \\ &= (\pi_1 \pi_2^{-1} \pi_{\tau}^{-1} \rho_{\tau}^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \mu^+ \rho^{-\frac{1}{2}}(u) (\pi_1^{-1} \pi_2 \pi_{\tau} \rho_{\tau}^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \mu^+ \rho^{-\frac{1}{2}}(v) \\ &\quad + (\pi_1 \pi_2^{-1} \pi_{\tau}^{-1} \rho_{\tau}^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \mu^- \rho^{-\frac{1}{2}}(u) (\pi_1^{-1} \pi_2 \pi_{\tau} \rho_{\tau}^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \mu^- \rho^{-\frac{1}{2}}(v) \end{aligned}$$

ただし $\mu^+(x) \equiv 1 \quad x \in k_{\tau}^x$
 $\mu^-(x) = 1 \quad x \in (k^x)^2, \quad -1 \quad x \in k_{\tau}^x \setminus (k^x)^2$

また $u, v \in k^x \setminus k_\tau^x$ のとき

$$\begin{aligned} K_{\pi_\tau}(h|u, v) &= K_{\pi_\tau^-}(h|u, v) \\ &= \sum_{\pm} (\pi_1 \pi_2^{-1} \pi_\tau^{-1} \rho_{\pi_\tau}^{\pm})^{\frac{1}{2}} \nu^{\pm} \rho^{\frac{1}{2}}(u) (\pi_1^{-1} \pi_2 \pi_\tau \rho_{\pi_\tau}^{\pm}) \nu^{\pm} \rho^{\frac{1}{2}}(v) \\ &\quad \nu^+ \equiv 1 \quad x \in k^x \setminus k_\tau^x \\ &\quad \nu^- = \pm 1 \quad k^x \setminus k_\tau^x \quad a \Rightarrow a \text{ coset の } \pm \nu^- \\ &\quad \nu^+ \text{ は } 1, \text{ 而 } \nu^- \text{ は } -1 \text{ の値をとる。} \end{aligned}$$

$$\Phi_S(\omega|\pi) = \int_k (\pi_1 \pi_2^{-1} \pi^{-1} \rho^{\pm})^{\frac{1}{2}} \rho_{\pi_S}^{\pm} \rho^{\frac{1}{2}}(u) K_\pi(f'|w, u) du$$

$\pi \in \hat{G}_d, \hat{G}_S$

$$\Phi_{\pm}(\omega|\pi_\tau+) = \int_{k_\tau^x} (\pi_1 \pi_2^{-1} \pi_\tau^{-1} \rho_{\pi_\tau}^{\pm})^{\frac{1}{2}} \mu^{\pm} \rho^{\frac{1}{2}}(u) K_{\pi_\tau^+}(f'|w, u) du$$

$$\Phi_{\pm}(\omega|\pi_\tau-) = \int_{k^x \setminus k_\tau^x} (\pi_1 \pi_2^{-1} \pi_\tau^{-1} \rho_{\pi_\tau}^{\pm})^{\frac{1}{2}} \nu^{\pm} \rho^{\frac{1}{2}}(u) K_{\pi_\tau^-}(f'|w, u) du$$

とある。

Prop. 4

(1) $\Phi_S(\omega|\pi), \Phi_S(\omega|\pi_0), \Phi_{\pm}(\omega|\pi_\tau+), \Phi_{\pm}(\omega|\pi_\tau-)$ の対応の積分は収束する。また

$$\Phi_S(\omega|\pi) \in \hat{\mathcal{S}}_\pi \otimes \hat{\mathcal{S}}^x, \quad \Phi(\omega|\pi_0) \in \hat{\mathcal{S}}_{-1}$$

$$\Phi_{\pm}(\omega|\pi_\tau+), \Phi_{\pm}(\omega|\pi_\tau-) \in \mathcal{S}^x \otimes \mathcal{F}(\hat{G}_d \cup \hat{G}_{sd})$$

$$(2) \{ \Phi_S(\omega|\pi), \Phi_S(\omega|\pi_0), \Phi_{\pm}(\omega|\pi_\tau+), \Phi_{\pm}(\omega|\pi_\tau-) \} = \Phi(\omega|\hat{g}_{S, \pm, +, -})$$

とあくと写像 $f \mapsto \Phi$ と $f \mapsto \varphi(x_1, x_2) \in \mathcal{H}_{\pi_1, \pi_2}$ の kernel は一致する。したがって $\mathcal{H}_{\pi_1, \pi_2} \ni \varphi \mapsto \Phi$ は同型で、しかも G -同型である。すなわち

$$(T_{\mathfrak{g}}^{\pi_1} \otimes T_{\mathfrak{g}}^{\pi_2} \varphi)(x_1, x_2) \mapsto \int k_{\mathfrak{g}}(g|w, u) \Phi(u| \hat{g}, \cdot) du$$

(3) $\Phi_1(\omega|\pi), \Phi_2(\omega|\pi), \Phi_p(\omega|\pi), \Phi_{2p}(\omega|\pi), \pi \in \hat{G}_d, \hat{G}_s$ とすると、同じ表現を扱えるが、4つの関数は vector \mathbb{C}^2 (双独立である。 $\Phi_+(\omega|\pi_{\epsilon+}), \Phi_-(\omega|\pi_{\epsilon+})$ および $\Phi_+(\omega|\pi_{\epsilon-}), \Phi_-(\omega|\pi_{\epsilon-})$ により 2 次元) 以上。

この prop. を 5 節等式 (*) に代入して分解公式を得る。

Th. 3 $\mathcal{R}_{\pi_i} = \{T^{\pi_i}, \delta_{\pi_i}\}, \pi_1, \pi_2 \in \hat{G}_c$ のとき、 $\tau = \nu$ による積 $\mathcal{R}_{\pi_1} \otimes \mathcal{R}_{\pi_2}$ の分解は次の公式で与えられる。

$$\begin{aligned} & C \int \varphi^1(x_1, x_2) \overline{\varphi^2(x_1, x_2)} dx \quad \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{H}_{\pi_1, \pi_2} \\ &= \int_{\hat{G}_c, \pi_1 \pi_2 \pi(-1)=1} \mu(\pi) \left(\frac{1}{2} \sum_{\pm} \int \Phi_{\pm}^1(\omega|\pi) \overline{\Phi_{\pm}^2(\omega|\pi)} d\omega \right) d\pi \\ &+ \frac{1}{2} C(\pi_1 \pi_2) \sum_{\pm} \int \Phi_{\pm}^1(\omega|\pi_0) \overline{\Phi_{\pm}^2(\omega|\pi_0)} |\omega|^{-1} d\omega \\ &+ \sum_{\tau} \sum_{h=1}^2 \sum_{\substack{\pi_1 \pi_2 \pi_{\tau} \text{sgn}_{\tau}(-1)=1}} \mu(\pi_{\tau}) \left\{ \sum_{\pm} \int \Psi_{\pm}^1(\omega|\pi_{\tau+}) \overline{\Psi_{\pm}^2(\omega|\pi_{\tau+})} d\omega \right. \\ &\quad \left. + \sum_{\pm} \int \Psi_{\pm}^1(\omega|\pi_{\tau-}) \overline{\Psi_{\pm}^2(\omega|\pi_{\tau-})} d\omega \right\} \end{aligned}$$

π_{ϵ}^0 は order 2 の C_{ϵ} の指標 ($\pi_1 \pi_2(-1) = \pi_{\epsilon}^0 \text{sgn}_{\epsilon}(-1)$) であり

また、上の公式は split discrete series は表わされる。

$$\Psi_{\pm}(\omega | \pi_{\varepsilon}^{\circ+}) = \eta'(\omega | \pi_{\varepsilon}^{\circ}) \pm \eta_{\varepsilon}(\omega | \pi_{\varepsilon}^{\circ})$$

$$\Psi_{\pm}(\omega | \pi_{\varepsilon}^{\circ-}) = \eta_p(\omega | \pi_{\varepsilon}^{\circ}) \pm \eta_{\varepsilon p}(\omega | \pi_{\varepsilon}^{\circ})$$

また、 $\eta_{\tau}(\omega | \pi_{\varepsilon}^{\circ})$ は $\tau(k^x)^2$ 以外 $\omega = 3\tau$ は 0 の関数である。
よって

$$\begin{aligned} & \sum_{\pm} \left\{ \int \Psi_{\pm}'(\omega | \pi_{\varepsilon}^{\circ+}) \overline{\Psi_{\pm}^2(\omega | \pi_{\varepsilon}^{\circ+})} d\omega + \int \Psi_{\pm}'(\omega | \pi_{\varepsilon}^{\circ-}) \overline{\Psi_{\pm}^1(\omega | \pi_{\varepsilon}^{\circ-})} d\omega \right. \\ & \left. = 2 \sum_s \int \eta_s'(\omega | \pi_{\varepsilon}^{\circ}) \overline{\eta_s^2(\omega | \pi_{\varepsilon}^{\circ})} d\omega \right. \end{aligned}$$

となる。以上で Martingale 公式は対応するより explicit な公式が得られたわけである。

(II) の場合 ほぼ同様な計算で、証明として表わされる形は全く変わらない。また $\pi_2(1) = 1$ という条件がつけ加わるのみである。

Th. 4 省略

7. 分解公式, (III) の場合

$h(y) = \pi_1^{-1} \pi_2(a) \pi_2^{-1} p^{-\frac{1}{2}}(y) \pi_1 p^{\frac{1}{2}}(x)$, $\pi_1(x) = |x|^{\lambda_1}$, $\pi_2(x) = |x|^{\lambda_2}$
 $-1 < \lambda_1, \lambda_2 < 0$ に対しては $K_g(h|u, v)$ は Γ -関数の因数をもつ。
 しかし積分の収束に因する条件から $-1 < \lambda_1 + \lambda_2 < 0$ とその他の場合に分けて論ぜられる。

結果だけ述べておくことにする。

Th. 5 $\mathcal{R}_{\pi_0} = \{T^{\pi_0}, \delta_{\pi_0}\}$ $\pi_1(x) = |x|^{\lambda_1}$; $\pi_2(x) = |x|^{\lambda_2}$, $-1 < \lambda_1$,
 $\lambda_2 < 0$, $-1 < \lambda_1 + \lambda_2 < 0$ とするとき, $\tau = 1$ とき $\mathcal{R}_{\pi_1} \otimes \mathcal{R}_{\pi_2}$ の

分解は次のように与えられる。 $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{A}_{\pi_1, \pi_2}$

$$\begin{aligned} & \int \pi_1^{-1} \rho^{-\frac{1}{2}}(x_1 - x_1') \pi_2^{-1} \rho^{-\frac{1}{2}}(x_2 - x_2') \varphi_1(x_1, x_2) \overline{\varphi_2(x_1', x_2')} dx dx' dx_2 dx_2' \\ &= \int_{G_c, \pi(-1)=1} \mu(\pi) \left(\frac{1}{2} \sum_{S=1,2,p,\varepsilon p} \Pi_S(\pi_1, \pi_2, \pi) \int \Phi_S'(\omega|\pi) \overline{\Phi_S^2(\omega|\pi)} d\omega d\pi \right. \\ &+ \frac{1}{2} \sum_S \Pi_S(\pi_1, \pi_2, \pi_0) \int \Phi_S'(\omega|\pi_0) \overline{\Phi_S^2(\omega|\pi_0)} |\omega|^{-1} d\omega \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{\tau} \sum_k \sum_{\pi_{\tau}} \left\{ \sum_{\pm} \Pi_{\tau}(\pi_1, \pi_2, \pi_{\tau}, \pm) \int \Phi_{\pm}'(\omega|\pi_{\tau}+) \overline{\Phi_{\pm}^2(\omega|\pi_{\tau}+)} d\omega \right\} \\ &+ \left. \sum_{\pm} \Pi_{\tau}(\pi_1, \pi_2, \pi_{\tau}, \pm) \int \Phi_{\pm}'(\omega|\pi_{\tau}-) \overline{\Phi_{\pm}^2(\omega|\pi_{\tau}-)} d\omega \right\} \end{aligned}$$

ただし

$$\begin{aligned} \Pi_S(\pi_1, \pi_2, \pi) &= \Gamma((\pi_1^{-1} \pi_2 \pi \rho^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \rho_{\mu_S}) \Gamma((\pi_1^{-1} \pi_2 \pi^{-1} \rho^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \rho_{\mu_S}) \\ &\times \Gamma((\pi_1 \pi_2 \pi \rho^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \rho_{\mu_S}) \Gamma((\pi_1 \pi_2 \pi^{-1} \rho^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \rho_{\mu_S}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Pi_{\tau}(\pi_1, \pi_2, \pi_{\tau}, \pm) &= \Gamma_{\tau}(\pi_1^{\pm 1} \pi_2^{\mp 1} \pi_{\tau} \rho_{\mu_{\tau}}) \\ &\times \Gamma_{\tau}(\pi_1 \pi_2 \pi_{\tau} \mu_{\tau}^{\pm} \rho_{\mu_{\tau}}) \end{aligned}$$

Γ_{τ} は $k(\sqrt{\tau})$ 上の gamma 関数で, $k(\sqrt{\tau})^{\times}$ の指標 π に対して

$$\Gamma_{\tau}(\pi) = \int_{k(\sqrt{\tau})} \chi(S(z)) \pi(z) dz$$

で定義されるものである。

以上

$-2 < \lambda_1 + \lambda_2 \leq -1$ の場合は Th の公式の解析接続により得

める。

まず公式の右辺は

$$-1 < \lambda_1 < 0, \quad -1 < \lambda_2 < 0$$

の範囲で解析的である。右辺から第1項 $S=1$, $\pi(x)=|x|^{-\lambda}$ の部分をとり出そう。

$$\text{右辺} = \frac{1}{2} \int_{-\pi(\log q)^{-1}}^{\pi(\log q)^{-1}} \mu(\pi) \Pi_1(\pi_1, \pi_2, \pi) \left(\int \Phi_1'(\omega|\pi) \overline{\Phi_1^2(\omega|\pi)} d\omega \right) d\lambda \\ + \text{others}$$

othersの分部分も上記の範囲で解析的である。か積分を書か
れた部分は解析的である。

$$K(\pi_1, \pi_2) = \frac{1}{2} \int_{-\pi(\log q)^{-1}}^{\pi(\log q)^{-1}} \mu(\pi) \Pi_1(\pi_1, \pi_2, \pi) \left(\int \Phi_1'(\omega|\pi) \overline{\Phi_1^2(\omega|\pi)} d\omega \right) d\lambda$$

$$\pi(x) = |x|^{-\lambda}$$

は $\lambda_1 + \lambda_2 + 1 = 0$, $\lambda = 0$ の $s=3$ の複積分関数が singular
point である。これが問題点を引き起こし, $\lambda_1, \lambda_2 > 1$ なら
 $\lambda_1 + \lambda_2 + 1 \geq 0$ まで解析延長が行われる。

$$K(\pi_1, \pi_2) = \frac{1}{2} \int d\lambda - \frac{2(1-q^{-1})}{\log q} \tan^{-1} \frac{\pi}{(\log q)(\lambda_1 + \lambda_2 + 1)} \\ \times \frac{\Gamma(\pi_2 \rho^{\frac{1}{2}})}{\Gamma(\pi_1 \rho^{\frac{1}{2}}) \Gamma((\pi_1, \pi_2 \rho^{\frac{1}{2}})^{-1})} \int \Phi_1'(\omega|\pi_1, \pi_2 \rho^{\frac{1}{2}}) \overline{\Phi_1^2(\omega|\pi_1, \pi_2 \rho^{\frac{1}{2}})} \\ |\omega|^{\lambda_1 + \lambda_2 + 1} d\omega$$

Th. 6 $\mathcal{R}_{\pi_i} = \{T^{\pi_i}, \delta_{\pi_i}\}$, $\pi_1(x) = |x|^{\lambda_1}$, $\pi_2(x) = |x|^{\lambda_2}$, $-1 < \lambda_1$,
 $\lambda_2 < 0$, $-2 < \lambda_1 + \lambda_2 \leq -1$ とするとき, $\overline{\tau} = \nu \otimes \frac{q}{2} \mathcal{R}_{\pi_1} \otimes \mathcal{R}_{\pi_2}$
 の分解は次の公式で与えられる。 $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{H}_{\pi_1, \pi_2}$

$$C \int \pi_1^{-1} \rho^{\frac{1}{2}}(x_1 - x'_1) \pi_2^{-1} \rho^{\frac{1}{2}}(x_2 - x'_2) \varphi_1(x_1, x_2) \overline{\varphi_2(x'_1, x'_2)} dx_1 dx_2 dx'_1 dx'_2$$

$$= \text{Th. 5 公式の右辺} - \frac{2(1-q^{-1})}{\log q} \tan^{-1} \frac{\pi}{(\log q)(\lambda_1 + \lambda_2 + 1)}$$

$$\times \frac{\Gamma(\pi_2 \rho^{\frac{1}{2}})}{\Gamma(\pi_1 \rho^{\frac{1}{2}}) \Gamma((\pi_1, \pi_2 \rho^{\frac{1}{2}})^{-1})} \int \frac{\Phi^1(\omega | \pi_1, \pi_2 \rho^{\frac{1}{2}}) \overline{\Phi^2(\omega | \pi_1, \pi_2 \rho^{\frac{1}{2}})}}{|\omega|^{\lambda_1 + \lambda_2 + 1}} d\omega$$

以上

注意 最後の項を complementary series の表現 $\mathcal{R}_{\pi_1, \pi_2, \rho^{\frac{1}{2}}}$
 が与えられる。

文献

- [1] Martin, R. P.: Tensor product for $SL_2(k)$,
 trans. A.M.S., vol. 239 (1978), pp. 197-211.