

2-fold branched covering spaces の個数について

北大 理 河野正晴

3-sphere S^3 の 2-fold branched covering space は
 その branch line となる link を一つきめると一意的にきま
 る。しかし、このことは一般に manifold に対しては正しくな
 ない。この Note では一般に 3-manifold に対し、その中にある link を
 一つきめた時、その 2-fold branched covering space 中で互
 いに同相でないものがどれくらいあるか、ということを探る。
 このとき取りあげる多様体はすべて closed とし、又多様体
 中の link と言えば、closed 1-submanifold (connected と
 は限らない) をさすものとする。

Definition

N を 3次元多様体、 L をその中の link とする。 $m(N, L)$ で、
 L で branch する N の 2-fold covering space で互いに同相で
 ないものの個数を表す。又 $m(N) := \max \{ m(N, L) \mid L \text{ は } N \text{ 中にある link} \}$ とする。

Remark

1. $m(N, L), m(N)$ が well-defined (上から決まってくるか) ということはまだ示していないが、これは後 a Prop. 1 で示さえる。
2. [3] の定理により、 L が \mathbb{Z}_2 -係数でホモロガジーゼーションがゼロであれば $m(N, L) = 0$ 。又同じく $1 \leq m(N)$ がわかる。

Lemma

N を 3次元多様体とし、 $L = L_1 \cup \dots \cup L_\mu$ を N の α link とする (ただし、各 L_i は L の component)。 L_i に対応する meridian を m_i とする。この時次 a), b) は同値。

- a) 次の i), ii) を満たす $H_1(N-L)$ の subgroup H が存在する。
 - i) $|H_1(N-L) : H| = 2$
 - ii) $\langle m_i \rangle \notin H \quad (1 \leq i \leq \mu)$
- b) associated unbranched covering が $h^{-1}(H)$ で済んだ様な N 上 αL で branch する 2-fold covering が存在する。ただし、 $|O : \square|$ は群 α index, $\langle m_i \rangle$ は meridian m_i が表わす $H_1(N-L)$ の元, h は $\pi_1(N-L)$ から $H_1(N-L) \wedge \alpha$ Hurewicz map とする。

(proof) まず a) \Rightarrow b)。 $h^{-1}(H)$ は $\pi_1(N-L)$ の index が 2 の部分群となる α で $h^{-1}(H)$ に対応する $N-L$ の (2-fold)

unbranched covering が存在する。Fox's unique compactification theorem [1]より、 Σ は N 上の 2-fold branched covering を一意的に定める。 Σ かつ $\langle m_i \rangle \in H$ という条件より、各 L_i 上で必ず branch している。よって Σ は L で branch する covering になっている。次に $b) \Rightarrow a)$ 。条件 $b)$ を満たす 2-fold covering $p: (M, \tilde{L}) \rightarrow (N, L)$ が存在したとする。 $p_*(\pi_1(M - \tilde{L})) = \tilde{H}$ とおくと、 \tilde{H} は $\pi_1(N - L)$ の index 2 の部分群となっている。又 $\pi_1(N - L) / \tilde{H} \cong \mathbb{Z}_2$ で \mathbb{Z}_2 は可換群だから、 \tilde{H} は $\pi_1(N - L)$ の交換子群を含む。

$H_1(N - L) = \pi_1(N - L) / [\pi_1(N - L), \pi_1(N - L)]$ より ($[0; 0]$ は群 0 の交換子群)、 $H = p_*(\tilde{H})$ とすると、 H は $H_1(N - L)$ の index 2 の部分群。又各 L_i でほんとに branch していることから $\langle m_i \rangle \in H$ ($1 \leq i \leq \mu$)。

Proposition 1

N を 3次元多様体とする。ここで $H_1(N; \mathbb{Z}_2) = \underbrace{\mathbb{Z}_2 + \dots + \mathbb{Z}_2}_{m \text{ 個}}$ とすると、 $1 \leq m(N) \leq 2^m$

(proof) Remarkより $1 \leq m(N)$ はわかるので任意の link $L = L_1 \cup \dots \cup L_\mu$ に対して、 $m(N, L) \leq 2^m$ を示せばよい。よって L を 1つ固定して、Lemmaの a) を満たす部分群が高々 2^m 個しか存在しないことを示す。

$H_1(N)$ は有限生成可換群だから次の形をしているとしてよ
 〃。

$$H_1(N) = \underbrace{\mathbb{Z} + \dots + \mathbb{Z}}_{m \text{個}} + \mathbb{Z}_{p_1} + \mathbb{Z}_{p_2} + \dots + \mathbb{Z}_{p_r} + \dots + \mathbb{Z}_{p_s}$$

ただし、 p_i は素数 α の乗で、 $i \leq r$ の時 $2 \mid p_i$, $r+1 \leq i \leq s$ の時は $2 \nmid p_i$ となり、 $r = m+r$ 。 $H_1(N)$ の i 番目の \mathbb{Z} -factor の generator を d_i , \mathbb{Z}_{p_i} の generator を d_{i+m} とする。 d_i ($1 \leq i \leq m+s$) を represent する $N-L$ の simple loop ℓ_i を一つとって fix し、 ℓ_i が $H_1(N-L)$ の中で表わす class を α_i とする。 L_i を a meridian m_i が表わす $H_1(N-L)$ の元を β_i としておく。

$H_1(N-L)$ から $H_1(N)$ への自然な写像を j_* とすると、 $j_*(d_i) = d_i$ となり、 $m+r < i \leq m+s$ なる i について d_i の order は奇数 α で、各 d_i ($m+r < i \leq m+s$) に対し、ある自然数 k_i が存在して、 $(2k_i+1)d_i = 0$ in $H_1(N)$ とする。 よって $(2k_i+1)d_i \in \ker j_*$ 。 ある整数 n_j^i ($j=1, \dots, \mu$) が存在して

$$(2k_i+1)d_i = \sum_{j=1}^{\mu} n_j^i \beta_j$$

と書ける。 α の時

$$A' := \{ i \mid m+r < i \leq m+s, \sum_{j=1}^{\mu} n_j^i \equiv 0 \pmod{2} \}$$

$$B' := \{ i \mid m+r < i \leq m+s, \sum_{j=1}^{\mu} n_j^i \equiv 1 \pmod{2} \}$$

とあくと, A', B' は m' のとり方によらず一意的にきまる。

又 Lemma a) を満たす任意の部分群に対し,
 $i \in A'$ なら $d_i \in H$, $i \in B'$ なら $d_i \notin H$ が成立する。

さて Lemma を満たす部分群 H に対し,

$$A^H := \{ i \mid 1 \leq i \leq m, d_i \in H \}$$

$$B^H := \{ i \mid 1 \leq i \leq m, d_i \notin H \}$$

とあくと, A^H, B^H は $\{1, 2, \dots, m\}$ を disjoint にわけ
 るが, この組み合わせは 2^m 通り存在する。逆に $\{1, 2, \dots, m\}$
 の分割 A'', B'' を与えた時, Lemma a) を満たす部分群 H で
 $A^H = A'', B^H = B''$ となる様なものが存在するとすれば一意的で
 ある, ということが言えれば証明は終了する。よって A'', B''
 を1つ個定し, 部分群 H が Lemma a) を満たし $A^H = A'', B^H = B''$
 と仮定する。

$$A = A' \cup A^H, B = B' \cup B^H \text{ とあくと, 是して,}$$

$$\tilde{H} := \text{gp} \{ \beta_i + \beta_j, \beta_i + \alpha_k, \alpha_k + \alpha_l, \alpha_t \mid \text{in } H(N-L) \}$$

ただし, $1 \leq i, j \leq m, k, l \in B, t \in A$ とする。 \tilde{H} は
 A^H, B^H によって一意的にきまり $\tilde{H} \subset H$ となる。こゝが $\tilde{H} = H$
 とすればよい。まず, ある β_i が存在して $\beta_i \in \tilde{H}$ とする
 と $\beta_i \in H$ となるので矛盾。よって各 β_i は $\beta_i \notin \tilde{H}$ とし
 よい。 $H_1(N-L)$ の任意の元 α に対して整数 $m_i (1 \leq i \leq m)$
 $m_i (1 \leq i \leq m+s)$ が存在して,

$$g = \sum_{i=1}^m n_i \beta_i + \sum_{i=1}^{m+s} m_i d_i \quad \text{と書ける。よって}$$

$$g \equiv \left(\sum_{i=1}^m n_i \right) \beta_1 + \sum_{i \in B} m_i d_i \quad (\text{mod } \hat{H})$$

$$\equiv \left(\sum_{i=1}^m n_i \right) \beta_1 + \left(\sum_{i \in B} m_i \right) \beta_1 \quad (\text{mod } \hat{H})$$

$$\equiv \left(\sum_{i=1}^m n_i + \sum_{i \in B} m_i \right) \beta_1 \quad (\text{mod } \hat{H})$$

$$\text{よって } \sum_{i=1}^m n_i + \sum_{i \in B} m_i \equiv 0 \pmod{2} \text{ なら } g \in \hat{H}.$$

$$\sum_{i=1}^m n_i + \sum_{i \in B} m_i \equiv 1 \pmod{2} \text{ なら } g \in \beta_1 \hat{H}.$$

$\alpha = \tau$ は \hat{H} の指数が 2 であることを示している。よって

$$\hat{H} = H \quad \square$$


次に $m(N) \neq 1$ とする例を実際にあげることにする。

Example $m(S^2 \times S^1) = 2$

2-sphere S^2 上に 4 点 P_1, \dots, P_4 をとり、 $L = \{P_1, \dots, P_4\} \times S^1$ とする。 S^2 上の $\{P_1, \dots, P_4\}$ で branch する 2-fold covering space は一意的にきまり、それは torus T であることを知らせている。これは covering map を p_0 とする。


次のページ a 図の様な位置に torus を置き軸の 180° 回転が与える同相写像をとる。これは自然な projection

$$\psi: T \longrightarrow T/\tau \text{ が } p_0 \text{ になっていることが知られている。}$$



180° 回転
が与える
homeo.
をととする。

$p_0 \downarrow$



さて、 $I = [0, 1]$ を unit interval とした時

$p_0 \times id_I : T \times I \longrightarrow S^2 \times I$
を考える。さて $S^2 \times \{0\}$ と $S^2 \times \{1\}$ を id_{S^2} により
山せた時、これに対応する $T \times \{0\}$ と $T \times \{1\}$ は

それぞれ $p_0 \times id_I$ と compatible な同相写像は id_T としてある
ことがわかる。 $T \times I$ を id_T によりそれぞれとできる多様
体をそれぞれ M_4^1, M_4^2 とすると、 M_4^1, M_4^2 は L で branch
する $S^2 \times S^1$ 上の 2-fold branched covering space となってい
る。今 M_4^1 と M_4^2 は同相でない。よって $n(S^2 \times S^1, L) \geq 2$ 。
又 Proposition 1 より $n(S^2 \times S^1) \leq 2$ となるので $n(S^2 \times S^1) = 2$
なる同様 $a = \alpha$ が S^2 上に $2m$ 個の点 P_1, P_2, \dots, P_{2m} ($m \geq 2$)
をとってとできる。この時 α による $S^2 \times S^1$ の 2-fold
covering space となる多様体を M_{2m}^1, M_{2m}^2 とする。この時
 M_{2m}^1 の基本群 $\pi_1(M_{2m}^1)$ は $\pi_1(F_{m-1}) \times \mathbb{Z}$ と同型で (F_{m-1} は

7

genus $n-1$ a closed orientable surface), $\pi_1(M_{2m}^Z)$ は $\pi_1(F_{n-1})$ a Z による拡大で trivial でない $\in a$ に存在。よって $1 \leq i, j \leq 2, m, n \geq 2$ の時 $(i, m) \neq (j, m)$ なら $\pi_1(M_{2m}^i) \not\cong \pi_1(M_{2m}^j)$ がわかるので M_{2m}^i と M_{2m}^j は同相でない。又 a M_{2m}^i は irreducible, よって prime であることを注意しておく。

前の Example を一般化するに次の Proposition が得られる。

Proposition 2

$$M = \underbrace{S^2 \times S^1 \# S^2 \times S^1 \# \dots \# S^2 \times S^1}_{n \text{ 個}} \quad \text{とすると,}$$

$$n(M) = 2^n \text{ である。}$$

(proof) $H_1(M; \mathbb{Z}_2) = \underbrace{\mathbb{Z}_2 + \dots + \mathbb{Z}_2}_{n \text{ 個}}$ より $n(M) \leq 2^n$ と存在。よって $n(M, L) = 2^n$ と存在 M a link a 存在を言えばよい。

M a connected sum a factor に存在して n 個の $S^2 \times S^1$ を $(S^2 \times S^1)_i$ と書き、各 $(S^2 \times S^1)_i$ a factor a S^2 上に $2i+2$ 個の点 P_1^i, \dots, P_{2i+2}^i をとり、 $L_i = \{P_1^i, \dots, P_{2i+2}^i\} \times S^1$ とする。各 $(S^2 \times S^1)_i$ から M をつくる connected sum を次のようにしてつくる。 $(S^2 \times S^1)_1$ 上に $n-1$ 個の disjoint な 3-balls B_2, \dots, B_m をとる。ただし、 $B_i \cap L_1$ は 1-ball に存在するように。各 i (≥ 2) に対し 3-ball B_i を $(S^2 \times S^1)_i$ a 中

に $\text{Lin } B_i$ が 1-ball になる様にとつておく。そして, B_i, B'_i ($i=2, \dots, m$) の内点をとりとり, ∂B_i と $\partial B'_i$ をはりつけることにより connected sum をつくる。ただし, この時 $\text{Lin } \partial B_i$ と $\text{Lin } \partial B'_i$ はそれぞれ 2 点よりなるが, この点が互いにはりつけられる様にはりつけの字句を進んでおく。

$$L = \bigcup_{i=1}^m L_i - \bigcup_{i=2}^m \{ \text{Int}(L_i \cap B_i) \cup \text{Int}(L_i \cap B'_i) \}$$

と L は M の link となる。次の形の多様体 N は M の L で branch する 2-fold covering space となる。

$$N = M_4^{\varepsilon_1} \# M_6^{\varepsilon_2} \# \dots \# M_{2(\varepsilon_i+1)}^{\varepsilon_i} \# \dots \# M_{2m+2}^{\varepsilon_m}$$

ただし, $M_{2(\varepsilon_i+1)}^{\varepsilon_i}$ は前の example で定義したもので, ε_i は 1 または 2。 $N = M^{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_m}$ と書くと, 前の example の最後の注意と connected sum に関する unique decomposition theorem [4] より $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m) \neq (\varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_m)$ なら $M^{\varepsilon_1 \dots \varepsilon_m}$ と $M^{\varepsilon'_1 \dots \varepsilon'_m}$ は同相でないことがわかる。よって $n(M, L) \geq 2^m$ 。□

Remark 証明を見ると次のこともわかる。 $1 \leq i \leq m$ なる任意の自然数 i に対して, $n(M, L^i) = 2^i$ と存在する link が存在する。

又, Proposition 2 は Jaco による次の定理 [2]

" M を closed orientable 3-manifold で $\pi_1(M) = \mathbb{Z} * \dots * \mathbb{Z}$

(\mathbb{Z} は m 個の free product) とすると $M = \Sigma \# S^2 \times S^1 \# \dots$

$\dots \# S^2 \times S^1$, ここで Σ は homotopy 3-sphere " を俾うと次の形

にできる。

Proposition 3

M は closed orientable 3-manifold と $\pi_1(M)$ は m 個の \mathbb{Z} の free product とする。この時 $m(M) = 2^m$

Note

1. ここで定義した $m(N)$ は当然 topological invariant であるが、homological invariant であるか? もし Yes なら covering の homeo. type は homology で決まるということであり、No なら $m(N)$ は N の homology 以外の情報も含んでいことになる。

2. $m(N, L)$ は homeo. type の個数としたが、少し定義をかえ

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & M' \\ p \searrow & \circlearrowleft & \swarrow p' \\ & N & \end{array}$$

て、covering type の個数として論じることできる。つまり、 M と M' の間に左の図式を可換にする homeo. が存在する時

covering type が同じとしい、その個数を $m(N, L)$ と書く。

これについては Viro [5] が少し論じているが、一般には $m(N, L) \neq m(N, L)$ である。

References.

- [1] Fox, R.H., Covering spaces with singularities, Algebraic Geometry and Topology, A Symposium in honor of S. Lefschetz, Princeton Univ. Pr., 1957, 243-257
- [2] Jaco, W., Three manifolds with fundamental group a free product, Bull. Amer. Math. Soc. 75(1969), 972-977
- [3] 河野正晴, Note on 2-fold branched coverings, (結び目 $\times 3$ 次元多様体), 基理解析論講究録346, 1979, 66-79
- [4] Milnor, J., A unique factorization theorem for 3-manifolds, Ann. J. Math. 84(1957), 623-630
- [5] Viro, O. Ja., Linkings, two sheeted branched coverings and braids, Math. USSR, Sbornik, 16(1972) No2, 223-236 (English translation)