

加速度をもつ輸送過程の拡散近似

広大 理学部 大和祐一

確率微分方程式に現われる Brown 運動を区分开的に滑らかな曲線で置換えて得られる常微分方程式で表わした幾何学的関係から対応する確率微分方程式で表わした関係に移行する問題は [7], [18], [5], [6] などで扱われているが、ここでは、区分开的に滑らかな曲線が輸送過程の場合について、Markov 過程の極限定理の martingale approach ([12], [1] 参照) の具体的な場合として、同様の問題を紹介する。

§1 極限定理

μ は \mathbb{R}^n の上の確率測度、 H は \mathbb{R}^n の上の C^{00} ベクトル場でいざれども局所コンパクトとする。パラメータ $\varepsilon > 0$ をしばらく固定し、 $[0, \infty) \times \mathbb{R}^n$ の上の測度 $\frac{1}{\varepsilon} dt \mu(dv)$ を平均測度にもつ Poisson random measure $N^\varepsilon(dt dv)$ を取る。 \mathbb{R}^n における確率微分方程式

$$(1.1) \quad v_t^\varepsilon = v + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} (u - v_s^\varepsilon) N^\varepsilon(ds du) \\ + \int_0^t \frac{1}{\varepsilon} H(v_s^\varepsilon) ds$$

(接ベクトル $H(v) = H^1(v) \left(\frac{\partial}{\partial v^i} \right)_v$ を \mathbb{R}^d のベクトル $(H^1(v), \dots, H^n(v))$ と同一視している) の解 v_t^ε は

$$(1.2) \quad \frac{1}{\varepsilon} L = \frac{1}{\varepsilon} Q + \frac{1}{\varepsilon} H$$

を生成作用素とする Markov 過程を与えている。ここで

$$(1.3) \quad Q\varphi(v) = \mu\varphi - \varphi(v)$$

$$(\mu\varphi = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(u) \mu(du))$$

とおいた。 v_t^ε を driving process に持つ \mathbb{R}^d に値を取る driven process x_t^ε を次の常微分方程式によって与える:

$$(1.4) \quad x_t^\varepsilon = x + \int_0^t \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} v_s^\varepsilon i F_i(x_s^\varepsilon) ds + \int_0^t G(x_s^\varepsilon) ds,$$

(右辺第2項は i について 1 から n まで加えている)

$c > 0$ は定数, F_i ($i=1, \dots, n$) と G は \mathbb{R}^d の上の C^∞ ベクトル場で次の仮定をみたすとする:

$$(1.5) \quad |F_i^a(x)|, |G^a(x)|, |F_i F_j^a(x)|, |GF_j^a(x)|, \\ |F_i F_j F_k^a(x)|, |GF_i F_j^a(x)| \leq \text{const.} (1+|x|), \\ x \in \mathbb{R}^d, 1 \leq i, j, k \leq n, 1 \leq a \leq d,$$

ここで, F_i^a , G^a はそれぞれ F_i , G の第 a 成分を表す関数, $F_i F_j^a$ は関数 F_j^a にベクトル場 F_i が作用してできる関数を表し, $|z| = \sqrt{\sum (Q^i)^2}$ とする。 (1.4), (1.1) は連立の確率微分方程式として $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^n$ に値を取る jump type の semi-martingale を与えている。 (1.4), (1.1) の与える Markov 過程の生成作用素は

$$(1.6) \quad \mathcal{L}^\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon} F + G + \frac{1}{\varepsilon} Q + \frac{1}{\varepsilon} H,$$

ただし

$$(1.7) \quad F\varphi(x, v) = cv^i F_i \varphi(x, v)$$

とし, F_i , G は \mathbb{R}^d の変数 x に作用し, Q, H は \mathbb{R}^n の変数 v に作用するとする。ベクトル場 H の生成する 1-1° ラメータ-変換群を H_t , $t \in \mathbb{R}$ で表し, \mathbb{R}^n の微分同型 H_t による μ の像測度を $H_t\mu$ で表す。 \mathbb{R}^n の上の確率測度 m を次の式で定義する:

$$(1.8) \quad m(A) = \int_0^\infty e^{-t} (H_t\mu)(A) dt.$$

H_t による変数変換:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \xrightarrow{H_t} & \mathbb{R}^n \\ H_t^* \varphi \searrow & \curvearrowright & \downarrow \varphi \\ & R & \end{array}$$

を H_t^* で表し, \mathbb{R}^n 上の関数に作用する作用素 \mathcal{U} を

$$(1.9) \quad \mathcal{U}\varphi(v) = \int_0^\infty e^{-t} (H_t^* \varphi)(v) dt, \quad v \in \mathbb{R}^n$$

で定義する。 \mathbb{R}^n の座標関数の定数倍:

$$(1.10) \quad \varphi^i(v) = cv^i, \quad v = (v^1, \dots, v^n)$$

を使って

$$(1.11) \quad b^{ij} = \int_{\mathbb{R}^n} (\varphi^i \circ \varphi^j)(v) m(dv),$$

$$(1.12) \quad a^{ii} = (b^{ii} + b^{ii})/2,$$

$$(1.13) \quad \bar{Z} = a^{ij} F_i F_j + \frac{1}{2} b^{ij} [F_i, F_j] + G$$

とおく。 (1.13) の右辺第1項, 第2項は i, j について
1から n まで加えている。次のことを仮定する:

$$(1.14) \quad \int_{\mathbb{R}^n} v m(dv) = 0,$$

$$(1.15) \quad \text{各行 } (a^{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \text{ は非負定値。}$$

Z^ε が道の空間 $C([0, T], \mathbb{R}^d)$ に与える確率測度を P_x^ε
で表わすとき,

定理 $\varepsilon \rightarrow +0$ のとき P_x^ε は弱収束し, 極限は
 \bar{Z} -diffusion である。

注意 1.1 $H = 0$ のとき, 上の定理は [12], [1] の特別な
場合 (driving process or driven process が線型
に入りこんでいる) である。

注意 1.2 定数行列 (a^{ij}) の平方根 (σ_j^i) :

$$\sigma_j^i \sigma_k^k \delta^{jl} = a^{ik}$$

を取れば、 $\bar{\mathcal{L}}$ -diffusion は確率微分方程式:

$$(1.16) \quad x_t = x + \int_0^t \sigma_j^i F_i(x_s) \circ d\beta_s^i + \int_0^t G(x_s) ds \\ + \int_0^t \frac{1}{2} b^{ij} [F_i, F_j](x_s) ds$$

(β_s は \mathbb{R}^n の Brown 運動) によって与えられる。

注意 1.3 $H=0$ のとき、 $H_t=id$, $m=\mu$,
 $U=id$, $b^{ij} = \int_{\mathbb{R}^n} (\varphi^i \varphi^j)(v) m(dv)$ は対称で
 a^{ij} と等しく、仮定(1.15) を満たしている。この場合、

$$(1.17) \quad \bar{\mathcal{L}} = a^{ij} F_i F_j + G$$

($[F_i, F_j]$ の項は消える) となる。さらに、
 μ が S^{n-1} の上の一様分布のとき、仮定(1.14) を満たして
おき、 $a^{ij} = \frac{c^2}{n} \delta^{ij}$ となる。また

$$\mu = \sum_{i=1}^n (\delta_{e_i} + \delta_{-e_i}) / 2n$$

$$(e_i = (0, \dots, 0, \underset{i}{1}, 0, \dots, 0))$$

のときも仮定(1.14) を満たし、 a^{ij} の値は上と同じになる。

注意 1.4 $H=0$ で 仮定(1.14) を満たし $a^{ij} = \frac{1}{2} \delta^{ij}$
の場合を以下では 等方的 と呼ぶ。この場合

$\bar{\mathcal{L}}$ -diffusion は 確率微分方程式

$$(1.18) \quad x_t = x + \int_0^t F_i(x_s) \circ d\beta_s^i + \int_0^t G(x_s) ds$$

で与えられる。

注意1.5 常微分方程式 (1.4) を接ベクトルの間の関係式と
して書けば

$$(1.19) \quad \begin{cases} \dot{x}_t^\varepsilon = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} v_t^{\varepsilon i} F_i(x_t^\varepsilon) + G(x_t^\varepsilon), \\ x_0^\varepsilon = x \end{cases}$$

となる。ここで、 $F_i(x_s^\varepsilon)$ はベクトル場 F_i の与える
点 x_s^ε における接ベクトルを表す。積分形で書けば

$$(1.20) \quad f(x_t^\varepsilon) - f(x) = \int_0^t \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} v_s^{\varepsilon i} F_i f(x_s^\varepsilon) ds + \int_0^t G f(x_s^\varepsilon) ds$$

となる。ここで $F_i f$ は関数 f にベクトル場 F_i が作用
してできる関数を表す。

注意1.6 driving process v_t^ε の推移確率は、 $\varepsilon=1$
のとき、

$$(1.21) \quad P(t, v, A) = e^{-t} \delta_{H_{t,2}}(A) + \int_0^t e^{-s} (H_s \mu)(A) ds$$

であり、 $t \rightarrow \infty$ の極限が (1.8) で定義した測度 m
である。 (1.9) で定義した作用素 μ は (1.21) の与える
ポテンシャル作用素から \mathbb{R}^n の変数 v について定数

の項を省いたものである。

§2. 例

例2.1 (補正項のある場合) μ が S^1 の上の一様分布, H は \mathbb{R}^2 の上の台がコンパクトな C^∞ ベアトル場で S^1 の近傍で

$$\alpha \frac{\partial}{\partial \theta} = \alpha \left(-v^2 \frac{\partial}{\partial v^1} + v^1 \frac{\partial}{\partial v^2} \right)$$

($\alpha \in \mathbb{R}$ は定数, $v = (v^1, v^2)$) に一致するとき仮定

(1.14), (1.15) を満たしていて, $c = \sqrt{1+\alpha^2}$ と取れば

$$a^{11} = \frac{1}{2} \delta^{11}, \quad a^{12} = \frac{1}{2}, \quad a^{22} = \frac{\alpha}{2} = -a^{11}$$

となる。このとき

$$\beta_t^\varepsilon = \int_0^t \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} v_s^\varepsilon ds$$

とおくと, (1.4) の解 x_t^ε と β_t^ε の関係は

$$(2.1) \quad x_t^\varepsilon = x + \int_0^t F_i(x_s^\varepsilon) d\beta_s^\varepsilon + \int_0^t G(x_s^\varepsilon) ds$$

となる。定理によると, β_t^ε の与える $C([0, T], \mathbb{R}^2)$ の上の確率測度は Wiener 測度に収束するが, x_t^ε の与える $C([0, T], \mathbb{R}^d)$ の上の確率測度は

$$\frac{1}{2} \{ (F_1)^2 + (F_2)^2 \} + \frac{\alpha}{2} [F_1, F_2] + G$$

を生成作用素にもつ拡散過程に収束する。[5]では, 区分的に滑らかな見本関数をもつ Brown 運動の汎関数の場合についてこれによく似た補正項の現われる場合を含むクラスを

扱っている。

以下の例においては、 (μ, H, c) が等方的な場合についてだけ説明する。

例 2.2 (平行移動) (M, g) は n 次元コンパクト Riemann 多様体とし、 M の上の測地線から成る折線 x をでく等方的に向きを変える> ものを定義するために、次の準備をする。正規直交枠の全体を $O(M)$ で表わすとき、 $O(M)$ の各点 u について、 $x = \pi u$ ($\pi: O(M) \rightarrow M$ は射影、 x と $u = (x_1, \dots, x_n)$ の関係は $x_i \in T_x M$) を通る M の曲線に沿って枠 u を平行移動すれば $O(M)$ の上の u を通る曲線ができるか、点 u での接線の方向を全部集めれば、点 u における水平方向 ($T_u O(M)$ の線型部分空間) Q_u が得られる。 $O(M)$ の各元 $u = (x_1, \dots, x_n)$ は内積空間としての同型写像:

$$(2.2) \quad (\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle) \xrightarrow{u} (T_x M, j_x) \\ \Downarrow \qquad \longleftrightarrow \qquad \Downarrow \xi^i X_i$$

と同一視される。ベクトル $\xi \in \mathbb{R}^n$ を固定するととき、各 $u \in O(M)$ について $u\xi$ は点 $x = \pi u$ における M の接ベクトルだが、同型: $Q_u \xrightarrow{(\pi u)_*} T_x M$ の逆写像 (horizontal lift) によって点 u における $O(M)$ の接

ベクトルが得られる。こうして得られた $O(M)$ の上のベクトル場を $\xi \in \mathbb{R}^n$ に対応する standard horizontal vector field (basic vector field) と呼び $B(\xi)$ で表す。 M の上の曲線が測地線であることは、止まつたベクトル $\xi \in \mathbb{R}^n$ があつて $B(\xi)$ の $O(M)$ における積分曲線の射影になつていることと同値であることに注意して、 $O(M)$ の上の曲線 π^ε を

$$(2.3) \quad \begin{cases} \dot{\pi}_t^\varepsilon = B\left(\frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} v_t^\varepsilon\right)_{\pi_t^\varepsilon}, \\ \pi_0^\varepsilon = u \end{cases}$$

によって定義する。第1式の右辺は \mathbb{R}^n のベクトル $\frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} v_t^\varepsilon$ に対応する standard horizontal vector field が点 π_t^ε で与えている接ベクトルである。 π_t^ε の M への射影を x_t^ε で表わすとき、 x_t^ε は測地線から成る折線で、 x_t^ε によって杆 u を平行移動したもののが π_t^ε になっている。 x_t^ε の速度ベクトルを杆 u_t^ε で読み取って得られる \mathbb{R}^n のベクトル

$$(u_t^\varepsilon)^{-1} \dot{x}_t^\varepsilon = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} v_t^\varepsilon$$

(2.3) と standard horizontal vector field の定義からこれがわかる。 $(u_t^\varepsilon)^{-1}$ については (2.2) を見よ。) が等方的に (例えば半径 $\frac{c}{\sqrt{\varepsilon}}$ の球面の上で一様に) jump しているという意味で、 x_t^ε は等方的に折れ曲がる

でいるわけである。 $e_i = (0, \dots, 0, \underset{i}{1}, 0, \dots, 0)$ に対応する
 $B(e_i)$ を B_i で表わせば (2.3) は

$$(2.4) \quad \begin{cases} \dot{u}_t^\varepsilon = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} v_t^\varepsilon + B_i(u_t^\varepsilon), \\ u_0^\varepsilon = u \end{cases}$$

となり、(1.19) と同じ形の常微分方程式となる。 $O(M)$ を十分次元の高い Euclid 空間に埋め込んで、 $O(M)$ のコンペクト性に注意すれば、 u_t^ε が $C([0, T], O(M))$ の上に与える確率測度の $\varepsilon \rightarrow +0$ での極限は

$$(2.5) \quad \Delta_{O(M)} = \delta^{ij} B_i B_j$$

を生成作用素にもつ diffusion である、

$$\begin{array}{ccc} C^\infty(O(M)) & \xleftarrow{\pi^*} & C^\infty(M) \\ \Delta_{O(M)} \searrow & \curvearrowright_R & \swarrow \Delta_g \end{array}$$

から、 x_t^ε が $C([0, T], M)$ の上に与える確率測度の極限は (M, g) の Brown 運動であることがわかる。

注意 2.1 常微分方程式 (2.3) または (2.4) の前半を微分形式で書くと次のようになる：

$$(2.6) \quad \langle \omega, \dot{u}_t^\varepsilon \rangle = 0, \quad \langle \theta, \dot{u}_t^\varepsilon \rangle = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} v_t^\varepsilon$$

ここで ω は connection form ($O(n; \mathbb{R})$ の Lie 環に値を取る $O(M)$ の上の 1 次微分形式)、 θ は

canonical form (solder form) :

$$(2.6) \quad \langle \theta, X \rangle_u = u^{-1}(\pi_u)X, \quad X \in T_u O(M)$$

(\mathbb{R}^n に値を取る $O(M)$ の上の 1 次微分形式) を表す。

微分形式 ω で u^ε の速度ベクトルを読み取ることによると「垂直方向の動きが 0 である」とかわから、微分形式 θ で読み取ることによると「水平方向の動きが $\frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} v_s^\varepsilon$ という等方なものである」とかわかるわけである。微分方程式 (2.6) を線積分で書くと次のようになる：

$$(2.7) \quad \int_{u^\varepsilon[0,t]} \omega = 0, \quad \int_{u^\varepsilon[0,t]} \theta = \beta_t^\varepsilon,$$

ここで

$$(2.8) \quad \beta_t^\varepsilon = \int_0^t \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} v_s^\varepsilon ds.$$

注意 2.2 [13], [14], [7], [8] を参照せよ。

例 2.3 (重複積分)

$$(2.9) \quad \beta_t^{\varepsilon, z_1, \dots, z_a} = \int \dots \int_{0 < s_1 < \dots < s_a < t} d\beta_{s_1}^{\varepsilon, z_1} \dots d\beta_{s_a}^{\varepsilon, z_a},$$

$$(2.10) \quad x_t^\varepsilon = (\beta_t^{\varepsilon, z_1, \dots, z_a})_{\substack{1 \leq z_1, \dots, z_a \leq n, \\ 1 \leq a \leq p}}$$

(p は定数) とおくとき, x_t^ε が $C([0,T], \mathbb{R}^N)$

($N = n + n^2 + \dots + n^p$) に与える確率測度は $\varepsilon \rightarrow +0$ のとき

を弱収束し、極限は、

$$(2.11) \quad \beta_t^{2_1^1 \dots 2_p^p} = \int_0^t \left(\int_0^{S_a} \dots \left(\int_0^{S_3} \left(\int_0^{S_2} d\beta_{S_1}^{2_1^1} \right) d\beta_{S_2}^{2_2^1} \dots \right) d\beta_{S_a}^{2_p^1} \right)$$

($\beta_t = (\beta_t^1, \dots, \beta_t^n)$ は R^n の Brown 運動),

$$(2.12) \quad x_t = (\beta_t^{2_1^1 \dots 2_p^p})_{\substack{1 \leq 2_1^1, \dots, 2_p^p \leq n, \\ 1 \leq a \leq p}}$$

で定義される x_t の与える確率測度である。これを見るには、 x_t^ξ が 常微分方程式

$$(2.13) \quad x_t^\xi = \int_0^t Q_i(x_s^\xi) dB_s^{\xi, 2}$$

の解であることに注意すればよい。227.

$$(2.14) \quad Q_i(x) = \frac{\partial}{\partial x^i} + x^{2_1^1} \frac{\partial}{\partial x^{2_1^2}} + x^{2_1^1 2_2^2} \frac{\partial}{\partial x^{2_1^1 2_2^2}} + \dots + x^{2_1^1 \dots 2_{p-1}^p} \frac{\partial}{\partial x^{2_1^1 \dots 2_{p-1}^p}}.$$

例2.4 (変分方程式) A_0, \dots, A_n が R^m の上の C^6 ベクトル場で次の条件を満たすとする：

$$(2.15) \quad \frac{\partial^3}{\partial x^l \partial x^c \partial x^f} A_i^a(x), \quad x \in R^m, \quad 1 \leq i \leq n, \\ l \leq a, b, c, f \leq m \text{ が有界。} (A_i^a(x) = A_i^a(x) \frac{\partial}{\partial x^a})$$

R^m の上の常微分方程式：

$$(2.16) \quad x_t^\varepsilon = x + \int_0^t A_i(x_s^\varepsilon) d\beta_s^{\varepsilon,i} + \int_0^t A_0(x_s^\varepsilon) ds$$

の解 $x_t^\varepsilon = \varphi_t^\varepsilon(x)$ によって微分同型 $\varphi_t^\varepsilon: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ を得るが、 φ_t^ε の微分の成分表示を $y_t^\varepsilon = (y_{t,a}^\varepsilon)_{1 \leq a, e \leq m}$ で表わす：

$$y_{t,a}^\varepsilon = \frac{\partial}{\partial x^a} \varphi_t^\varepsilon(x).$$

これは次の変分方程式の解になっている：

$$(2.17) \quad y_{t,a}^\varepsilon = \delta_a^e + \int_0^t \frac{\partial}{\partial x^c} A_i^e(x_s^\varepsilon) y_{s,a}^\varepsilon d\beta_s^{\varepsilon,i} + \int_0^t \frac{\partial}{\partial x^c} A_0^e(x_s^\varepsilon) y_{s,a}^\varepsilon ds$$

(c について 1 から m まで加えている。) \mathbb{R}^{m+m^2} の上の
ベクトル場

$$(2.18) \quad \begin{aligned} F_i &= A_i^a(x) \frac{\partial}{\partial x^a} + \frac{\partial}{\partial x^e} A_i^e(x) y_a^\varepsilon \frac{\partial}{\partial y_a^\varepsilon}, \\ G &= A_0^a(x) \frac{\partial}{\partial x^a} + \frac{\partial}{\partial x^e} A_0^e(x) y_a^\varepsilon \frac{\partial}{\partial y_a^\varepsilon} \end{aligned}$$

($(x, y) = (x^a, y_a^\varepsilon)_{1 \leq a, e \leq m}$ が \mathbb{R}^{m+m^2} の座標を表わす) について §1 の定理を適用すれば、 $(x_t^\varepsilon, y_t^\varepsilon)$ が $C([0, T], \mathbb{R}^{m+m^2})$ の上に与える確率測度は $\varepsilon \rightarrow +0$ のとき、確率微分方程式

$$(2.19) \quad x_t = x + \int_0^t A_i(x_s) \circ d\beta_s^i + \int_0^t A_0(x_s) ds$$

$$(2.20) \quad y_{t,a}^e = \delta_a^e + \int_0^t \left(\frac{\partial}{\partial x^c} A_i^e(x_s) y_{s,a}^c \right) \circ d\beta_s^i + \int_0^t \frac{\partial}{\partial x^c} A_0^e(x_s) y_{s,a}^c ds$$

の解 (x_t, y_t) の与える確率測度が弱収束することわかる。

確率微分方程式のパラメータに関する微分については[16]を参照せよ。

§3. 半線型1階偏微分方程式についての注意

主部の等しい半線型方程式：

$$(3.1) \quad \left(\frac{\partial}{\partial t} + \beta_t^{\varepsilon} F_i^a(x) \frac{\partial}{\partial x^a} + G^a(x) \frac{\partial}{\partial x^a} \right) u^\alpha(t, x) \\ = \gamma^\alpha(x, u(t, x)) \quad (u = (u^\alpha)_{1 \leq \alpha \leq m})$$

を特性曲線の方法で解くことを考える。 F_i, G, γ は以下で考える常微分方程式が爆発しない条件を課す。まず、常微分方程式

$$(3.2) \quad x_{s,t}^\varepsilon = x + \int_s^t F_i(x_{s,r}^\varepsilon) d\beta_r^{\varepsilon,i} + \int_s^t G(x_{s,r}^\varepsilon) dr$$

の解 $x_{s,t}^\varepsilon = \varphi_{s,t}^\varepsilon(x)$ から微分同型 $\varphi_{s,t}^\varepsilon : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ ($s \leq t$) を得る。また、曲線 $x_{s,r}^\varepsilon, r \in [s, \infty)$ を与えたとき、常微分方程式

$$(3.3) \quad u_{s,t}^\varepsilon = u + \int_s^t \gamma(x_{s,r}^\varepsilon, u_{s,r}^\varepsilon) dr$$

の解 $u_{s,t}^\varepsilon = \psi_{s,t}^\varepsilon(u)$ から微分同型 $\psi_{s,t}^\varepsilon : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($s \leq t$) を得る。 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^m)$ を与えたとき、

$$(3.4) \quad u_+^\varepsilon(t, x) = \psi_{0,t}^\varepsilon(f((\varphi_{0,t}^\varepsilon)^{-1}(x)))$$

とおけば、 $u_+^\varepsilon(t, x)$ は初期条件：

$$(3.5) \quad u_+^\varepsilon(0, x) = f(x)$$

をみたす (3.1) の解を与える。確率微分方程式でこれから対応する計算については [11], [4] を参照せよ。

次に、

$$(3.6) \quad u^\varepsilon(s, T, x) = (\varphi_{s, T}^\varepsilon)^{-1}(f(\varphi_{s, T}^\varepsilon(x)))$$

とおけば、 $u^\varepsilon(s, T, x)$ は (s, x) について終期条件:

$$(3.7) \quad u^\varepsilon(T, T, x) = f(x)$$

をみたす (3.1) の解を与える。 (3.1) を s について積分すると

$$(3.8) \quad \begin{aligned} u_-^\varepsilon(0, t, x) &= f(x) + \int_0^t F_i^a(x) \frac{\partial}{\partial x^a} u_-^\varepsilon(s, t, x) d\beta_s^{\varepsilon, i} \\ &\quad + \int_0^t G^a(x) \frac{\partial}{\partial x^a} u_-^\varepsilon(s, t, x) ds \\ &\quad - \int_0^t \gamma(x, u_-^\varepsilon(s, t, x)) ds \end{aligned}$$

となる。

例 3.1 (線型の場合) $\gamma = 0$ のとき、 $\varphi_{s, t}^\varepsilon = id$ となり、(3.6) は

$$(3.9) \quad u_-^\varepsilon(s, t, x) = f(x_{s, t}^\varepsilon)$$

となる。等方的な場合、これは次のよう分解される:

$$(3.10) \quad \begin{aligned} u_-^\varepsilon(s, t, x) &= f(x) + m_{s, t}^\varepsilon \\ &\quad + \int_s^t \left(\frac{1}{2} \delta^{ij} F_i F_j + G \right) (x_{s, r}^\varepsilon) dr + r_{s, t}^\varepsilon, \end{aligned}$$

227

$$(3.11) \quad m_{s,t}^{\varepsilon} = \int_{s+}^{t+} \int_{\mathbb{R}^m} \left[\sqrt{\varepsilon} \left\{ u^i F_i f(x_{s,r-}^{\varepsilon}) - v_{r-}^{\varepsilon,i} F_i f(x_{s,r-}^{\varepsilon}) \right\} \right. \\ \left. + \varepsilon \left\{ u^i u^j F_i F_j f(x_{s,r-}^{\varepsilon}) - v_{r-}^{\varepsilon,i} v_{r-}^{\varepsilon,j} F_i F_j f(x_{s,r-}^{\varepsilon}) \right\} \right] \tilde{N}^{\varepsilon}(dr du),$$

$$(3.12) \quad \tilde{N}^{\varepsilon}(dr du) = N^{\varepsilon}(dr du) - \frac{1}{\varepsilon} dr \mu(da),$$

$$r_{s,t}^{\varepsilon} = -\sqrt{\varepsilon} \left[- \left\{ v_t^{\varepsilon,i} F_i f(x_{s,t}^{\varepsilon}) - v_s^{\varepsilon,i} F_i f(x) \right\} \right.$$

$$(3.13) \quad \left. + \int_s^t v_r^{\varepsilon,i} G F_i f(x_r^{\varepsilon}) dr \right. \\ \left. + \int_s^t v_r^{\varepsilon,i} v_r^{\varepsilon,j} v_r^{\varepsilon,k} F_i F_j F_k f(x_{s,r}^{\varepsilon}) dr \right] \\ + \varepsilon \left[\int_s^t v_r^{\varepsilon,i} v_r^{\varepsilon,j} G F_i F_j f(x_{s,r}^{\varepsilon}) dr \right. \\ \left. - \left\{ v_t^{\varepsilon,i} v_t^{\varepsilon,j} F_i F_j f(x_{s,t}^{\varepsilon}) - v_s^{\varepsilon,i} v_s^{\varepsilon,j} F_i F_j f(x) \right\} \right]$$

(補題5.4参照)。

例3.2 (右辺が u について線型の場合) $m=1$,

$$\gamma(x,u) = \gamma(x)u \quad \text{のとき}$$

$$(3.14) \quad u_{-}(s,t,x) = f(x_{s,t}) e^{-\int_s^t \gamma(x_{s,r}) dr}$$

となる。

§4. C^{∞} 切断の flow と其変微分

E は P の principal fibre bundle, \mathbb{R}^m を

standard fibre κ たつ M の上の vector bundle κ , P に接続が与えられているとする。 A_i , $i=0, \dots, n$ は M の上の C^∞ ベクトル場, A_i の horizontal lift (P の上のベクトル場) を F_i ($F_0 = G$) で表わす。 P の Euclid 空間 \mathbb{R}^N への埋め込みで, F_i が (1.5) の条件を満たすよう $\kappa \subset \mathbb{R}^N$ に拡張できる場合を考える。 ξ で x_ξ^ε と書いたものを ξ では u_ξ^ε と書き, u_ξ^ε の M への射影 πu_ξ^ε を x_ξ^ε で表わす。 E の任意の C^∞ 切断 $\sigma: M \rightarrow E$ に対応する P の上の \mathbb{R}^m 値関数 (torsorial θ -form) を f_σ で表わす:

$$(4.1) \quad f_\sigma(u) = u^{-1} \sigma(\pi u), \quad u \in P$$

([9] II5, III1 参照)。共変微分と horizontal lift の関係式

$$(4.2) \quad f_{\nabla_X \sigma} = X^* f_\sigma, \quad X \in \mathcal{X}(M)$$

(X^* は X の horizontal lift) を使って,

$$(4.3) \quad f_\sigma(u_\xi^\varepsilon) = f_\sigma(u) + \int_0^t f_{\nabla_{A_i} \sigma}(u_s^\varepsilon) d\beta_s^\varepsilon \\ + \int_0^t f_{\nabla_{A_0} \sigma}(u_s^\varepsilon) ds$$

を得る。 x_ξ^ε における E の fibre $\pi_E^{-1}(x_\xi^\varepsilon)$ との関係に直すと

$$(4.4) \quad \begin{aligned} \sigma(x_t^\varepsilon) &= u_t^\varepsilon u^{-1} \sigma(u) + \int_0^t u_t^\varepsilon (u_s^\varepsilon)^{-1} \nabla_{A_i} \sigma(x_s^\varepsilon) d\beta_s^\varepsilon \\ &\quad + \int_0^t u_t^\varepsilon (u_s^\varepsilon)^{-1} (\nabla_{A_0} \sigma)(x_s^\varepsilon) ds \end{aligned}$$

となる。 $u_t^\varepsilon u^{-1}$ は $\pi_E^{-1}(x)$ の元の曲線 x_r^ε , $r \in [0, t]$ を沿う平行移動を、 $u_t^\varepsilon (u_s^\varepsilon)^{-1}$ は $\pi_E^{-1}(x_s^\varepsilon)$ の元の曲線 x_r^ε , $r \in [s, t]$ を沿う平行移動を表している。出発点における fibre $\pi_E^{-1}(x)$ との関係式に直すと

$$(4.5) \quad \begin{aligned} u(u_t^\varepsilon)^{-1} \sigma(x_t^\varepsilon) &= \sigma(x) + \int_0^t u(u_s^\varepsilon)^{-1} \nabla_{A_i} \sigma(x_s^\varepsilon) d\beta_s^\varepsilon \\ &\quad + \int_0^t u(u_s^\varepsilon)^{-1} \nabla_{A_0} \sigma(x_s^\varepsilon) ds \end{aligned}$$

となる。

§ 5 定理の証明

§ 1 の仮定のもとで次のことが成立。

補題 5.1

$$(5.1) \quad \varphi - m\varphi = -L U \varphi, \quad \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n),$$

$$\text{222} \quad m\varphi = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(v) m(dv).$$

証明 φ が有界で $m\varphi = 0$ のとき, driving process の生成作用素が L ($\varepsilon = 1$) であることから, 推移確率の形

(1.21) が成り立つ

$$T_t \varphi(v) \equiv \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(u) P(t, v, du)$$

$$\begin{aligned} &= e^{-t} H_t^* \varphi - \int_t^\infty e^{-s} (H_s \mu) \varphi ds \\ &= O(e^{-t}), \quad t \rightarrow \infty \end{aligned}$$

となるのでポテンシャル作用素

$$R \varphi(v) = \int_0^\infty T_t \varphi(v) dt$$

が意味をもつ、

$$-LR \varphi = \varphi$$

が成立つ。一方

$$\begin{aligned} R \varphi &= \int_0^\infty (e^{-t} H_t^* \varphi + v \text{-const.}) dt \\ &= U \varphi + v \text{-const.} \end{aligned}$$

(v const. は \mathbb{R}^n の変数 v についての定数) となるので、

$$\varphi = -L U \varphi \quad (m \varphi = 0 \text{ のとき})$$

となる。 μ と H の台がコンパクトなどとく注意すれば一般の φ について (5.1) を得る。補題 5.2 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^n)$ のとき、

$$(5.2) \quad \varphi(z_t^\varepsilon) = \varphi(z) + m_t^\varphi + \int_0^t (\mathcal{L}^\varepsilon \varphi)(z_s^\varepsilon) ds,$$

 $z \in \mathbb{Z}^d$

$$(5.3) \quad z_t^\varepsilon = (x_t^\varepsilon, v_t^\varepsilon), \quad z = (x, v),$$

$$(5.4) \quad m_t^{\varphi_\varepsilon} = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^m} \left\{ \varphi(x_{s-}^\varepsilon, u) - \varphi(x_{s-}^\varepsilon, v_{s-}^\varepsilon) \right\} \tilde{N}^\varepsilon(dsdu)$$

(\tilde{N}^ε は (3.13) の定義(左。))

証明 semi-martingale の表示 (4), (1) と伊藤の公式

によると

$$\begin{aligned} \varphi(z^\varepsilon) &= \varphi(z) + \int_0^t \frac{\partial}{\partial x^a} \varphi(z_s^\varepsilon) \left\{ \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} v_s^{\varepsilon, i} F_i^a(x_s^\varepsilon) \right. \\ &\quad \left. + G^a(x_s^\varepsilon) \right\} ds + \int_0^t \frac{\partial}{\partial v^i} \varphi(z_s^\varepsilon) \cdot \frac{1}{\varepsilon} H^i(v_s^\varepsilon) ds \\ &\quad + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \varphi(x_{s-}^\varepsilon + 0, v_{s-}^\varepsilon + u - v_{s-}^\varepsilon) \right. \\ &\quad \left. - \varphi(x_{s-}^\varepsilon, v_{s-}^\varepsilon) \right\} N^\varepsilon(dsdu) \end{aligned}$$

となる。 $\mathcal{L}^\varepsilon, \tilde{N}^\varepsilon$ の定義から (5.2) を得る。

補題 5.3 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^n)$, $\varphi_1 = \mathcal{L}^\varepsilon \varphi$ かつ

$$\begin{aligned} \int_0^t \varphi(z_s^\varepsilon) ds &= \int_0^t (m\varphi)(x_s^\varepsilon) ds \\ &\quad + \int_0^t (\sqrt{\varepsilon} F + \varepsilon G) \varphi_1(z_s^\varepsilon) ds \\ &\quad - \varepsilon \left\{ \varphi_1(z^\varepsilon) - \varphi_1(z) \right\} + \varepsilon m_t^{\varphi_1, \varepsilon}. \end{aligned} \tag{5.5}$$

証明

$$(5.6) \quad \mathcal{L}^\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} F + G + \frac{1}{\varepsilon} L$$

に注意して補題 5.1 と (5.2) を使えばよい。

補題5.4 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ のとき,

$$(5.7) \quad f(x_t^\varepsilon) = f(x) + M_t^\varepsilon + \int_0^t \bar{\mathcal{L}} f(x_s^\varepsilon) ds + R_t^\varepsilon,$$

$\geq 2\varepsilon''$

$$(5.8) \quad M_t^\varepsilon = \int_0^{t+} \int_{\mathbb{R}^m} \left[\varepsilon \left\{ U\varphi^i(u) - U\varphi^i(u_{s-}^\varepsilon) \right\} F_i f(x_{s-}^\varepsilon) \right. \\ \left. + \varepsilon \left\{ U\varphi^j(u) - U\varphi^j(u_{s-}^\varepsilon) \right\} F_i F_j f(x_{s-}^\varepsilon) \right]$$

$$\tilde{N}^\varepsilon(dsdu),$$

$$(5.9) \quad \varphi^{ij} = \varphi^i \cup \varphi^j \quad (\varphi^i \text{ は (1.10) で定義 (左。)}) ,$$

$$R_t^\varepsilon = - \left\{ \sqrt{\varepsilon} U\varphi^i F_i f + \varepsilon U\varphi^{ij} F_i F_j f \right\} (z_t^\varepsilon)$$

$$(5.10) \quad + \left\{ \sqrt{\varepsilon} U\varphi^i F_i f + \varepsilon U\varphi^{ij} F_i F_j f \right\} (z) \\ + \int_0^t \left(\sqrt{\varepsilon} U\varphi^i \cdot G F_i f + \sqrt{\varepsilon} \varphi^{ijk} F_i F_j F_k f \right. \\ \left. + \varepsilon U\varphi^{ij} \cdot Q F_i F_j f \right) (z_s^\varepsilon) ds.$$

$$(5.11) \quad \varphi^{ijk} = \varphi^i \cup \varphi^{jk}$$

証明 (1.20) の右辺第1項を次のようして変形する。

centering condition (1.14) より

$$mFf = m\varphi^i \cdot F_i f = 0$$

となるので、(5.5) より

$$\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} Ff(z_t^\varepsilon) dt = (\sqrt{\varepsilon} F + \varepsilon G) \varphi_1^\varepsilon(z_t^\varepsilon) dt \\ - \varepsilon d\varphi_1^\varepsilon(z_t^\varepsilon) + \varepsilon dm\varphi_1^\varepsilon.$$

227

$$(5.12) \quad \varphi_1^\varepsilon = \nabla \varphi^\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \nabla \varphi^i \cdot F_i f.$$

(t=t^n, T)

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} F f(z_t^\varepsilon) dt \\ &= (F + \sqrt{\varepsilon} G) f_1(z_t^\varepsilon) dt - \sqrt{\varepsilon} d f_1(z_t^\varepsilon) + \varepsilon \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} dm_{t^\varepsilon}^{f_1}, \end{aligned}$$

t=t^n (

$$(5.13) \quad f_1 = \nabla \varphi^i F_i f.$$

phi ~ k

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} F f(z_t^\varepsilon) dt \\ &= \varphi^{ij} F_i F_j f(z_t^\varepsilon) dt + \sqrt{\varepsilon} \nabla \varphi^{ij} G F_j f(z_t^\varepsilon) dt \\ & \quad - \sqrt{\varepsilon} d f_1(z_t^\varepsilon) + \sqrt{\varepsilon} dm_{t^\varepsilon}^{f_1}, \end{aligned}$$

t ~一度 (5.5) を使って

$$\begin{aligned} & \varphi^{ij} F_i F_j f(z_t^\varepsilon) dt \\ &= b^{ij} F_i F_j f(z_t^\varepsilon) dt + (\sqrt{\varepsilon} F + \varepsilon G) \varphi_1(z_t^\varepsilon) dt \\ & \quad - \varepsilon d \varphi_1(z_t^\varepsilon) + \varepsilon dm_{t^\varepsilon}^{\varphi_1}, \end{aligned}$$

227

$$(5.14) \quad \varphi_1 = \nabla \varphi^{ij} \cdot F_i F_j f.$$

(t=t^n, T)

$$\begin{aligned} & \varphi^{ij} F_i F_j f(z_t^\varepsilon) dt \\ &= \frac{1}{2} (b^{ij} F_i F_j + b^{ji} F_j F_i) \overbrace{f(z_t^\varepsilon)}^{dt} + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + \sqrt{\varepsilon} \varphi^{i,j,k} F_i F_j F_k f(z_t^\varepsilon) dt \\
 & + \varepsilon U \varphi^{i,j} G F_i F_j f(z_t^\varepsilon) dt \\
 & - \varepsilon d\psi_1(z_t^\varepsilon) + \varepsilon dm_{t^\varepsilon}^{\psi_1, \varepsilon}.
 \end{aligned}$$

また

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{2} (\ell^{i,j} F_i F_j + \ell^{j,i} F_j F_i) \\
 & = \frac{1}{2} (\ell^{i,j} F_i F_j + \ell^{j,i} F_i F_j + \ell^{i,j} [F_j, F_i]) \\
 & = \alpha^{i,j} F_i F_j + \frac{1}{2} \ell^{i,j} [F_i, F_j]
 \end{aligned}$$

となるので、以上をまとめ

$$\begin{aligned}
 df(z_t^\varepsilon) &= \sqrt{\varepsilon} U \varphi^i \cdot G F_i f(z_t^\varepsilon) dt \\
 &\quad - \sqrt{\varepsilon} d\psi_1(z_t^\varepsilon) + \sqrt{\varepsilon} dm_{t^\varepsilon}^{\psi_1, \varepsilon} \\
 &\quad + \sqrt{\varepsilon} \varphi^{i,j,k} F_i F_j F_k f(z_t^\varepsilon) dt \\
 &\quad + \varepsilon U \varphi^{i,j} G F_i F_j f(z_t^\varepsilon) dt \\
 &\quad - \varepsilon d\psi_1(z_t^\varepsilon) + \varepsilon dm_{t^\varepsilon}^{\psi_1, \varepsilon} \\
 &\quad + \bar{\mathcal{L}} f(z_t^\varepsilon) dt
 \end{aligned}$$

ゆえに

$$\begin{aligned}
 (5.15) \quad df(z_t^\varepsilon) &= dm_{t^\varepsilon}^{\psi_1, \varepsilon} + \bar{\mathcal{L}} f(z_t^\varepsilon) dt - df^\varepsilon(z_t^\varepsilon) \\
 &\quad + \{ \sqrt{\varepsilon} U \varphi^i \cdot G F_i + \sqrt{\varepsilon} \varphi^{i,j,k} F_i F_j F_k \\
 &\quad + \varepsilon U \varphi^{i,j} G F_i F_j \} f(z_t^\varepsilon) dt,
 \end{aligned}$$

$$(5.16) \quad f^\varepsilon = \sqrt{\varepsilon} U \varphi^i \cdot F_i f + \varepsilon U \varphi^{i,j} \cdot F_i F_j f$$

となり、(5.4) により結論を得る。

$$\text{補題 5.5} \quad \sup_{\varepsilon} E \left[\sup_{t \in [0, T]} |x_t^\varepsilon|^4 \right] < \infty.$$

証明 $a_t^\varepsilon = E \left[\sup_{s \in [0, t]} |x_s^\varepsilon|^4 \right]$ とおく。 $\mu \in H$

の台がコンパクトな z とかく、 $\varphi''(v_t^\varepsilon)$, $\mathcal{L}\varphi''(v_t^\varepsilon)$,
 $\varphi'''(v_t^\varepsilon)$, $\mathcal{L}\varphi'''(v_t^\varepsilon)$, $\varphi''''(v_t^\varepsilon)$ は一様有界である。
 $f^a(x) = x^a$ ($x = (x_1, \dots, x^d)$) の場合に

(5.7) を適用して

$$a_t^\varepsilon \leq \text{const.} \left(1 + E \sum_a |M_t^{f^a, \varepsilon}|^4 + \int_0^t a_s^\varepsilon ds \right)$$

がわかる。(5.15) と

$$\begin{aligned} & E (m_t^{\varphi, \varepsilon})^p \\ &= E \int_0^t [(\varphi)^p(z_s^\varepsilon) + \sum_{k=1}^{p-1} (\binom{p}{k}) \mathcal{L}^k \varphi(z_s^\varepsilon)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5.17) \quad & x (-1)^{p-k} \left(\int_0^s \mathcal{L}^k \varphi(z_r^\varepsilon) dr \right)^{p-k} \\ & + \sum_{k=1}^{p-1} (\binom{p}{k}) (\varphi)_s^k (z_s^\varepsilon) (-1)^{p-k} \epsilon_{p-k} \\ & x \left(\int_0^s (\mathcal{L}^k \varphi)(z_r^\varepsilon) dr \right)^{p-k-1} \mathcal{L}^k \varphi(z_s^\varepsilon) \\ & + p \left(\int_0^s (\mathcal{L}^k \varphi)(z_r^\varepsilon) dr \right)^{p-1} \Big] ds \end{aligned}$$

($\varphi_z(s) = \varphi(s) - \varphi(z)$) に注意すれば、

$E|M_t^{\frac{a}{\epsilon}}|^4 \leq \text{const.} \int_0^t a_s^\epsilon ds$

を得る。

補題 5.6

$$\lim_{\delta \rightarrow +0} \limsup_{\epsilon \rightarrow +0} \sup_{S \in [0, T]} \frac{1}{\delta} E \left[\sup_{t \in [s, s+\delta]} |x_t^\epsilon - x_s^\epsilon|^4 \right] = 0.$$

証明 区間 $[s, s+\delta]$ について上と同様の評価をすればよい。

補題 5.7 $\{P_x^\epsilon\}_{\epsilon > 0}$ は $C([0, T], \mathbb{R}^d)$ で tight.

証明 $\forall \alpha > 0 \quad \forall \gamma > 0 \quad \exists \delta \in (0, 1) \quad \exists \epsilon_0 > 0$

$\forall \epsilon \in (0, \epsilon_0) \quad \forall t \in [0, T]$

$$\frac{1}{\delta} P_x^\epsilon \left\{ \sup_{s \in [t, t+\delta]} |w_s - w_t| \geq \alpha \right\} \leq \gamma$$

(w_s は曲線 $w \in C([0, T], \mathbb{R}^d)$ の s における値)
が上の補題からわかるので [2] 定理 8.3 が使える。

定理の証明 $\{P_x^\epsilon\}_{\epsilon > 0}$ の集積点が \bar{L} -martingale 問題の解であることは、(5.7) からわかる。ゆえに martingale 問題の解の一意性により結論を得る。

文 献

- [1] Bensoussan, A., Lions, J. L. and Papanicolaou, G. C. : Boundary Layers and Homogenization of Transport Processes, Publ. RIMS, Kyoto Univ. 15 (1979), 53-157.
- [2] Billingsley, P.: Convergence of probability measures, Wiley, New York, 1968.
- [3] Bishop, R. and Crittenden, R. J.: Geometry of manifolds, Academic Press, New York, 1964.
- [4] Funaki, T.: Construction of a solution of random transport equation with boundary condition, J. Math. Soc. Japan 31 (1979), 719-744.
- [5] Ikeda, N., Nakao, S. and Yamato, T. : A Class of Approximations of Brownian Motion, Publ. RIMS, Kyoto Univ. 13 (1977), 285-300.
- [6] Ikeda, N. and Watanabe, S. : Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes, to appear.

- [7] Itô, K. : The Brownian motion and tensor fields on Riemannian manifold, Proc. Intern. Congr. Math. Stockholm, 536-539, 1963.
- [8] Itô, K. : Stochastic parallel displacement, Probabilistic methods in differential equations, Lecture Notes in Math. 451, 1-7, Springer-Verlag, Berlin, 1975.
- [9] Kobayashi, S. and Nomizu, K. : Foundations of Differential Geometry, Wiley 1963.
- [10] Malliavin, P. : Stochastic calculus of variation and hypoelliptic operators, Proc. Intern. Symp. SDE Kyoto 1976 ed. by K. Itô, 195-263, Kinokuniya, Tokyo, 1978
- [11] Ogawa, S. : A Partial Differential Equation with the White Noise as a Coefficient, Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Geb. 28, 53-71 (1973).
- [12] Papapiccolaou, G. C., Stroock, D. W. and Varadhan, S. R. S. : Martingale approach to some limit theorems, 1976 Duke

Turbulence Conf., Duke Univ. Math. Series
III, 1977.

- [13] Pinsky, M.A.: Isotropic Transport Process on a Riemannian Manifold, Trans. Amer. Math. Soc. 218 (1976) 353-360.
- [14] Pinsky, M. A.: Homogenization in Stochastic Differential Geometry (preprint)
- [15] Stroock, D.W. and Varadhan, S.R.S.: On the support of diffusion processes with applications to the strong maximum principle, Proc. Sixth Berkeley Symp. Math. Statist. Prob. III, 333-359, Univ. California Press, Berkeley, 1972.
- [16] 田中洋・長谷川実: 確率微分方程式, Seminar on Prob. 19, 1964.
- [17] 渡辺信三: 多様体上の SDE の定義する diffeomorphism の flow の微分と変分, 本講究録.
- [18] Wong, E. and Zakai, M.: On the relation between ordinary and stochastic differential equations, Intern. J. Engrg. Sci. 3 (1965), 213-229.