

Title	右延長文法により生成される言語について (オートマトン理論と数理言語の研究)
Author(s)	大芝, 猛; 有川, 節夫
Citation	数理解析研究所講究録 (1974), 213: 104-122
Issue Date	1974-06
URL	http://hdl.handle.net/2433/105234
Right	
Type	Departmental Bulletin Paper
Textversion	publisher

右延長文法により生成される言語について

静大 工 大芝 猛

九大 理 有川 節夫

alphabet $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$ に対し次の $G = (\Sigma, S, P)$ を Σ の上の右延長文法という。即ち S は Σ^* の有限部分集合 (axioms), P は $\Sigma^* \times (\Sigma^* - \{\lambda\})$ の有限部分集合 (production rules).

(i) P の rules の適用について関係 \Rightarrow は「任意の $\langle x, y \rangle \in P$, $w_i \in \Sigma^*$ について $w_1 x w_2 \Rightarrow w_1 y w_2$ 」によって定め.

(ii) $\overset{*}{\Rightarrow}$ は \Rightarrow の reflexive, transitive closure とする.

$L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u \in S, u \overset{*}{\Rightarrow} w\}$ を G の定める右延長言語という。

右延長言語について以下の結果が成立する。


1 $\Sigma = \{a_1\}$ のとき右延長言語の族は $\Sigma = \{a_1\}$ の上の正規集合族と一致する。

2 $\#(\Sigma) \geq 2$ のとき、右延長言語の族は正規集合族と真部分に含み、左片側文脈依存言語の族 (従って文脈依存言語の族) に真部分に含まれる。

3° $\#(\Sigma) \geq 2$ のとき、右延長言語の族と文脈自由言語の族は互に他の部分ではない。

下図の関係が成立し、マークされた部分の例としては

ex.1; $L_1 = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$, ex.2: L_2 : a, b からなる Dyck 言語,
 ex.3: $L_3 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$, ex.4: ある homomorphism φ , ある正規集合 C を用いて $\varphi(L_4 \cap C) = \{a^n b^n c^k \mid n \geq 1, n \geq k \geq 0\}$ なる $L_4 = L(G)$ が Proposition 3 に与えられ、更にある homomorphism ψ によって $\psi(L_4) = L'_4 = L(G') \subseteq \{0,1\}^*$ なる L'_4 が与えられる。



§ 1 正規集合との関係

更に $G=(\Sigma, S, P)$ の rules P の適用を左端のみに制限してうる

言語 $R(G) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u \in S, u \xrightarrow{*}_R w\}$ と次のように定義する。

$v, z \in \Sigma^*$ に対し $v \xrightarrow{R} z$ は $\exists x, y, v' \in \Sigma^*, v = xv', z = xyv', \langle x, y \rangle \in P$ とし

$\xrightarrow{*}_R$ は \xrightarrow{R} の reflexive, transitive closure とする。

[Proposition 1] 任意の正規集合 $R = T(A), (A=(K, \Sigma, \delta, q_0, F))$ 有限オートマトン) に対し $T(A) = R(G_A) = L(G_A)$ なる右延長文法

$G_A = (\Sigma, S, P)$ あり, (但し K : 内部状態の集合, $q_0 \in K$ 初期状態, F : 最終状態, δ 決定論的遷移関数)

(証明) $\#(K) = m$ とし. $S = \{w \in T(A) \mid |w| < m^m\}$

$$P = \{ \langle x, y \rangle \mid x \equiv xy, |xy| \leq m^m, |y| \neq 0, x, y \in \Sigma^* \}$$

$G_A = (\Sigma, S, P)$ とする但し $u, v \in \Sigma^*$ に対し同値関係

$$u \equiv v \Leftrightarrow \forall q \in K, \delta(q, u) = \delta(q, v)$$
 と定義する.

• $R(G_A) \subseteq L(G_A) \subseteq T(A) = R$ は明か可

• $R = T(A) \subseteq R(G_A)$ のみを示せばよ

「 $w \in R \rightarrow w \in R(G_A)$ 」と $|w|$ に依る帰納法により示す:

(case 1) $|w| < m^m$: $w \in S \subseteq R(G)$

(case 2) $|w| \geq m^m$: $w = a_{i_1} \dots a_{i_{|w|}} (a_{i_j} \in \Sigma)$

$a_{i_1} \dots a_{i_p} = x_p (0 \leq p \leq |w|)$ とする x_0, x_1, \dots, x_{m^m} の中に同値なるものあり, $x_k \equiv x_{k+l} (0 \leq k < k+l \leq m^m)$ とする.

$a_{i_{k+1}} \dots a_{i_{k+l}} = y$ とおくと $x_k \equiv x_{k+l} y, |y| \neq 0, \langle x_k, y \rangle \in P$

一方 $w = x_k y v' \equiv x_k v' \quad x_k v' \in T(A) = R, |x_k v'| < |w|$

帰納法の仮定より $x_k v' \in R(G_A) \therefore w = x_k y v' \in R(G_A)$

[系 1] 族 $\{R(G) \mid G \text{ は } \Sigma \text{ 上の右延長文法}\}$ は Σ 上の正規集合の族と一致する.

(証明) Proposition 1 より任意の右延長文法 $G = (\Sigma, S, P)$ において $R(G)$ が正規集合となることを示せばよ.

$G=(\Sigma, S, P)$ に対し $R(G) = T(A_G)$ なる非決定論的 λ input タイプ

の有限オートマトン $A_G=(K, \Sigma, \delta, q_0, F)$ あり.

即ち $\max(\max_{\langle x, y \rangle \in P} |xy|, \max_{u \in S} |u| + 1) = k$ とし

$$K = \bigcup_{\ell=0}^k \Sigma^\ell = \{a_{i_1} \dots a_{i_\ell} \mid 0 \leq \ell \leq k, a_{i_j} \in \Sigma (j=1, \dots, \ell)\}$$

$$q_0 = \lambda \in K, \quad F = S, \quad \text{とす.}$$

δ は次の2つのタイプのもつからなる:

(1) $\delta(xyv, \lambda) \ni xv$ (for each $x, y, v \in \Sigma^*, \langle x, y \rangle \in P, |xyv| \leq k$)

(2) $\delta(x, a) \ni xa$ (for each $x \in \Sigma^*, |x| < k, a \in \Sigma$)

(i) $R(G) \subseteq T(A)$ については: $w = a_{i_1} \dots a_{i_m} \in \Sigma^*$ に対し

$$w^{(k)} = \begin{cases} a_{i_1} \dots a_{i_k} & (\text{if } m > k), \\ a_{i_1} \dots a_{i_m} & (\text{if } m \leq k) \end{cases}, \quad w \setminus w = \begin{cases} a_{i_{k+1}} \dots a_{i_m} & (\text{if } m > k) \\ \lambda & (\text{if } m \leq k) \end{cases}$$

とし、 A に対して状態 q , input x の計算状況と (q, x) と可視

は、一般に " $u \xrightarrow{R} w$ ならば $(w^{(k)}, w \setminus w) \stackrel{*}{\vdash}_A (u^{(k)}, u \setminus u)$ " が成立

する。従って $w \in R(G)$ 即ち $S \ni u \xrightarrow{R} w$ のとき $(q_0, w) = (\lambda, w) \stackrel{*}{\vdash}_A$

$$(w^{(k)}, w \setminus w) \stackrel{*}{\vdash}_A (u^{(k)}, u \setminus u) = (u^{(k)}, \lambda) \quad \text{即ち } w \in T(A_G).$$

(ii) $T(A) \subseteq R(G)$ については: " $w \in T(A_G)$ ならば $w \in R(G)$ " と $|w|$ に依り

る帰納法により容易に示しうる。

[系 2] $\#(\Sigma) = 1$ のとき $\{L(G) \mid G \text{ } \Sigma \text{ の上の右延長文法}\}$ は正規集合族と一致する

(\because) $\#(\Sigma) = 1$ のとき Σ の上の任意の右延長文法 につき

$L(G) = R(G)$ が成立する。

§ 2 文脈依存言語, 文脈自由言語との関係

[Proposition 2] 右延長言語は左片側文脈依存言語であり従って文脈依存言語である。

[Lemma] $L(G)$; $G = (\Sigma, S, P)$ に対し $L(G) = L(G')$; $G' = (\Sigma, S', P')$, 「 P' は $\langle \lambda, v \rangle, \langle u, \lambda \rangle$ なる要素をもとに」なる G' あり。

(証明) $P = P_1 \cup P_2$, $P_1 = \{\langle x_i, y_i \rangle \mid i=1, \dots, p\}$, $x_i \neq \lambda, y_i \neq \lambda$

$P_2 = \{\langle \lambda, v_j \rangle \mid j=1, \dots, q\}$ $v_j \neq \lambda$ とおける。

$P' = P_1 \cup P'_2$, $P'_2 = \{\langle a, v_j \rangle \mid a \in \Sigma, j=1, \dots, q\}$

$S' = S \cup \{v_j u \mid j=1, \dots, q, u \in S\}$, $G' = (\Sigma, S', P')$ とする。

• $L(G') \subseteq L(G)$ は明らか。

$L(G) \subseteq L(G')$ について: 任意の $w \in L(G)$ に対して導出

$S \ni u \xrightarrow{*}_P w$ の中において

(case 1) $P_2 \ni \langle \lambda, v_j \rangle$ のルールの左端での適用がないとき:

P_2 の適用は P'_2 の適用とみなせる。従って, $S' \ni S \ni u \xrightarrow{*}_{P'} w$ ($w \in L(G')$)

(case 2) P_2 の左端における適用があるとき: その最終のもの

の $\langle \lambda, v \rangle$ の適用をマークする: $S \ni u \xrightarrow{*}_P u_1 \xrightarrow{P_2} vu_1 \xrightarrow{*}_P w$ 従って

$S' \ni vu_1 \xrightarrow{*}_P vu_1 \xrightarrow{*}_P w$ が成立。これに P_2 の左端適用は現れない。

従って $S' \ni vu_1 \xrightarrow{*}_{P'} w$ 即ち $w \in L(G')$ 。

(Proposition 2 の証明) 右延長言語 $L = L(G)$; $G = (\Sigma, S, P)$ に対し前 Lemma より $P = \{\langle u_i, x_i, v_i \rangle \mid i=1, \dots, k\}$ とおける。

但し $x_i \in \Sigma$, $u_i \in \Sigma^*$, $v_i \in \Sigma^+$ ($i=1, \dots, k$).

ここで $V_N = \{X_0\} \cup \{X_a \mid a \in \Sigma\}$, $V_T = \Sigma$ とし

$\psi(a) = X_a$ (for each $a \in \Sigma$) によって $V_T = \Sigma$ から V_N への写像
型を定める: $P' = P'_0 \cup P'_1 \cup P'_2$, $P'_0 = \{X_0 \rightarrow \psi(u) \mid u \in S\}$,

$P'_1 = \{\psi(u_i)X_{x_i} \rightarrow \psi(u_i)X_{x_i}\psi(v_i) \mid i=1, \dots, k\}$, $P'_2 = \{X_a \rightarrow a \mid a \in \Sigma\}$

とすると $G' = (V_N, V_T, P', X_0)$ は 1 つの左片側文脈依存文法
を与える, G' によって定義される phrase structure 言語 $L(G')$
は右延長言語 $L(G)$ と一致することは容易に確かめうる.

◦ $\#(\Sigma) \geq 2$ のとき, 正規言語でない右延長言語としては:

Dyck 言語 $L(G_D)$ がある. 即ち $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

に対して $G_D = (\Sigma, S_D, P_D)$, $P_D = \{\langle a_1, a_1, a_2 \rangle, \langle a_2, a_1, a_2 \rangle\}$,

$S_D = \{\lambda, a_1 a_2\}$.

◦ $\#(\Sigma) \geq 2$ のとき, 右延長言語の族は文脈自由言語の族と
互に他の部分ではない. これは $\{a^n a_2^n \mid n \geq 1\}$ が右延長言
語ではないこと. と次の Proposition 3 による.

[Proposition 3] 右延長言語で文脈自由ではないものあり

下記の $L(G)$ はその例を与える

$G = (\Sigma, S, P)$; $\Sigma = \{a, b, c, a', f, X, Y, \bar{X}\}$,

$S = \{cab\bar{X}\bar{X}\}$, $P = P_0 \cup P_1 \cup P_2 \cup P_3 \cup P_4 \cup P_5 \cup P_6$:

$$P_0 = \{ \langle c, cab \rangle \}, P_1 = \{ \langle a, fa'bba' \rangle \}, P_2 = \{ \langle a, fa'ba' \rangle \},$$

$$P_3 = \{ \langle bb\alpha b, b \rangle \mid \alpha \in \{a, a'\} \}, P_4 = \{ \langle \alpha, b\alpha b, a' \rangle \mid \alpha, \alpha' \in \{a, a'\} \},$$

$$P_5 = \{ \langle bb\alpha b, bY \rangle \mid \alpha \in \{a, a'\} \}, P_6 = \{ \langle \alpha, b\alpha b, X \rangle \mid \alpha, \alpha' \in \{a, a'\} \}$$

これが文脈自由でないことを示すために次の正規集合 C と準同型 φ とを考え.

$$\varphi(L(G) \cap C) = \{ c^n a^n X^k \mid n \geq 1, n \geq k \geq 0 \} \text{ なることを示す.}$$

このとき、右辺は文脈自由ではないが $L(G)$ も同様となる。

但し $C = C_0 \cap C_1 \cap C_2 \cap C_3$ はパターンへの制限を与える。

$$\text{即ち } C_0 = \Sigma^* - \Sigma^* a \Sigma^* c \Sigma^* \text{ (aのあとにcのある語を除く)}$$

$$C_1 = \Sigma^* - \Sigma^* a' (\Sigma - \{b\}) \Sigma^* \text{ (a'のあとにはbのみ)}$$

$$C_2 = \Sigma^* - \Sigma^* Y (\Sigma - \{X, \bar{X}\}) \Sigma^* \text{ (YのあとにはXまたは}\bar{X}\text{)}$$

$$C_3 = \Sigma^* - \Sigma^* X (\Sigma^* - bY \Sigma^*) \text{ (XのあとにはbYが続く),}$$

$$\varphi \text{ は } \begin{cases} \varphi(x) = x \text{ (} x = c, a, X \text{)}, & \varphi(Y) = X, \\ \varphi(a') = \varphi(b) = \varphi(f) = \varphi(\bar{X}) = \lambda \text{ と定義する.} \end{cases}$$

以下に $L_1 = L(G) \cap C$ とおき、 $\varphi(L_1) = L_2 = \{ c^n a^n X^k \mid n \geq 1, n \geq k \geq 0 \}$ を示す。

(Part 1) $L_2 \subseteq \varphi(L_1)$ について：各 $n \geq 1$ 各 $p (n \geq p \geq 0)$ に

対して次の形の $w_{n,p}$ が $L_1 = L(G) \cap C$ に属することを確かめ

$$w_{n,2k} = c^n \left(\prod_{i=1}^k af(a'bb)^{n_{2i-1}} af(a'b)^{n_{2i}} \right) \cdot \left(\prod_{j=2k+1}^n ab(a'b)^{n_j} \right) (XbY)^k \bar{X}\bar{X}$$

$$w_{n,2k+1} = c^n \left(\prod_{i=1}^k af(a'bb)^{n_{2i-1}} af(a'b)^{n_{2i}} \right) \cdot af(a'bb)^{n_{2k+1}} \left(\prod_{j=2k+2}^n abb(a'bb)^{n_j} \right) Y(XbY)^k \bar{X}\bar{X}.$$

(註)* Salomaa. Formal Languages. p.102(Academic Press 1973) 等参照.

従って $\varphi(w_{n,p}) = c^n a^n X^p \in \varphi(L(G) \cap C)$.

(Part 2) $\varphi(L_1) \subseteq L_2$: 次のような挿入文法 $G' = (\Sigma, S, P')$ が存在するこゝから示される。

$$(A) L_1 = L(G) \cap C \subseteq L(G')$$

$$(B) \varphi(L(G')) \subseteq L_2 = \{c^n a^n X^k \mid n \geq 1, n \geq k \geq 0\}$$

但し $P' = P'_0 \cup P'_1 \cup P'_2 \cup P'_3 \cup P'_4 \cup P'_5 \cup P'_6$, P'_i は P_i に関連して次のように定義される:

$$P'_0 = \{ \langle c, cab, a \rangle \}, P'_1 = \{ \langle a, fa'bba', b \rangle \}, P'_2 = \{ \langle a, fa'ba', b \rangle \},$$

$$P'_3 = P_3 = \{ \langle b\alpha b, b \rangle \mid \alpha \in \{a, a'\} \},$$

$$P'_4 = \{ \langle b\alpha b, b\gamma \rangle \mid \alpha \in \{a, a'\}, \gamma \in \{X, \bar{X}\} \},$$

$$P'_5 = \{ \langle \alpha_1 b \alpha_2 b, a', b \rangle \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \{a, a'\} \},$$

$$P'_6 = \{ \langle \alpha_1 b \alpha_2 b, X, bY \rangle \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \{a, a'\} \}.$$

(こゝで挿入文法 $G' = (\Sigma, S, P')$ とは右延長文法の拡張として

P は $\Sigma^* \times (\Sigma^* - \{\lambda\}) \times \Sigma^*$ の有限部分集合として定義し、このと

き $L(G)$ は右延長言語と同様に S の語から productions

$uxzv \Rightarrow uxyzv$; ($\langle x, y, z \rangle \in P, u, v \in \Sigma^*$) の有限回をほどに

してうる語の全体と定義する.)

(A の証明) (A)は $L(G)$ w の "パターン" の制限 $w \in C$ が "導出に用いられるルール P の P' の制限" を導びくことを主張するものがある。即ち導出 $cab\bar{X}\bar{X} \Rightarrow w$ において P のルールは P' の形でのみ用いうることを示す。

(0) $P_0 \Rightarrow \langle c, cab \rangle$ の適用をマークする : $u, v, v_i, w_i \in \Sigma^*, \xi \in \Sigma$

として, $cab\bar{X}\bar{X} \xrightarrow{P_0} uc\xi v = uc\xi v_2$ ($\because v=v_1\bar{X}\bar{X}, |v_1| \geq 2$)
 $= \xi v_2$ とおける.

$$\xrightarrow{P_0} uccab\xi v_2 \xrightarrow{P_0} w_1 a w_2 \xi w_3 = w$$

先づ一般に $uc\xi v_1 \in L(G)$ ならば c の右隣りの ξ は a or c .

また $w \in L_1 \subseteq C_0 = \Sigma^* - \Sigma^* a \Sigma^* c \Sigma^*$ より a の右の ξ は c , $\therefore \xi = a$.

P_0 は $ucav_2 \xrightarrow{P_0} uccabav_2$ の形、即ち P_0' の形で用いられる。

(1) $P_1 \Rightarrow \langle a, fa' bba', a' \rangle$ の適用をマーク :

$$cab\bar{X}\bar{X} \xrightarrow{P_1} uav = ua\xi v_1 \xrightarrow{P_1} ua\underline{fa' bba'}\xi v_1 \xrightarrow{P_1} w, a'\xi w_2 = w$$

($\because P$ が $\langle \dots a', \dots \rangle$ の形のルールを含まぬ故に $a'\xi$ は不変.)

$w \in C_1$ より a' の直後は b . $\xi = b$ 故に P_1 は P_1' として適用

(2) P_2 は P_2' としてのみ用いられることは(1)と同様.

(3) $P_3 = P_3'$

(4) $P_4 \Rightarrow \langle bba\alpha b, bY \rangle$ の適用をマーク ; (1)と同様 $Y\xi$ が P

$$\text{で不変なることに注意し, } cab\bar{X}\bar{X} \xrightarrow{P_4} ubb\alpha bv = ubb\alpha b\xi v_1 \xrightarrow{P_4} ubb\alpha bbY\xi v_1,$$

$$= w, Y\xi w_2 = w \in L_1 \subseteq C_2$$

$\therefore \xi = X$ or $\bar{X} \therefore P_4$ は P_4' としてのみ適用される。

(5) P_5 についても(1)同様 P_5' としてのみ適用される。

(6) $P_6 \Rightarrow \langle \alpha_1 b \alpha_2 b, X \rangle$ の適用をマーク ; $X\xi$ が P で不変で

$$\text{あることに注意 } cab\bar{X}\bar{X} \xrightarrow{P_6} u\alpha_1 b \alpha_2 bv = u\underline{\alpha_1 b \alpha_2 b}\xi v_1, (\because |v_1| \geq 2)$$

$$\xrightarrow{P_6} u\underline{\alpha_1 b \alpha_2 b X}\xi v_1 \xrightarrow{P_6} w, X\xi \eta' w_2 = w \in C_3$$

$\therefore \xi \eta' = bY \therefore \xi = b, \eta' = Y$ 更に Xb も P で不変 $\therefore \eta = \eta' = Y$

従って P_6 も P'_6 としてのみ用いられる。

(B の証明) 下記の Lemma (1)–(5) から

「任意の $w \in L(G')$ について

$$\left. \begin{array}{l} w \in c^*c\{a, a'b, f\}^*\{X, bY\}^*\bar{X}\bar{X} \\ \#_c(w) = \#_a(w) \geq \#_{XY}(w) \end{array} \right\} \text{が示され}$$

一方 φ により a, c, X はそのまま残り, Y は X に, 他の記号は消去される故 $\varphi(w) = c^{n+1} a^{m+1} X^k \in L_2$ 即ち $\varphi(L(G')) \subseteq L_2$.

[Lemma] $w \in L(G')$ に対して

(1) w の中の $\alpha \in \{a, a'\}$ の直後の記号は b または f .

(2) w の中の f は $uaafa'bv$ の形でのみ現われる。

(3) $w \in c^*c\{a, a', b, f\}^*((XbY)^* \cup bY(XbY)^*)\bar{X}\bar{X}$

特に w が f を含まぬなら $w = c^{n+1}(ab)^{m+1}\bar{X}\bar{X}$ ($n \geq 0$)

(4) $\#_c(w) = \#_a(w) \geq \#_f(w)$

(証明) (1), (2), (3) と (4) の前半は w の導出ステップ数に因る帰納法により容易. (4) の後半は (2) の「 f は a の直後に高々 1 回のみ現われる」ことを導ぶべく説明らるである。

下の Lemma (5) は (a の直後に高々 1 回現われる) f 1 つが右の $\{X, bY\}^*$ のブロックに高々 1 つの X or Y を発生させることを示すもので、これには左の情報を右方へ移動させる手段として $\alpha (a \text{ or } a')$ と b とからなる 2 種類のパターンが利用される。Lemma (5) に用いられる 2 つの定義を述べる:

(定義 1) $w \in L(G')$ に対し $\rho(w)$ を次のように定義する:

(i) w が f を含まぬとき $w = c^{n+1} (ab)^{n+1} \bar{X}\bar{X}$; $\rho(w) = (ab)^{n+1}$

(ii) w が f を含むとき、最も右の f と最も左の X or Y or \bar{X} とはとられる w の部分語 ($\in \{a, a', b\}^*$) を $\rho(w)$ とする。即ち

このとき Lemma (2), (3) より $w = c^{n+1} u f \rho(w) v \bar{X}\bar{X}$

$u \in \{a, a', b, f\}^*$, $v \in (XbY)^* \cup Y(XbY)^*$

$\rho(w) = \alpha_1 b^{n_1} \alpha_2 b^{n_2} \dots \alpha_k b^{n_k}$ ($n_i \geq 1, \alpha_i \in \{a, a'\} \ i=1, \dots, k$).

(定義 2) $w \in L(G')$ の部分語で $v = \alpha_1 b^{n_1} \alpha_2 b^{n_2} \dots \alpha_k b^{n_k}$,

$\alpha_i \in \{a, a'\}, n_i \geq 1$ なるものについて

$N(v) = (311 \ h(n_1) \ h(n_2) \ \dots \ h(n_k) \text{ の記号変化の個数})$

と定義する。但し $h(n) = 1 \ (n=1), h(n) = 2 \ (n \geq 2)$ とする。

[Lemma (5)] 任意の $w \in L(G')$ に対して

$\#_f(w) \geq N(\rho(w)) + \#_{X,Y}(w)$ が成立する。

(証明) $w = cab\bar{X}\bar{X} \in S$ については明らかに成立。

○ w については成立を仮定し $w \xrightarrow{P_i} w'$ なる w' については成立を示せばよい: w が f を含むか否かのそれぞれの場合に適用されるルールの種類によって cases を分類し確かめる。

1. w が f を含まないとき Lemma (3) より $w = c^{n+1} (ab)^{n+1} \bar{X}\bar{X}$ 故に適用可能なルールは P'_0, P'_1, P'_2 のみ。

1.0 P'_0 適用のとき: $w' = c^{n+2} (ab)^{n+2} \bar{X}\bar{X}$, $\rho(w') = (ab^4)^{n+2}$

$N(\rho(w')) = (311 \ 1^{n+2} \text{ の記号変化の数}) = 0$

一方 $\#_f(w') = \#_{XY}(w') = 0$ 故成立.

1.1 $P_1' \ni \langle a, fa'bba', b \rangle$ 適用のとき:

$$w' = c^{m+1} (ab)^k \underbrace{afa'bba'b(ab)}_{\mathcal{O}(w')} \overline{XX}^{m-k}, \quad \mathcal{O}(w') = a'bba'b(ab)^{m-k};$$

$$N(\mathcal{O}(w')) = (2 \cdot 1^{m-k-1} \text{の記号変化の数}) = 1, \quad \#_f(w') = 1$$

$$\#_{XY}(w') = 0 \quad \text{故に成立.}$$

1.3 $P_2' \ni \langle a, fa'ba' \rangle$ }適用のとき: $w' = c^{m+1} (ab)^k \underbrace{afa'ba'b(ab)}_{\mathcal{O}(w')} \overline{XX}^{m-k}$

$$\#_f(w') = 1, \quad N(\mathcal{O}(w')) = 0, \quad \#_{XY}(w') = 0 \quad \text{よって成立.}$$

2. w が f と含むとき:

$$w = c^{m+1} u f \mathcal{O}(w) v \overline{XX}, \quad u \in \{a, a', b, f\}^*, \quad v \in (XbY)^* \cup Y(XbY)^*,$$

$$\mathcal{O}(w) = \alpha_1 b^{n_1} \dots \alpha_k b^{n_k} \quad (n_i \geq 1, \alpha_i \in \{a, a'\})$$

2.0 $P_0' \ni \langle c, cab, a \rangle$ 適用のとき.

$$w' = c^{m+2} ab u f \mathcal{O}(w) v \overline{XX}, \quad \mathcal{O}(w') = \mathcal{O}(w) \quad N(\mathcal{O}(w')) = N(\mathcal{O}(w))$$

一方 $\#_f(w'), \#_{XY}(w')$ も w と変らぬ故, w' に f して成立.

2.1 $P_1' \ni \langle a, fa'bba', b \rangle$ 適用のとき:

2.1.1 u の中の a に適用のとき $\mathcal{O}(w') = \mathcal{O}(w) \therefore N(\mathcal{O}(w')) = N(\mathcal{O}(w))$

$$\#_{XY}(w') = \#_{XY}(w), \quad \#_f(w') > \#_f(w) = N(\mathcal{O}(w)) + \#_{XY}(w) = N(\mathcal{O}(w')) + \#_{XY}(w')$$

2.1.2 $\mathcal{O}(w)$ の中の $\alpha_p = a$ に適用の場合: $\mathcal{O}(w) = w_1 a b^{n_p} w_2$

$$w' = c^{m+1} u f w_1 \underline{afa'bba'b}^{n_p} w_2 \overline{XX}, \quad \mathcal{O}(w') = \underline{a'bba'b}^{n_p} w_2;$$

$$N(\mathcal{O}(w')) \leq N(a'b^{n_p} w_2) + 1 \leq N(\mathcal{O}(w)) + 1 \quad \text{一方 } \#_{XY}(w') = \#_{XY}(w)$$

$$\#_f(w') = \#_f(w) + 1 \geq (N(\mathcal{O}(w)) + \#_{XY}(w)) + 1 \geq N(\mathcal{O}(w')) + \#_{XY}(w')$$

2.2 $P_2' \ni \langle a, fa'ba' \rangle$ 適用の場合 P_1' の場合と同様.

2.3 $P_3' = P_3 \Rightarrow \langle \underline{bb\alpha b, b} \rangle$ 適用の場合

2.3.1 u の中の $bb\alpha b$ に適用されるときの 2.0 の場合と同様

2.3.2 $\sigma(w)$ の中で適用の場合: $\sigma(w) = \alpha_1 b^{n_1} \dots \alpha_k b^{n_k} = w, \underline{bb\alpha_p b w_2}$,

$\therefore p \geq 2, n_{p-1} \geq 2, n_i \geq 1 (i=1, \dots, k), w' = c^{m+1} u f w, \underline{bb\alpha_p b w_2} v \bar{X}\bar{X}, \sigma(w') = w, \underline{bb\alpha_p b w_2}$

$$\therefore \text{のとき} \begin{cases} h(n'_i) = h(n_i) & (i=1, \dots, p-1, p+1, \dots, k) \\ h(n'_{p-1}) = h(n_{p-1}) = 2 \\ h(n'_p) = h(n_p + 1) = 2 \geq h(n_p) \end{cases} \quad \text{である}$$

更に case (i): $p < k, h(n_p) = 2$; $N(\sigma(w')) = N(\sigma(w))$

(ii) " , $h(n_p) = 1, h(n_{p+1}) = 1$; " " " "

(iii) " , " , $h(n_{p+1}) = 2$; $N(\sigma(w')) = N(\sigma(w)) - 2$

(iv): $p = k, h(n_p) = 2$; $N(\sigma(w')) = N(\sigma(w))$

(v): " , $h(n_p) = 1$; $N(\sigma(w')) = N(\sigma(w)) - 1$

従って (i) — (v) のいずれにしても $N(\sigma(w')) \leq N(\sigma(w)) - 1$ #_f, #_{x, y} は不変故成立.

2.4 $P_4' \Rightarrow \langle \underline{bb\alpha b, bY, X} \rangle$ の適用の場合

$\sigma(w) = \alpha_1 b^{n_1} \dots \alpha_k b^{n_k} = w, \underline{bb\alpha_k b}$, $n_{k-1} \geq 2, n_k = 1$, $v = Xv$

$w = c^{m+1} u f w, \underline{bb\alpha_k b X v}, \bar{X}\bar{X}$

$w' = c^{m+1} u f w, \underline{bb\alpha_k b Y X v}, \bar{X}\bar{X}$ $n'_{k-1} \geq 2, n'_k = 2$

$$\sigma(w') = w, \underline{bb\alpha_k b b} \begin{cases} h(n'_i) = h(n_i) & (i=1, \dots, k-1) \\ h(n'_{k-1}) = h(n_{k-1}) = 2 \\ h(n'_k) = 2 > h(n_k) = 1 \end{cases}$$

$$N(\sigma(w')) = N(\sigma(w)) - 1, \quad \#_{XY}(w') = \#_{XY}(w) + 1.$$

$$\#_f(w') = \#_f(w) \geq N(\sigma(w)) + \#_{XY}(w) = N(\sigma(w')) + \#_{XY}(w')$$

2.5 $P'_6 \ni \langle \alpha_1 b \alpha_2 b, a', b \rangle$ の適用の場合.

2.5.1 $w = c^{m+1} u f \sigma(w) v \bar{X}\bar{X}$ のうち $a \alpha_1 b \alpha_2 b b$ は適用の場合

は 2.0 と同様.

2.5.2 $\sigma(w) = w_1 \alpha_p b \alpha_{p+1} b b w_2$ の中で適用される場合: $n_p = 1,$

$n_{p+1} \geq 2, w' = c^{m+1} u f w_1 \alpha_p b \alpha_{p+1} b a' b w_2 v \bar{X}\bar{X}, \sigma(w') = w_1 \alpha_p b \alpha_{p+1} b a' b w_2$

$$\left\{ \begin{array}{l} h(n'_i) = \underline{h(n_i)} \quad (i=1, \dots, p) \\ h(n'_p) = h(n_p) = 1 \\ h(n'_{p+1}) = 1 \\ h(n'_{p+2}) = h(n_{p+1} - 1), \quad h(n_{p+1}) = 2 \\ \underline{h(n'_j) = h(n_{j-1})} \quad (j=p+3, \dots, k+1) \end{array} \right.$$

case (i); $p+1 < k, h(n'_{p+3}) = 2$; $N(\sigma(w')) = N(\sigma(w))$

(ii): " " , $h(n'_{p+3}) = 1, h(n'_{p+2}) = 2$; " " "

(iii): " " , " " , $h(n'_{p+2}) = 1$; $N(\sigma(w')) = N(\sigma(w)) - 2$

(iv): $p+1 = k, h(n'_{p+2}) = 2$; $N(\sigma(w')) = N(\sigma(w))$

(v): " " , $h(n'_{p+2}) = 1$; $N(\sigma(w')) = N(\sigma(w)) - 1$

従って (i) — (v) のいずれのときも, $N(\sigma(w')) \leq N(\sigma(w)) - 1$ かつ $\#_f,$

$\#_{XY}$ は不変故 w' について成立.

2.6 $P'_6 \ni \langle \alpha_1 b \alpha_2 b, X, bY \rangle$ の適用の場合.

$$w = c^{m+1} u f w_1 \alpha_{k-1} b \alpha_k b b Y v, \bar{X}\bar{X}, \sigma(w) = w_1 \alpha_{k-1} b \alpha_k b b, v = Y v,$$

$$w' = c^{m+1} u f w_1 \alpha_{k-1} b \alpha_k b X b Y v, \bar{X}\bar{X}, \quad \rho(w') = w_1 \alpha_{k-1} b \alpha_k b, \quad v = \bar{X} b Y v,$$

$$N(\rho(w')) = N(\rho(w)) - 1, \quad \#_{xy}(w') = \#_{xy}(w) + 1$$

$$\therefore \#_f(w') = \#_f(w) \geq N(\rho(w)) + \#_{xy}(w) = N(\rho(w')) + \#_{xy}(w').$$

§ 3. Left to right 導出への標準化について.

前節で調べたように右延長言語 $L(G)$ は文脈自由であるとはかぎらない。しかし Proposition 2 の Lemma に示したように $G = (\Sigma, S, P)$ の P は $\langle \lambda, u \rangle$ をそのままの形に reduce してあれば、その任意の導出は あり意味で左から右へ実行するよ
うに実行順序を整理することが可能である。Proposition 4, 2
5 はこのことに関連した性質をまとめたものである。

先づ実行順序の変更が可能な場合を例によって示す:

$$w \in L(G) \quad \text{の } / \text{ の導出 } S \Rightarrow u \Rightarrow w \quad \text{につき}$$

$$\text{production } \rho_1: uxv \Rightarrow uxyv \quad \text{の実行後に実行される}$$

$$" \quad " \quad \rho_2: u_1 x_1 v \Rightarrow u_1 x_1 y_1 v_1 \quad \text{について}$$

ρ_2 が ρ_1 に直接つながる枝であるとは x_1 の右端の文字 x_1
($x_1 = x_1' y_1$; y_1 の x_1 を ρ_1 の main 記号 という) が


(i) ρ_1 の xy (ρ_1 の main word という) の中ですでに現れて

(ii) ρ_1 と ρ_2 との中間の productions の main words の中には現

わけて"な"場合をいう。図1の ρ_1, ρ_2 は ρ に直接つながる枝であり、 ρ' は ρ_2 に直接つながるが ρ や ρ_2 には直接つながらない。

ρ に直接つながる2つの枝 ρ_1, ρ_2 について、それぞれの main 記号を x_1, x_2 とする。 ρ の main word の中において、 x_2 が x_1 の左にあれば ρ_2 は ρ_1 の左にあるという。このとき次の結果が成立つ。

- ρ_2 が ρ_1 の左にあれば ρ_2 を ρ_1 より先に実行しうる (図1)。
- ρ_2 が ρ_1 の右にあるときは ρ_2 を ρ_1 より先に実行しうるとはかぎらない。(図2)



以上のことを一般化すれば、1つの導出 ρ が与えられれば、そのすべての productions に (直接つながる枝) の関係によって tree 型の半順序を導入し、更に "根元より枝が後" "左の枝より右の枝があと" の順序により導入される線形順序

によつてすべての productions を並べかえ λ と同じ語を生成する (left to right) の導出 λ' をうるゝことができる。正確には以下の通りである。

前節の Lemma の従ひ手えられた右延長言語 $L=L(G)$, $G=(\Sigma, S, P)$ の P は $\langle \lambda, u \rangle$ タイプを含まぬよう標準化してあるとする。 $\max_{\langle x, y \rangle \in P} |xy| = p$ とし $\{1, \dots, p\} = N_p$ とする。
 $N_p^* = \{\alpha_1 \dots \alpha_k \mid k \geq 0, \alpha_i \in N_p\}$ によつて p -分岐 tree の nodes を表す。特に $\lambda \in N_p^*$ を root と呼ぶ。

$\gamma, \delta \in N_p^*$, $d \in N_p$ に対し

- γd は node γ の上の左から d 番目の node
- $\gamma \delta$ と γ によつて "より先端" なる半順序を表わす。

N_p^* の $d_1 \dots d_k$ ($k \neq 0$) を k 桁 $p+1$ 進小数 $0.d_1 \dots d_k$ とみなし、

$\lambda \in 0$ とみなして導入される線形順序を \geq で表わす。

この $>$ は tree の nodes によつて left to right の順序づけを行つてゐる。

$G=(\Sigma, S, P)$ の一つの導出 $D: S \Rightarrow w_1 \Rightarrow w_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow w_r = w$

($w_i = u_i x_i v_i \Rightarrow u_i x_i y_i v_i = w_{i+1}$, $\langle x_i, y_i \rangle \in P$ ($i=1, \dots, r-1$)) によつて、

各 production (n, m) (n 語 w_n の左から n 番目の記号の位置) に次の g_D によつて N_p^* の要素としての node $g_D(n, m)$ を対応させる。 ($g_D \in G$ と略記)

• $g(1, m) = m$

• $g(n, m) = \begin{cases} g(n-1, m) & ; \text{if } m \leq |u_{n-1}| \\ g(n-1, |u_{n-1}x_{n-1}|) * (m - |u_{n-1}|) & ; \text{if } |u_{n-1}| < m \leq |u_{n-1}x_{n-1}y_{n-1}| \\ g(n-1, m - |y_{n-1}|) & ; \text{if } |u_{n-1}x_{n-1}y_{n-1}| < m \end{cases}$

また、便宜上 $g(0, 0) = \lambda$ と定義する。(*乗算とほらわしいので"・"を用いた。))

n -th production $w_n = u_n x_n v_n \Rightarrow u_n x_n y_n v_n = w_{n+1}, \langle x_n, y_n \rangle \in P$ に
 N_p^* の要素 $f_D(n) = g_D(n, |u_n x_n|)$ を対応させる (f_D と f と
 略記する)

[Proposition 4] f_D は導出ステップ $\{1, \dots, r\}$ から N_p^* の中
 への 1:1 対応である。

一般に f_D は順序を保存するとはいえない。即ち $f_D(1), f_D(2),$
 $\dots, f_D(r)$ は N_p^* の順序の通りに並ぶとはかぎらない。

(定義) $f_D(i) < f_D(j)$ ($i < j$) のとき導出 D は left to
 right であるという。

[Proposition 5] $w \in L(G)$ に対し w を導びく任意の導出 D
 に対し、同じ w を導びく left to right の導出 D' あり。

謝辞: 東工大の木村泉助教授, 小林孝次郎助教授, 高橋
 正子氏には種々有益な助言をいただいたことと感謝致します。
 特に高橋正子氏からは §1 の系1「右延長文法による正規集合
 の特性化」が Büchi の結果の一部に含まれること等の御指摘

を得たことを付記する。

参考文献

Salomaa, A., Formal Languages, Academic Press(1974)

Büchi, J. R., Regular canonical systems, Archiv für

Mathematische Logik und Grundlagenforschung, 6(1964)91-111.

Arikawa, S., On the languages defined by sentential forms of

context-free grammars, Res. Rept. 17, Res. Inst. Fund.

Inform. Sci., Kyushu Univ. (1970), 1-12.

" " , Closure and non-closure properties of quasi

context-sensitive languages, Ibid. 37 (1973) 1-25.