

## Lipomorphisms close to an Anosov Diffeomorphism

名大理 高木 健太郎

### § 0 Introduction

以下  $M$  を compact connected boundaryless  $C^\infty$ -manifold of dimension  $n$  with a Riemannian metric  $\|\cdot\|$  とする。 $\|\cdot\|$  より自然に induce される  $M$  上の distance function を  $d$  で表わす。 $M$  から  $M$  への continuous map の全体を  $C^0(M)$  で表わし, homeomorphism の全体を  $H(M)$  で表わす。 $C^0(M)$  上には  $d$  より自然に induce される distance function  $d_0$  がある。

$$; d_0(f, g) = \sup_{x \in M} d(f(x), g(x)) \quad ; f, g \in C^0(M)$$

$M$  から  $M$  への Lipschitz map の全体を  $L(M)$  で表わし, Lipomorphism の全体を  $HL(M)$  で表わす。;  $HL(M) = \{f \in H(M) \mid f, f' \in L(M)\}$  勿論,  $HL(M) \subset L(M) \subset C^0(M)$  である。 $HL(M)$  の各え  $f, g$  に対して,  $d_0(f, g)$  が十分小さければ, Lipschitz の意味での近さを計る量  $d_L(f, g)$  が自然に定義される。(§ 1)

$M$  から  $M$  上への  $C^1$ -diffeomorphism の全体を  $Diff^1(M)$  で表わす。 $Diff^1(M)$  の各え  $f, g$  に対して,  $d_0(f, g)$  が十分小さければ,  $C^1$  の

意味での近さを計る量  $d_1(f, g)$  が自然に定義される。平均値の定理によりて,  $\text{Diff}^1(M) \subset \text{HL}(M)$  であるが,  $d_1$  を  $\text{Diff}^1(M)$  に制限したものが  $d_1$  であるとみてよい。(See §1 and [4])

$f \in \text{Diff}^1(M)$  が Anosov diffeomorphism であるとは、次の条件をみたすことである。

:  $E^s = \bigcup_{x \in M} E_x^s$ ,  $E^u = \bigcup_{x \in M} E_x^u$  : continuous subbundles of  $TM$   
 $\exists C \geq 1$ ,  $\exists \lambda$  :  $0 < \lambda < 1$  : constants  
such that

(i)  $TM = E^s \oplus E^u$  (Whitney sum)

(ii)  $df(E^r) = E^r$   $r=s, u$ . 但し,  $df$  は  $f$  の differential を表す。

(iii)  $\| df^n(v) \| \leq C \cdot \lambda^n \| v \| \quad \forall v \in E^s \quad \forall n \geq 0$

$\| df^{-n}(w) \| \leq C \cdot \lambda^{-n} \| w \| \quad \forall w \in E^u \quad \forall n \geq 0$

Anosov diffeomorphism の stability に関する次の定理がある。

Theorem (Anosov) ([1])

$f \in \text{Diff}^1(M)$  を Anosov diffeomorphism とする。このとき,

$\exists \varepsilon_0 > 0 \quad \exists \delta_0 > 0$

such that

$\exists \gamma : \{g \in \text{Diff}^1(M) \mid d_1(g, f) < \delta_0\} \rightarrow \{u \in C^0(M) \mid d_0(u, 1_M) < \varepsilon_0\}$

with the property that  $\gamma \circ \gamma(g) = \gamma(g) \circ f$  for  $g \in \text{Diff}^1(M)$  with  $d_1(g, f) < \delta_0$ .

更にこのとき、各  $g \in \text{Diff}^1(M)$  で  $d_1(g, f) < \delta_0$  に対して、 $\varphi(g)$  は homeomorphism であり、 $d_0(\varphi(g), 1_M) \rightarrow 0$  且  $d_1(g, f) \rightarrow 0$  である。

Theorem (P. Walters) ([7])

$f \in \text{Diff}^1(M)$  を Anosov diffeomorphism とする。このとき、

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \quad \exists \delta_0 > 0$$

such that

$$\exists^1 \varphi : \{g \in H(M) \mid d_0(g, f) < \delta_0\} \rightarrow \{u \in C^0(M) \mid d_0(u, 1_M) < \varepsilon_0\}$$

with the property that  $f \circ \varphi(g) = \varphi(g) \circ f$  for  $\forall g \in H(M)$  で  $d_0(g, f) < \delta_0$

更にこのとき、各  $g \in H(M)$  で  $d_0(g, f) < \delta_0$  に対して  $\varphi(g)$  は onto である、 $d_0(\varphi(g), 1_M) \rightarrow 0$  且  $d_0(g, f) \rightarrow 0$  である。

Remark.

P. Walters の定理で、 $\varphi(g)$  は一般には injective ではない。

ここでは次の定理を証明する。

Theorem ([6])

$f \in \text{Diff}^1(M)$  を Anosov diffeomorphism とする。このとき、

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \quad \exists \delta_0 > 0$$

such that

$$\exists^1 \varphi : \{g \in HL(M) \mid d_{\text{e}}(g, f) < \delta_0\} \rightarrow \{u \in C^0(M) \mid d_0(u, 1_M) < \varepsilon_0\}$$

with the property that  $\varphi \circ \varphi(g) = \varphi(g) \circ f$  for  $\forall g \in HL(M)$  で  $d_{\text{e}}(g, f) < \delta_0$

更にこのとき、各  $g \in HL(M)$  で  $d_{\text{e}}(g, f) < \delta_0$  に対して  $\varphi(g)$  は homeomorphism である、 $d_0(\varphi(g), 1_M) \rightarrow 0$  且  $d_{\text{e}}(g, f) \rightarrow 0$  である。

証明は, J. Moser [4] の idea に依りながら, Anosov diffeomorphism が expansive であることに注意して進めていく。([6])

$\{(U_\alpha, \alpha)\}_\alpha$  を有限個の charts よりなる  $M$  の 1つの atlas とする。但し各 local diffeomorphism  $\alpha$  は  $U_\alpha$  の closure  $\overline{U_\alpha}$  を含み,  $M$  のある open subset 上で define されていとする。

;  $M = \bigcup_\alpha U_\alpha$  : a finite open covering of  $M$ .

$\mathcal{O}(\alpha) \supset \overline{U_\alpha}$ ,  $\alpha : \mathcal{O}(\alpha) \rightarrow \mathbb{R}^n$  into  $C^1$  diffeomorphism.

$\mathbb{R}^n$  の standard norm を  $1/1$  で表わす。

### §1. Lipschitz maps on $M$ .

正数  $\lambda_1$  を次の条件をみたすように十分小さくとる。

; 各  $f \in C^0(M)$  with  $d_C(f, 1_M) < \lambda_1$  に対して,

$$f(\overline{U_\alpha}) \subset \mathcal{O}(\alpha) \quad \forall \alpha$$

任意に  $f \in C^0(M)$  with  $d_C(f, 1_M) < \lambda_1$  をとる。このとき,  $f \in L(M)$  となるためには, 各  $\alpha$  に対して  $\alpha \circ f \circ \alpha^{-1} : \alpha(U_\alpha) \rightarrow \mathbb{R}^n$  が lipschitz map であること, 即ち  $\alpha \circ f \circ \alpha^{-1} : \alpha(U_\alpha) \rightarrow \mathbb{R}^n$  の lipschitz constant を,  $L(\alpha \circ f \circ \alpha^{-1} \text{ on } \alpha(U_\alpha))$  (または単に  $L(\alpha \circ f \circ \alpha^{-1})$ ) で表わすとき,  $L(\alpha \circ f \circ \alpha^{-1} \text{ on } \alpha(U_\alpha)) < +\infty$  であることが必要かつ十分である。

各  $f \in L(M)$  with  $d_C(f, 1_M) < \lambda_1$  に対して.  $d_L(f, 1_M)$  を,

$$d_L(f, 1_M) = d_C(f, 1_M) + \sup_\alpha L(\alpha \circ f \circ \alpha^{-1} - 1 \text{ on } \alpha(U_\alpha))$$

によりて定める。また各  $g, f \in HL(M)$  にて  $d_L(g, f) = d_L(g \circ f^{-1}, 1_M) < \lambda_1$  に対して、 $d_L(g, f) = d_L(g \circ f^{-1}, 1_M)$  と定める。

Proposition.

$f \in L(M)$  で  $d_L(f, 1_M) < \lambda_1$  にて任意  $\epsilon$  にて、 $\epsilon L(f, 1_M)$  が十分小であるならば、 $f$  は  $M$  の homeomorphism である。 $\therefore f \in HL(M)$

### §2. Lipschitz vector fields on $M$ .

$\mathcal{X}^0(M)$  を  $M$  上の continuous vector field の全体とする。 $\mathcal{X}^0(M)$  の中には、complete norm  $\| \cdot \|$  が、 $M$  上の与えられている Riemannian metric  $\| \cdot \|$  より自然に induce される。

$$\| v \| = \sup_{x \in M} \| v_x \| \quad \forall v = (v_x)_{x \in M} \in \mathcal{X}^0(M)$$

各 chart  $(U_\alpha, \alpha)$  に対して、 $v_\alpha' = \alpha(v_\alpha)$  とおき、 $T\alpha : TM|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha' \times \mathbb{R}^n$  より自然に induce された isomorphism とする。 $T\alpha : TM|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha' \times \mathbb{R}^n$  と projection  $U_\alpha' \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  の composition を  $D\alpha$  と表わす。

$$\begin{array}{ccc} TM|_{U_\alpha} & \xrightarrow{T\alpha} & U_\alpha' \times \mathbb{R}^n \\ D\alpha \searrow & \swarrow \text{projection} & \\ & \mathbb{R}^n & \end{array}$$

また各  $v \in \mathcal{X}^0(M)$  に対して、 $v_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$  と  $v_\alpha = D\alpha \circ v|_{U_\alpha}$  によりて定める。

map  $| \cdot | : \mathcal{X}^0(M) \rightarrow \mathbb{R}^+ - \{ a \in \mathbb{R} \mid a \geq 0 \}$  を、

$$| v | = \sup_\alpha \left( \sup_{x \in U_\alpha} | v_\alpha(x) | \right) \quad \forall v \in \mathcal{X}^0(M)$$

によって定める。 $\|\cdot\|$ は $\mathcal{X}^*(M)$ の中の complete norm である、 $\|\cdot\|$ とは equivalent である。

Definition.

$\forall v \in \mathcal{X}^*(M)$  とする。このとき、 $v$ が $M$ 上の lipschitz vector field であるとは、各 $x$ に対して $v_x : U_x \rightarrow \mathbb{R}^n$ が lipschitz である、即ち $L(v_x \circ \varphi^{-1} \text{ on } U_x) < +\infty$ であることを言うものと定める。

$M$ 上の lipschitz vector field の全体を $\mathcal{X}_L(M)$ で表わす。map

$$\|\cdot\|_L : \mathcal{X}_L(M) \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$\|v\|_L = \|v\| + \sup_{x \in M} L(v_x \circ \varphi^{-1}) \quad \forall v \in \mathcal{X}_L(M)$$

によって定める。 $(\mathcal{X}_L(M), \|\cdot\|_L)$ は 1つの Banach space である。

$\exp = (\exp_x)_{x \in M} : TM \rightarrow M$  を、 $M$ 上の与えられた Riemannian metric  $\|\cdot\|$ が induce された exponential map とする。

一般に normed space  $(E, \|\cdot\|)$  において、原点の回りの closed  $\lambda$ -ball を  $(E, \|\cdot\|)_\lambda$  で、open  $\lambda$ -ball を  $(E, \|\cdot\|)_\lambda^\circ$  で表わすことにする。

$M$ は compact であるから、正数 $\lambda_2$ が存在して、各 $x \in M$ に対して  $\exp_x$ は $(T_x M, \|\cdot\|)_{\lambda_2}^\circ$ から、 $(M, d)$ に於ける $x$ の回りの open  $\lambda_2$ -ball への onto diffeomorphism を与えるようにできる。更にこのとき、任意の $x \in M$ 及 $v \in T_x M$  with  $\|v_x\| < \lambda_2$ に対して  $\|v_x\| = d(x, \exp_x v_x)$ である。従てこの $\lambda_2$ に対しては  $\exp : (\mathcal{X}^*(M), \|\cdot\|)_{\lambda_2}^\circ \ni v \rightarrow \exp v = \exp \circ v \in \{f \in C^*(M) | d(f, 1_M) < \lambda_2\}$  は

well-defined で bijective であり、更に、任意の  $V \in (\mathcal{X}^*(M), \| \cdot \|)_{\lambda_2}^\circ$  に対して、 $d_\theta(\exp V, 1_M) = \|V\|$  となる。便宜上、 $\lambda_2 \leq \lambda_1$  とおく。

$\|\cdot\|$  との equivalent 性により、正数  $\varepsilon_1$  が存在して、 $(\mathcal{X}^*(M), \| \cdot \|)_{\lambda_1}^\circ \subset (\mathcal{X}^*(M), \| \cdot \|)_{\lambda_2}^\circ$  となる。

### Proposition

正数  $\varepsilon_2$ ;  $0 < \varepsilon_2 \leq \varepsilon_1$  が存在して次の条件をみたす。

(i) 各  $V \in (\mathcal{X}^*(M), \| \cdot \|)_{\varepsilon_2}^\circ$  に対して

$$\exp V \in L(M) \Leftrightarrow V \in \mathcal{X}_\varepsilon(M)$$

(ii) 各 sequence  $\{V^{(i)}\}_{i=1}^\infty \subset \mathcal{X}_\varepsilon(M) \cap (\mathcal{X}^*(M), \| \cdot \|)_{\varepsilon_2}^\circ$  に対して

$$d_\theta(\exp V^{(i)}, 1_M) \rightarrow 0 \text{ as } i \rightarrow \infty \Leftrightarrow \|V^{(i)}\| \rightarrow 0 \text{ as } i \rightarrow \infty$$

### §3. proof of the theorem.

#### Lemma 1

正数  $\delta_1, \varepsilon_3$ ;  $0 < \varepsilon_3 \leq \varepsilon_1$ , 実数  $L_1: (0, \delta_1) \times (0, \varepsilon_3) \rightarrow \mathbb{R}^+$  及び continuous map  $r: (\mathcal{X}_\varepsilon(M), \| \cdot \|_\varepsilon)_{\delta_1}^\circ \times (\mathcal{X}^*(M), \| \cdot \|)_{\varepsilon_3}^\circ \rightarrow \mathcal{X}^*(M)$  が存在して次の条件をみたす。

(i) 各  $w \in (\mathcal{X}_\varepsilon(M), \| \cdot \|_\varepsilon)_{\delta_1}^\circ$  及び  $v \in (\mathcal{X}^*(M), \| \cdot \|)_{\varepsilon_3}^\circ$  に対して

$$\exp w \circ \exp v = \exp(w + v + r(w, v)) \quad r(w, 0) = r(0, v) = 0$$

(ii)  $\forall \delta$ ;  $0 < \delta < \delta_1$ ,  $\forall \varepsilon$ ;  $0 < \varepsilon < \varepsilon_3$ ,  $\forall w \in (\mathcal{X}_\varepsilon(M), \| \cdot \|_\varepsilon)_{\delta}^\circ$

及び  $\forall v, v' \in (\mathcal{X}^*(M), \| \cdot \|)_{\varepsilon}^\circ$  に対して、

$$|r(w, v) - r(w, v')| \leq L_1(\delta, \varepsilon) \cdot |v - v'|$$

$$(iii) L_1(\delta, \varepsilon) \rightarrow 0 \text{ as } \delta, \varepsilon \rightarrow 0$$

以下  $f: M \rightarrow M$  を  $1\circ$  の  $C^1$ -diffeomorphism として, 固定する。

この  $f$  に対して  $\mathcal{X}^0(M)$  の continuous linear automorphism  $f_*$  を

$$f_*(v) = df \circ v \circ f^{-1} \quad \forall v \in \mathcal{X}^0(M)$$

によって定める。

### Lemma 2

正数  $\varepsilon_4$ ;  $0 < \varepsilon_4 \leq \varepsilon_1$ , 有界実数  $L_2: (0, \varepsilon_4) \rightarrow \mathbb{R}^+$  及び continuous map  $\alpha: (\mathcal{X}^0(M), 1\circ)_{\varepsilon_4}^\circ \rightarrow \mathcal{X}^0(M)$  が存在して, 次の条件をみたす。

(i) 各  $v \in (\mathcal{X}^0(M), 1\circ)_{\varepsilon_4}^\circ$  に対して

$$f \circ \exp v \circ f^{-1} = \exp(f_*(v) + \alpha(v)), \quad \alpha(0) = 0$$

(ii) 各  $\varepsilon$ ;  $0 < \varepsilon < \varepsilon_4$  及び  $v, v' \in (\mathcal{X}^0(M), 1\circ)_\varepsilon$  に対して

$$|\alpha(v) - \alpha(v')| \leq L_2(\varepsilon) |v - v'|$$

(iii)  $L_2(\varepsilon) \rightarrow 0$  as  $\varepsilon \rightarrow 0$ .

### Lemma 3

$f$  を Anosov diffeomorphism とする。然るには  $f$  は expansive である。即ち, 正数  $\lambda$  が存在して, 各  $x, y \in M$  with  $x \neq y$  に対して常に

$$\sup_{n \in \mathbb{Z}} d(f^n(x), f^n(y)) > \lambda.$$

proof of the theorem

$\forall f \in HL(M)$  と  $\forall u \in C^0(M)$  をとる。このとき,

$$g \circ u = u \circ f \iff (g \circ f^{-1}) \circ (f \circ u \circ f^{-1}) = u \quad \dots \dots \textcircled{1}$$

いま  $d_e(g, f)$  及び  $d_e(u, 1_M)$  が十分小さければ、§2で述べたことより、 $\exists^1 w \in \mathcal{X}_e(M)$  with  $|w|_e$  sufficiently small,  $\exists^1 v \in \mathcal{X}^e(M)$  with  $|v|_e$  sufficiently small such that  $g \circ f^{-1} = \exp w$ ,  $u = \exp v$  となる。よって①は次の式と equivalent となる。

$$\exp w \circ f \circ \exp v \circ f^{-1} = \exp v \quad \dots \dots \textcircled{2}$$

Lemma 2 続いて Lemma 1 によう。

$$\begin{aligned} \exp w \circ f \circ \exp v \circ f^{-1} &= \exp w \circ \exp(f_*(v) + s(v)) \\ &= \exp(w + f_*(v) + s(v) + t(w, f_*(v) + s(v))) \end{aligned}$$

よって②は次の式と equivalent である。

$$w + f_*(v) + s(v) + t(w, f_*(v) + s(v)) = v \quad \dots \dots \textcircled{3}$$

いま  $f$  は Anosov diffeomorphism であるから  $1 - f_* : \mathcal{X}^e(M) \rightarrow \mathcal{X}^e(M)$  は continuous linear automorphism である。従て③は次の式と equivalent である。

$$v = (1 - f_*)^{-1}(w + s(v) + t(w, f_*(v) + s(v))) \quad \dots \dots \textcircled{4}$$

以下④を解くことを考える。

各  $w \in \mathcal{X}_e(M)$  with  $|w|_e$  sufficiently small 及び  $v \in \mathcal{X}^e(M)$  with  $|v|_e$  sufficiently small に対して,  $F(v) = f_*(v) + s(v)$ ,  $G_w(v) = (1 - f_*)^{-1}(w + s(v) + t(w, f_*(v) + s(v)))$  と定めよう。Lemma 1 の (ii) 及び Lemma 2 の (ii) 及び (iii) より次の命題を得る。

$$\exists \delta_2 ; 0 < \delta_2 \leq \delta_1, \quad \exists \varepsilon_5 ; 0 < \varepsilon_5 < \varepsilon_1$$

such that

$$\text{i)} \quad \forall w \in (\mathcal{X}_\ell(M), 1 \cdot 1_\ell)_{\delta_2}^\circ \quad \forall v \in (\mathcal{X}^*(M), 1 \cdot 1)_\varepsilon \quad |(1 - f_*)^{-1}(s(v))| \leq \frac{1}{3} |v|$$

$$|(1 - f_*)^{-1}(t(w, f(v)))| \leq \frac{1}{3} |v|$$

$$\text{ii)} \quad \forall w \in (\mathcal{X}_\ell(M), 1 \cdot 1_\ell)_{\delta_2}^\circ \quad \forall v, v' \in (\mathcal{X}^*(M), 1 \cdot 1)_\varepsilon \quad |G_w(v) - G_w(v')| \leq \frac{1}{2} |v - v'|$$

$$\exists \varepsilon, \delta : 0 < \delta \leq \delta_2 \text{ such that } |(1 - f_*)^{-1}(w)| < \frac{1}{3} \varepsilon \text{ for } w \in (\mathcal{X}_\ell(M), 1 \cdot 1_\ell)_{\delta}^\circ$$

で  $\exists \varepsilon, \delta : 0 < \delta \leq \delta_2$  で  $|(1 - f_*)^{-1}(w)| < \frac{1}{3} \varepsilon$  が成り立つ。また  $\forall w \in (\mathcal{X}_\ell(M), 1 \cdot 1_\ell)_{\delta}^\circ$  をとると、 $\forall v$  は  $G_w(v) : (\mathcal{X}^*(M), 1 \cdot 1)_\varepsilon \rightarrow V$

$\rightarrow G_w(v) \in (\mathcal{X}^*(M), 1 \cdot 1)_\varepsilon$  は well-defined で、contraction constant  $\frac{1}{2}$  の contraction である。(更に各  $v \in (\mathcal{X}^*(M), 1 \cdot 1)_\varepsilon$  に対し,  $|G_w(v)| < \varepsilon$  である。) 従って contraction principle により

$$\exists v \in (\mathcal{X}^*(M), 1 \cdot 1)_\varepsilon \text{ s.t. } G_w(v) = v$$

$$\text{i.e. } \exp w \circ f \circ \exp v \circ f^{-1} = \exp v.$$

さて,  $u = \exp v$  は  $1_M$  と homotopic であるから onto である。よって

次の命題を証明すれば Theorem の証明は終る。

:  $\forall u : M \rightarrow M$  map で  $d_u(u, 1_M) < \lambda/2$  かつ fix. す。

いま,  $\exists f : M \rightarrow M$  bijective map で  $f \circ u = u \circ f$  であるならば,  $u$  は injective である。

∴

$\forall x, y \in M$  とし,  $u(x) = u(y)$  と仮定する.  $x \neq y$  と仮定する.

Lemma 3 1=2).  $\exists m_0 \in \mathbb{Z}$  s.t.  $d(f^{m_0}(x), f^{m_0}(y)) \geq \lambda$ .  $\therefore u \circ f^{m_0}$   
 $= g \circ u$  であるから,  $u \circ f^{m_0}(x) = g^{m_0}(u(x)) = g^{m_0}(u(y)) = u \circ f^{m_0}(y)$   
 $\therefore \lambda_0 \leq d(f^{m_0}(x), f^{m_0}(y)) \leq d(f^{m_0}(x), u \circ f^{m_0}(x)) + d(u \circ f^{m_0}(y), f^{m_0}(y))$   
 $\leq d(u, 1_M) + d(u, 1_M) < \lambda_0$

これは矛盾である。よって  $x = y$  であることは示された。//

f. e. d.

### References.

- [1]. Anosov, Geodesic Flows on Closed Riemannian Manifolds with Negative Curvature, Proceeding of the Steklov Institute of Mathematics, (translated by the AMS) No. 90 (1967)
- [2]. Dieudonné, Foundations of Modern Analysis, Academic Press, New York, 1960
- [3] Hirsch and Pugh, Stable Manifolds and Hyperbolic Sets, Proc. of Symposia in Pure Math. (Global Analysis) XIX, AMS (1970)  
133 ~ 163.
- [4] Moser, On a Theorem of Anosov, J. of Differential Equations 5 (1969)  
411 ~ 440.
- [5] Nitecki, Differentiable Dynamics, Cambridge the M.I.T. Press 1971.
- [6]. Takaki, Lipeomorphisms close to an Anosov Diffeomorphism, (to appear)
- [7]. Walters, Anosov Diffeomorphisms are topologically stable, Topology 9, 71 ~ 78 (1970)