

Applications of Nagumo-Hukuhara theory
on the boundary value problem for nonlinear differential equations
to the boundary layer equation and the nonlinear Bessel equation.

都立大 理 岩野正宏

まえがき.

非線型 Bessel 方程式に関する問題は 次の境界値問題で、
これは超伝導現象の研究に現われた問題である:

$$(A) \begin{cases} y'' = -x^{-1}y' + \nu^2 x^{-2}y - y + y^3 = f(x, y, y') \\ y(0) = 0, \quad y(\infty) = 1 \\ 0 < y(x) < 1 \quad \text{for } 0 < x < \infty, \end{cases}$$

$\nu > 0$ は パラメーターである。この境界値問題の解の存在と
一意性とは すむに逢高性掬氏により解決されている。こ
こでは ぐかて説明する全く異つた方法で 解の存在だけを
証明する。

境界層の方程式に関する問題は 次の境界値問題で、粘性
流体の境界層の研究に現われた問題である:

$$(1) \quad \begin{aligned} \varepsilon''' + \varepsilon \varepsilon \varepsilon'' + \varepsilon \lambda (1 - \varepsilon'^2) &= 0, \\ \varepsilon(0) &= 0, \quad \varepsilon'(0) = 0 \end{aligned}$$

$$x'(\infty) = 1.$$

$\lambda < 0$ は パラメーターである。独立変数は t , $'$ は 導関数。

本研究の目的は この境界値問題の解が存在するかどうかを調べることである。Hartman 氏や Serrin 氏などの研究にも関わらず 私の知る限りでは まだ解が存在するかどうかはわかっていない。この問題に関する最新の結果は、1955年 Iglisch と Kemnitz 両氏の共著の論文で発表されたものである:

与えられた境界条件を少し変えて 新しい境界条件

$$x(0) = \alpha, \quad x'(0) = \beta, \quad x'(\infty) = 1, \quad 0 \leq \beta < 1$$

を考える。

“ $0 \leq \beta < 1$, $\lambda < 0$ なる β, λ を任意に固定する。 λ, β によって定まる或る number $A \equiv A(\lambda, \beta)$ と $A \leq \alpha$ において定義された狭義単調増加関数 $\gamma(\alpha)$ (ただし $\gamma(A) = 0$) が存在し, $(\alpha, \beta, x''(0))$ を 初期値とする解が $t = +\infty$ まで接続可能かつ $x'(t) \rightarrow 1$ as $t \rightarrow \infty$ となるための必要かつ十分条件は $x''(0)$ が 不等式

$$0 \leq x''(0) \leq \gamma(\alpha)$$

を満足することである。”

しかしながら, $A(\lambda, \beta)$ の決め方は 解析的であるために, $A \leq 0$ となるかどうかは不明である。したがって この存在

定理からは 流体力学で解の存在を要請されている境界値問題に解が存在するかどうかの判定はできない。

Hartman 氏は “ $\delta''(0) = \delta(\alpha)$ とする解は, $t \rightarrow +\infty$ のとき $\delta'(t)$ は 指数関数の order で 1 に近づく. それ以外の解に対しては, $\delta'(t)$ は $t \rightarrow \infty$ のとき power の order で 1 に近づく” ことを証明した。

λ の値は負であるが, 実験的には λ が $-0.199 < \lambda < 0$ のときに 解の存在がわかればよい. というのは $\lambda = -0.199$ のとき いわゆる separation という現象が起って境界層が剝離されることになるからである。

境界層の方程式は3階であるが, 独立変数を陽に含んでいないので, 2階の方程式に変換することが出来る. このことについて説明をしよう。

δ' , δ'' , δ''' は t の関数 δ の 1階, 2階, 3階の導関数である. δ' を δ の関数と考えれば

$$\delta'' = \frac{d\delta'}{dt} = \frac{d\delta'}{d\delta} \delta',$$

$$\delta''' = \frac{d}{d\delta} \left(\frac{d\delta'}{d\delta} \delta' \right) \cdot \delta' = \delta' \frac{d^2 \delta'}{d\delta^2} + \delta' \left(\frac{d\delta'}{d\delta} \right)^2$$

とえる. まって与えられた 3階の方程式は

$$(2) \quad z' \left\{ z' \frac{d^2 z'}{dz^2} + \left(\frac{dz'}{dz} \right)^2 \right\} + 2z z' \frac{dz'}{dz} + 2\lambda (1 - z'^2) = 0$$

となる。 $z=0$ における初期値を

$$z(0) = z_0, \quad z'(0) = z_0', \quad z''(0) = z_0'', \quad z'''(0) = z_0'''$$

と書くことにする。 $z(0) = z'(0) = 0$ より

$$z_0 = 0, \quad z_0' = 0.$$

これらの値を与方程式に代入すれば

$$z_0''' = -2\lambda > 0$$

を得る。 $z'(z)$ を z の関数と考え $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z'}{z^\alpha}$ が存在しかつ 0 と異なる値をとるような $\alpha > 0$ を探してみる。

$$\frac{dz'}{dz} = \frac{z''}{z'}, \quad \frac{dz''}{dz} = \frac{z'''}{z'}$$

よめるから、l'Hospital's rule により

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z'}{z^\alpha} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z'' \cdot z'^{-1}}{\alpha z^{\alpha-1}}$$

$$\therefore \left(\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z'}{z^\alpha} \right)^2 = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z''}{\alpha z^{2\alpha-1}} \quad \text{when } \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z'}{z^\alpha} \neq 0$$

よって $z_0'' \neq 0$ のとき、 $\alpha = \frac{1}{2}$ にとり

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z'}{\sqrt{z}} = \sqrt{2z_0''} \quad \text{when } z_0'' \neq 0.$$

$z_0'' = 0$ のときは、 $z_0''' > 0$ を考慮して、

$$\left(\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z'}{z^\alpha} \right)^2 = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z'' \cdot z'^{-1}}{\alpha(2\alpha-1)z^{2\alpha-2}},$$

$$\therefore \left(\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z'}{z^\alpha} \right)^3 = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z'''}{\alpha(2\alpha-1)z^{3\alpha-2}} \quad \text{when } \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z'}{z^\alpha} \neq 0.$$

よって $\alpha = \frac{2}{3}$ (κ と ν の κ 対し),

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z'}{z^{2/3}} = \sqrt[3]{\frac{9}{2} z_0'''} = \sqrt[3]{-9\lambda} \quad \text{when } z_0'' = 0.$$

$z'(\infty) = 1$ 対し,

$$z \rightarrow \infty \quad \text{のとき } z' \rightarrow 1.$$

よって 新し... 方程式 (2) κ に対する境界条件は,

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z'}{\sqrt{z}} = \sqrt{2z_0''} \quad \text{when } z_0'' \neq 0,$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z' = 1$$

または

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z'}{\sqrt[3]{z^2}} = \sqrt[3]{-9\lambda} \quad \text{when } z_0'' = 0,$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z' = 1$$

となる。

2階の境界値問題に帰着させるために,

$$y = z'^2, \quad x = z$$

をそれぞれ従属変数および独立変数 x とすれば、方程式(2)および対応する境界条件は

$$\sqrt{y} \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} + 4\lambda(1-y) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x} = 2z_0'' \quad \text{when } z_0'' \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = 1$$

or

$$\sqrt{y} \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} + 4\lambda(1-y) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{\sqrt[3]{x^4}} = -9\lambda \quad \text{when } z_0'' = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = 1$$

となる。

両者の場合をまとめて

$$(B) \begin{cases} y'' = -\frac{1}{\sqrt{y}}(2xy' + 4\lambda(1-y)) \equiv f(x, y, y') \\ y(0) = 0, \quad y(\infty) = 1 \\ 0 < y(x) < 1 \quad \text{for } 0 < x < \infty \end{cases}$$

なる境界値問題が与えられたことになる。

いまから説明する方法では、境界値問題 (A) に関しては、おぼての $\nu > 0$ の値に対して解の存在 (ただし一意性は全然考えないことにする) が証明できる。また境界値問題 (B) に関しては、 λ が

$$-\frac{3}{2}\lambda(3-2\lambda)(5-3\lambda) < 1$$

のとき、したがって $-0.042 \leq \lambda < 0$ のとき、Algebraic Type の解 (すなわち $x \rightarrow \infty$ のとき $y(x)$ は x の power の order で 1 に近づく) の存在が、また λ が $-0.059 \leq \lambda < 0$ のとき、Exponential Type の解 (すなわち $x \rightarrow \infty$ のとき $y(x)$ は指数関数の order で 1 に近づく) の存在が証明できたように思われる。

この結果が正しいとしても、物理実験の結果を保証するには λ の範囲があまりにも狭すぎる。改良の見込みは十分あると思われるが、初等的にはあるけれども可成り面倒な計算を必要とする。改良の方針については、一通り説明を終えた段階で述べる。

これらの計算結果の check をさし、鹿児島大学の齋藤利彦、石井一平の両氏に大へんお世話になった。福摩先生には、彼の理論について私の理解できなかった若干の箇所を教えて

戴いた。これら 3 人の方々のご好意に感謝する。

§1. 南雲型の存在定理

1939 年 南雲氏は 2 階の非線型常微分方程式の境界値問題の解の存在に関して すぐれた結果をえられた。この結果は、彼の有名な解の単独条件とともに、今日でもしばしば引用されている。 “2 階非線型常微分方程式

$$y'' = f(x, y, y')$$

の右辺の関数 $f(x, y, z)$ は Bergman 領域

$$a \leq x \leq b,$$

$$\underline{\omega}(x) \leq y \leq \bar{\omega}(x),$$

$$\underline{\Omega}(x, y) \leq z \leq \bar{\Omega}(x, y)$$

において (x, y, z) の関数として連続である。

$\underline{\omega}(x), \bar{\omega}(x)$ は $a \leq x \leq b$ において 2 回連続微分可能かつ $\underline{\omega}(a) = \bar{\omega}(a) = A$. $\underline{\Omega}(x, y), \bar{\Omega}(x, y)$ は

$$a \leq x \leq b, \quad \underline{\omega}(x) \leq y \leq \bar{\omega}(x)$$

において 連続な一階の偏導関数をもつ。しかも次の不等式が満足される:

$$(1.1) \quad \begin{cases} \underline{\omega}''(x) \geq f(x, \underline{\omega}(x), \underline{\omega}'(x)) \\ \bar{\omega}''(x) \leq f(x, \bar{\omega}(x), \bar{\omega}'(x)) \end{cases} \quad a \leq x \leq b$$

$$\begin{aligned} \underline{\Omega}(x, \underline{\omega}(x)) &\leq \underline{\omega}'(x) \leq \overline{\Omega}(x, \underline{\omega}(x)) \\ \underline{\Omega}(x, \overline{\omega}(x)) &\leq \overline{\omega}'(x) \leq \overline{\Omega}(x, \overline{\omega}(x)) \end{aligned} \quad a \leq x \leq b$$

$$(1.2) \begin{cases} f(x, y, \underline{\Omega}(x, y)) - \underline{\Omega}_x(x, y) - \underline{\Omega}_y(x, y) \underline{\Omega}(x, y) > 0 \\ f(x, y, \overline{\Omega}(x, y)) - \overline{\Omega}_x(x, y) - \overline{\Omega}_y(x, y) \overline{\Omega}(x, y) < 0 \end{cases}$$

for $a \leq x \leq b, \underline{\omega}(x) \leq y \leq \overline{\omega}(x)$.

これらの条件の f と κ , $\underline{\omega}(b) \leq B \leq \overline{\omega}(b)$ とする。任意の B に対して、境界値問題

$$\begin{aligned} y'' &= f(x, y, y') \\ y(a) &= A, \quad y(b) = B \end{aligned}$$

の解が, $a \leq x \leq b, \underline{\omega}(x) \leq y \leq \overline{\omega}(x)$ 内に存在する。”

仮定 (1.1) と (1.2) の役割を示すために この定理の証明の概略を述べよう。

解が存在することを仮定すれば, $y(x), \kappa(x) = \frac{dy(x)}{dx}$ は次の積分方程式を満足する: かつ

$$G(x, t) = \begin{cases} \frac{(b-x)(t-a)}{b-a} & a \leq t \leq x \leq b \\ \frac{(b-t)(x-a)}{b-a} & a \leq x \leq t \leq b \end{cases}$$

とあければ,

$$(1.3) \quad \begin{aligned} y(x) &= \frac{A(b-x) + B(x-a)}{b-a} - \int_a^b G(x,t) f(t, y(t), z(t)) dt \\ z(x) &= \frac{B-A}{b-a} - \int_a^b \frac{\partial G}{\partial x}(x,t) f(t, y(t), z(t)) dt \end{aligned}$$

このことは, 直接計算によつて, $y'(x) = z(x)$, $z'(x) = f(x, y(x), z(x))$ となることからわかる.

この積分方程式に解の存在することを証明しようとするとき, 積分記号のなかの関数 $f(x, y, z)$ の y, z の範囲が制限されていることは不便である. \mathbb{R} のまうとして この $f(x, y, z)$ に対して $f^*(x, y, z)$ をつくる:

$\underline{\omega}(x) \leq y \leq \bar{\omega}(x)$ のとき

$$f_1^*(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, \bar{\Omega}(x, y)) & \text{for } z > \bar{\Omega}(x, y) \\ f(x, y, z) & \text{for } \underline{\Omega}(x, y) \leq z \leq \bar{\Omega}(x, y) \\ f(x, y, \underline{\Omega}(x, y)) & \text{for } z < \underline{\Omega}(x, y) \end{cases}$$

とあければ, $f_1^*(x, y, z)$ は

$$a \leq x \leq b, \quad \underline{\omega}(x) \leq y \leq \bar{\omega}(x), \quad -\infty < z < +\infty$$

において定義されしとき

$$\max f(x, y, z) = \max f_1^*(x, y, z).$$

$\bar{\omega}(x) < \gamma$ のとき

$$f^*(x, y, z) = f_1^*(x, \bar{\omega}(x), z) + \frac{\gamma - \bar{\omega}(x)}{1 + \gamma - \bar{\omega}(x)},$$

$\gamma < \underline{\omega}(x)$ のとき

$$f^*(x, y, z) = f_1^*(x, \underline{\omega}(x), z) - \frac{\underline{\omega}(x) - \gamma}{1 + \underline{\omega}(x) - \gamma},$$

$\underline{\omega}(x) \leq \gamma \leq \bar{\omega}(x)$ のとき

$$f^*(x, y, z) = f_1^*(x, y, z)$$

とおく。このようにして定義された関数 $f^*(x, y, z)$ は

$$a \leq x \leq b, \quad -\infty < y < +\infty, \quad -\infty < z < +\infty$$

において連続かつ有界である:

$$|f^*(x, y, z)| \leq M$$

f の代わりに f^* でおきかえた積分方程式

$$y(x) = \frac{A(b-x) + B(x-a)}{b-a} - \int_a^b G(x, t) f^*(t, y(t), z(t)) dt$$

(1.4)

$$z(x) = \frac{B-A}{b-a} - \int_a^b \frac{\partial G}{\partial x}(x, t) f^*(t, y(t), z(t)) dt$$

を考へる。 $a \leq x \leq b$ で連続かつ一様に有界な関数 $y(x), z(x)$:

$$|y(x)| \leq H, \quad |z(x)| \leq H$$

の pair $\{y(x), z(x)\}$ の全体から成る関数の族を \mathcal{F} とする。すると

$$Y(x) = \frac{A(b-x) + B(x-a)}{b-a} - \int_a^b G(x,t) f^*(t, y(t), z(t)) dt,$$

$$Z(x) = \frac{B-A}{b-a} - \int_a^b \frac{\partial G}{\partial x}(x,t) f^*(t, y(t), z(t)) dt$$

に対して $\{Y(x), Z(x)\}$ を定義し、

$$T: \{y(x), z(x)\} \rightarrow \{Y(x), Z(x)\}$$

に対して写像 T を定義する。 $Y(x), Z(x)$ は連続関数であるから、 H を適当に定めれば

$$|Y(x)| \leq H, \quad |Z(x)| \leq H$$

となることを証明され、Schauder 型の不動点定理によつて (1.4) は解をもつことになる。もし計算すれば H として

$$H = \max \left\{ \frac{(b-a)^2}{8} M + |A|, \frac{(b-a)^2}{8} M + |B|, \frac{|B-A|}{b-a} + \frac{b-a}{4} M \right\}$$

をとればよいことがわかる。

このようにしてえられた解 $\{y(x), z(x)\}$ は境界値問題

$$y'' = f^*(x, y, y')$$

$$y(a) = A, \quad y(b) = B$$

の解である。不等式 (1.1) は、 $y(x)$ は

$$\underline{\omega}(x) \leq y(x) \leq \bar{\omega}(x), \quad a \leq x \leq b$$

を満足し, 不等式 (1.2) は $y'(x)$ は

$$\underline{\Omega}(x, y(x)) \leq y'(x) \leq \bar{\Omega}(x, y(x))$$

を満足することの証明に用い^{られる}。したがって $y(x)$ は与えられた境界値問題の解となる。

南原氏の存在定理は 安番氏によってもう少し一般的な形で述べられている。

Remark 1

南原氏は, $\omega(x) \in \text{class } C^2$ と仮定しているが, $\omega(x)$ に関する条件は 次のような f, γ とゆるい条件で置き換えられる: “ $\underline{\omega}(x), \bar{\omega}(x)$ は $a \leq x \leq b$ において連続かつ $a \leq x \leq b$ なる任意の点 $x = \xi$ において, ξ を含む或る区間 I_ξ において定義された $\text{class } C^2$ に属する関数 $\underline{\gamma}(x), \bar{\gamma}(x)$ で”

$$\underline{\gamma}(x) \leq \underline{\omega}(x) \quad \text{on } I_\xi$$

$$\underline{\gamma}''(x) \geq f(x, \underline{\gamma}(x), \underline{\gamma}'(x)) \quad \text{on } I_\xi,$$

$$\bar{\omega}(x) \leq \bar{\gamma}(x) \quad \text{on } I_\xi,$$

$$\bar{\gamma}''(x) \leq f(x, \bar{\gamma}(x), \bar{\gamma}'(x)) \quad \text{on } I_\xi$$

となる f のが存在する。” 安番氏は, このような $\underline{\omega}(x), \bar{\omega}(x)$ を

sub-function, super-function と名付けている。

Remark 2

$\underline{\Omega}(x, y)$, $\bar{\Omega}(x, y)$ は class C^1 に属すると仮定されている。この条件も、次の f のうち ω の条件で置き換えられる：“ $\underline{\Omega}(x, y)$, $\bar{\Omega}(x, y)$ は、 $a \leq x \leq b$, $\underline{\omega}(x) \leq y \leq \bar{\omega}(x)$ において連続かつ $\underline{\omega}(x) \leq y(x) \leq \bar{\omega}(x)$ をみたす 2 回連続微分可能な任意の $y(x)$ に対して

$$f(x, y(x), \underline{\Omega}(x, y(x))) - \frac{d}{dx} \underline{\Omega}(x, y(x)) \geq 0$$

$$f(x, y(x), \bar{\Omega}(x, y(x))) - \frac{d}{dx} \bar{\Omega}(x, y(x)) \leq 0$$

を満足する” この条件も安斎氏による。

Remark 3 南原型の存在定理を目的とする二つの境界値問題 (A), (B) に応用するとき、少し改良しなければならない。その理由は

1° 区間 $a \leq x \leq b$ は無限区間 $0 \leq x \leq \infty$ である

2° $f(x, y, z)$ は特異性をもっている。

ために少し面倒なことがあるからである。

区間が有限区間であっても無限区間であっても南原の存在定理において仮定されている $\underline{\omega}(x)$, $\bar{\omega}(x)$, $\underline{\Omega}(x, y)$,

$\Omega(x, y)$ のまんまにする不等式 さえ成り立たずれば、少くとも一つは境界値問題の解が存在することも示すためには、福原型の存在定理は極めて有効である。

§2. 福原型の存在定理

1940年の前後に南雲, 岡村 両氏によって 2階常微分方程式の二点境界値問題に関し, beautiful な結果がえられた。南雲氏の結果は §1 に紹介したが。文献は南雲 (函数方程式 No 5 (1939) 27-34, No 6 (1939) 37-44) 岡村 (函数方程式 No 27 (1941) 27-35, No 30 (1941) 14-19, No 31 (1942) 32-40), また Knobloch は 1965年 Journal of P. Equations 1 (1965) 1-26 に南雲と同じような結果を発表している。福原氏は Kneser の性質を用いて, 境界における条件のみならず (したがってある条件を満足するように特殊な領域を探さなければならぬ) 解の存在定理を証明することも試み, ついに南雲, 岡村 Knobloch の結果を統一的に証明する全く新しい方法を考案された。先生の original な証明には難解な部分があるので 他日 証明をわかりやすくしたものをどこかの雑誌に発表する予定である。ここでは一応存在定理だけを述べるだけにしておく。

いろいろな形の存在定理を統一的に取り扱うために、まず第一に、ある条件を満足する関数の族 F (これは (x, y, z) -space におけるグラフで、 $y'' = f(x, y, y')$ の解 $y(x)$ のつくるグラフ $(x, y(x), y'(x))$ と思えばよい) を考える。ある条件とは、 $f(x, y, z)$ がコンパクト集合 D で連続な場合に、その解の集合によって満足されている性質をとりあげて、それらを関数族 F の満足する条件として仮定する。

公理 1° おのこの関数は real line \mathbb{R}^1 上のコンパクトな区間 (とくに一点であってもよい) から \mathbb{R}^n への連続写像である。ただし、関数が定義される区間は関数に依存する。関数値のとくする空間の次元 n は関数に無関係である。

この公理は、 $y'' = f(x, y, y')$ の解を $y = y(x)$ とするとき、 f の連続性を仮定すれば、 $y(x), y'(x)$ は x および初期値の連続関数であるという性質に対応する。

公理 2° 関数族に属する関数の部分はいずれも関数族に属する。

この公理は、解曲線 $(x, y(x), y'(x))$ の部分は、いずれも解曲線であるという事実に対応する。

公理 3° $R^1 \times R^n$ におけるコンパクトな集合を要素とする集合に Hausdorff の metric を導入した metric space において 関数族はコンパクトな集合である。ここで、 E_1, E_2 を $R^1 \times R^n$ のコンパクト集合とするとき、 E_1 と E_2 の Hausdorff の metric は

$$\text{dist}(E_1, E_2) = \inf \{ \rho \mid \cup_{\rho}(E_1) \supset E_2, \cup_{\rho}(E_2) \supset E_1 \}$$

$\cup_{\rho}(E)$ は E から Euclid の距離が ρ よりも小さい点の集合。

この公理は本質的な仮定である。 $y'' = f(x, y, y')$ の右辺が連続な場合、解の集合は、同程度連続になるから、関数族としてコンパクトになる。

公理 4° 関数族に属する二つの関数 f, g が $t = \alpha$ で一致するならば、 $t \leq \alpha$ で f と、 $t \geq \alpha$ で g と一致する関数も関数族に属する。

この公理は、解を接続したものはやはり解になるという性質に対応する。

公理 5° 関数族 F に属する曲線によって埋められる集合を F の基本領域と云い、 \mathcal{D} と書く。 F のうちの極大曲

線とは それを真部分集合として含む曲線は F のなかに入
りていないことをいう。このとき、極大曲線の端点は D
の境界点である。

この定理は、最大接続可能な解が存在し、端点は方程式
の右辺の定義域の境界点であるという事実に対応する。

ついでに注意しておくが、関数族 F の要素は曲線
あり、基本領域 D の要素は点となっている。

福原の存在定理を説明するため、基本領域 D の境界 ∂ の
点を分類しなければならない。

∂^L は基本領域 D の左端といい、極大曲線の左端となる
点の集り。 ∂^R は基本領域 D の右端といい、極大曲線の右
端となる点の集り。

$y'' = f(x, y, y')$ の解曲線で言えば、 ∂^L の点から左に出る解
曲線は、もし接続できれば、必ず D の外部にあることを意
味する。

$A \in \partial$ (しかし $A \notin \partial^L$) とすれば、 A から左に出る曲線 $\in F$
が存在する。 $Z^-(A)$ は、 A から左に出るすべての曲線によ
って埋められる点の集りを表わすものとする。このとき

$$\partial^- = \{A \mid A \text{ は } \partial \text{ の } Z^-(A) \text{ の集積点とまらない}\}$$

$\mathcal{B}_- = \{A \mid A \text{ は } \mathcal{B} \cap Z^-(A) \text{ の集積点となる}\}$

とおく. 同じようにして 左に出る曲線を考えることにより,
 $\mathcal{B}^+, \mathcal{B}_+$ が定義される.

$A \in \mathcal{D}$ は \mathcal{B}^l にとくある点の集積点でない と仮定する.
 A の左側に, A に十分近い 超平面 $\alpha = \xi$ を考え, これによる
 $Z^-(A)$ の横断面が 連続体であるとき, A は 本来の左 Kneser
 点 と呼ばれる.

C は \mathcal{D} のコンパクト部分とし, 下に厚みある曲線で C と交
 わるものは唯一点で交わる時, C は \mathcal{D} の横断面^{である} といふ.

次の定理は いわゆる Kneser 定理である:


定理 H_1 “ \mathcal{D} の各点は 本来の左 Kneser 点である. $E \subset \mathcal{D}$
 は連続体であり, E の各点から 左に出る曲線 $\in \mathcal{F}$ によって 埋
 められる点の集合, $Z^-(E)$, の横断面は 連続体 である.”

A が 左 Kneser 点であるとは, 次の二つの条件が満足さ
 れるときを言う:

i) $A \notin \mathcal{B}_-$ (A は $\mathcal{B} \cap Z^-(A)$ の孤立点) ならば, A は本来
 の左 Kneser 点.

ii) $A \in \mathcal{B}_-$ (A は $\mathcal{B} \cap Z^-(A)$ の集積点) ならば, A の十

分近く左側にある超平面 $x=\tau$ による $Z(A)$ の横断面と $\partial \cap Z(A)$ との合併集合は連続体である。



次の定理は 本来の Kneser 定理, すなわち 定理 H_2 , の拡張である。

定理 H_2 “ Ω の 各点は 左 Kneser 点 である。

$$\partial^- \subset \partial^+$$

$\partial^+ \cup \partial^-$ は 閉集合。

と仮定すれば, $Z(E) \cap (\partial^+ \cup \partial^-)$ は連続体 である。”

すなわち仮定は, $y'' = f(x, y, y')$ の 解曲線については, $A \in \partial$ のとき, A から左に出る解曲線は, A の十分小さい近傍では点 A を除いて Ω の内部にあるならば, A から右に出る解曲線は もし連続可能であれば すべて Ω の外部にある ことを意味する。

これら二つの定理を用いて, 次の定理に達する。これは 2点境界値問題についての基本的な結果である:

定理 H_3 “ $E \subset \Omega$ は連続体。

$E' \subset \partial^+ \cup \partial^-$ は連続体。

$E \cap (\mathcal{B}^l \cup \mathcal{B}_-)$ は 少くとも二つの点を含み, その点
は $\mathcal{B}^l \cup \mathcal{B}_-$ のなかで E' によって分離される
(すなわち, これら二点は, $\mathcal{B}^l \cup \mathcal{B}_- - E'$ の異なる連結
成分に属する)

と仮定すれば, E と E' とを結ぶ曲線 $\in F$ が存在する。”

§3 福原の定理による南雲型定理の考察

福原の定理の証明をここに紹介する紙数はないので, 証明
を省略してしまつたが, 南雲型定理はどのように取り扱われ
るかを説明しよう。

2階非線型常微分方程式

$$y'' = f(x, y, y')$$

を考へる。

非線型 Bessel 方程式および境界層の方程式の研究に直接役
立つ形で述べる。

存在定理

“ $f(x, y, z)$ は (x, y, z) -space の領域

$$0 < x < \infty, \quad \underline{\omega}(x) \leq y \leq \bar{\omega}(x), \quad \underline{\Omega}(x, y) \leq z \leq \bar{\Omega}(x, y)$$

において (x, y, z) の関数として連続である。

(1) $\bar{\omega}(x)$ は $0 \leq x \leq \infty$ で連続かつ単調増加かつ

$$\bar{\omega}(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \bar{\omega}(x) = 1 ;$$

かつ

$$\bar{\omega}(x) = \begin{cases} \bar{\omega}_1(x) & 0 \leq x \leq N_1 \\ \bar{\omega}_2(x) & N_1 \leq x \leq N_2 \\ \bar{\omega}_3(x) & N_2 \leq x < \infty \end{cases}$$

の形に表わされ, ($N_1 = N_2$ の場合も含まれる)

$\bar{\omega}_1(x)$ は $0 < x \leq N_1$ において class C^2 に属する関数で,

$$\bar{\omega}_1''(x) \leq f(x, \bar{\omega}_1(x), \bar{\omega}_1'(x)) \quad 0 < x \leq N_1 ;$$

$\bar{\omega}_2(x)$ は $N_1 - \varepsilon \leq x \leq N_2$ において class C^2 に属し,

$$\bar{\omega}_2''(x) \leq f(x, \bar{\omega}_2(x), \bar{\omega}_2'(x)) \quad N_1 - \varepsilon \leq x \leq N_2 ;$$

$\bar{\omega}_3(x)$ は $N_2 - \varepsilon \leq x < \infty$ において class C^2 に属し,

$$\bar{\omega}_3''(x) \leq f(x, \bar{\omega}_3(x), \bar{\omega}_3'(x)), \quad N_2 - \varepsilon \leq x < \infty .$$

よって

$$\bar{\omega}_1(N_1) = \bar{\omega}_2(N_1), \quad \bar{\omega}_1(x) < \bar{\omega}_2(x) \quad N_1 - \varepsilon \leq x < N_1,$$

$$\bar{\omega}_2(N_2) = \bar{\omega}_3(N_2), \quad \bar{\omega}_2(x) < \bar{\omega}_3(x) \quad N_2 - \varepsilon \leq x < N_2 .$$

ε は十分小さい正数.

(2) $\underline{\omega}(x)$ は $0 \leq x \leq +\infty$ において連続かつ単調増加で,

$$\underline{\omega}(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \underline{\omega}(x) = 1$$

かつ

$$\underline{\omega}(x) = \begin{cases} \underline{\omega}_1(x) & 0 \leq x \leq M, \\ \underline{\omega}_2(x) & M \leq x \leq \infty \end{cases}$$

の形に表わされ,

$\underline{\omega}_1(x)$ は $0 < x \leq M$ において class C^2 に属し,

$$\underline{\omega}_1''(x) \geq f(x, \underline{\omega}_1(x), \underline{\omega}_1'(x)), \quad 0 < x \leq M;$$

$$\underline{\omega}_2(x) \text{ は } M-\varepsilon \leq x < \infty \text{ において class } C^2 \text{ に属し,}$$

$$\underline{\omega}_2''(x) \geq f(x, \underline{\omega}_2(x), \underline{\omega}_2'(x)) \quad M-\varepsilon \leq x < \infty.$$

また

$$\underline{\omega}_1(M) = \underline{\omega}_2(M), \quad \underline{\omega}_1(x) > \underline{\omega}_2(x) \quad M-\varepsilon \leq x < M$$

$$\underline{\omega}_1'(M) = \underline{\omega}_2'(M)$$

(3) $\underline{\Omega}(x, y), \bar{\Omega}(x, y)$ は

$$0 < x < \infty, \quad \underline{\omega}_1(x) \leq y \leq \bar{\omega}_2(x)$$

において 1回連続微分可能で、次の不等式が成り立つ:

$$\underline{\Omega}(x, \bar{\omega}_1(x)) \leq \bar{\omega}_1'(x) \leq \bar{\Omega}(x, \bar{\omega}_1(x)) \quad 0 < x \leq N_1$$

$$\underline{\Omega}(x, \bar{\omega}_2(x)) \leq \bar{\omega}_2'(x) \leq \bar{\Omega}(x, \bar{\omega}_2(x)) \quad N_1-\varepsilon \leq x \leq N_2$$

$$\underline{\Omega}(x, \bar{\omega}_3(x)) \leq \bar{\omega}_3'(x) \leq \bar{\Omega}(x, \bar{\omega}_3(x)) \quad N_2-\varepsilon \leq x < \infty$$

$$\underline{\Omega}(x, \underline{\omega}_1(x)) \leq \underline{\omega}_1'(x) \leq \bar{\Omega}(x, \underline{\omega}_1(x)) \quad 0 < x \leq M$$

$$\underline{\Omega}(x, \underline{\omega}_2(x)) \leq \underline{\omega}_2'(x) \leq \bar{\Omega}(x, \underline{\omega}_2(x)) \quad M-\varepsilon \leq x < \infty.$$

また 次の不等式が成り立つ:

$$f(x, y, \underline{\Omega}(x, y)) - \underline{\Omega}_x(x, y) - \underline{\Omega}_y(x, y) \underline{\Omega}(x, y) > 0$$

$$f(x, y, \bar{\Omega}(x, y)) - \bar{\Omega}_x(x, y) - \bar{\Omega}_y(x, y) \bar{\Omega}(x, y) < 0$$

$$\text{for } 0 < x < \infty, \quad \underline{\omega}(x) \leq y \leq \bar{\omega}(x).$$

これらの条件が成りて満足されるならば

境界値問題

$$y'' = f(x, y, y')$$

$$y(0) = 0, \quad y(\infty) = 1$$

$$0 < y(x) < 1 \quad \text{for } 0 < x < \infty$$

は少くとも一解をもつ。このとき $\underline{\omega}(x) < y(x) < \bar{\omega}(x), 0 < x < \infty$ ”

証明

$\{a_n\} \downarrow 0, \{b_n\} \uparrow \infty$ なる二組の点列をとる。

$a_n = a, b_n = b$ とおき、

$$\underline{\omega}(a) \leq A \leq \bar{\omega}(a), \quad \underline{\omega}(b) \leq B \leq \bar{\omega}(b)$$

なる A, B を適当にえらび、

$$y'' = f(x, y, y')$$

$$y(a) = A, \quad y(b) = B$$

は解をもつことを証明すればよい。このとき、そのおこなった解の \rightarrow を $y(x) = y_n(x)$ とすれば、 $\{y_n(x)\}$ なる解の列をとる。これから適当な部分列をえり、広義一様収束する程度に最初の境界値問題の解である。 n は十分大きくとり

$$a = a_n < \min(N_1, M), \quad b = b_n > \max(N_2, M) \text{ とする。}$$


Ω とすれば

$$a \leq x \leq b, \quad \underline{\omega}(x) \leq y \leq \bar{\omega}(x), \quad \underline{\Omega}(x, y) \leq z \leq \bar{\Omega}(x, y)$$

で表わされる (x, y, z) -space の領域をとる。 Ω の任意

の点を (ξ, η, ζ) とし, $x=\xi$ のとき $y=\eta, y'=\zeta$ となる解を $\varphi(x)$ で表わす. F は 解曲線 $(x, \varphi(x), \varphi'(x))$ の全体 $\cup (x, \varphi(x), \varphi'(x))$ が点集合として Ω に属するもの \cup である. このとき Ω は F の基本領域となる.


Ω の 超平面 $x=a, x=\xi, x=b$ による切口を考へる:



----- は \mathcal{B}^-
 _____ は $\mathcal{B}^l \cup \mathcal{B}^-$

もう少し詳しく説明する. 切口は 以下 すべて 超平面 $x=\xi$ 上にあるもの と考へる.

次の六つの Cases に分けて, Ω の境界点 (つまり 超平面 $x=\xi$ による Ω の切口の境界点) を詳しる.




$$\underline{\omega}(\xi) < \eta < \bar{\omega}(\xi), \quad \zeta = \bar{\Omega}(\xi, \eta)$$

or

$$\underline{\omega}(\xi) < \eta < \bar{\omega}(\xi), \quad \zeta = \underline{\Omega}(\xi, \eta)$$

∴ ∃ $(\xi, \eta, \zeta) \in \mathcal{B}^l$ である。




$$\eta = \bar{\omega}(\xi), \quad \underline{\Omega}(\xi, \eta) < \zeta < \bar{\omega}'(\xi)$$

or

$$\eta = \underline{\omega}(\xi), \quad \underline{\omega}'(\xi) < \zeta < \bar{\Omega}(\xi, \eta)$$

∴ ∃ $(\xi, \eta, \zeta) \in \mathcal{B}^l$



$$\eta = \bar{\omega}(\xi), \quad \bar{\omega}'(\xi) < \zeta = \bar{\Omega}(\xi, \eta)$$

or

$$\eta = \bar{\omega}(\xi), \quad \zeta = \underline{\Omega}(\xi, \eta) < \bar{\omega}'(\xi)$$


or

$$\eta = \underline{\omega}(\xi), \quad \underline{\omega}'(\xi) < \zeta = \bar{\Omega}(\xi, \eta)$$

or

$$\eta = \underline{\omega}(\xi), \quad \zeta = \underline{\Omega}(\xi, \eta) < \underline{\omega}'(\xi)$$

∴ ∃ $(\xi, \eta, \zeta) \in \mathcal{B}^l$




$$\eta = \bar{\omega}(\xi), \quad \bar{\omega}'(\xi) < \zeta < \bar{\Omega}(\xi, \eta)$$

or

$$\eta = \underline{\omega}(\xi), \quad \underline{\Omega}(\xi, \eta) < \zeta < \underline{\omega}'(\xi)$$

∴ ∃ $(\xi, \eta, \zeta) \in \mathcal{B}^- \cap \mathcal{B}^+$. このことは

\mathcal{B}^- の点では, \mathcal{B}^+ に属する点と見做す。




$$\eta = \bar{\omega}(\xi), \quad \zeta = \bar{\omega}'(\xi), \quad \bar{\omega}''(\xi) < f(\xi, \bar{\omega}(\xi), \bar{\omega}'(\xi))$$

or

$$\eta = \underline{\omega}(\xi), \quad \zeta = \underline{\omega}'(\xi), \quad \underline{\omega}''(\xi) > f(\xi, \underline{\omega}(\xi), \underline{\omega}'(\xi))$$

$$\text{or } (\xi, \eta, \zeta) \in \mathcal{B}^l \cap \mathcal{B}^r$$



$$\eta = \bar{\omega}(\xi), \quad \zeta = \bar{\omega}'(\xi), \quad \bar{\omega}''(\xi) = f(\xi, \bar{\omega}(\xi), \bar{\omega}'(\xi))$$

or

$$\eta = \underline{\omega}(\xi), \quad \zeta = \underline{\omega}'(\xi), \quad \underline{\omega}''(\xi) = f(\xi, \underline{\omega}(\xi), \underline{\omega}'(\xi))$$

or (ξ, η, ζ) is, $\notin \mathcal{B}^l$ but belongs to \mathcal{B}_- ,
 if, \mathcal{B}_- belongs to left Kneser point.

最後の命題以外の証明は、やさしいが、最後命題の証明はむづかしい。

ただし $x = N_1$ or $x = N_2$ のときは


$$\bar{\omega}'_1(N_1) = \lim_{x \rightarrow N_1-0} \bar{\omega}'_1(x) > \bar{\omega}'_2(N_1),$$

$$\bar{\omega}'_2(N_2) = \lim_{x \rightarrow N_2-0} \bar{\omega}'_2(x) \geq \bar{\omega}'_3(N_2),$$

$x = M$ のときは

$$\underline{\omega}'_1(M) = \lim_{x \rightarrow M-0} \underline{\omega}'_1(x) = \underline{\omega}'_2(M)$$

と仮定しているから、 $x=N_1$, $x=N_2$ のときは少し様子が異なる。そこで例えは $x=N_1$ のときを改めて調べる。



いま ξ の

$$\eta = \bar{\omega}(\xi), \quad \underline{\omega}(\xi, \eta) < \xi < \bar{\omega}'(\xi)$$

なる部分は、

$$\eta = \bar{\omega}(\xi), \quad \underline{\omega}(\xi, \eta) < \xi < \bar{\omega}'_2(N_1),$$

$$\eta = \bar{\omega}(\xi), \quad \xi = \bar{\omega}'_2(N_1),$$

$$\eta = \bar{\omega}(\xi), \quad \bar{\omega}'_2(N_1) < \xi < \bar{\omega}'_1(N_1)$$

の三つの部分に分けて調べなければならない。それぞれ、 $\mathcal{B}^l \cap \mathcal{B}^+$, \mathcal{B}^l , $\mathcal{B}^l \cap \mathcal{B}^+$, したがって、やはり \mathcal{B}^l に属することになる。

宿原の存在定理 H_3 を応用するため、 E として $x=b$ における \mathcal{D} の切口上の実線 Γ を図示されている一方の $\mathcal{B}^l \cup \mathcal{B}^-$ の点と他方の $\mathcal{B}^l \cup \mathcal{B}^-$ の点を結ぶ曲線をとる; E' として $x=a$ における \mathcal{D} の切口上の点線 Γ' を図示されている \mathcal{B}^- (二つの連結成分) の二つの点を結ぶ曲線をとる。^{二のこ} $E \cap (\mathcal{B}^l \cup \mathcal{B}^-)$ は二点を含む。この二点を \mathcal{D} の境界 \mathcal{B} 上で $\mathcal{B}^l \cup \mathcal{B}^-$ のなかで結ぶとすれば、図から明らかであるように、どうしても E' と交わりぬけることはない。したがって E と E' との

点を結ぶ曲線 $\in F$ が少くとも一つは存在する。この曲線に対応する解 $y(x)$ は、

$$\underline{\omega}(x) \leq y(x) \leq \bar{\omega}(x), \quad \underline{\Omega}(x, y(x)) \leq y'(x) \leq \bar{\Omega}(x, y(x)) \\ a \leq x \leq b$$

を満足する。このようにして南雲型の定理は証明される。

§4. 非線型 Bessel 方程式

境界値問題


$$y'' = -x^{-1}y' + \nu^2 x^{-2}y + y^3 - y \equiv f(x, y, y')$$

$$y(0) = 0, \quad y(\infty) = 1$$

$$0 < y(x) < 1 \quad \text{for } 0 < x < \infty$$

を考える。 $\nu > 0$ はパラメーター。

$x=0$ は確定型特異点、 $x=\infty$ は不確定型特異点であるから、 x に関する形式解の計算により、 $x=0$ 付近は ν を指数とする解が存在し、 $x=\infty$ 付近は x^{-2} の整級数に漸近展開される解が存在することがわかる。これらのことを考慮すれば $\underline{\omega}(x)$, $\bar{\omega}(x)$ として何をとりかはいいかは大体的に見当がつく。図は $\nu > 1$ の場合である。もちろん以下の結果は $0 < \nu \leq 1$ のときも正しい。



“

$$\underline{\omega}_1(x) = Ax^\nu, \quad \text{for } 0 < x \leq M + \varepsilon$$

$$\underline{\omega}_2(x) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}x^{-2} - \left(\nu^2 + \frac{\nu^4}{8}\right)x^{-4} - Bx^{-5} \quad \text{for } M - \varepsilon \leq x < \infty$$

$$\bar{\omega}_1(x) = Cx^\alpha \quad \text{for } 0 < x \leq M + \varepsilon$$

$$\bar{\omega}_2(x) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}x^{-2} - \left(\nu^2 + \frac{\nu^4}{8}\right)x^{-4} + Dx^{-5} \quad \text{for } M - \varepsilon \leq x < \infty$$

ε は十分小さな正数, A, B, C, D はすべて正数.

$$\bar{\Omega}(x, y) = E x^{\alpha-1} \quad E > 0$$

$$\underline{\Omega}(x, y) = -E x^{\alpha-1}$$

$B \gg 1$ とし, M, A, D, C, α および E を B の関数として適当に定めれば, §3 の存在定理に仮定されたすべての条件が満足される”

1° まず $y = \underline{\omega}_1(x)$ と $y = \underline{\omega}_2(x)$ とが接するための条件を探る。その条件は

$$Ax^\nu = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}x^{-2} - \left(\nu^2 + \frac{\nu^4}{8}\right)x^{-4} - Bx^{-5},$$

$$\sqrt{A}x^{\nu} = \nu^2 x^{-2} + (4\nu^2 + \frac{\nu^4}{2})x^{-4} + 5Bx^{-5}$$

が共通根をもつこととある。 Ax^{ν} を消去すれば

$$\nu x^5 - \nu^2 \left(1 + \frac{\nu}{2}\right) x^3 - 4\nu^2 \left(1 + \frac{\nu}{4}\right) \left(1 + \frac{\nu^2}{2}\right) x - (5+\nu)B = 0.$$

この根が正確に計算できないために 擾動法を用いざるを得ないように思う。

$B \gg 1$ と仮定する。根 M (接点の x 座標) は

$$M = \left(\frac{5+\nu}{\nu}\right)^{\frac{1}{5}} B^{\frac{1}{5}} \left(1 + \frac{1}{5}(\nu + \frac{\nu^2}{2}) \left(\frac{\nu}{5+\nu}\right)^{\frac{2}{5}} B^{-\frac{2}{5}} + \dots\right)$$

\dots は $\left(\frac{\nu}{5+\nu}\right)^{\frac{2}{5}} B^{-\frac{2}{5}}$ のべき級数。以下同様

したがって $A = \underline{\omega}_2(M) M^{-\nu}$ より

$$A = \frac{5}{5+\nu} \left(\frac{\nu}{5+\nu}\right)^{\frac{\nu}{5}} B^{-\frac{\nu}{5}} \left(1 - \frac{1}{10} \nu^2 (5+\nu) \left(\frac{\nu}{5+\nu}\right)^{\frac{2}{5}} B^{-\frac{2}{5}} + \dots\right).$$

$x = M$ において

$$\underline{\omega}_1(x) = \underline{\omega}_2(x), \quad \underline{\omega}'_1(x) = \underline{\omega}'_2(x)$$

となるが、さらに

$$\underline{\omega}_1''(x) > \underline{\omega}_2''(x) \quad \text{at } x = M$$

が成立つ。したがって

$$\underline{\omega}_1''(M) - \underline{\omega}_2''(M) =$$

$$= 5(5+\nu) \left(\frac{\nu}{5+\nu}\right)^{\frac{\nu}{5}} B^{-\frac{2}{5}} \left(1 + \dots\right) > 0 \quad \text{when } B \gg 1$$

このことは

$$\underline{\omega}_1(x) > \underline{\omega}_2(x) \quad M-\varepsilon \leq x \leq M+\varepsilon, \quad x \neq M$$

となっていることを示す。

2° $\underline{\omega}_1(x) = Ax^\nu$ が

$$\underline{\omega}_1''(x) > f(x, \underline{\omega}_1(x), \underline{\omega}_1'(x))$$

を満足する x の範囲は

$$0 < x < A^{-\frac{1}{\nu}}$$

となっていることがわかる。よって

$$A^{-\frac{1}{\nu}} = \left(\frac{5+\nu}{5}\right)^{\frac{1}{\nu}} \left(\frac{5+\nu}{\nu}\right)^{\frac{1}{5}} B^{\frac{1}{5}} \left(1 + \frac{1}{10}\nu(5+\nu) \left(\frac{\nu}{5+\nu}\right)^{\frac{\nu}{5}} B^{-\frac{2}{5}} + \dots\right)$$

よって

$$M < A^{-\frac{1}{\nu}}$$

故に $\underline{\omega}_1(x)$ は $0 < x \leq M+\varepsilon$ において

$$\underline{\omega}_1''(x) > f(x, \underline{\omega}_1(x), \underline{\omega}_1'(x))$$

をみたす。

3° $\underline{\omega}_2(x) = 1 - \frac{\nu^2}{2}x^{-2} - \left(\nu^2 + \frac{\nu^4}{8}\right)x^{-4} - Bx^{-5}$ が

$$\underline{\omega}_2''(x) > f(x, \underline{\omega}_2(x), \underline{\omega}_2'(x))$$

を満足する x の範囲を求める。直接計算すればすぐわかるように、不等式

$$\begin{aligned}
 (*) \quad & 2B + \frac{3}{64}v^8 x^{-3} + \frac{3}{2}\left(v^2 + \frac{v^4}{8}\right)^2 v^2 x^{-5} \\
 & + 3\left(v^4 + \frac{v^8}{8}\right)B x^{-6} + \left(\frac{3}{2}v^2 B^2 + \left(v^2 + \frac{v^4}{8}\right)^3\right)x^{-7} \\
 & + 3\left(v^2 + \frac{v^4}{8}\right)B x^{-8} + 3\left(v^2 + \frac{v^4}{8}\right)B^2 x^{-9} + B^3 x^{-10} \\
 & > \left(16v^2 + 4v^4 + \frac{v^6}{8}\right)x^{-1} + (25 + 2v^2)B x^{-2} \\
 & \quad + 3v^4 x^{-3} + 6v^2 B x^{-4} + 3B^2 x^{-5}.
 \end{aligned}$$

をみたす x の値に対して $\omega_2'' > f$ が成立つ。よってこの不等式の左辺から $2B + B^3 x^{-10}$ 、右辺から $3B^2 x^{-5}$ なる項をとりだし、

$$2B + B^3 x^{-10} > 3B^2 x^{-5}$$

が成立つ範囲を考へる。この範囲は $x = \infty$ までのびていなければならぬことから、

$$x > B^{\frac{1}{5}}.$$

よって

$$\left(\frac{5+v}{v}\right)^{\frac{1}{5}} B^{\frac{1}{5}} \leq x$$

において上記の不等式は もちろん成立し、かつ

$$2B + B^3 x^{-10} - 3B^2 x^{-5} \geq \frac{5(10+v)}{(5+v)^2} B \quad \text{for} \quad \left(\frac{5+v}{v}\right)^{\frac{1}{5}} B^{\frac{1}{5}} \leq x$$

しかるに 不等式(*) において, $2B, B^3x^{-10}, 3B^2x^{-5}$ 以外の項の大きさは $O(B^{\frac{3}{5}}) = o(B)$ を超えない。よって, ν に関係するが, B を十分大きくとれば 不等式(*) は

$$\left(\frac{5+\nu}{\nu}\right)^{\frac{1}{5}} B^{\frac{1}{5}} \leq x < \infty \quad \text{において成立つ。しかも}$$

$$\left(\frac{5+\nu}{\nu}\right)^{\frac{1}{5}} B^{\frac{1}{5}} < M.$$

ひある。

故に $\omega_2(x)$ は $M-\varepsilon \leq x < \infty$ において

$$\omega_2''(x) > f(x, \omega_2(x), \omega_2'(x))$$

をみたす。

4° $y = \bar{\omega}_2(x)$ は 小極値をもちることがわかるから, その 小極値を $x=M$ においてとるから D の値を定める。この 小極値は いっさい最小値である。極値を与える x は $\bar{\omega}_2'(x) = 0$ の根であるから, そのもう一方の x は

$$\nu^2 x^3 + \left(4\nu^2 + \frac{\nu^4}{2}\right) x - 5D = 0$$

の根であり, かつ この方程式は ただ一つの实根 > 0 をもつ。よって

$$D = \frac{1}{5} \left\{ \nu^2 M^3 + \left(4\nu^2 + \frac{\nu^4}{2}\right) M \right\}$$

とあるから D を定める。このとき

$$D = \frac{\nu^2}{5} \left(\frac{5+\nu}{\nu}\right)^{\frac{3}{5}} B^{\frac{3}{5}} \left(1 + \left(4 + \frac{3\nu}{5} + \frac{4\nu^2}{5}\right) \left(\frac{\nu}{5+\nu}\right)^{\frac{2}{5}} B^{-\frac{2}{5}} + \dots\right).$$

C において $C = \bar{\omega}_2(M) M^{-\alpha}$ とおけるように定めれば

$$C = \left(\frac{\nu}{5+\nu}\right)^{\frac{\alpha}{5}} B^{-\frac{\alpha}{5}} \left(1 - \frac{\nu}{5} \left(\alpha + \frac{3+\alpha}{2}\nu\right) \left(\frac{\nu}{5+\nu}\right)^{\frac{2}{5}} B^{-\frac{2}{5}} + \dots\right)$$

をえる。このとき

$$\bar{\omega}_1'(M) > \bar{\omega}_2'(M) = 0.$$

$$5^\circ \quad \bar{\omega}_2(x) = 1 - \frac{\nu^2}{2} x^{-2} - \left(\nu^2 + \frac{\nu^4}{8}\right) x^{-4} + D x^{-5} \quad \text{が}$$

$$\bar{\omega}_2''(x) < f(x, \bar{\omega}_2(x), \bar{\omega}_2'(x))$$

を満足する x の範囲を探そう。この条件は §33 の不等式(*) において B の代わりに $-D$ とおけばえられる。

よって

$$\begin{aligned} (*) \quad & (25+2\nu^2)D x^{-2} + \frac{3\nu^8}{64} x^{-3} + 6\nu^2 D x^{-4} \\ & + \frac{3}{2}\nu^2 \left(\nu^2 + \frac{\nu^4}{8}\right)^2 x^{-5} + \left(\frac{3\nu^2}{2} D^2 + \left(\nu^2 + \frac{\nu^4}{8}\right)^3\right) x^{-7} \\ & + 3\left(\nu^2 + \frac{\nu^4}{8}\right) D^2 x^{-9} \\ & < 2D + \left(16\nu^2 + 4\nu^4 + \frac{\nu^6}{8}\right) x^{-1} + 3\nu^4 x^{-3} + 3D^2 x^{-5} \\ & + 3\left(\nu^4 + \frac{\nu^6}{8}\right) D x^{-6} + 3\left(\nu^2 + \frac{\nu^4}{8}\right)^2 D x^{-8} + D^3 x^{-10} \end{aligned}$$

この不等式は 次の不等式が同時に成り立つ x の値に於て

$$成立つ: \quad (25+2\nu^2)D x^{-2} < D; \quad 9\nu^2 D x^{-4} < D;$$

$$\frac{3}{64}\nu^8 x^{-3} < \frac{\nu^6}{64} x^{-1}; \quad \frac{3\nu^2}{2} \left(\nu^2 + \frac{\nu^4}{8}\right)^2 x^{-5} < \frac{6}{64}\nu^6 x^{-1};$$

$$\left(\nu^2 + \frac{\nu^4}{8}\right)^3 x^{-7} < \frac{\nu^6}{64} x^{-1}; \quad \frac{3\nu^2}{2} D^2 x^{-7} < \frac{3}{4} D^2 x^{-5};$$

$$8(1+2\nu^2+\nu^4)D^2 x^{-9} < 2D^2 x^{-5}.$$

これら 7 個の不等式は $\sqrt{2V^2+25} < x$ において同時に成立つ。ただし $\bar{\omega}_2(x) < 1$ でなければならぬ。したがって $\bar{\omega}_2(x) = 1$ の有限な正根を x_0 とすれば、不等式 (**) は

$$\max \left\{ (2V^2+25)^{\frac{1}{2}}, x_0 \right\} < x$$

において成立つ。しかるに x_0 は

$$\frac{V^2}{2} x^3 + (V^2 + \frac{V^4}{8}) x - D = 0$$

の根である。 $B \gg 1$ のとき $D \gg 1$ であるから、

$$x_0 = \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{1}{3}} \left(\frac{5+V}{V}\right)^{\frac{1}{5}} B^{\frac{1}{5}} (1 + \dots) < M.$$

したがって

$$\bar{\omega}_2(x) \text{ は } M - \varepsilon \leq x < \infty \text{ において}$$

$$\bar{\omega}_2'' < f(x, \bar{\omega}_2, \bar{\omega}_2')$$

をみたす。

$$6^\circ \quad \bar{\omega}_1(x) = C x^\alpha \quad \text{が} \quad \bar{\omega}_1'' < f(x, \bar{\omega}_1, \bar{\omega}_1') \quad \text{を}$$

$0 < x \leq M$ において満足するためには


$$h(x) \equiv V^2 - \alpha^2 - x^2 + C^2 x^{2\alpha+2}, \quad 0 < x \leq M$$

が成立てばよいことがわかる。

$h(x)$ の最小値をとる x の値を x_2 とすれば $x_2 = [(1+\alpha)C^2]^{-\frac{1}{2\alpha}}$ 。したがって α を

$$M < x_2, \quad \text{すなわち} \quad h(M) > 0$$

となるように定める。直接計算によつて α の満足すべき条件は



$$\alpha < \frac{3v^2}{5} \left(\frac{v}{5+v}\right)^{\frac{2}{5}} B^{-\frac{2}{5}} + \dots, \quad \text{かつ} \quad \alpha < \frac{v}{\sqrt{5}}$$

とあることがわかる

よ $\underline{\Omega}, \bar{\Omega}$ が §3 の存在定理に述べた条件を満足する
 ために E を十分大きくとればよい。初等的計算ではある
 が紙数を要するので省略する。 E は十分大きいといって
 びきるだけ精密な値でなければならぬ。

$$E > (v^2 C + v^{2\alpha} C^3) \alpha^{-1}; \quad E > \max(v^{2-\alpha}, M^{2-\alpha}) \alpha^{-1};$$

$$E > v C; \quad E > v^2 M^{-\alpha} \alpha^{-1};$$

$$E > v^2 x^{-\alpha-2} + (4v^2 + \frac{v^4}{2}) x^{-\alpha-4} + 5B x^{-\alpha-5} \quad \text{for } M \leq x < \infty;$$

$$\left(\frac{1-v^2 x^{-2}}{3}\right)^{\frac{1}{2}} = \underline{\omega}_2(x) \quad \text{の根を } S \text{ とすれば}$$

$$S = \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}\right)^{\frac{1}{5}} B^{\frac{1}{5}} \left(1 + \frac{v^2}{10} \left(\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}\right)^{\frac{2}{5}} B^{-\frac{2}{5}} + \dots\right).$$

したがって $v > 5(\sqrt{3}-1)$ ならば $M < S$, $0 < v \leq 5(\sqrt{3}-1)$

ならば $S < M$ とする。 $v^2 x^{-2} \underline{\omega}_2(x) + \underline{\omega}_2(x)^3 - \underline{\omega}_2(x) =$

$$= -2v^2 x^{-4} (1 + O(x^{-4})) \quad \text{とあることには注意する。 } S \text{ による}$$

$$E > (-v^2 x^{-2} \underline{\omega}_2(x) - \underline{\omega}_2(x)^3 + \underline{\omega}_2(x)) x^{2-\alpha} \alpha^{-1}$$

for $S \leq x < \infty$ when $v > 5(\sqrt{3}-1)$ or $M \leq x < \infty$ when $v \leq 5(\sqrt{3}-1)$.

および

$$E > \frac{2}{3\sqrt{3}} (1-v^2 S^{-2})^{\frac{3}{2}} \max(M^{2-\alpha}, S^{2-\alpha}) \alpha^{-1}.$$

以上より 7個の不等式を満足する E をとればよい。

§5 境界層の方程式 (Algebraic Type)

考えがきにおいて説明したように, 方程式は

$$y'' = -\frac{1}{\sqrt{y}} (2xy' + 4\lambda(1-y)) \equiv f(x, y, y')$$

$$y(0) = 0, \quad y(\infty) = 1$$


$$0 < y(x) < 1 \quad \text{for } 0 < x < \infty.$$

と与えられる.

パラメータ λ は負の数で, 不等式

$$(*) \quad -\frac{3}{2}\lambda(3-2\lambda)(5-3\lambda) < 1$$

を満足する λ が存在する. そのうち $-0.072 \leq \lambda < 0$.



“

$$\underline{\omega}_1(x) = (-9\lambda)^{\frac{2}{3}} x^{\frac{4}{3}} \quad \text{for } 0 < x \leq M + \varepsilon$$

$$\underline{\omega}_2(x) = 1 - Ax^{2\lambda} - Bx^{2\lambda-2} \quad \text{for } M - \varepsilon \leq x < \infty$$

$$\bar{\omega}_1(x) = C^2 x^{2\sigma} \quad \text{for } 0 < x \leq N_1$$

$$\bar{\omega}_2(x) = 1 - \frac{1}{1-\lambda} \left(\frac{1-\lambda}{-\lambda}\right)^\lambda A \quad \text{for } N_1 - \varepsilon \leq x \leq N_2$$

$$\bar{\omega}_3(x) = 1 - Ax^{2\lambda} + Ax^{2\lambda-2} \quad \text{for } N_2 - \varepsilon \leq x < \infty$$

$$\bar{\Omega}(x, y) = F \frac{y}{x},$$

$$\underline{\Omega}(x, y) = 0$$

ここで σ は $0 < 2\sigma < 1$ なる任意の数

$$N_1 = \left(1 - \frac{1}{1-\lambda} \left(\frac{1-\lambda}{-\lambda}\right)^\lambda A\right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{\sigma(1-2\sigma)}{2(\sigma-\lambda)}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$N_2 = \left(\frac{1-\lambda}{-\lambda}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$C^2 = \left(\frac{2(\sigma-\lambda)}{\sigma(1-2\sigma)}\right)^\sigma \left(1 - \frac{1}{1-\lambda} \left(\frac{1-\lambda}{-\lambda}\right)^\lambda A\right)^{1-\frac{1}{2\sigma}}$$

$\varepsilon > 0$ は十分小なる数.

A, B は

$$(**) \begin{cases} (-q\lambda)^{\frac{2}{3}} x^{\frac{4}{3}} = 1 - Ax^{2\lambda} - Bx^{2\lambda-2}, \\ \frac{2}{3}(-q\lambda)^{\frac{2}{3}} x^{\frac{4}{3}} = -\lambda Ax^{2\lambda} - (\lambda-1)Bx^{2\lambda-2} \end{cases}$$

が共通根 $M > 0$ を持つ正の数である

$F > \frac{4}{3}$ なる正の数.

このとき λ が不等式(*) を満足する負数とすれば、
§3の存在定理に仮定されたすべての条件が満足される。”

ここでは λ に関する制限(*) がどのようにして与られた

かを説明したい。方程式(**)が共通根をもつことは、二つの曲線 $y = \omega_1(x)$ と $y = \omega_2(x)$ が接することを意味する。

(**)より $Ax^{2\lambda}$ を消去すれば

$$H(x) \equiv \left(\frac{2}{3} - \lambda\right)(-9\lambda)^{\frac{2}{3}} x^{\frac{4}{3}} + \lambda - Bx^{2\lambda-2} = 0,$$

また $Bx^{2\lambda-2}$ を消去すれば

$$K(x) \equiv \left(\frac{5}{3} - \lambda\right)(-9\lambda)^{\frac{2}{3}} x^{\frac{4}{3}} - (1-\lambda) + Ax^{2\lambda} = 0.$$

共通根 $M > 0$ をもつと仮定すれば、 $B > 0$ より

$$M > \left(\frac{(-9\lambda)^{\frac{1}{3}}}{3(2-3\lambda)}\right)^{\frac{3}{4}} \equiv \left(\frac{-3\lambda}{2-3\lambda}\right)^{\frac{3}{4}} (-9\lambda)^{-\frac{1}{2}},$$

また $A > 0$ より $\left(\frac{3-3\lambda}{5-3\lambda}\right)^{\frac{3}{4}} (-9\lambda)^{-\frac{1}{2}} > M.$

共通根 M を A の関数と考えれば $K(x) = 0$ から、 M は一意的に定まり A の減少関数となることがわかる。

M は B の関数とも考えられる。しかし M は B の増加関数となることが確かめられる。故に A, B のとりうる値は

$$0 < A < \frac{2}{2-3\lambda} \left(\frac{(-9\lambda)^{\frac{1}{3}}}{3(2-3\lambda)}\right)^{-\frac{3\lambda}{2}},$$

$$\frac{2}{5-3\lambda} \left(\frac{3-3\lambda}{5-3\lambda}\right)^{\frac{3-3\lambda}{2}} (-9\lambda)^{-1+\lambda} > B > 0,$$

このとき 共通根 M は次の不等式を満足しなければならない

$$\left(\frac{3-3\lambda}{5-3\lambda}\right)^{\frac{3}{4}} (-9\lambda)^{-\frac{1}{2}} > M > \left(\frac{-3\lambda}{2-3\lambda}\right)^{\frac{3}{4}} (-9\lambda)^{-\frac{1}{2}}.$$

逆に上の不等式をみたす M の値に対しては,

$$\left(\frac{2}{3}-\lambda\right)(-9\lambda)^{\frac{2}{3}} M^{\frac{4}{3}} + \lambda > 0, \left(\frac{5}{3}-\lambda\right)(-9\lambda)^{\frac{2}{3}} M^{\frac{4}{3}} - (1-\lambda) > 0$$

となる。しかつて $H(M)=0, K(M)=0$ となる M に対して

$A > 0, B > 0$ は一意的に定まり、かつ上記の不等式をみたすことがわかる。

共通根 M としてどんな値が最適であるかはよくわからないが、ここでは $A > 0$ は十分小さいと考えて、 $K(x)=0$ の根 M を、摂動法により求めれば、次の収束展開式で与えられる:

$$M = \left(\frac{3-3\lambda}{5-3\lambda}\right)^{\frac{3}{4}} (-9\lambda)^{-\frac{1}{2}} \left\{ 1 - \frac{3}{4} \frac{1}{1-\lambda} \left(\frac{3-3\lambda}{5-3\lambda}\right)^{\frac{3\lambda}{2}} (-9\lambda)^{-\lambda} A + \dots \right\}$$

... は $\left(\frac{3-3\lambda}{5-3\lambda}\right)^{\frac{3\lambda}{2}} (-9\lambda)^{\lambda} A$ の n べき級数。

このとき $H(M)=0$ より、 B は次の展開式で表わされる:

$$B = \frac{2}{5-3\lambda} \left(\frac{3-3\lambda}{5-3\lambda}\right)^{\frac{3-3\lambda}{2}} (-9\lambda)^{-1+\lambda} \left\{ 1 - \frac{5-3\lambda}{2} \left(\frac{3-3\lambda}{5-3\lambda}\right)^{\frac{3\lambda}{2}} (-9\lambda)^{-\lambda} A + \dots \right\}.$$

1° $\underline{\omega}_1(x) = (-9\lambda)^{\frac{2}{3}} x^{\frac{4}{3}}$ は $0 < x < (-9\lambda)^{-\frac{1}{2}}$ において不等式 $\underline{\omega}_1''(x) > f(x, \underline{\omega}_1(x), \underline{\omega}_1'(x))$ を満足することがわかるから、 $0 < x \leq M + \varepsilon$ において不等式

$$\underline{\omega}_1''(x) > f(x, \underline{\omega}_1(x), \underline{\omega}_1'(x))$$

は満足される。

2° $\underline{\omega}_2(x) = 1 - Ax^{2\lambda} - Bx^{2\lambda-2}$ に対して $\underline{\omega}_2''(x) > f(x, \underline{\omega}_2(x), \underline{\omega}_2'(x))$ を満足するためには 次の不等式が成立しなければならない:

$$(\#) \quad (1-\lambda)(3-2\lambda)B < \left(\frac{2B}{\sqrt{1-Ax^{2\lambda}-Bx^{2\lambda-2}}} + \lambda(1-2\lambda)A \right) x^2.$$

この不等式は $M \leq x < \infty$ において成り立つならば連続性により $M-\varepsilon \leq x < \infty$ において満足されることとなる。不等式(*)は上記の不等式が $x=M$ において成り立つための条件である。従って B , $x=M$ の代わりに A による展開式を代入し、^(*) 両辺の主要項を比較すればすぐわかることとなる。不等式(*)の右辺の導関数の零点を S とすれば、

$$S = \left(\frac{3-\lambda}{5-3\lambda} \right)^{\frac{1}{2-2\lambda}} \left(\frac{3-3\lambda}{5-3\lambda} \right)^{\frac{3}{4}} (-4\lambda)^{-\frac{1}{2}} \{ 1 - \dots \}$$

となる。しかるに $S < M$ であるから、(*)の右辺は $M \leq x < \infty$ において x の単調増加関数である。よって $-\frac{3}{2}\lambda(3-2\lambda)(5-3\lambda) < 1$ なる λ の値に対しては (*) は $M \leq x < \infty$, (したがって $\bar{\omega}_2'' > f(\alpha, \bar{\omega}_2, \bar{\omega}_2')$) は $M-\varepsilon \leq x < \infty$ において満足されることとなる。

2° $\bar{\omega}_3(\alpha) = 1 - Ax^{2\lambda} + Ax^{2\lambda-2}$ は、 $\left(\frac{3-5\lambda+2\lambda^2}{2-\lambda+2\lambda^2} \right)^{\frac{1}{2}} < x < \infty$ において、 $\bar{\omega}_3'' < f(\alpha, \bar{\omega}_3, \bar{\omega}_3')$ を満足すること容易に確かめられる。一方 $y = \bar{\omega}_3(\alpha)$ は $x = \left(\frac{1-\lambda}{-\lambda} \right)^{\frac{1}{2}}$ において最小値(極小値)をとることともわかる。このときの最小値は

$$\bar{\omega}_3 \left(\sqrt{\frac{1-\lambda}{-\lambda}} \right) = 1 - \frac{1}{1-\lambda} \left(\frac{1-\lambda}{-\lambda} \right)^\lambda A.$$

$$-1 < \lambda < 0 \text{ ならば } \left(\frac{3-5\lambda+2\lambda^2}{2-\lambda+2\lambda^2} \right)^{\frac{1}{2}} < \left(\frac{1-\lambda}{-\lambda} \right)^{\frac{1}{2}}$$

が成り立つ。そこで不等式(*)をみたす λ の値 κ に対して $\bar{\omega}_3(x)$ は, $N_2 \equiv \left(\frac{1-\lambda}{-\lambda} \right)^{\frac{1}{2}}$ とおくと, $N_2 - \varepsilon \leq x < \infty$ において $\bar{\omega}_3''(x) < f(x, \bar{\omega}_3(x), \bar{\omega}_3'(x))$ をみたす。

3° $\bar{\omega}_2(x) \equiv \text{const} = D$ は $0 < D < 1$ なる限り, 任意の x に対して $\bar{\omega}_2'' < f(x, \bar{\omega}_2, \bar{\omega}_2')$ を満足する。故

$$\kappa, \quad D = 1 - \frac{1}{1-\lambda} \left(\frac{1-\lambda}{-\lambda} \right)^\lambda A$$

とおけば,

$$\begin{aligned} \bar{\omega}_2(x) &= \bar{\omega}_3(x), \quad \bar{\omega}_2'(x) = \bar{\omega}_3'(x) \quad \text{at } x = N_2, \\ \bar{\omega}_2(x) &< \bar{\omega}_3(x) \quad \text{for } N_2 - \varepsilon \leq x < N_2. \end{aligned}$$

4° $\bar{\omega}_1(x) = C^2 x^{2\sigma}$, $0 < 2\sigma < 1$, は, $0 < x \leq \left(\frac{\sigma(1-2\sigma)C}{2(\sigma-\lambda)} \right)^{\frac{1}{2-\sigma}}$ において, $\bar{\omega}_1''(x) < f(x, \bar{\omega}_1(x), \bar{\omega}_1'(x))$ を満足することに確かめられる。
 $N_1 = \left(\frac{\sigma(1-2\sigma)C}{2(\sigma-\lambda)} \right)^{\frac{1}{2-\sigma}}$ とおき, C を

$\bar{\omega}_1(N_1) = \bar{\omega}_2(N_1)$, あるいは $\bar{\omega}_1(N_1) = 1 - \frac{1}{1-\lambda} \left(\frac{1-\lambda}{-\lambda} \right)^\lambda A$ とする方が定めれば, N_1 および C^2 の値は最初においた値となる。連続性から $\bar{\omega}_1''(x) < f(x, \bar{\omega}_1(x), \bar{\omega}_1'(x))$ は $0 < x \leq N_1 + \varepsilon$ において成り立つことになる。

5° $\bar{\Omega}(x, y) = F \frac{y}{x}$ とおけば

$$\begin{aligned} f(x, y, \bar{\Omega}(x, y)) - \bar{\Omega}_x(x, y) - \bar{\Omega}_y(x, y) \bar{\Omega}(x, y) &= \\ &= -\frac{1}{\sqrt{y}} (2Fy + 4\lambda(1-y)) - (F^2 - F) \frac{y}{x^2} \end{aligned}$$

となる。 $F > 1$ ならば、右辺の y に関する偏導関数は負である。よって $f(x, y, \bar{\Omega}) - \bar{\Omega}_x - \bar{\Omega}_y \bar{\Omega}$ は、各 x の値に対して、 y の単調減少関数となる。 $F > \frac{4}{3}$ にとれば、§3の存在定理に仮定された $\bar{\Omega}(x, y)$ に関するすべての条件は満足される。

$\bar{\Omega}(x, y) = 0$ であるから、これに対しては §3のなかで示された条件が満足されることは簡単に確かめられる。

§6 境界層の方程式 (Exponential Type)

方程式は、前§におけると同様、


$$y'' = -\frac{1}{\sqrt{y}} (2xy' + 4\lambda(1-y)) \equiv f(x, y, y')$$

$$y(0) = 0, \quad y(\infty) = 1$$

$$0 < y(x) < 1 \quad \text{for } 0 < x < \infty$$

の形をもち。

$-0.059 \leq \lambda < 0$ と仮定する。このとき $\underline{\omega}(x), \bar{\omega}(x)$, $0 < x < \infty$, を図示すれば図のようになる。



$$\omega_1(x) = (-9\lambda)^{\frac{2}{3}} x^{\frac{4}{3}} \quad \text{for } 0 < x \leq M + \varepsilon$$

$$\omega_2(x) = 1 - A \int_x^\infty e^{-\alpha s^2} ds, \quad \text{for } M - \varepsilon \leq x < \infty$$

$$\bar{\omega}_1(x) = C^2 x^{2\sigma} \quad \text{for } 0 < x \leq N + \varepsilon,$$

$$\bar{\omega}_2(x) = 1 - B e^{-\beta x^2} \quad \text{for } N - \varepsilon \leq x < \infty$$

$$\bar{\Omega}(x, y) = F \frac{y}{x}$$

$$\underline{\Omega}(x, y) = 0.$$

ここで σ は $0 < 2\sigma < 1$ なる任意の数

$$\alpha = \frac{1}{3},$$

$$\beta > \frac{2(\sigma - \lambda)(1 - \sigma)^{\frac{1}{2}}}{\sigma(1 - 2\sigma)}$$

M は ω の超越方程式の正根:

$$g(x) = x^{\frac{4}{3}} - (-9\lambda)^{-\frac{2}{3}} + \frac{4}{3} x^{\frac{1}{3}} e^{\frac{x^2}{3}} \int_x^{\infty} e^{-\frac{s^2}{3}} ds = 0.$$

A は次式で与えられる:

$$A = \frac{4}{3} (-9\lambda)^{\frac{2}{3}} M^{\frac{1}{3}} e^{\frac{M^2}{3}} = \left(1 - (-9\lambda)^{\frac{2}{3}} M^{\frac{4}{3}}\right) \left(\int_M^{\infty} e^{-\frac{1}{3}s^2} ds\right)^{-1}.$$

また

$$N = \left(\frac{1-\sigma}{\beta}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$C^2 = \left(\frac{\beta}{1-\sigma}\right)^{\sigma} (1-\sigma)$$

$$B = \sigma e^{1-\sigma},$$

F は 次の四つの不等式を同時にみたす数:

$$F > \frac{4}{3}; \quad F > A\sqrt{3}e^{-1}(-9\lambda)^{-\frac{2}{3}}M^{-\frac{4}{3}};$$

$$F > -2\lambda((-9\lambda)^{-\frac{2}{3}}M^{-\frac{4}{3}}-1); \quad F > \frac{2\sigma}{1-\sigma}e^{-\sigma}.$$

λ が $-0.059 \leq \lambda < 0$ を満足するならば、§3 の存在定理のなかで仮定されたすべての条件は満足される”

λ に関する表記の制限が” のようにして与られたかを説明する。そうすれば $\alpha = \frac{1}{3}$ とする理由も明らかになる。

1° 二つの曲線 $y = \omega_1(x)$, $y = \omega_2(x)$ が接するところに A を定める。接するための条件は、接点の x 座標 M が方程式

$$g(x) \equiv x^{\frac{4}{3}} - (-9\lambda)^{-\frac{2}{3}} + \frac{4}{3} x^{\frac{1}{3}} e^{\alpha x^2} \int_x^{\infty} e^{-\alpha s^2} ds = 0$$

の根となることである。しかるに

$$g'(x) = \left(\frac{8\alpha}{3} x^{\frac{4}{3}} + \frac{4}{9} x^{-\frac{2}{3}} \right) e^{\alpha x^2} \int_x^{\infty} e^{-\alpha s^2} ds > 0$$

であるから、 $g(x)=0$ はただ一つの正根 M を持つ。

$g((-9\lambda)^{-\frac{1}{2}}) > 0$, $g(0) < 0$ であるから、

$$M < (-9\lambda)^{-\frac{1}{2}}.$$

正根を計算することはむづかしいから、 M の下端を求める

ことである。不等式

$$(*) \quad e^{\alpha x^2} \int_x^{\infty} e^{-\alpha s^2} ds \leq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

を利用すれば、 M は

$$h(x) \equiv x^{\frac{4}{3}} - (-9\lambda)^{-\frac{2}{3}} + \frac{2}{3} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} x^{\frac{1}{3}} = 0$$

のただ一つの正根よりも大きいことがわかる。

M が決まれば、 A は自動的に定まる。

2° $\underline{\omega}_1(x) = (-9\lambda)^{\frac{2}{3}} x^{\frac{4}{3}}$ は、 $0 < x < (-9\lambda)^{-\frac{1}{2}}$ において、

したがって $0 < x \leq M + \varepsilon$ において

$$\underline{\omega}_1''(x) > f(x, \underline{\omega}_1(x), \underline{\omega}_1'(x))$$

を満足することは容易に確かめられる。

3° λ が $-0.059 \leq \lambda < 0$ を満たすならば、 $\alpha = \frac{1}{3}$ に

よれば $\underline{\omega}_2(x) = 1 - A \int_x^\infty e^{-\alpha s^2} ds$ は, $M - \varepsilon \leq x < \infty$ において $\underline{\omega}_2''(x) > f(x, \underline{\omega}_2(x), \underline{\omega}_2'(x))$ をみたすことを証明する。

このために $\underline{\omega}_2(x)$ が $\underline{\omega}_2'' > f(x, \underline{\omega}_2, \underline{\omega}_2')$ を満足するための条件を求める。この不等式が成立するのは, x が

$$-2\lambda e^{\alpha x^2} \int_x^\infty e^{-\alpha s^2} ds < x \left\{ 1 - \alpha \left(1 - A \int_x^\infty e^{-\alpha s^2} ds \right)^{\frac{1}{2}} \right\}$$

を満足するときに限ることが、直接計算によってわかる。後者の不等式は十分大きい x に対して成立することは, $\alpha < 1$ なる限り自明である。この範囲を正確に求めることはできないように思われる。そこで前頁の不等式(*)を用いればおおよそわかるように、不等式

$$-\lambda \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \leq \alpha(1-\alpha)$$

を満足する x は上記の不等式をみたす。この範囲をできるだけ広くするために, $0 < \alpha < 1$ なる α を動かしてみれば

$$\alpha = \frac{1}{3} \text{ のとき, 上記の区間は } -\frac{3\sqrt{3}\pi}{2}\lambda \leq \alpha < \infty$$

となってこれが最大区間である。このとき

$$-\frac{3\sqrt{3}\pi}{2}\lambda \leq M$$

となる必要がある。(あるいは十分であると言うほうが適

たかもしれない). この不等式は $f(x)$ が $x = -\frac{3\sqrt{3}\pi}{2}\lambda$ のとき負の値をとれば確かに満足される. かくして λ の範囲は $-0.059 \leq \lambda < 0$, の制限をうける. これは大雑把な λ の範囲であるが,

$g(x)$ が $x = -\frac{3\sqrt{3}\pi}{2}\lambda$ のとき負の値をとるという条件を求めるのは容易でないように思われる. 連続性により

$$\underline{\omega}_2(x) = 1 - A \int_x^\infty e^{-\frac{1}{3}s^2} ds \quad \text{は, } M - \varepsilon \leq x < \infty \quad \text{において}$$

$$\underline{\omega}_2'' > f(x, \underline{\omega}_2, \underline{\omega}_2')$$

を満足する.

4° C, B は \Rightarrow の曲線 $y = C^2 x^{2\sigma}$, $y = 1 - B e^{-\beta x^2}$ が接する σ に定める. その条件は, $C > 0, B > 0, \alpha > 0$ に対し,

$$2\sigma C^2 x^{2\sigma-1} = 2\beta B x e^{-\beta x^2}, \quad C^2 x^{2\sigma} = 1 - B e^{-\beta x^2}$$

が共通根 N を持つことである. これから $B e^{-\beta x^2}$ を消去すれば,

$$f(x) \equiv \beta C^2 x^2 - \beta x^{2-2\sigma} + \sigma C^2 = 0$$

が正根を持つことになる. これは等根を持つ σ に C を定める. そうすれば, 等根 N , 1°より C, B の値は定理の存在に述べられた σ の N になることかわかる. このとき

$$\bar{\omega}_1(N) = \bar{\omega}_2(N), \quad \bar{\omega}_1'(N) = \bar{\omega}_2'(N), \quad \bar{\omega}_1''(N) = \bar{\omega}_2''(N), \quad \bar{\omega}_1'''(N) > \bar{\omega}_2'''(N)$$

となる. 2位の接触をしているが, 最後の不等式は

$$\bar{\omega}_1(x) < \bar{\omega}_2(x), \quad N - \varepsilon \leq x < N; \quad \bar{\omega}_1(x) > \bar{\omega}_2(x), \quad N < x \leq N + \varepsilon$$

となつていふことを示す.

5° $\bar{\omega}_1(x) = C^2 x^{2\sigma}$ は, $0 < x \leq \left\{ \frac{\sigma(1-2\sigma)}{2(\sigma-\lambda)} C \right\}^{\frac{1}{2-\sigma}}$ において, 不等式 $\bar{\omega}_1''(x) < f(x, \bar{\omega}_1(x), \bar{\omega}_1'(x))$ を満たすことができることが直接代入して確かめられる。 C^2 の値はすでに定まっているから, これを代入することにより, かつ

$$\beta \geq \frac{2(\sigma-\lambda)(1-\sigma)^{\frac{1}{2}}}{\sigma(1-2\sigma)} \quad \text{ならば,} \quad \left(\frac{\sigma(1-2\sigma)}{2(\sigma-\lambda)} C \right)^{\frac{1}{2-\sigma}} \geq N = \left(\frac{1-\sigma}{\beta} \right)^{\frac{1}{2}}$$

が成立つことがわかる。 かつ $\bar{\omega}_1(x)$ は, $0 < x \leq N + \varepsilon$ において $\bar{\omega}_1'' < f(x, \bar{\omega}_1, \bar{\omega}_1')$ を満足する。

6° $\bar{\omega}_2(x) = 1 - B e^{-\beta x^2}$ with $B = \sigma e^{1-\sigma}$ は, x が不等式

$$(*) \quad \beta - 2\beta^2 x^2 < \frac{-2\beta x^2 - 2\lambda}{\sqrt{1 - B e^{-\beta x^2}}} \quad \text{or} \quad (**) \quad \frac{1}{2\beta} \frac{\beta \sqrt{1 - B e^{-\beta x^2}} + 2\lambda}{\beta \sqrt{1 - B e^{-\beta x^2}} - 1} < x^2$$

を満足する範囲において, 不等式 $\bar{\omega}_2'' < f(x, \bar{\omega}_2, \bar{\omega}_2')$ を満たすことが, 簡単な計算によってわかる。

不等式(**)の右辺は, x の単調増加関数である。左辺の関数は, 少し計算すればわかるように, $0 < -2\lambda \leq 1$ ならば x の単調減少関数, $-2\lambda > 1$ ならば x の単調増加関数となる。 かつ $0 < -2\lambda \leq 1$ のときは, $x = N$ において不等式(**)が満足されるければ, $N \leq x < \infty$, したがって連続性によって $N - \varepsilon \leq x < \infty$ において(**)は満足されることになる。 したがって $\beta > 2(1-\sigma+\lambda)(1-\sigma)^{-\frac{1}{2}}(1-2\sigma)^{-1}$ ならば

不等式(*) は $x=N$ において成立つ。 λ に関する両側の極定から, $0 < -2\lambda \leq 1$ の場合だけ考えればよいが, ついでに $-2\lambda > 1$ の場合を説明しておく。 B の決め方から

$$1-B = 1 - \sigma e^{1-\sigma} > 1 - \frac{1}{2\sqrt{e}} = 1 - 0.82436 > 0 \quad \text{for } 0 \leq \sigma < \frac{1}{2}$$

であるから, (*) の左辺の関数は $0 \leq x < \infty$ において $\frac{1}{2B}$ より小さい値をとらない。 右辺は, $N \leq x < \infty$ において $\frac{1-\sigma}{\beta}$ より小さい値をとらない。 まづ $1 < 2(1-\sigma)$ ならば (*) は $N \leq x < \infty$ において成立つ。 しかるに $1 > 2\sigma$ であるから たしかに $1 < 2(1-\sigma)$ 。 したがって $-2\lambda > 1$ のときは, β に関する制限なしに不等式(*) は $N-\varepsilon \leq x < \infty$ において満足される。

$$\begin{aligned} 70 \quad & f(x, y, \bar{\Omega}(x, y)) - \bar{\Omega}_x(x, y) - \bar{\Omega}_y(x, y) \bar{\Omega}(x, y) \\ &= -2F y^{\frac{1}{2}} - 4\lambda(1-y) y^{-\frac{1}{2}} - (F^2 - F) y x^{-2} \\ &\equiv \mathcal{F}(x, y) \quad \text{と置く。} \end{aligned}$$

$F > 1$ ならば $\frac{\partial}{\partial y} \mathcal{F}(x, y) < 0$ であるから, $\mathcal{F}(x, y)$ は各 x に対して y の単調減少関数となる。 したがって

$\mathcal{F}(x, \underline{\omega}(x)) < 0$ for $0 < x < \infty$ であることか言えればよい。 この不等式は F を十分大きくとれば満足されることはすぐわかる。 初等的な計算により 定理の左から述べられている 4個の不等式が同時に満足されるように F をとればよいのである。

あとがき

いくつかの問題点を指摘しておこう。

§4 において, $\nu > 1$ のとき $\alpha > 1$ となつておさうであるが, α に関する制限からわかるように, $B \gg 1$ であるから α は十分小さくなる. これは M の値を $B \gg 1$ のとき摂動法によつて求めたからである. M をきめぬ方程式 (4.31) の根をできるだけ正確に計算する方法はないか? $B \gg 1$ の仮定なしに §4 の計算をうまく行う方法はないか? そうすれば α に関する制限はもっとゆるくなる.

§5 において, A の値のとり方を変えることによつて, λ の有効な範囲を もっと広くすることはできないか? $x \rightarrow \infty$ のとき $y-1$ が x のべきの order で小さくなると仮定すれば $y \sim \omega_2(x)$ (\sim は order が同じことを意味する) でなければならぬが, $\omega_2(x)$ のとり方を変えて, せめて 物理実験の結果を保証するだけの λ の有効範囲をえることはできないか? 例えば $0 < -2\lambda \leq 1$ なる λ の値に対して 有効な関数 $\omega_2(x)$ をみつけることはできないか?

§6 において, $g(x) = 0$ の根 M を $0 < \alpha < 1$ なる α の関数として求めることはできないか? もし これかう早くできれば, λ のとりうる範囲が もっと広くなつて

物理実験の結果が保証されるようなことになるかもしれない。
 $\omega_1(x)$, $\omega_2(x)$ を別の関数でおきかえて、 λ の有効な範囲を
 もっと広げることはいけぬか?

すなわち で説明したように 解が存在すれば $\alpha \rightarrow 0$ の
 とき $y(x)/\alpha$ は有限な値をとる。したがって $\overline{\omega}_1(x)$ とし
 て、 $\overline{\omega}_1(x)/\alpha$ が $\alpha \rightarrow 0$ のとき有限な値になるものは
 どれか?

Wasow さんの来日を記念して
 1974年 盛夏