

フォン・カルマンの方程式に在りする
混合型の有限要素法の応用について

熊本大(理) 三好哲考

1. 序

板やシエルの大変形の解析には一般に4階の非線形偏微分方程式を解く必要が生じる。このために変位法の使用には試験関数の構成などめぐりくぐりの問題がある。

ここでは、板の非線形曲げに関連して、いわゆるフォン・カルマン方程式を取り上げて、これを在りしめる種の混合法が適用可能であるということを示す。

2. π -K.方程式とその弱型

フォン・カルマン (π -K.) の方程式は $[f, w] = f_{,11} w_{,22} + f_{,22} w_{,11} - 2f_{,12} w_{,12}$ とすると次の型に表わせる。

$$(2.1) \quad \Delta^2 f = -[w, w]$$

$$(2.2) \quad \Delta^2 w = [f, w] + p$$

我々はこの方程式を境界条件 $f = \frac{df}{dn} = w = \frac{dw}{dn} = 0$ のもとで

解 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ を考えよ. 次の記号を用いる.

Ω ; 板の点の領域 (変型前の)

$W_p^k(\Omega)$; Sobolev 空間. k ; positive integer, $p > 1$

$W_2^0(\Omega)$; Ω に support を持った C^∞ -関数で次のノルムで完備化したもの.

$$\|u\|_k^2 = \sum_{|\alpha|=k} \int |D^\alpha u|^2 dx_1 dx_2$$

$L_2(\Omega)$; 直積空間 $W_2^0 \times L_2 \times L_2 \times L_2$, ノルムは普通のもの.

$H^1(\Omega)$; 直積空間 $W_2^1 \times W_2^1 \times W_2^1 \times W_2^1$, ノルムは普通のもの, i.e.,

$$\|w\|_{H^1}^2 = \|w\|_2^2 + \sum_{i,j} \|w_{ij}\|_2^2 \quad (w = (w, w_{11}, w_{12}, w_{22}))$$

次に, $H \times H$ 上に定義された双一次形式を定義する.

$$\mathcal{L}(w, \bar{w}) = \sum_{i,j} \{ (D_i w, D_i \bar{w}_{ij})_{L_2} + (w_{ij}, \bar{w}_{ij})_{L_2} \} + \sum_{i,j} (D_i w_{ij}, D_j \bar{w}_{ij})_{L_2}$$

ただし, $w = (w, w_{11}, w_{12}, w_{22})$, $\bar{w} = (\bar{w}, \bar{w}_{11}, \bar{w}_{12}, \bar{w}_{22})$, $w_{21} = w_{12}$ etc.

[定義 1] $(F, w) \in H \times H$ が次の方程式を満たすとき, z は

$\forall k$ 方程式の弱解と"す.

$$(2.3) \quad \mathcal{L}(F, z) = (C(w), \phi)_{L_2} \quad \forall z \in H$$

$$(2.4) \quad \mathcal{L}(w, z) + (C(F), \phi)_{L_2} + (P, \phi)_{L_2} = 0 \quad \forall z \in H$$

[定理 1] 任意の p (充分滑か) には " (弱解は常に存在し,

$\partial\Omega$ が充分滑か) であるならば z の解も充分滑かである. ([2], [8])

(2.3), (2.4) の方程式は単独方程式として表わす. "2.

$\mathcal{C}(F, w; z) \equiv (C(F), \phi)_{L_2}$ とおくことができる作用素 \mathcal{C} による.

$$\mathcal{C}(F, w; z) = (\mathcal{C}(F, w), z)_{H^1} \quad \forall z \in H^1$$

と表現されることは Sobolev の埋蔵定理および Riesz の表現定理によりおかしなこと: $U(w, \bar{w}) = (Uw, \bar{w})_{H^1}$, $(p, \phi)_{L_2} = (Bp, \bar{w})_{H^1}$ と表現されることは (2.3), (2.4) はおかしな次のようになる。

(2.5) $Uw = C(w, w)$

(2.6) $Uw + C(F, w) + Bp = 0$

[補題 2] U は $H_{1+\varepsilon} = (W_{1+\varepsilon}^2 \cap W_2^1) \times \{0\} \times \{0\} \times \{0\}$ ($\varepsilon > 0$) の上で invertible 2 次の式が成立する

(2.7) $\|U^{-1}v\|_{L_2} \leq C\|v\|_{L_2} \quad \forall v \in H_{1+\varepsilon}$

したがって 2 次の単独方程式が得られる ($W_{1+\varepsilon}^2 \subset W_2^2$ を使う)。

(2.8) $Uw + C(U^{-1}C(w, w), w) + Bp = 0$.

3. 混合法の導入

Ω_R ($R \rightarrow 0$) は、三角形からなる Ω の部分領域とする。 Ω_R 上の区分的一次の有限要素空間 \hat{S}_2 , $\partial\Omega_R$ で ψ_D と存在する全体の (\hat{S}_2 の部分空間) \hat{S}_0 を表わす。 $\Omega - \Omega_R \cap$ は適宜に拡張する (詳しくは [14] 参照)。 我々が提案する scheme は (2.3) ~ (2.4) の Galerkin 近似のようである。

(3.1) $U(\hat{F}, \hat{w}) = ([\hat{w}, \hat{w}], \phi)_{L_2} \quad \forall \hat{w} \in \hat{H}^1$

(3.2) $U(\hat{w}, \hat{w}) + ([\hat{F}, \hat{w}], \phi)_{L_2} + (p, \phi)_{L_2} = 0 \quad \forall \hat{w} \in \hat{H}^1$

ただし, $\hat{F}, \hat{w} \in \hat{H}^1$. 容易にわかるようにこの方程式を

次の形の単独方程式を表す工作子.

$$(3.3) \quad \hat{L}\hat{w} + PC(\hat{L}^{-1}PC(\hat{w}, \hat{w}), \hat{w}) + PBp = 0$$

ただし, $P: H \rightarrow \hat{H}$ (projection), $\hat{L} = PLP$.

4. 定調和方程式の場合の誤差評価.

分割の規則性を適当に仮定すると (以下への仮定を常に置
く) 次の誤差評価が, 問題

$$(4.1) \quad \Delta^2 w = p \quad w = 0 \text{ on } \partial\Omega = 0$$

の場合に成り立つ.

[定理3]. $w \in H$ は (4.1) の解, $\hat{w} \in \hat{H}$ は (4.1) の近似解とする
と h を最大辺長とすると

$$(4.2) \quad \|w - \hat{w}\|_{L_2} \leq Ch^{\frac{1}{2}} \|p\|_{L_2} \quad \blacksquare$$

5. 標準化方程式 (注4)

(3.3) の解の存在性, 収束性を示すために種々の反復法を
利用する. この節ではこの反復に用いられる標準方程式の可
解性を調べる. (2.8) を次の型に書く.

$$(5.1) \quad w + C(w) + \hat{L}^{-1}Bp = 0$$

ただし, $C(w) = \hat{L}^{-1}C(\hat{L}^{-1}C(w, w), w)$.

$z = w_1 - w_0$ ($w_1 \in H$) とすれば $C(w)$ は "3次多項式" となる.

$$(5.2) \quad C(w_1) - C(w_0) = C'_{(w_0)}(w_1 - w_0) + D(w_0, z)$$

さらに,

$$C'_{(w_0)} z = \mathbb{L}^{-1} C(\mathbb{L}^{-1} C(w_0, w_0), z) + 2 \mathbb{L}^{-1} C(\mathbb{L}^{-1} C(w_0, z), w_0)$$

$$D(w_0, z) = 2 \mathbb{L}^{-1} C(\mathbb{L}^{-1} C(w_0, z), z) + \mathbb{L}^{-1} C(\mathbb{L}^{-1} C(z, z), w_0 + z)$$

(3.2) の離散システムを同様に $\hat{w} + \hat{C}(\hat{w}) + \hat{\mathbb{L}} \hat{B} p = 0$ とすれば,

$$(5.3) \quad \hat{C}(\hat{w}_1) - \hat{C}(\hat{w}_0) = \hat{C}'_{(\hat{w}_0)}(\hat{w}_1 - \hat{w}_0) + \hat{D}(\hat{w}_0, \hat{z}) \text{ etc.}$$

と存す. 以下 \hat{w}_0 は (5.1) の (1) の解 w の補角と考へる.

[補題4] $C'_{(w_0)}, \hat{C}'_{(\hat{w}_0)}$ は \mathbb{L}_2 上で well defined であり,

$\mathbb{L}_2 \wedge$ の作用素とみなして compact である.

以下, 次の方程式

$$(5.4) \quad \hat{K} z = (\mathbb{I} + \hat{C}'_{(\hat{w}_0)}) z = \hat{q} \quad \hat{q} \in \mathbb{L}_2$$

の可解性, 方程式

$$(5.5) \quad \mathbb{K} z = (\mathbb{I} + C'_{(w_0)}) z = 0$$

の trivial 右解しか持たないことを仮定して考へる.

[補題5] $\hat{U} = \hat{\mathbb{L}}^{-1} \hat{B} C(\hat{v}, \hat{w})$, $(\hat{v}, \hat{w} \in H)$ とすれば $0 < \varepsilon < 1$ なる

なる,

$$(1) \quad \|\hat{U}\|_{\mathbb{L}_2} \leq c_\varepsilon \|\hat{v}, \hat{w}\|_{L_{1+\varepsilon}}$$

$$(2) \quad \|\hat{U}\|_{\mathbb{L}_2} \leq c_\varepsilon \|\hat{v}\|_{H^1} \cdot \|\hat{w}\|_{\mathbb{L}_2}$$

$$(3) \quad \|\hat{U}\|_{\mathbb{L}_2} \leq c \|\hat{v}\|_{\max} \|\hat{w}\|_{\mathbb{L}_2} \quad \blacksquare$$

[補題 6] $\hat{v} \in H^1, z \in L_2, 0 < \varepsilon < 1$ のとき

$$\|\hat{v}, z\|_{L^{1+\varepsilon}} \leq C h^{-\frac{2\varepsilon}{1+\varepsilon}} \|\hat{v}\|_{L_2} \|z\|_{L_2} \quad \blacksquare$$

[定理 7] (5.5) の trivial solution u が存在するならば、 h が十分小さいとき $H^* = K^{-1}G$ による u の式が成立する。

$$(5.6) \quad \|KH^* - G\|_{L_2} \leq C_\varepsilon h^{\frac{1}{2} - \frac{2\varepsilon}{1+\varepsilon}} \|G\|_{L_2} \quad \blacksquare$$

[定理 8]. 前定理の仮定のもとで (5.4) は十分小さい h に対して一意可解であり、次の式が成立する。

$$(5.7) \quad \|(I + \hat{C}'(\hat{w}_0))^{-1}\|_{L_2} \leq C < \infty \quad \text{as } h \rightarrow 0.$$

6. 近似解の存在性, 一意性, 収束性.

[補題 9]. $\hat{w}_0 \in H^1$ を正確解, \hat{w}_0 は \hat{w}_0 の補間とする。

$$\|\hat{E}\|_{L_2} \equiv \|\hat{w}_0 + \hat{C}(\hat{w}_0) + \hat{L}^{-1}PBp\|_{L_2} \leq C_\varepsilon h^{\frac{1}{2} - \frac{2\varepsilon}{1+\varepsilon}} \quad (3.0) \quad \blacksquare$$

我々が使う反復法は次の形 \hat{w} の書き換えから始まる。

$$(6.1) \quad \hat{w} = R\hat{w}$$

$\hat{w} \in E'$ として,

$$R\hat{w} = \hat{w}_0 - (I + \hat{C}'(\hat{w}_0))^{-1} (\hat{E} + \hat{D}(\hat{w}_0, \hat{z})) \quad (\hat{z} = \hat{w} - \hat{w}_0).$$

(6.1) は (3.3) 式と全く同じであることに注意。

[定理10] \bar{w}_0 は \mathbb{R}^n 方程式の n の解. \bar{w}_0 はその補角と
 する. \bar{w}_0 はまた (5.5) にあける \mathbb{R}^n の特異に属する
 する. n の n を反復

$$\hat{w}_n = R \hat{w}_{n-1}$$

は contracting である. n を n の球

$$S_\delta = \{ \hat{w} \in \mathbb{R}^n ; \|\hat{w} - \bar{w}_0\|_{L_2} \leq \delta \}$$

n の条件を n の n が存在する.

$$(A) \quad \|\hat{w}_0 - R \hat{w}_0\|_{L_2} \leq \delta \quad \text{かつ} \quad \hat{w}_0 \in S_\delta$$

$$(B) \quad \|R \hat{w}_1 - R \hat{w}_2\|_{L_2} \leq \varepsilon \|\hat{w}_1 - \hat{w}_2\|_{L_2} \quad (0 < \varepsilon < 1)$$

$$(\hat{w}_1, \hat{w}_2 \in S_\delta)$$

$$\varepsilon = \frac{1}{n} \quad (n \geq 11), \quad \delta = R^{\frac{1}{2} - \frac{3}{(n+1)}} \quad \text{とすれば} \quad n \text{ が十分小さい}$$

と n (A), (B) が成立することになる.

[定理11]. n ($n \geq 11$) と整数. $\delta = R^{\frac{1}{2} - \frac{3}{(n+1)}}$ とする. n が
 十分小さいければ方程式 (3.3) は \hat{w}_0 の δ -近傍に n の n の解
 を持つ. n (A), n (B) は \mathbb{R}^n の特異に属する n と反走する.

[注意] 以上の議論及び結果は lumped type の近似スキーム
 に属する (これも全く同様に成り立つ (14) 参照).

1. Agmon, S.: The L_p approach to the Dirichlet problem. Ann. Scuola Normale Pisa 13, 405-448(1959).
2. Berger, M.S.: On von Kármán's equations and the buckling of a thin elastic plate I, Comm.Pure and Appl.Math. 20, 687-720(1967).
3. Berger, M.S. and P.Fife: On von Kármán's equations and the buckling of a thin elastic plate II, Plate with general edge conditions. Comm.Pure and Appl.Math. 21, 227-241(1968).
4. Friedrichs, K.O. and J.J.Stoker: The nonlinear boundary value problem of the buckled plate. Amer.J.Math. 63, 839-888(1941).
5. Johnson, C.: On the convergence of a mixed finite element method for plate bending problems. Numer.Math. 21, 43-62 (1973).
6. Kantorovich, L.V. and G.P.Akilov: Functional analysis in normed spaces: Pergamon press 1964.
7. Keller, H.B. and E.Reiss: Iterative solutions for non-linear bending of circular plates. Comm.Pure and Appl.Math. 11, 273-292(1958).
8. Knightly, G.H.: An existence theorem for the von Kármán equations. Arch.Rational Mech.Anal. 27, 233-242(1967).
9. Krasnosel'skii, M.A. et al.: Approximate solution of operator equations: Wolters-Noordhoff publishing 1972.
10. Miyoshi, T.: A finite element method for the solution of fourth order partial differential equations. Kumamoto J. Sci. (Math.) 9, 87-116(1972).
11. Miyoshi, T.: Finite element method of mixed type and its convergence in linear shell problems. Kumamoto J. Sci. (Math.) 10, 35-58(1973).
12. Morosov, N.: On the non-linear theory of thin plates. Dokl.Akad.Nauk SSSR 114, 968-971(1957).
13. Pian, T.H.H. and P.Tong: Basis of finite element method for solid continua.Int.J.Numerical Methods Eng. 1, 3-28(1969).

14. Miyoshi, T.: A mixed finite element method for the Solutions of the von Kármán Equations. (to appear)