

n次元空間行列式とn次形式の不变式

都立大 理 原 岩 龍二

§1. n次元空間行列の定義

$I(\ell) = \{1, 2, \dots, \ell\}$, $I(\ell_1, \dots, \ell_n) = I(\ell_1) \times \dots \times I(\ell_n)$, K は可換体とするとき, $I = I(\ell_1, \dots, \ell_n) \rightarrow K$ なる写像 A を K 上の(n次元) (ℓ_1, \dots, ℓ_n) 型(空間)行列といふ. これを通常の行列にならして

$$A = (a_{\nu})_{\nu \in I} = (a_{\nu_1, \dots, \nu_n})_{1 \leq \nu_i \leq \ell_i}$$

のように書く. ここに $a_{\nu_1, \dots, \nu_n} = A(\nu_1, \dots, \nu_n) \in K$ である.

今 $\tau \in \mathfrak{S}_n = n$ 次対称群とし, 空間行列 $A = (a_{\nu_1, \dots, \nu_n})$ の τ による転置行列 ${}^{\tau}A$ を次のようく定義する:

$${}^{\tau}A = {}^{\tau}(a_{\nu_1, \dots, \nu_n}) = (a_{\lambda_1, \dots, \lambda_n}), \quad \lambda_i = \nu_{\tau^{-1}(i)} \quad (\text{i.e. } \nu_i = \lambda_{\tau(i)}).$$

例. $A = (a_{ijk}) \in K^{I(2,2,2)}$, $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \in \mathfrak{S}_3$ ならば $i = \nu_1 = \lambda_2$, $j = \nu_2 = \lambda_3$, $k = \nu_3 = \lambda_1$ で ${}^{\tau}A = (a_{kij})$. $A = \begin{pmatrix} a_{111} & a_{121} \\ a_{211} & a_{221} \\ a_{112} & a_{122} \\ a_{212} & a_{222} \end{pmatrix}$ と書けば ${}^{\tau}A = \begin{pmatrix} a_{111} & a_{211} \\ a_{112} & a_{212} \\ a_{121} & a_{221} \\ a_{122} & a_{222} \end{pmatrix}$ である.

$A \in K^{I(\ell_1, \dots, \ell_n)} = K^{I(\ell)^n}$ がすべての $\tau \in \mathfrak{S}_n$ に対して ${}^{\tau}A = A$ であるとき A は対称(symmetric)であるといふ.

§2. 積 * と n 次形式

今、 $A \in K^{I(\ell_1, \dots, \ell_n)}$, $B \in K^{I(\ell_1, \dots, \ell_m)}$, $A = (a_{i_1, \dots, i_n})$, $B = (\beta_{\lambda_1, \dots, \lambda_m})$,

$\ell_1 = \ell'_1$ とする。このとき A, B の積 $C = A * B = (c_{\mu_1, \dots, \mu_{n+m-2}})$
 $\in K^{I(\ell_2, \dots, \ell_n, \ell'_1, \dots, \ell_m)}$ を次で定義する：

$$c_{\mu_1, \dots, \mu_{n+m}} := \sum_{k=1}^{\ell_1} a_{k, \mu_1, \dots, \mu_{n-1}} \beta_{k, \mu_n, \dots, \mu_{n+m-2}}.$$

今 μ_i

$$F(x_1, \dots, x_\ell) = a_{i_1, \dots, i_n} x_{i_1} \cdots x_{i_n} \quad (1 \leq i_1, \dots, i_n \leq \ell)$$

(同じ文字に関する総和記号を省略)

を ℓ 元 n 次形式とする。これに対して

$$A = (a_{i_1, \dots, i_n}) \in K^{I(\ell)^n}, \quad X = (x_j) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_\ell \end{pmatrix} \in K(x_1, \dots, x_\ell)^{I(\ell)}$$

とすれば、

$$F(X) = F(x_1, \dots, x_\ell) = a_{i_1, \dots, i_n} x_{i_1} \cdots x_{i_n}$$

$$(1) \quad = A * \underbrace{X * \cdots * X}_n \quad (\text{演算 } * \text{ は前から順番に } n \text{ 回行なう})$$

となる。 $x_{i_1} \cdots x_{i_n}$ は i_1, \dots, i_n の順番を入れ換えても不变だから

A は対称行列にとることができ、 ℓ 元 n 次形式と $I(\ell)^n$ 型の

対称行列は 1 対 1 に対応する。

一次変換

$$(2) \quad X = SY, \quad S = (s_{ij}) \in K^{I(\ell)^2}, \quad Y = (y_j) \in K(y_1, \dots, y_\ell)^{I(\ell)}$$

が与えられたとき、 $F(x_1, \dots, x_\ell) \equiv y_1, \dots, y_\ell$ の n 次形式として

計算すれば

$$\begin{aligned}
 F(x) &= a_{i_1, \dots, i_n} x_{i_1} \cdots x_{i_n} \\
 &= a_{i_1, \dots, i_n} (s_{i_1 j_1} y_{j_1}) \cdots (s_{i_n j_n} y_{j_n}) \\
 &= a_{i_1, \dots, i_n} s_{i_1 j_1} \cdots s_{i_n j_n} y_{j_1} \cdots y_{j_n} \\
 &= A * S * \cdots * S * Y * \cdots * Y
 \end{aligned}$$

となる。 $A[x]^n = A + \underbrace{x + \cdots + x}_n$ なる記号を使えば

$$(3) \quad F(x) = A[x]^n = A[SY]^n = (A[S]^n)[Y]^n$$

を得る。即ち X に SY を代入すれば、新しい n 次形式に対応する n 次元空間行列 $A[SY]^n$ を得るのである。忽論 A が symmetric ならば $A[S]^n$ も symmetric である。

§3. (空間)行列式

$A = (a_{i_1, \dots, i_n}) \in K^{T^0^n}$, $(\sigma_i, \dots, \tau_n) \in (\gamma_\ell)^n$ とする。同値関係

$(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \sim (\sigma'_1, \dots, \sigma'_n)$ を $\exists \tau \in \gamma_\ell^e \quad (\sigma_1, \dots, \sigma_n) = (\sigma'_1 \tau, \dots, \sigma'_n \tau)$ で定めれば、

これは同値関係になり

$$\begin{aligned}
 (*) \quad (\sigma_1, \dots, \sigma_n) \sim (\sigma'_1, \dots, \sigma'_n) &\Rightarrow \{\sigma_i(k), \dots, \sigma_n(k) \mid k=1, \dots, \ell\} \\
 &= \{\sigma'_i(k), \dots, \sigma'_n(k) \mid k=1, \dots, \ell\}
 \end{aligned}$$

が成立する。 $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ の属す同値類を $[\sigma_1, \dots, \sigma_n]$ で表わすことにする。 $\sigma = [\sigma_1, \dots, \sigma_n] \in (\gamma_\ell)^n / \sim$ と置いて次を定義する：

$$(1) \quad A_\sigma = \prod_{k=1}^{\ell} a_{\sigma_i(k), \dots, \sigma_n(k)}$$

これは (*) で保障されているようだ。 $\sigma = [\sigma_1, \dots, \sigma_n]$ となるよう

$\sigma_1, \dots, \sigma_n$ の取り方によらない。又、

$$(2) \quad \text{sign}_j(\sigma) = \prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ (i \neq j)}} \text{sign } \sigma_i, \quad \sigma = [\sigma_1, \dots, \overset{j}{\check{\sigma}}, \dots, \sigma_n]$$

ここで $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ のとり方を $\sigma_j=1$ となるよう 12 取るのである。

この取り方は unique である。そこで $A \in K^{I(\ell)^n}$ の行列式を次の
よう 12 決める：

$$(3) \quad \det_j A = \sum_{\sigma \in (\mathfrak{A}_n)^n / \sim} \text{sign}_j(\sigma) \cdot A_\sigma$$

$$= \sum_{\substack{\sigma_i \in \mathfrak{A}_n \\ i=1, \dots, n \\ i \neq j}} \prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} \text{sign } \sigma_i \prod_{k=1}^{\ell} a_{\sigma_1(k), \dots, \overset{j}{\check{\sigma}}, \dots, \sigma_n(k)}$$

これを n 次元第 j 行列式と呼ぶことにする。

この第 j 行列式は $\tau \in \mathfrak{A}_n$ による転置に関して

$$(4) \quad \det_j \tau A = \det_{\tau(j)} A$$

なる性質をもつ。

証明。 n 次元空間行列 A は $I(\ell)^n \rightarrow K$ なる写像である。

また $\tau \in \mathfrak{A}_n$ は $\{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ なる写像でこれは

$$I(\ell)^n \ni (v_1, \dots, v_n) \mapsto (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in I(\ell)^n, \quad \lambda_i = v_{\tau^{-1}(i)}$$

なる写像 $\tilde{\tau}$ を誘導する。このとき τA の定義より, $I(\ell)^n \rightarrow K$

なる写像として $\tau A = A \circ \tilde{\tau}$ である。

$$\begin{array}{ccc} I(\ell)^n & \xrightarrow{\tilde{\tau}} & I(\ell)^n \\ & \searrow \Omega & \swarrow A \\ \tau A & & K \end{array}$$

$$\sigma = [\sigma_1, \dots, \sigma_n] \in (\mathbb{Z}_\ell^{\times})^n / \sim$$

とすれば、

$$\begin{aligned} A_\sigma &= \prod_{k=1}^{\ell} A(\sigma_1(k), \dots, \sigma_n(k)) \\ (\tau A)_\sigma &= \prod_{k=1}^{\ell} \tau A(\sigma_1(k), \dots, \sigma_n(k)) \\ &= \prod_{k=1}^{\ell} A \circ \tilde{\tau}(\sigma_1(k), \dots, \sigma_n(k)) \\ &= \prod_{k=1}^{\ell} A(\sigma_{\tau^{-1}(1)}(k), \dots, \sigma_{\tau^{-1}(n)}(k)) \\ &= A_{\tau(\sigma)} \quad \text{ここで } \tau(\sigma) = [\sigma_{\tau^{-1}(1)}, \dots, \sigma_{\tau^{-1}(n)}] \end{aligned}$$

$$\text{今, } \operatorname{sign}_j \sigma = \prod_{i=1}^n \operatorname{sign} \sigma_i, \quad \sigma = [\sigma_1, \dots, \sigma_n], \quad \sigma_j = 1$$

とすれば、 $\tau^{-1}(i) = j$ と $\sigma_{\tau^{-1}(i)} = 1$ となる

$$\tau(\sigma) = [\sigma_{\tau^{-1}(1)}, \dots, \sigma_{\tau^{-1}(n)}]$$

において $\tau(j)$ 番目が 1 である。 (Tz の) で

$$\operatorname{sign}_j \sigma = \operatorname{sign}_{\tau(j)} \tau(\sigma)$$

である。よって

$$\begin{aligned} \det_j(\tau A) &= \sum_{\sigma \in (\mathbb{Z}_\ell^{\times})^n / \sim} \operatorname{sign}_j \sigma \cdot (\tau A)_\sigma \\ &= \sum_{\sigma \in (\mathbb{Z}_\ell^{\times})^n / \sim} \operatorname{sign}_{\tau(j)} \tau(\sigma) \cdot A_{\tau(\sigma)} \\ &= \det_{\tau(j)} A. \quad \text{Q.E.D.} \end{aligned}$$

$A \in K^{I\ell \times I\ell}$ を次のよう書きく：

$$\begin{aligned} A &= (a_{i_1, \dots, i_n}) = (a_{i_1, \dots, \check{i}, \dots, i_n}, \dots; a_{i_1, \dots, \check{j}, \dots, i_n})_m \\ &= (A_1^m, \dots, A_\ell^m)_m. \end{aligned}$$

このとき $A_i^m = (a_{i_1, \dots, i_m, \dots, i_n}) \in K^{I(\ell)^{n-1}}$ は A の第 m 方向への第 i 番目の sheet と呼ぶ。

定理 1. A を $I(\ell)^n$ 型の空間行列, $A_1^m, \dots, A_\ell^m \in A$ の第 m 方向への sheets である。このとき $\sigma \in \mathcal{V}_\ell^n$ に対して

$$(5) \quad \det_j(A_{s(1)}^m, \dots, A_{s(\ell)}^m)_m = \begin{cases} \text{sign } \sigma \cdot \det_j(A_1^m, \dots, A_\ell^m), \\ \quad (j \neq m \text{ または } j = m \text{ で } n \text{ が偶数のとき}) \\ \det_j(A_1^m, \dots, A_\ell^m), \\ \quad (j = m \text{ で } n \text{ が奇数のとき}) \end{cases}$$

が成立する。

証明. $A' = (A_{s(1)}^m, \dots, A_{s(\ell)}^m)_m$ と置けば

$$A'(i_1, \dots, i_n) = A(i_1, \dots, s(i_m), \dots, i_n)$$

である。したがって $\sigma \in (\mathcal{V}_\ell^n)^\sim$ に対して

$$A'_\sigma = \prod_{k=1}^{\ell} A'(\sigma_1(k), \dots, \sigma_n(k)) = \prod_{k=1}^{\ell} A(\sigma_1(k), \dots, s\sigma_m(k), \dots, \sigma_n(k))$$

すなは

$$\det_j A' = \sum_{\substack{\sigma_1, \dots, \sigma_n \in \mathcal{V}_\ell^n \\ \sigma_j = 1}} \prod_{u=1}^n \text{sign } \sigma_u \prod_{k=1}^{\ell} A(\sigma_1(k), \dots, s\sigma_m(k), \dots, \sigma_n(k))$$

である。 $j \neq m$ のとき, $\sigma' = [\sigma_1, \dots, s\sigma_m, \dots, \sigma_n] = [\sigma_1', \dots, \sigma_n']$, $\sigma_j' = 1$

と置けば $\sigma_1' = \sigma_1, \dots, \sigma_m' = s\sigma_m, \dots, \sigma_n' = \sigma_n$ で

$$\prod_{u=1}^n \text{sign } \sigma_u = \text{sign } s \cdot \prod_{u=1}^n \text{sign } \sigma_u'$$

$$\det_j A' = \sum_{\substack{\sigma_1, \dots, \sigma_n \in \mathcal{V}_\ell^n \\ \sigma_j' = 1}} \text{sign } s \cdot \prod_{u=1}^n \text{sign } \sigma_u' \cdot \prod_{k=1}^{\ell} A(\sigma_1(k), \dots, \sigma_n(k))$$

$$= \text{sign} s \cdot \det_j A.$$

$j=m$ のとき, $\sigma' = [\sigma_1, \dots, \check{\sigma}, \dots, \sigma_n] = [\sigma'_1, \dots, \sigma'_n]$, $\sigma'_j = 1$ と置けば

$$\sigma' = \sigma_1 \Delta^{-1}, \dots, \sigma'_j = 1, \dots, \sigma'_n = \sigma_n \Delta^{-1} \quad \text{で}$$

$$\prod_{u=1}^n \text{sign} \sigma_u = (\text{sign} s)^{n-1} \prod_{u=1}^n \text{sign} \sigma'_u,$$

$$\det_j A' = (\text{sign} s)^{n-1} \det_j A.$$

即ち

$$\det_j A' = \begin{cases} \text{sign} s \cdot \det_j A, & j \neq m \text{ のとき} \\ (\text{sign} s)^{n-1} \cdot \det_j A, & j = m \text{ のとき} \end{cases}$$

が示されたのである。Q.E.D.

定理2. 写像 $f: K^{I(\ell)^n} \rightarrow K$ が次の性質(A), (B) をもつとする:

$$(A) \quad A = (A_1^m, \dots, A_\ell^m)_m \in K^{I(\ell)^n} \cong (K^{I(\ell)^{n-1}})^\ell, \quad A_k^m = (a_{i_1, \dots, k, \dots, i_n}) \in K^{I(\ell)^{n-1}}$$

と表わすとき, f は各変数 A_1^m, \dots, A_ℓ^m について線形。これは

任意の m ($1 \leq m \leq n$) に対してである。即ち各方向 m について ℓ 重線形。

(B) $m \neq j$ に対して, A_1^m, \dots, A_ℓ^m の中に等しいものがあれば

$f(A) = f(A_1^m, \dots, A_\ell^m) = 0$. 即ち f は j 以外の方向について交代的(alternating)。

このとき,

$$(C) \quad f(A) = f(E) \cdot \det_j(A), \quad E = (\delta_{i_1, \dots, i_n}), \quad \delta_{i_1, \dots, i_n} = \begin{cases} 1, & (i_1 = \dots = i_n) \\ 0, & (\text{その他}) \end{cases}$$

が成立する。逆に $f(A) = c \cdot \det_j(A)$, $c \in K$ で与えられる写像は

(A), (B) を満足す。

系1. n が偶数のとき, 写像 $\det_j: K^{I(e)} \rightarrow K$ は j ($1 \leq j \leq n$) はようすすべて等しく, n の写像はすべての方向 m ($1 \leq m \leq n$) は対して交代的である.これを \det と書いて $\det A$ を A の行列式と呼ぶこととする.

系2. n が奇数のとき, すべての方向 m ($1 \leq m \leq n$) はつりで多重線形, 交代的であるような写像 $f: K^{I(e)} \rightarrow K$ は $f(A) = 0$ 以外には存在せず, 写像たち \det_j ($1 \leq j \leq n$) はすべて異なる. \det_j は方向 $m \neq j$ はつりでは交代的多重線形, 方向 j はつりでは対称的多重線形である.

系1, 系2 は定理1, 定理2 と $\det_j E = 1$ なることから従う.

定理2 の証明. 定理の前半 ((A), (B) より (C) を導くこと).

$$(6) \quad E_{k_1, \dots, k_{n-1}} = (\varepsilon_{i_1, \dots, i_{n-1}})_{1 \leq i_1, \dots, i_{n-1} \leq \ell}, \quad \varepsilon_{i_1, \dots, i_{n-1}} = \begin{cases} 1, & (i_1 = k_1, \dots, i_{n-1} = k_{n-1}) \\ 0, & \text{その他} \end{cases}$$

と置けば

$$(7) \quad A = \left(\sum_{\substack{k_1, \dots, k_{j-1}, \\ k_{j+1}, \dots, k_n}} a_{k_1, \dots, \overset{j}{\underset{\downarrow}{k}}, \dots, k_n} E_{k_1, \dots, k_{j-1}, k_{j+1}, \dots, k_n}, \dots, \sum_{\substack{k_1, \dots, k_{j-1}, \\ k_{j+1}, \dots, k_n}} a_{k_1, \dots, \overset{j}{\underset{\downarrow}{k}}, \dots, k_n} E_{k_1, \dots, k_{j-1}, k_{j+1}, \dots, k_n} \right)_j$$

j 方向についての多重線形性 (A) より,

$$(8) \quad f(A) = \sum_{\substack{\sigma_1, \dots, \sigma_{j-1}, \\ \sigma_{j+1}, \dots, \sigma_n}} \prod_{k=1}^{\ell} a_{\sigma_1(k), \dots, \overset{j}{\underset{\downarrow}{k}}, \dots, \sigma_n(k)} f(E_{\sigma_1(k), \dots, \sigma_{j-1}(k), \sigma_{j+1}(k), \dots, \sigma_n(k)}, \dots, E_{\sigma_1(\ell), \dots, \overset{j}{\underset{\downarrow}{k}}, \dots, \sigma_n(\ell)})$$

今, $(\varepsilon'_{i_1, \dots, i_n}) = (E_{\sigma_1(k), \dots, \sigma_{j-1}(k), \sigma_{j+1}(k), \dots, \sigma_n(k)})_{j, k=1}^{\ell}$

と置く. ここに右辺は (8) の右辺の f が作用する行列を表わす.

このとき

$$\varepsilon'_{i_1, \dots, i_n} = \begin{cases} 1, & (i_1 = \tau_1(i_j), \dots, i_{j-1} = \tau_{j-1}(i_j), i_{j+1} = \tau_{j+1}(i_j), \dots, i_n = \tau_n(i_j)) \\ 0, & \text{その他} \end{cases}$$

となるから

$$\varepsilon'_{i_1, \dots, i_n} = (\tau_1^{-1}(i_1), \dots, \tau_{j-1}^{-1}(i_{j-1}), i_j, \tau_{j+1}^{-1}(i_{j+1}), \dots, \tau_n^{-1}(i_n))$$

となり、(8)より

$$(9) \quad f(A) = \sum_{\substack{\sigma = [\sigma_1, \dots, \sigma_n] \in (\mathbb{N}_0)^n / \sim \\ \sigma_j = 1}} A_\sigma \cdot f(\varepsilon_{\tau_1^{-1}(i_1), \dots, \tau_n^{-1}(i_n)})$$

が成立する。一方 (A), (B) により各 $m (m \neq j)$ に対して

$$f(A_{\Delta(m)}, \dots, A_{\Delta(\ell)})_m = \text{sign } \sigma \cdot f(A_1^m, \dots, A_\ell^m)$$

即ち

$$(10) \quad f(a_{i_1, \dots, \overset{m}{\circlearrowleft}, \dots, i_n}) = \text{sign } \sigma \cdot f(a_{i_1, \dots, i_n}), \quad m \neq j$$

が成立する。これを (9) の右辺に適用すれば、

$$\begin{aligned} f(A) &= \sum_{\substack{\sigma = [\sigma_1, \dots, \sigma_n] \in (\mathbb{N}_0)^n / \sim \\ \sigma_j = 1}} A_\sigma \prod_{\substack{u=1 \\ u \neq j}}^n \text{sign } \sigma_u \cdot f(\varepsilon_{i_1, \dots, i_n}) \\ &= \det_j A \cdot f(E) \end{aligned}$$

即ち (C) が得られる。

逆に $f(A) = \det_j A$ は \Rightarrow にて (A), (B) が成り立つことと同様によく (B) は定理 1 は既に示されている。 (A) を示す。

$m (1 \leq m \leq n), k (1 \leq k \leq \ell)$ を任意として

$$(a_{i_1, \dots, i_n}) = (A_1^m, \dots, A_k^m, \dots, A_\ell^m)_m = A$$

$$(\beta_{i_1, \dots, i_n}) = (A^m, \dots, B_k^m, \dots, A_\ell^m)_m = B$$

$$(C_{i_1, \dots, i_n}) = (A_1^m, \dots, A_k^m + B_k^m, \dots, A_\ell^m)_m = C$$

と置けば

$$c_{i_1, \dots, i_n} = \begin{cases} a_{i_1, \dots, i_n} + \beta_{i_1, \dots, i_n} & (i_m = k のとき) \\ a_{i_1, \dots, i_n} & (i_m \neq k のとき) \end{cases}$$

である。そこで

$$\begin{aligned} \det_j C &= \sum_{\substack{\sigma_1, \dots, \sigma_n \in \mathfrak{S}_\ell \\ \sigma_j = 1}} \prod_{k=1}^n \text{Sign } \sigma_k \prod_{p=1}^\ell c_{\sigma_1(p), \dots, \sigma_n(p)} \\ &= \sum_{\substack{\sigma_1, \dots, \sigma_n \\ \sigma_j = 1}} \prod_{k=1}^n \text{Sign } \sigma_k \left(\prod_{\substack{1 \leq p \leq \ell \\ \sigma_m(p) \neq k}} a_{\sigma_1(p), \dots, \sigma_n(p)} \right) (a_{\sigma_1 \sigma_m^{-1}(k), \dots, \sigma_n \sigma_m^{-1}(k)} \\ &\quad + \beta_{\sigma_1 \sigma_m^{-1}(k), \dots, \sigma_n \sigma_m^{-1}(k)}) \\ &= \det_j A + \det_j B. \end{aligned}$$

$\det_j (A_1^m, \dots, c A_k^m, \dots, A_\ell^m)_m = \det_j A \cdot c$ は同様である。Q.E.D.

定理3. $A \in K^{I(\ell)^n}, S \in K^{I(\ell)^2}, j = 1, \dots, n-1$ は下記の

$$(1) \quad \det_j (A * S) = \det_{j+1} A \cdot \det S$$

が成立する。

証明. $(a_{i_1, \dots, i_n}) = A$

$$(s_{ij}) = (S_1^2, \dots, S_k^2, \dots, S_\ell^2)_2 = S$$

$$(t_{ij}) = (S_1^2, \dots, T_k^2, \dots, S_\ell^2)_2 = T$$

$$(u_{ij}) = (S_1^2, \dots, S_k^2 + T_k^2, \dots, S_\ell^2)_2 = U$$

と置けば

$$U_{ij} = \begin{cases} S_{ij} + T_{ij}, & j=k のとき \\ S_{ij}, & j \neq k のとき \end{cases}$$

で

$$\sum_{r=1}^{\ell} a_{r,i_1, \dots, i_{n-1}} U_{r,i_n} = \begin{cases} \sum_r a_{r,i_1, \dots, i_{n-1}} (S_{r,i_n} + T_{r,i_n}), & i_n = k のとき \\ \sum_r a_{r,i_1, \dots, i_{n-1}} S_{r,i_n} & \text{otherwise} \end{cases}$$

でから

$$A * U = ((A * S)_1^n, \dots, (A * S)_k^n + (A * T)_k^n, \dots, (A * S)_\ell^n)_n$$

すなはち $T_2 = A * (S_1^2, \dots, c S_k^2, \dots, S_\ell^2)_2 = ((A * S)_1^n, \dots, c(A * S)_k^n, \dots, (A * S)_\ell^n)_n$

が成り立つ、 $S_k^2 = S_k^2$ で $(A * S)_k^n = (A * S)_k^n$ である。

$$(12) \quad f(S) = \det_j (A * S) \quad (j=1, \dots, n-1)$$

と置けば \det_j が第 n 方向に交代的多重線形であることから、

$f(S)$ は S の第 2 方向について交代的多重線形である。

通常の行列の理論により、

$$(13) \quad f(S) = c \cdot \det S$$

ここで c は S に無関係な定数である。 $S = E = (\delta_{ij})$ とす

$$(A * E)(i_1, \dots, i_n) = \sum_{r=1}^{\ell} a_{r,i_1, \dots, i_{n-1}} \delta_{r,i_n} = a_{i_n, i_1, \dots, i_{n-1}}$$

でから $A * E = {}^T A$, ${}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & \cdots & n & 1 \end{pmatrix}$ で

$$(14) \quad f(E) = \det_j {}^T A = \det {}^T A = \det_{j+1} A$$

となり、(13)より $c = \det_{j+1} A$ である。即ち

$$\det_j A * S = \det_{j+1} A \cdot \det S$$

が示され \square . Q.E.D.

ここで $\det_n A * S = \det_n A \cdot \det S$ は成立しないことを注意しておき

$t_2 \dots t_n$ が奇数の場合である。

n が偶数の場合は index j は書く必要がなくて

$$(15) \quad \det(A \cdot S) = \det A \cdot \det S, \quad S \in K^{I(\ell)^2}, \quad A \in K^{I(\ell)^n}$$

が成立する。

A が偶数次形式に対応する対称空間行列のとき

$$(16) \quad \det(A[S]^n) = \det A \cdot (\det S)^n$$

だから $\det A$ はこの n 次形式の重さ n の不变式となる。

また A が奇数次 n の代数形式に 対応する 空間行列のとき、

$$(17) \quad \det \sum_{\tau \in \mathfrak{S}_n} \tau(A \otimes A)$$

はこの n 次形式の重さ $2n$ の不变式を与える。ここは tensor 積

$$A \otimes B, \quad A \in K^{I(\ell)^n}, \quad B \in K^{I(\ell)^m}$$

$$(17) \quad (A \otimes B)(i_1, \dots, i_{n+m}) = A(i_1, \dots, i_n) \cdot B(i_{n+1}, \dots, i_{n+m}) \in K^{I(\ell)^{n+m}}$$

で与えられる。

$$\text{例 1. } f(x, y) = a_0 x^4 + 4a_1 x^3 y + 6a_2 x^2 y^2 + 4a_3 x y^3 + a_4 y^4$$

$$B = \left(\begin{array}{ccc|cc} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_0 \\ \hline a_2 & a_3 & a_4 & a_0 & a_1 \\ a_3 & a_4 & a_0 & a_1 & a_2 \\ a_4 & a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \end{array} \right) \quad f(x, y) = B[x]^4, \quad x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \{1, t\}$$

σ_2	σ_3	σ_4	sign σ	$\epsilon_{1, \sigma_2(1), \sigma_3(1), \sigma_4(1)}$	$\epsilon_{2, \sigma_2(2), \sigma_3(2), \sigma_4(2)}$	$\epsilon_{3, \sigma_2(3), \sigma_3(3), \sigma_4(3)}$	$\epsilon_{4, \sigma_2(4), \sigma_3(4), \sigma_4(4)}$
1	1	1	+1	$\epsilon_{111} = a_0$	$\epsilon_{2222} = a_4$	$a_0 a_4$	+
1	1	t	-1	$\epsilon_{1112} = a_1$	$\epsilon_{2221} = a_3$	$a_1 a_3$	-
1	t	1	-1	$\epsilon_{1121} = a_1$	$\epsilon_{2212} = a_3$	$a_1 a_3$	+
1	t	t	+1	$\epsilon_{1122} = a_2$	$\epsilon_{2211} = a_2$	a_2^2	+
t	1	1	-1	$\epsilon_{1211} = a_1$	$\epsilon_{2122} = a_3$	$a_1 a_3$	+
t	1	t	+1	$\epsilon_{1212} = a_2$	$\epsilon_{2121} = a_2$	a_2^2	+
t	t	1	+1	$\epsilon_{1221} = a_2$	$\epsilon_{2112} = a_2$	a_2^2	+
t	t	t	-1	$\epsilon_{1222} = a_3$	$\epsilon_{2111} = a_1$	$a_1 a_3$	+

$$\det B = a_0 a_4 - 4a_1 a_3 + 3a_2^2 = g_2 \quad (\text{Cayley の不变式})$$

例 2.

$$B = \left(\begin{array}{|cc|cc|cc|} \hline a_0 & a_1 & a_1 & a_2 & a_1 & a_3 \\ \hline a_1 & a_2 & a_2 & a_3 & a_2 & a_4 \\ \hline a_2 & a_3 & a_2 & a_3 & a_3 & a_4 \\ \hline a_3 & a_4 & a_3 & a_4 & a_4 & a_5 \\ \hline a_4 & a_5 & a_4 & a_5 & a_5 & a_6 \\ \hline a_5 & a_6 & a_2 & a_3 & a_2 & a_4 \\ \hline a_6 & a_7 & a_3 & a_4 & a_3 & a_5 \\ \hline a_7 & a_8 & a_3 & a_4 & a_4 & a_5 \\ \hline a_8 & a_9 & a_3 & a_4 & a_4 & a_5 \\ \hline a_9 & a_{10} & a_4 & a_5 & a_4 & a_6 \\ \hline \end{array} \right)$$

$$\det B = a_0 a_6 - 6 a_1 a_5 + 15 a_2 a_4 - 10 a_3^2$$

(2 元 6 次形式の重さの不变式)

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

と置けば

$$A \otimes A = \left(\begin{array}{|cc|cc|cc|} \hline a^2 & ab & ac & b^2 & ab & bc \\ \hline ab & ac & b^2 & bc & b^2 & bc \\ \hline ac & ad & b^2 & bc & bc & c^2 \\ \hline \hline ab & ad & bc & bd & bc & cd \\ \hline ab & b^2 & ac & bc & ac & bc \\ \hline b^2 & bc & ac & c^2 & bc & c^2 \\ \hline bc & bd & bc & cd & bc & cd \\ \hline bc & cd & c^2 & cd & ccd & cd^2 \\ \hline \end{array} \right)^\tau$$

$$\det(A \otimes A) = 0 \text{ であるか}, \quad B = \sum_{\tau \in S_6} \tau(A \otimes A) \text{ と置けば}$$

$$a_0 = 6! a^2, \quad a_1 = 6! ab, \quad a_2 = 6! \cdot \frac{9b^2 + 6ac}{15}, \quad a_3 = 6! \cdot \frac{ad + 9bc}{10},$$

$$a_4 = 6! \cdot \frac{9c^2 + 6bd}{15}, \quad a_5 = 6! \cdot cd, \quad a_6 = 6! \cdot d^2$$

 τ

$$\det B = (6!)^2 \cdot \frac{9}{10} \{ a^2 d^2 - 6abdcd - 3b^2 c^2 + 4b^3 d + 4ac^3 \}$$

$$= (6!)^2 \cdot \frac{9}{10} \left(-\frac{D}{27} \right)$$

$$\tau = 12, \quad D = a^4 \{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3)\}^2, \quad x_1, x_2, x_3 \text{ は } ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

の根。

追記. 筆者は昭和50年の正月ごろ、れん次形式の算術をこうみようと考えて、そのためには最低、上記ほどの準備は必要なものであろうと考へた。これらのこと既に得られていてあることは容易に想像されたが、文献を知らないかたは、自分で考えた方が勉強になると思つた。田村純一君のすすめで、これを当度紹介することになった訳であります。当日、内山三郎先生より文献[1]を教示いただきました。それによれば今回紹介したものとスタイルの差はあるけれど同じ概念のものが書かれている。本文において空間行列なる用語に改めたのは[1]によるものである。本文において

$$\det_j A$$

となる式のものは[1]において

$$\left| \begin{matrix} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} \\ \vdots \\ a_{i_r, \dots, i_n} \end{matrix} \right|, nが奇数のとき$$

$$\left| \begin{matrix} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} \\ \vdots \\ a_{i_r, \dots, i_n} \end{matrix} \right|, nが偶数のとき$$

と同じもので index の上の ±, + は各方向への交代性、対称性を表わしているのである。[1]には $\det_j A$ 以外の行列式も多種載っているが、有用なのは全交代的なる行列式であろう。

また[1]では行列と行列の多種の積と載せてあるが、本文に登場するのは * と \otimes だけである。れん次形式をあつかう上には積はこの2つで足りると思う。これらの意味から、結果として本文は[1]の单纯化、要約になつてゐると思う。勿論一部で

あるが、

また tensor との関連であるが、空間行列は tensor と同じ概念である。算者は concrete な計算式で表現形式は、行列のようには空間行列の方が扱い易いように思う。

[ii] Н. П. Соколов,

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МАТРИЦЫ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ

МОСКВА 1960