

von Neumann algebras の continuous fields について

東北大 教養 武元英夫

M を finite von Neumann algebra, Σ を M の center, Ω を Σ の spectrum space とする。 M から Σ への \sharp -operation \sharp に対して, M のすべての maximal ideals は Ω の元に対応して完全に決定されるることは良く知られている。すなわち, $\omega \in \Omega$ に対して,

$$m_\omega = \{a \in M : (a^*a)^\sharp(\omega) = 0\}$$

は M での maximal ideal であって, M での maximal ideal は上の形で完全に決定される。さらに, maximal ideal m_ω に対して, quotient algebra M/m_ω が finite factor にはることは Sakai [1] によって示されている。maximal ideal による quotient algebra が von Neumann algebra になるということを示した Sakai の結果の拡張として次の Takesaki [3] の定理がある。

定理 1. M が finite von Neumann algebra, Z が M の center, A が Z の von Neumann algebra とする。 A の spectrum space を Ω とおく。 ε を次の性質を満す M から A 上への α -weakly continuous linear mapping とする。

- (i) $\varepsilon(x^*x) = \varepsilon(xx^*) \geq 0$ for $\forall x \in M$, $= 0 \Leftrightarrow x = 0$,
- (ii) $\varepsilon(ax) = a\varepsilon(x)$ for $\forall a \in A$, $\forall x \in M$,
- (iii) $\varepsilon(1) = 1$

各 $\omega \in \Omega$ に対して

$$m_\omega = \{x \in M : \varepsilon(x^*x)(\omega) = 0\}$$

とすると、 m_ω は M で closed two-sided ideal で quotient algebra M/m_ω は finite von Neumann algebra となる。さらには、 M から M/m_ω への canonical homomorphism を π_ω として、 A を含む任意の M の von Neumann subalgebra N に対して $\pi_\omega(N)$ は M/m_ω の von Neumann subalgebra となる。

議論を進める前に、 Z が α -finite のときは上のようなどが存在することを示しておく。このことが本講演では重要な役割を演じている。 M が finite von Neumann algebra であるから定理 1 の (i), (ii), (iii) の性質を満す M から Z への γ -operation が存在している。従って、 Z から A への α -weakly continuous, faithful な norm one の projection の存在について言えれば

より、 Z が“ α -finite”であるので、 φ は Z 上の faithful normal state である。しかも、 φ は $\mathfrak{J} \otimes M$ の cyclic representation を考えることによって、 M は Hilbert space H 上で act していてしかも $\varphi(x) = (x\zeta_0, \zeta_0)$ for $x \in Z$ と ζ_0 は cyclic vector であると見ていいと仮定しても十分である。 H から $[A\zeta_0]$ への projection を e とするとき、 A が abelian von Neumann algebra であるから、 e は A' での abelian projection となる。しかも、 $A' \cap Z' = Z \cap A$ より、 e の A' の central support は 1 である。したがって、 $eA'e$ と A は $*$ -isomorphic である。
 $\theta : eA'e \rightarrow A$, $*$ -isomorphic, $\theta(xe) = x$ for $x \in A$ と見て、 $\varepsilon_Z(x) = \theta(exe)$ for $x \in Z$ とおくと、 ε_Z は ε と一致するものとなつていい。

定理 1 に対応して、von Neumann algebras or continuous fieldsを使った考え方がある。Takemoto and Tomiyama [2] によるとえられた。すなはち、それらは次の様な考え方で進められた。

$M, Z, A, \Omega, \varepsilon$ は全て定理 1 と同じものである。
 $L(M, A)$ は M から A への bounded linear mapping 全体からなる Banach space である。上に与えられた ε は $L(M, A)$

の元となつてゐる。特に, bounded A -module homomorphism となつてゐる。ここで, $a \in M$ に対して $\varepsilon_a(x) \in \varepsilon(ax) = \varepsilon(xa)$ によつて ε_a を定義すると, ε_a は M から A への α -weakly continuous A -module homomorphism となつてゐる。 $\{\varepsilon_a : a \in M\}$ の $L(M, A)$ での closure を V とするとき, 各 $\Phi \in V$ は M から A への α -weakly continuous な A -module homomorphism である。したがつて, 各 $a \in M$ に対して, $L(M, A)$ での linear mapping L_a, R_a と

$$(L_a \Phi)(x) \in \Phi(ax), \quad (R_a \Phi)(x) = \Phi(xa)$$

となつて定めると,

$$L_a V \subset V, \quad R_a V \subset V$$

となつてゐる。ここで, 各 $\omega \in \Omega$ に対して,

$$m_\omega = \{a \in M : \varepsilon(a^*a)(\omega) = 0\}$$

とおくと, m_ω は M での closed ideal となつてゐる。

$$m_\omega = \{a \in M : \Phi(a)(\omega) = 0 \text{ for all } \Phi \in V\}$$

となつてゐる。したがつて,

$$\pi_\omega : M \ni a \mapsto a(\omega) \in M/m_\omega$$

とあると, $\Phi \in V$ に対して, $\Phi(m_\omega) \subset m_\omega \cap A$, $a \in M$ を \rightarrow てくと, $|\Phi(a)(\omega)| \leq \|\Phi\| \cdot \|a(\omega)\|$ となつてゐる。由此から, $\Phi \in V$ に対して

$$\Phi(\omega)(a(\omega)) \in \Phi(a)(\omega)$$

によって $\underline{\varphi}(\omega)$ を定めると、 $\underline{\varphi}(\omega)$ は $M(\omega) = M/m_\omega$ 上の bounded linear functional となつてゐる。

$$V(\omega) \equiv \{ \underline{\varphi}(\omega) : \underline{\varphi} \in V \}$$

は $M(\omega)^*$ での invariant subspace である。さらに、次の性質が示される。

(1) 各 $\underline{\varphi} \in V$ に対して、関数 $\omega \rightarrow \|\underline{\varphi}(\omega)\|$ は Ω 上の連続関数である。

実際、各 $\underline{\varphi} \in V$ に対して M の元 u (unitary element) が存在して、すべての $\omega \in \Omega$ に対して、 $\|\underline{\varphi}(\omega)\| = \underline{\varphi}(u)(\omega)$ となつてゐる。

(2) 各 $\omega \in \Omega$ に対して、 $V(\omega)$ は $M(\omega)^*$ での closed subspace となつてゐる。

実際、 \mathfrak{f} を V から $V(\omega)^\wedge$ の canonical mapping とするとき、 \mathfrak{f} から induce される $V/\ker \mathfrak{f}$ から $V(\omega)^\wedge$ の mapping $\hat{\mathfrak{f}}$ が isometry となつてゐる。

これから、 $V(\omega)$ は $M(\omega)^*$ での closed invariant subspace となつてゐる。したがって、 $V(\omega)^* = M(\omega)^{**}/V(\omega)^\circ$ は $V(\omega)$ を predual space としても von Neumann algebra となつてゐる。したがって、 $M(\omega)^{**}/V(\omega)^\circ$ が $M(\omega)$ と一致することが示される。したがって、 $M(\omega)$ は $V(\omega)$ を predual space として von Neumann algebra

となる。

以上のことから, von Neumann algebras & predual spaces からなる field $\{M(\omega), V(\omega) : \omega \in \Omega\}$ が von Neumann algebra M と α -weakly continuous A -module homomorphisms の set V の pair $\{M, V\}$ から構成される。しかも, 上に示されている様に, $a \in M$, $v \in V$ に対して, $\omega \mapsto \pi(\omega)(a(\omega))$ は Ω 上の連続関数となつてゐる。このことから,

$$\begin{aligned} W(\Omega, M(\omega), V(\omega)) \\ \ni \{a = \{a(\omega)\} : a(\omega) \in M(\omega), \omega \in \Omega, \omega \mapsto \pi(\omega)(a(\omega)) \text{ は連続, } v \in V, \omega \mapsto \|a(\omega)\| \text{ は有界}\} \end{aligned}$$

とおくと, $W(\Omega, M(\omega), V(\omega))$ は M と等距離写像で同型となる。

次に今までの field & subalgebras & restriction について考えよう。

N を M の C^* -subalgebra, $N(\omega) \in \pi_\omega(N)$ とおく。 $v \in V$ に対して $v|N$, $v(\omega)|N(\omega)$ をそれぞれ v , $v(\omega)$ の N , $N(\omega)$ への restriction を表す。

定理1より, N を A を含む M の von Neumann subalgebra とする。そのとき, $N(\omega)$ は $M(\omega)$ の von Neumann subalgebra となつてゐる。これから, 任意の $v \in V$ に対して,

$$\omega \rightarrow \|v(\omega)|N(\omega)\|$$

は Ω 上の連続関数となる。

これは、 M の von Neumann subalgebras に対する性質であるが、これを C^* -subalgebra について考えると次の結果が得られる。

定理2. N は A を含む M の C^* -subalgebra である。このとき、 $w_0 \in \Omega$ に対して、次は同値である。

$$(1) \quad \widetilde{N(w_0)} = \widetilde{N}(w_0)$$

(2) 各 $v \in V$ に対して、関数 $\omega \rightarrow \|v(\omega)|N(\omega)\|$ は点 w_0 で連続である。

ここで \widetilde{N} は N の α -weak closure を表わす。

定理1、定理2 の性質を C^* -subalgebra で考えた場合にはどうなるかということを、具体的なもので考えてみよう。

M は α -finite, finite von Neumann algebra, T を M 上の faithful normal trace とする。

$$\Omega \subset \{\alpha = (a_n) : M \text{ の元からなる bounded sequence}\}$$

$$= l^\infty(N, M)$$

とすると、 Ω は finite von Neumann algebra である、 Ω の center は $\mathcal{A} = l^\infty(N, \mathbb{C})$ を含んでいい。これを用いて、 Ω から \mathcal{A} への mapping Σ を次のように定義する。

$$\varepsilon(a) \in (\tau(a_n)) \quad \text{for } a = (a_n) \in \mathcal{O}$$

そのとき、 ε に対して定理1で(i),(ii),(iii)が満たされる。 \mathbb{N} の Stone-Cech compactification $\beta\mathbb{N}$ とおく。 $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $m_n = \{a = (a_n) : \tau(a_n^* a_n) = 0\} = \{a \in \mathcal{O} : \varepsilon(a)(n) = 0\}$ は \mathcal{O} でclosed idealで \mathcal{O}/m_n は von Neumann algebraである。特に、 $\mathcal{O}/m_n \cong M$ となる。 $w \in \beta\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ に対しては、 $\mathcal{U} = \mathcal{U}(w)$ を w の all neighborhoodsからなる filterとする。それに対して、

$$m_w = \{a = (a_n) \in \mathcal{O} : \lim_{n \rightarrow w} \tau(a_n^* a_n) = 0\}$$

とおく。すると、定理1の結果より、 \mathcal{O}/m_w は finite von Neumann algebraとなる。そこで、 \mathcal{B} を \mathcal{O} での A を含む C^* -subalgebraとする。そのとき、定理2と同様が孤立集合であることから、 $\mathcal{B}(n) = \widehat{\mathcal{B}(n)}$ は成立する。しかし、 $\mathcal{B}(n) = \widehat{\mathcal{B}(n)}$ はかならずしも成立しない。それは、後で述べる系からも簡単にわかる。しかし、 $w \in \beta\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ に対しては、この性質が成立することは次の定理で示される。

定理3. M を α -finite, finite von Neumann algebraとする。 τ を M 上の faithful normal traceとする。 $\mathcal{O} = l^\infty(\mathbb{N}, M)$, $A = l^\infty(\mathbb{N}, \mathbb{C})$ とおく、各 $w \in \beta\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ に対して w のすべての近傍からなる filterを $\mathcal{U} = \mathcal{U}(w)$ とおく。その

とき、

$$m_\omega = \{a = (a_n) \in \mathcal{O}_\mathbb{Z} : \lim_{n \rightarrow \infty} \tau(a_n^* a_n) = 0\}$$

ここで、 \mathcal{O}/m_ω は finite von Neumann algebra となる。 \mathcal{O} から \mathcal{O}/m_ω への canonical homomorphism を π_ω とおく。

\mathcal{A} を含む \mathcal{O} の C^* -subalgebra B に対して、 $(B)_n = \{a_n : a = (a_n) \in B\}$ とおくと $(B)_n$ は M の C^* -algebra であるが、今、 $B = l^\infty(\mathbb{N}, (B)_n) = \{a = (a_n) \in \mathcal{O} : a_n \in (B)_n \text{ for all } n\}$ のとき、 $\pi_\omega(B)$ は \mathcal{O}/m_ω の von Neumann subalgebra となる。

定理3で B を \mathcal{A} を含む C^* -subalgebra としたときは $B = l^\infty(\mathbb{N}, (B)_n)$ となるとは限らない。しかし、各 n に対して、 M での C^* -subalgebra B_n with the identity を与えたとき、 $B = l^\infty(\mathbb{N}, B_n)$ に対して、 $(B)_n = B_n$ である $B = l^\infty(\mathbb{N}, (B)_n)$ が成立している。 B が von Neumann subalgebra のときは、 $B = l^\infty(\mathbb{N}, (B)_n)$ がいつも成立している。

定理3の証明。 B の α -weak closure を \widetilde{B} とかくと定理2と $\{n\}$ が $\beta\mathbb{N}$ での孤立集合であるから、 $(\widetilde{B})_n = \widetilde{(B)_n}$ がすべての $n \in \mathbb{N}$ に対して成立している。しかも、 $B = l^\infty(\mathbb{N}, (B)_n)$ であるから、 $\widetilde{B} = l^\infty(\mathbb{N}, \widetilde{(B)_n})$ が成立する。

したがって、Kaplansky の density theorem によって、任意の $a = (a_n) \in \widehat{\mathcal{B}}$ に対して次の性質を満す sequence $b = (b_n)$ が存在する。

- (i) $b_n \in (\mathcal{B})_n$ for $\forall n$
- (ii) $\tau((a_n - b_n)^*(a_n - b_n)) < \frac{1}{n}$
- (iii) $\|b_n\| \leq \|a_n\|$ for $\forall n$

そのとき、 $a = (a_n)$ は bounded sequence であるから $b = (b_n)$ も bounded sequence である。しかも、(i) と $\mathcal{B} = \ell^\infty(\mathbb{N}, (\mathcal{B})_n)$ より $b = (b_n) \in \mathcal{B}$ となつていい。 (iii) から

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tau((a_n - b_n)^*(a_n - b_n)) = 0$$

であるから $\pi_\omega(a) = \pi_\omega(b)$ となつていい。

ゆえに、 $\pi_\omega(\widehat{\mathcal{B}}) = \pi_\omega(\mathcal{B})$ であつて、定理 1 から $\pi_\omega(\widehat{\mathcal{B}})$ は \mathcal{O}/m_ω の von Neumann subalgebra であるから、 $\pi_\omega(\mathcal{B})$ が \mathcal{O}/m_ω の von Neumann subalgebra となつていい。

系. A は Hilbert space H 上に act して $\|\cdot\|$ は C^* -algebra with the identity である。 A の weak closure $\widehat{A} = M$ が σ -finite, finite von Neumann algebra となつてとする。そのとき、 M に a faithful normal trace をとおして、定理 3 と同様く、
 $m_n = \{a = (a_n) \in \mathcal{O} : \tau(a_n^* a_n) = 0\}$,

$$m_\omega = \{a = (a_n) \in \mathcal{O} : \lim_{n \rightarrow \infty} \tau(a_n^* a_n) = 0\}$$

を定める。ただし、 $\mathcal{O} = \ell^\infty(\mathbb{N}, A)$ とする。そのとき、各

n に対して τ , $\sigma/m_n \cong A$, $\omega \in \beta\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ に対して τ は σ/m_ω は von Neumann algebra となる。

[1] S. Sakai : Yale University, Lecture Note, 1962.

[2] H. Takemoto and J. Tomiyama ; Tôhoku Math. Journ., 25
(1973), 273-289.

[3] M. Takesaki ; Pacific Journ. Math., 36(1971), 827-831.