

境界条件を持つ確率微分方程式の解の  
一意性について

京大理 志賀 徳造  
神大理 中尾慎太郎

§ 0. Introduction

最近 *markov-process* の境界問題の定式化として二つの方法が示された。D. W. Stroock and S. R. S. Varadhan [8] による *submartingale problem* による定式化と、S. Watanabe [9], [10] による境界条件を持つ確率微分方程式による定式化である。[8] では Lipschitz 連続な *oblique derivative* を境界条件に持つ *non-degenerate* な連続係数の *diffusion process* を取り扱っている。[9], [10] では係数がすべて Lipschitz 連続な場合を取り扱っている。N. E. Karou [3] は *submartingale problem* と境界条件を持つ確率微分方程式の同値性を議論している。

ここでは境界条件が *uniformly elliptic* な 2 階微分作用素で、*infinitesimal generator* も *uniformly elliptic* である場合に境界条件を持つ確率微分方程式について一意性が成り立つことを述べる。

§ 1. 解の存在について

$n \geq 2$ ,  $\bar{D} = \{x \in \mathbb{R}^n; x^1 \geq 0\}$ ,  $D = \{x \in \mathbb{R}^n; x^1 > 0\}$ ,  $\partial D = \{x \in \mathbb{R}^n; x^1 = 0\}$ ,  
 $x \in \mathbb{R}^n$  に対して,  $\tilde{x} = (0, x^2, \dots, x^n)$  とする。

non-sticky case ( $f \equiv 0$ ) の境界条件を持つ確率微分方程式  
 とは

$$(1.1) \quad \begin{cases} dx_t^1 = \sigma^1(t, x_t) dB_t + b^1(t, x_t) dt + dY_t \\ dx_t^i = \sigma^i(t, x_t) dB_t + b^i(t, x_t) dt + \tau^i(t, \tilde{x}_t) dM_t \\ \quad + \beta^i(t, \tilde{x}_t) dY_t \quad i=2, \dots, n \end{cases}$$

である。

sticky case ( $f \neq 0$ ) の境界条件を持つ確率微分方程式とは

$$(1.2) \quad \begin{cases} dx_t^1 = \sigma^1(t, x_t) I_D(x_t) dB_t + b^1(t, x_t) I_D(x_t) dt + dY_t \\ dx_t^i = \sigma^i(t, x_t) I_D(x_t) dB_t + b^i(t, x_t) I_D(x_t) dt \\ \quad + \tau^i(t, \tilde{x}_t) dM_t + \beta^i(t, \tilde{x}_t) dY_t \quad i=2, \dots, n \\ I_{\partial D}(x_t) dt = f(t, \tilde{x}_t) dY_t \end{cases}$$

である。

記号は [6] と同じで、解の定義については [6], [9], [10] を参照のこと。解の存在について [6] に次の結果がある。

Theorem 1.1.  $\sigma(t, x)$ ,  $b(t, x)$ ,  $\tau(t, x)$ ,  $\beta(t, x)$  が有界連続な  
 ならば, (1.1) の解が存在する。

Theorem 1.2.

(i)  $\nabla(x)$ ,  $b(x)$ ,  $\tau(x)$ ,  $\beta(x)$  が有界連続、 $f(x)$  が有界ボレル可測とする。もし  $|\nabla'(x)| = \left(\sum_{j=1}^n \nabla_j'(x)^2\right)^{1/2} > 0$  for all  $x \in \bar{D}$  ならば、(1.2) の解が存在する。

(ii)  $\nabla(t,x)$ ,  $b(t,x)$ ,  $\tau(t,x)$ ,  $\beta(t,x)$ ,  $f(t,x)$  が有界連続とする。もし  $|\nabla'(t,x)| = \left(\sum_{j=1}^n \nabla_j'(t,x)^2\right)^{1/2} > 0$  for all  $(t,x) \in [0,\infty) \times \bar{D}$  ならば、(1.2) の解が存在する。

明らかに drift の変換により、 $\nabla(x)$  が uniformly elliptic ならば  $b(x)$  は有界ボレル可測に、 $\tau(x)$  が uniformly elliptic ならば  $\beta(x)$  は有界ボレル可測に出来る。

## §2. 解の一意性について

解の一意性の定義は [9], [10] を参照のこと。即ち、分布の意味での一意性である。

## Condition (C-I)

$\nabla(t,x)$  と  $\tau(t,x)$  は有界連続で、uniformly elliptic である。

即ち

$$(i) \quad M_1 |\xi|^2 \leq \sum_{i,j=1}^n [\nabla \nabla^*]_{ij}(t,x) \xi_i \xi_j \leq M_2 |\xi|^2 \quad \text{for } \xi \in \mathbb{R}^n$$

$$(ii) \quad M_1 |\xi|^2 \leq \sum_{i,j=2}^n [\tau \tau^*]_{ij}(t,x) \xi_i \xi_j \leq M_2 |\xi|^2 \quad \text{for } \xi \in \mathbb{R}^{n-1}$$

をみたす正定数  $M_1, M_2$  が存在する。

Theorem A. もし  $\sigma$  と  $\tau$  が time independent で (C-I) をみたし、 $b$  と  $\beta$  が time independent で有界ボレル可測ならば、(1.1) の解について一意性が成り立つ。

Theorem B. もし  $\sigma$  と  $\tau$  が time independent で (C-I) をみたし、 $b, \beta, \rho$  が time independent で有界ボレル可測ならば、(1.2) の解について一意性が成り立つ。

証明の概略について述べる。  $M_2 > 1, 1 > M_1 > 0$  に対して  $\Pi \mathcal{C}[M_1, M_2]$  を  $(n, n)$ -matrix  $(\sigma_{ij}^n)_{i,j=1}^n$  で次の条件をみたすもの全体とする。

$$(i) \quad \sigma_{11}^n = 1, \quad \sigma_{ij}^n = 0 \quad (j \neq 1)$$

$$(ii) \quad M_1 |\xi|^2 \leq \langle [\sigma \sigma^*] \xi, \xi \rangle \leq M_2 |\xi|^2 \quad \text{for } \xi \in \mathbb{R}^n$$

$\tilde{\Pi} \mathcal{C}[M_1, M_2]$  を  $(n-1, n-1)$ -matrix  $(\tau_{ij}^n)_{i,j=2}^n$  で次の条件をみたすもの全体とする。

$$(iii) \quad M_1 |\xi|^2 \leq \langle [\tau \tau^*] \xi, \xi \rangle \leq M_2 |\xi|^2 \quad \text{for } \xi \in \mathbb{R}^{n-1}$$

今後  $p > n+2$  とする。  $\sigma \in \Pi \mathcal{C}[M_1, M_2], \tau \in \tilde{\Pi} \mathcal{C}[M_1, M_2]$

に対して、  $H^{[\sigma]} \in D_t + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n [\sigma \sigma^*]_{ij} D_{i,j}$  に対応する space time harmonic extension operator,  $V_{\lambda}^{[\sigma, \tau]} \in D_t +$

$\frac{1}{2} \sum_{i,j=2}^n [\tau \tau^*]_{ij} D_{ij} + D_t H^{[\tau]}$  に対応する resolvent operator とする。特に、 $\tau$  と  $\tau^*$  が単位行列の時  $H^{(0)}$ ,  $V_\lambda^{(0)}$  と表わすこととする。  $\|\cdot\|_p$  を  $[0, \infty) \times \bar{D}$  上の  $L^p$ -norm,  $\|\cdot\|_{np}$  を  $[0, \infty) \times \bar{D}$  上の  $L^p$ -norm とする。

Theorem 2.1.  $\{V_\lambda^{[\tau, \tau^*]}\}$  は  $L^p([0, \infty) \times \bar{D})$  上の resolvent operator  $\tau$

$$(2.1) \quad \|D_t V_\lambda^{[\tau, \tau^*]} f\|_{np} \leq C_1 \|f\|_{np}$$

$$(2.2) \quad \sum_{i,j=2}^n \|D_{ij} V_\lambda^{[\tau, \tau^*]} f\|_{np} \leq C_1 \|f\|_{np}$$

$$(2.3) \quad \sup_{(t,x) \in [0, \infty) \times \bar{D}} |V_\lambda^{[\tau, \tau^*]} f(t,x)| \leq C_1 \|f\|_{np}$$

for  $\lambda \geq 1$ ,  $\tau \in \mathcal{M}[M_1, M_2]$ ,  $\tau^* \in \tilde{\mathcal{M}}[M_1, M_2]$

$$(2.4) \quad \sum_{i,j=1}^n \|D_{ij} H^{(0)} V_\lambda^{(0)} f\|_p \leq C_1 \|f\|_{np} \quad \text{for } \lambda \geq 1$$

をみたす定数  $C_1 > 0$  が存在する。

$\tau \in \mathcal{M}[M_1, M_2]$ ,  $0 < T < \infty$  とする。  $f \in C_0^\infty([0, T) \times \bar{D})$  に

対して

$$\begin{cases} -(D_t + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n [\tau \tau^*]_{ij} D_{ij}) u = f \\ u|_{\partial D} = 0 \end{cases}$$

をみたす解が一意的に  $C_0^\infty([0, T) \times \bar{D})$  上に存在して、これを  $G_0^{[\tau]} f$  とする。特に  $\tau$  が単位行列の時、 $G_0^{(0)} f$  とする。

Theorem 2.2.  $0 < T < \infty$  に対して

$$(2.5) \quad \sup_{(t,x) \in [0,\infty) \times \mathbb{R}^n} |G_0^{[\Gamma]} f(t,x)| \leq C_2(T) \|f\|_{p,T}$$

$$(2.6) \quad \sup_{(t,x) \in [0,\infty) \times \mathbb{R}^n} |D_i G_0^{[\Gamma]} f(t,x)| \leq C_2(T) \|f\|_{p,T}$$

$$(2.7) \quad \sum_{i,j=1}^n \|D_{i,j} G_0^{(0)} f\|_{p,T} \leq C_2(T) \|f\|_{p,T}$$

$$\text{for } \lambda \geq 1, \quad \Gamma \in \Pi[\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2]$$

をみたす定数  $C_2(T) > 0$  が存在する。但し、 $\|\cdot\|_{p,T}$  は  $[0,T] \times \mathbb{R}^n$  上の  $L^p$ -norm である。

$$P(t,y) = \mathbb{I}_{\{t \geq 0\}} \frac{1}{(2\pi t)^{n/2}} e^{-\frac{|y|^2}{2t}}$$

$[0,\infty) \times \mathbb{R}^n$  上の関数  $f$  に対して、 $f^*$  を

$$f^*(t, -x^1, x^2, \dots, x^n) = -f(t, x^1, \dots, x^n) \quad x^1 \geq 0$$

なる  $[0,\infty) \times \mathbb{R}^n$  上の拡張とする。

$$G_0 f(t,x) = \int_{-\infty}^{\infty} ds \int_{\mathbb{R}^n} dy P(s-t, x-y) f^*(s,y)$$

$$\varepsilon_{i,j}(t,x) = [\Gamma \Gamma^*]_{i,j}(t,x) - \delta_{i,j}, \quad \tilde{\varepsilon}_{i,j}(t,x) = [\tilde{\Gamma} \tilde{\Gamma}^*]_{i,j}(t,x) - \delta_{i,j}$$

$$A = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n [\Gamma \Gamma^*]_{i,j}(t,x) D_{i,j}$$

$$T_\varepsilon = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \varepsilon_{i,j}(t,x) D_{i,j} G_0$$

$$D_\varepsilon = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \tilde{\varepsilon}_{i,j}(t,x) D_{i,j}$$

$$H_A = H^{(0)} + G_0 (I - T_\varepsilon)^{-1} D_\varepsilon H^{(0)}$$

$$L = D_t + \frac{1}{2} \sum_{i,j=2}^n [\tau \tau^*]_{ij}(t,x) D_{i_j} + D_1 H_A$$

$$L^{(0)} = D_t + \frac{1}{2} \sum_{i,j=2}^n \varepsilon_{ij} D_{i_j} + D_1 H^{(0)}$$

とした時、次の定理が成り立つ。

Theorem 2.3.  $\sup_{(t,x) \in [0, \infty) \times \mathbb{D}} \sum_{i,j=1}^n |\varepsilon_{ij}(t,x)| < \varepsilon_1$  かつ  
 $\sup_{(t,x) \in [0, \infty) \times \mathbb{D}} \sum_{i,j=2}^n |\tilde{\varepsilon}_{ij}(t,x)| < \varepsilon_1$  ならば

$$V_\lambda^{-1}[\tau(t,x), \tau(t,x)] = (\lambda - L^{(0)})^{-1} [I + (L^{(0)} - L)(\lambda - L^{(0)})^{-1}]^{-1}$$

が  $L^1([0, \infty) \times \mathbb{D})$  上の resolvent operator として定義可能である定数  $\varepsilon_1 > 0$  が存在する。更にこの時

$$(2.8) \quad \sup_{(t,x) \in [0, \infty) \times \mathbb{D}} |V_\lambda^{-1}[\tau(t,x), \tau(t,x)] f(t,x)| \leq C_3 \|f\|_{\infty} \quad \text{for } \lambda \geq 1$$

をみたす定数  $C_3 > 0$  が存在する。但し、 $\varepsilon_1, C_3$  は  $M_1, M_2$  にしか depend しない。

Condition (C-II)

(i)  $\tau(t,x), \tau(t,x)$  は (C-I) を満たす。

(ii)  $\varepsilon < \varepsilon_1$ ,  $\varepsilon C_1 < 1$ ,  $\varepsilon C_2(T_0) < 1$  である  $\varepsilon > 0$ ,  $T_0 > 0$  が存在して  $\tau_1^1(t,x) \equiv 1$ ,  $\tau_1^i(t,x) \equiv 0$  ( $i \neq 1$ ) が

$$\sigma_{ij}^{\lambda}(t, x) = \bar{\Delta}_{ij} \quad \text{for } t \geq T_0, \quad \tau_{ij}^{\lambda}(t, x) = \bar{\Delta}_{ij} \quad \text{for } t \geq T_0,$$

$$\sum_{i,j=1}^n |[\sigma \sigma^*]_{ij}(t, x) - \bar{\Delta}_{ij}| < \varepsilon, \quad \sum_{i,j=2}^n |[\tau \tau^*]_{ij}(t, x) - \bar{\Delta}_{ij}| < \varepsilon$$

$$(iii) \quad b(t, x) = \beta(t, x) = 0 \quad \text{and} \quad \rho(t, x) \equiv 1.$$

(C-II) を満たす  $(\sigma, b, \tau, \beta, \rho)$  について証明が出来れば、Brownian motion の変換、drift の変換、time change 等により、Theorem A. と Theorem B. の証明は終わる。従って今後は  $(\sigma, b, \tau, \beta, \rho)$  は (C-II) を満たし、二の場合の Theorem B. の証明を行う。

$$M_{\lambda}[R] = E \left[ \int_0^{\infty} e^{-\lambda \varphi_t} h(t, \tilde{x}_t) d\varphi_t \right]$$

$$V_{\lambda, T}[N] = E \left[ \int_0^T e^{-\lambda \varphi_t} I_{(0, \infty)}(x_t) u(t, x_t) dt \right]$$

と示す。

Theorem 2.4. 係数が (C-II) を満たせば

$$(2.9) \quad |M_{\lambda}[R]| \leq C_4 \|R\|_{\infty} \quad \text{for } \lambda \geq 1, \quad R \in L^{\infty}(\bar{D}, \mathbb{N}) \times \mathbb{D}$$

を満たす定数  $C_4 > 0$  が存在する。

(Proof) 証明中  $\lambda \geq 1$  とする。  $m \in \mathbb{N}$  かつ  $\lambda \geq 1$

$$\pi_m(s) = \begin{cases} \frac{k}{m} & \text{for } \frac{k}{m} \leq s < \frac{k+1}{m} \quad k=0, 1, \dots, m-1 \\ m & \text{for } s \geq m^2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} x_t^{(m),1} = x_t^1 \\ x_t^{(m),i} = x_0^i + \int_0^t I_{(0,\omega)}(x_s^1) \Gamma^i(\pi_{\pi_m(s)}, x_{\pi_m(s)}) dB_s \\ \quad + \int_0^t \tau^i(\pi_{\pi_m(s)}, \tilde{x}_{\pi_m(s)}) dM_s \end{cases}$$

とある。明かに

$$\int_0^t I_{\gamma_0^1}(x_s^{(m),1}) ds = \gamma_0^1$$

をみたす。任意の  $\varepsilon > 0$ ,  $t > 0$  に対し

$$(2.10) \quad \lim_{m \rightarrow \infty} P \left\{ \max_{0 \leq s \leq t} |x_s^{(m)} - x_s| > \varepsilon \right\} = 0$$

である。  $m \in \mathbb{N}$ ,  $T > 0$  に対し

$$M_\lambda^{(m)}[R] = E \left[ \int_0^T e^{-\lambda \varphi_t} R(t, \tilde{x}_t^{(m)}) d\varphi_t \right]$$

$$V_{\lambda,T}^{(m)}[U] = E \left[ \int_0^T e^{-\lambda \varphi_t} I_{(0,\omega)}(x_t^1) U(t, x_t^{(m)}) dt \right]$$

とある。 Theorem 2.1, Theorem 2.2 と regular conditional probability を考えることにより

$$|M_\lambda^{(m)}[R]| \leq C_m \|R\|_{P,T}$$

$$|V_{\lambda,T}^{(m)}[U]| \leq B_{m,T} \|U\|_{P,T}$$

をみたす  $m$  に対し  $C_m$  と、  $m$  と  $T$  に対し  $B_{m,T}$  が存在する。  $\|M_\lambda^{(m)}\|_T$  ( $\|V_{\lambda,T}^{(m)}\|$ ) は  $L^1([0,T] \times \partial D)$  ( $L^1([0,T] \times \bar{D})$ ) 上の functional norm とある。  $H^{(0)} V_\lambda^{(0)} R$  ( $R \in C_0^W([0,T] \times \partial D)$ ) に対し Itô's

formula を適用する = 2.1 5)

$$H^{(10)} V_{\lambda}^{-1(10)} h(0, x_0)$$

$$= -\frac{1}{2} E \left[ \int_0^T e^{-\lambda \varphi_s} \sum_{i,j=2}^n \tilde{\varepsilon}_{ij} (\pi_m(s), \tilde{x}_{\pi_m(s)}) D_{ij} V_{\lambda}^{-1(10)} h(s, \tilde{x}_s^{(m)}) d\varphi_s \right]$$

$$+ E \left[ \int_0^T e^{-\lambda \varphi_s} h(s, \tilde{x}_s^{(m)}) d\varphi_s \right]$$

$$- \frac{1}{2} E \left[ \int_0^T e^{-\lambda \varphi_s} I_{(0, \infty)}(x_s^1) \sum_{i,j=1}^n \varepsilon_{ij} (\pi_m(s), x_{\pi_m(s)}) D_{ij} H^{(10)} V_{\lambda}^{-1(10)} h(s, x_s^{(m)}) ds \right]$$

を得る。Theorem 2.1 により次の不等式

$$(2.11) \quad \| M_{\lambda}^{(m)} \|_T \leq \frac{\varepsilon}{2} C_1 \| M_{\lambda}^{(m)} \|_T + \frac{\varepsilon}{2} C_1 \| V_{\lambda, T}^{(m)} \| + C_1$$

を得る。\$G\_0^{(10)} f\$ (\$f \in C\_0^{\infty}(\bar{D}\_0 \times \bar{D})\$) により Itô's formula を適用する = 2.1 5)

$$G_0^{(10)} f(0, x_0)$$

$$= E \left[ \int_0^T e^{-\lambda \varphi_s} I_{(0, \infty)}(x_s^1) f(s, x_s^{(m)}) ds \right]$$

$$- \frac{1}{2} E \left[ \int_0^T e^{-\lambda \varphi_s} I_{(0, \infty)}(x_s^1) \sum_{i,j=1}^n \varepsilon_{ij} (\pi_m(s), x_{\pi_m(s)}) D_{ij} G_0^{(10)} f(s, x_s^{(m)}) ds \right]$$

$$- E \left[ \int_0^T e^{-\lambda \varphi_s} D_1 G_0^{(10)} f(s, \tilde{x}_s^{(m)}) d\varphi_s \right]$$

を得る。Theorem 2.2 により

$$(2.12) \quad \| V_{\lambda, T}^{(m)} \| \leq \frac{\varepsilon}{2} C_2(T) \| V_{\lambda, T}^{(m)} \| + 2C_2(T)$$

を得る。(C-II), (2.11), (2.12) より

$$\| V_{\lambda, T_0}^{(m)} \| \leq 4C_2(T_0)$$

$$(2.13) \quad \|M_\lambda^{(m)}\|_{T_0} \leq 6C_1$$

である。又 (C-II) より

$$|E[\int_{T_0}^{\infty} e^{-\lambda \varphi_s} R(s, \tilde{x}_s^{(m)}) d\varphi_s]| \leq C_5 \|R\|_{\infty P}$$

をみたす定数  $C_5 > 0$  が存在するので、(2.13) とあわせることにより

$$\|M_\lambda^{(m)}\| \leq 6C_1 + C_5$$

である。これと (2.10) により (2.9) を得る。

A. E. D.

Theorem 2.5. 係数が (C-II) をみたせば

$$M_\lambda[R] = V_\lambda^{[\tau(t,x), \tau(t,x)]} R \quad \text{for } \lambda \geq 1$$

である。

(Proof) Theorem 2.3 と Theorem 2.4 より明らかである。

Theorem 2.5 により、係数が (C-II) をみたせば境界上の process の分布の意味の一意性がいえるので、全体の process の一意性が従う。

Remark. この unique solution は  $\bar{D}$  上の diffusion で

$$A = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n [\sigma^* J_{ij}(x) D_{ij} + \sum_{i=1}^n b^i(x) D_{ii}]$$

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n [\tau \tau^*]_{ij}(x) D_{ij} + \sum_{i=1}^n \beta^i(x) D_i + D_0$$

とすると、粗く言えば、この diffusion の infinitesimal generator は、 $Lf = P \cdot Af$  on  $\mathcal{D}$  で特徴づけられる domain を持つ微分作用素  $A$  である。

### References

- [1] K. Ito, Canonical measurable random functions, Proc. International Conference on Functional Analysis and Related Topics, Univ. Tokyo Press (1970), 369-377.
- [2] K. Ito and H. P. McKean, Jr., Diffusion processes and their sample paths, Springer-verlag (1965).
- [3] N. E. Karoui, Diffusions avec condition frontière associées à un opérateur elliptique dégénéré, C. R. Acad. Sc. t. 273 (1971), 311-314.
- [4] H. Kunita and S. Watanabe, On square integrable martingales, Nagoya Math. J. Vol. 30 (1967), 209-245.
- [5] O. A. Ladyzhenskaya, V. A. Solonnikov and N. N. Uralkova, Linear and quasi-linear equations with parabolic type, A. M. S. Transl. of Math. Monograph No. 23 (1968).
- [6] S. Nakao, On the existence of solutions of stochastic

- differential equations with boundary conditions, (to appear).
- [7] D. W. Stroock and S. R. S. Varadhan, Diffusion processes with continuous coefficients I, II, *Comm. Pure Appl. Math.* Vol. 22 (1969), 345-400 & 479-530.
- [8] D. W. Stroock and S. R. S. Varadhan, Diffusion processes with boundary conditions, *Comm. Pure Appl. Math.* Vol. 24 (1971), 147-225.
- [9] S. Watanabe, On stochastic differential equations for multi-dimensional diffusion processes with boundary conditions, *J. Math. of Kyoto Univ.* Vol. 11 (1971), 169-180.
- [10] S. Watanabe, On stochastic differential equations for multi-dimensional diffusion processes with boundary conditions II, (to appear).