

Orbit-preserving transformation groups for a flow

序言

小和田 正 (津田塾大)

与えられた可測な flow  $T$  に対して  $T$  の orbits を保つ  $\Omega$  上の bimeasurable な変換の全体  $G$  を導入しその構造と  $T$  の性質との関係を調らべるのがこの講演の目的である。

いくつかの点で flow  $T$  の性質は  $G$  とかわりともよとか、具体的な flow を調らべるには遭遇するのであるが、この話では、flow のエルゴード性、スペクトル型、エントロピー、及び flow の time change の問題と  $G$  の関係が論ぜられる。

$G$  は変換の普通の積について群をなしているが、以下の議論では群構造をくわしく調らべることはなされていない。むしろ どの元を含むかとか どの部分群を含むかといった程度<sup>で</sup>しか言らされていない。一つの原因は、 $G$  に flow  $T$  の性質を調らべるのに望ましい topology が入るのか不明な事である。 $\Omega$  に topology が入っていて、それについて連続な  $G$  の変換に制限した群を考えれば充分なのかも知れないが今の段階ではそういう設定をする事は出来なかった。たとえば flow  $T$  を time change してえられる flow がもとの flow  $T$  と同型か という問題で 同型写像の連続性がどの程度期待出来るかということなどにかかわるのである。

$G$  の導入の動機のもう一つとして、E. Hopf 以来 Ya. G. Sinai, Anosov 等とよこつかわれて来た transverse fields の概念がある

。その特別な場合として与えられた flow  $J = (\Omega, \mathcal{B}, P, T_t)$  にお  
 おし flow  $Z = (\Omega, \mathcal{B}, P, Z_t)$  が交換関係  $T_t Z_s \omega = Z_{t+s} T_t \omega$   
 が成立するとき  $Z$  を  $J$  の transversal flow という。  $Z$  達の性  
 質から flow  $J$  の性質を明らかにしようというのが彼等の考  
 え方であるが、我々は transversal commutation を相対的なもの  
 と認識する <sup>立場</sup> にとり、  $Z$  を調らへるのに交換関係  
 をみたく変換群  $\{T_t\}$  を含むより広い群  $G$  を導入するものであ  
 る。したがって彼等の立場に相対的な立場にたっている。

一般にエルゴード理論に於いては、一つの自己同型に対す  
 る研究手段に比べて flow に対する研究手段は少ないように  
 思われるが、我々の方法がどの程度 flow の研究に役立つ  
 のかは今後の研究 <sup>を</sup> またねはならない。

### §1 定義

$(\Omega, \mathcal{B}, P)$  を standard space,  $P$  を確率測度とする。空間  
 $(\Omega, \mathcal{B}, P)$  上の自己同型の群  $\{T_t\}$  が  $(\mathcal{B})$  可測、又は単に  
 可測 flow であるとは、

$$\{(t, \omega) \mid T_t \omega \in E \in \mathcal{B}_\Omega\} \in \mathcal{B}_R \times \mathcal{B}_\Omega \quad \text{for } \forall E \in \mathcal{B}_\Omega$$

が成立することである。ここで  $\mathcal{B}_R$  は実直線  $R$  上の topological  
 Borel field である。以下で単に flow という時は可測な  
 flow を意味するものとする。

定義 1.1  $O_\omega$  と是  $\omega \in \Omega$  の flow  $J$  に関する orbit, 即ち  $O_\omega = \{T_t \omega; -\infty < t < \infty\}$  とする。  $\sigma$  を orbit を得る  $\Omega$  上の両可測な変換;  $\sigma O_\omega = O_\gamma$ ,  $\omega, \gamma \in \Omega$ , とするとか  $G$  の全体は普通の変換の積に関して群になる。変換  $\sigma \in G$  は orbit-preserving であるという。特に  $\sigma O_\omega = O_\omega$

をみたす  $\sigma$  の全体  $G_0$  は  $G$  の部分群をなしているが変換  $\sigma \in G_0$  は strictly orbit-preserving であるという。記号  $C$  で、全ての  $T_t$  ( $-\infty < t < \infty$ ) と交換可能な両可測変換を表わすことにする。明らかに  $C$  は  $G$  の部分群になっている。更に  $\mathcal{O}$  及び  $\mathcal{O}_0$  を  $\Omega$  上の automorphisms 全体と  $G$  及び  $G_0$  との共通集合とする。  $\mathcal{O}$  及び  $\mathcal{O}_0$  はそれぞれ  $G$  及び  $G_0$  の部分群をなしている。

上に定義した変換群達は次の意味で flow  $J$  の invariant になっている。即ち flow  $J^\circ = (\Omega^\circ, \mathcal{B}^\circ, P^\circ, T_t^\circ)$  が flow  $J$  と同型 ( $\theta T_t^\circ \theta^{-1} = T_t$ ) になっているれば,  $\theta G^\circ \theta^{-1} = G$ ,  $\theta G_0^\circ \theta^{-1} = G_0$ , 等々である。

## § 2. flow の時間変更と群 $G$

群  $G$  は以下に述べる意味で flow の時間変更 (time change)

と密接な関係をもっている。

定義 2.1 関数  $\tau = \tau(t, \omega) ; \mathbb{R} \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  が次の三条件をみたす時 flow  $J$  の time change function と呼ぶ。

- (1)  $\tau(t, \omega)$  は a.e  $\omega$  に対して finite valued  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  の 1対1 の写像である。
- (2)  $\tau(t+s, \omega) = \tau(t, \omega) + \tau(s, T_{\tau(t, \omega)} \omega)$  a.e  $\omega$
- (3)  $\tau(0, \omega) = 0$  a.e  $\omega$ .

$J$  の time change function の全体を  $\mathcal{F}$  と書くことにする。

特に  $\tau$  が  $B$ -可測 のとき measurable time change function と云う。

変換  $\sigma \in G$  は次の式

$$\sigma T_t \sigma^{-1} \omega = T_{\tau_\sigma(t, \omega)} \omega$$

で関数  $\tau_\sigma(t, \omega)$  を定義する。

Prop. 2.1 1)  $\tau_\sigma = \tau_\sigma(t, \omega)$  は flow  $J$  の time change function である。

$$2) \tau_{\sigma_1 \sigma_2}(t, \omega) = \tau_{\sigma_1}(\tau_{\sigma_2}(t, \sigma_1^{-1} \omega), \omega) \quad \text{a.e } \omega$$

を得る。このようにして我々は写像:  $\sigma \rightarrow \tau_\sigma (G \rightarrow \mathcal{F})$  を得る。更に  $S_t \equiv \sigma T_t \sigma^{-1}$ ,  $Q(E) \equiv P(\sigma^{-1} E)$  とおくことにより 新しい flow  $S^\sigma = (\Omega, B, Q, S_t)$  がつくられるが明らかに  $S^\sigma$  は  $J$  に同型な可測な flow である。

$\mathcal{F}(G) = \{T_\sigma \in \mathcal{F}; \sigma \in G\}$  とおく。もし  $\sigma_1, \sigma_2^{-1} \in \mathcal{C}$  ならば  $\sigma_1 \sim \sigma_2$  とかくことにすれば、 $\sim$  は同値関係であることは容易にわかる。今  $\sigma_1 \sim \sigma_2$  とすれば

$$\begin{aligned} T_{T_{\sigma_1}(t, \omega)} \omega &= \sigma_1 T_t \sigma_1^{-1} \omega = \sigma_2 \sigma_2^{-1} \sigma_1 T_t \sigma_1^{-1} \omega \\ &= \sigma_2 T_t \sigma_2^{-1} \sigma_1 \sigma_1^{-1} \omega = \sigma_2 T_t \sigma_2^{-1} \omega = T_{T_{\sigma_2}(t, \omega)} \omega \end{aligned}$$

従って  $T_{\sigma_1}(t, \omega) = T_{\sigma_2}(t, \omega)$  a.e.  $\omega$  となる。この事

から quotient group  $G/\sim$  から  $\mathcal{F}(G)$  への写像

$$[\sigma] \rightarrow T_\sigma \in \mathcal{F}(G) \quad ([\sigma] \text{ は } \sigma \text{ を代表元とする}$$

class)

は bijection であることがわかる。

time change function  $\tau \in \mathcal{F}$  が measurable ならば

$$S_t \omega \equiv T_{\tau(t, \omega)} \omega$$

により  $S_t$  を定義すると後述するよりに (定理 3.3),  $\{S_t\}$

は time measurable ~~function~~ <sup>transformations</sup> の 1-parameter group になるが

$\tau \in \mathcal{F}(G)$  になる為の条件は不明である。以上をまとめて

命題 群  $G/\sim$  の元は flow  $J$  の time changed flow

$S^{[\sigma]}$  を取りおとし  $S^{[\sigma]}$  は  $J$  に同型になる。又 写像

$G/\sim \ni [\sigma] \rightarrow T_\sigma \in \mathcal{F}(G)$  は bijection になっている。

問題は  $\mathcal{F}(G)$  の  $\mathcal{F}$  の中での characterization である。

§ 3 コホモロジー  $H^1(J, R)$  と time change function

この節では flow  $J$  の time change function の class を characterize する為には コホモロジー  $H^1(J, R)$  を導入する。  
便宜上 一般の力学系の コホモロジー を定義しておく。

$(X, B, \mu)$  を測度空間,  $\mathcal{G}$  を  $X$  上の両可測変換で  $\mu(E) = 0$  の時は  $\mu(gE) = 0$ ,  $E \in B$ ,  $g \in \mathcal{G}$  をみたすもの群とする。又  $\Sigma$  を可変群とする。  $\mathcal{G} \times X$  から  $\Sigma$  への写像  $\varphi$  が

$$\varphi(g_2 g_1, \omega) = \varphi(g_1, \omega) \varphi(g_2, g_1 \omega)$$

をみたすとき,  $\varphi$  を 力学系  $(X, B, \mu, \mathcal{G})$  の群  $\Sigma$  に同する コサイクルと呼ぶ。この時コサイクルの全体を記号  $\tilde{H}^1(\mathcal{G}, \Sigma)$  で表わす。コサイクル  $\varphi$  及び  $\psi \in \tilde{H}^1(\mathcal{G}, \Sigma)$  が コバングリー  $h$  に関して互いにホモトープであるとは

$$\varphi(g, \omega) h(\omega) = \psi(g, \omega) h(g\omega)$$

をみたす  $X$  上の関数  $h = h(\omega)$  が存在する事を云う。

明らかに ホモトープの関係は 同値関係である。コサイクルのこの関係による同値類のなす群を  $\mathcal{G}$  の  $\Sigma$  に同する コホモロジーと呼び  $H^1(\mathcal{G}, \Sigma)$  で表わす。

特に flow  $J = (\Omega, B_\Omega, P, T_t)$  に対して群  $\{T_t\}$  の実加法群  $R$  に同する コホモロジー  $H^1(J, R)$  を考えよう。

time change function  $\tau \in \mathcal{F}$  に対して、時間変換についての  
の逆関数  $\varphi$  を

$$\varphi(u, \omega) = t \quad \text{if } \tau(t, \omega) = u$$

で定義する。容易に

補題 3.1  $\varphi$  は次の条件をみたす

- $\varphi = \varphi(u, \omega)$  は  $u$  について  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  の 1対1の上への  
写像である (a.e.  $\omega$ )。
- $\varphi(u+v, \omega) = \varphi(u, \omega) + \varphi(v, T_u \omega) \quad \text{a.e. } \omega$
- $\varphi(0, \omega) = 0 \quad \text{a.e. } \omega$

を得る。  $\varphi$  を  $\tau$  に対応する (flow  $J$  の) additive functional  
と呼ぶ。つまり, additive functional とは  $H^1(J, \mathbb{R})$  の  
コサイクルである。特に  $\mathcal{F}(G)$  に対応する additive fcl. に  
ついて次の事がわかる。

補題 3.2  $\tau_\sigma \in \mathcal{F}(G)$  及び  $\tau_{\sigma^{-1}}$  に対応する add. fcl.  $\varphi_{\sigma^{-1}}$

$$\tau_\sigma(t, \sigma\omega) = \varphi_{\sigma^{-1}}(t, \omega) \quad \text{a.e. } \omega$$

が成立する。

上の補題から  $\tau_\sigma$  は  $\varphi_{\sigma^{-1}}$  が可測の時且つその時に限り可  
測になることがわかる。二つのコサイクル  $\varphi$  及び  $\varphi'$  が互い  
にホロモーグになるための十分条件を与えよう。

定理 3.1 共に可測なコサイクル  $\varphi$  と  $\psi$  が 条件

$$\lim_{S \rightarrow \infty} \frac{1}{S} \int_0^S [\varphi(t, \omega) - \psi(t, \omega)] dt < \infty \quad \text{a.e. } \omega$$

を満たすならば  $\varphi$  と  $\psi$  は互いに  $\mathbb{E} \circ \tau$ -グラフである。

証明  $\tilde{h}(\omega) \equiv \lim_{S \rightarrow \infty} \frac{1}{S} \int_0^S [\varphi(t, \omega) - \psi(t, \omega)] dt$

$$B = \{\omega \mid \tilde{h}(\omega) < \infty\}$$

とすれば  $T_+ B \subset B$  である

$$\tilde{h}(T_+ \omega) = \lim_{S \rightarrow \infty} \frac{1}{S} \int_0^S [\varphi(s, T_+ \omega) - \psi(s, T_+ \omega)] ds$$

$$= \lim_{S \rightarrow \infty} \frac{1}{S} \int_0^S [\varphi(t+s, \omega) - \varphi(t, \omega) - \psi(t+s, \omega) + \psi(t, \omega)] ds$$

$$= \tilde{h}(\omega) - \varphi(t, \omega) + \psi(t, \omega)$$

$\mathcal{P}(B) = 1$  ならば  $h$  を  $\tilde{h}$  の  $1$ - $\tau$  の measurable version とすれば

$$\varphi(t, \omega) + h(T_+ \omega) = \psi(t, \omega) + h(\omega) \quad \text{a.e. } \omega$$

次に

定理 3.2 flow  $T$  は ergodic であるとする。共に可測な

コサイクル  $\varphi$  と  $\psi$  が 可積分なコバンダリー  $h$  に関して  $\mathbb{E} \circ \tau$ -

グラフならば

$$\lim_{S \rightarrow \infty} \frac{1}{S} \int_0^S [\varphi(s, \omega) - \psi(s, \omega)] ds < \infty \quad \text{a.e. } \omega$$

証明 
$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} \frac{1}{\beta} \int_0^\beta [\varphi - \psi] d\omega = \lim_{\beta \rightarrow \infty} \frac{1}{\beta} \int_0^\beta [h(T_\beta \omega) - h(\omega)] d\omega$$

$$= \int_\Omega h(\omega) d\mu - h(\omega)$$

以下では物特に  $\mathcal{F}(G_s)$  に関する time change function の characterization について述べる。

$\Omega$  上の実可測関数  $f = f(\omega)$  が条件

(C)  $F_\omega(t) = f(T_t \omega) - f(\omega) + t$  が  $t \geq 0$  について  $\mathbb{R}$  から  $\mathbb{R}$  への 1対1 なる関数

をみたすとき  $f$  は admissible であると言ふ。

$f$  を admissible function とし

$$\sigma \omega = T_{f(\omega)} \omega, \quad \omega \in \Omega$$

によって  $\Omega$  上の変換  $\sigma$  を定義する。

定理 3.3  $f$  を admissible function とし,  $\Omega$  上の変換  $\sigma$  を

$$\sigma \omega = T_{f(\omega)} \omega, \quad \omega \in \Omega$$

によって定義すると  $\sigma$  は strictly orbit-preserving transf. on  $\Omega$  である, 即ち  $\sigma \in G_s$ .

証明  $\mathcal{J}^* = (\Omega^*, \mathcal{B}_{\Omega^*}, P^*, T_t^*)$  を  $\mathcal{J}$  の  $S$ -表現とする。又  $\theta$  をその天井関数 ~~とす~~,  $G(p, t) = t$  及び

$F(p,t) = \Theta(p)$  とおく。但し  $p$  は basic space  $\Omega^0$  の  $\bar{x}$   $\theta$  は ceiling function とする。basic automorphism は  $Tz$  表わす。

$$M^* = \{ (p,t) \mid p \in M, M \subset \Omega^0 \} \text{ 又 } \omega - M^*(a,b) =$$

$$\{ (p,t) \mid a \leq G(p,t) < b \} \cap M^* \text{ とおく。又}$$

$$W_m = \{ (p,x) \in \Omega^* \mid \sum_{k=0}^{m-1} \theta(T^k p) \leq f(p,x) + b < \sum_{k=0}^m \theta(T^k p) \}$$

$$W_0 = \{ (p,x) \in \Omega^* \mid a + f(p,x) \leq G(p,x) < f(p,x) + b < \theta(p) \}$$

( $m \geq 1$ )

と (特に  $M \in \Omega^0$  の measurable set,  $TM = N$  とおく。

$\sigma$  が fimeasurable を言うには  $M^*(a,b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (M(a,b) \cap W_n)$

だから たとえば  $\sigma(M^*(a,b) \cap W_1)$  が  $\Omega^0$  の Borel set なる

ことを云えば ~~十分~~ 十分である。(  $\Omega^0$  on standard space

だから  $\Omega^0$  に Borel structure が入り  $T$  は ~~可測~~ 可測にとり

$M^*(a,b)$  なる可測の Borel sets  $\sigma$  Borel field は生成される。

$f(p,x)$  は  $\Omega$  上の admissible function  $f$  を  $\Omega^*$  にうつしかえ

たものである) しかるに

$$\sigma(M^*(a,b) \cap W_1) = (M^* \cap W_0) \cup$$

$$\cup \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \bigcup_{k=0}^{\infty} M^* \cap [k2^{-n} \leq b + f(p,x) - \theta(T^k p) < (k+1)2^{-n}] \cap [k2^{-n} + a - b \leq G(p,x) < (k+1)2^{-n}] \right\}$$

よ)  $\sigma(M(a,b) \cap M_1)$  は  $B$ -可測である。  $M^*(a,b) \cap W_m$

に7いて ~~同様~~ 同様である。又  $\sigma$  の可測性についてを類似に考えらるから省略する。

以下では  $\sigma$  が |対| 可測性を言う。

$\sigma\omega = \sigma\zeta$ ,  $\omega, \zeta \in \Omega$  とする. 即ち  $T_{f(\omega), \omega} = T_{f(\zeta), \zeta}$  である。

$t \equiv f(\omega) - f(\zeta)$  とおけば,  $\zeta = T_t\omega$  だから

$$\sigma\zeta = \sigma T_t\omega = T_{f(T_t\omega) + t}\omega = \sigma\omega = T_{f(\omega), \omega}$$

従って  $f(T_t\omega) - f(\omega) + t = 0$ , 故に  $t = 0$  即ち  $\zeta = \omega$ .

任意の  $\zeta \in \Omega$  に対し 元  $\omega \in \Omega_\zeta$  と 時間  $t \in \mathbb{R}$  をえらんで

$\zeta = T_t\omega$  と表わす.  $t \equiv \zeta - f(T_t\omega)$  とおきように  $t$  を

$$\zeta = T_{f(T_t\omega) + t}\omega = T_{f(T_t\omega)}T_t\omega = \sigma T_t\omega$$

即ち  $\sigma$  は onto mapping である. 以上のことから  $\sigma \in G_d$  が云えた。

$\sigma \in G_d$  を与えれば  $\sigma\omega = T_t\omega$  とする時間  $t$  が存在するがこれを  $f_\sigma(\omega)$  と表わす. 同様  $F_\omega(t) \equiv f_\sigma(T_t\omega) - f_\sigma(\omega) + t$  は明らかに 1対1である.  $f_\sigma$  の可測性は不明である。

命題 3.1 time change function  $\tau_\sigma \in \mathcal{F}(G_d)$  は次の形を (とれる);  $\tau_\sigma(t, \omega) = f_\sigma(T_t\omega) - f_\sigma(\omega) + t$  a.e.  $\omega$ .

普通の時間を  $\varphi_0$  と表わす, 即ち  $\varphi_0(t, \omega) = t$ ,  $\forall \omega \in \Omega$ .

当然  $\varphi_0$  は  $\tilde{H}^1(\mathbb{T}, \mathbb{R})$  の元である. これを用いて time change function  $\tau$  が  $G_d$  の元から induce される為の十分条件を与える。

定理 33  $\varphi$  を  $\tau \in \mathcal{F}$  に対応する additive fcl. とする。  
もし  $\varphi$  が  $\varphi_0$  に admissible なコバウシタリ— に因りてホエ  
ロ—グなら  $\tau$  は  $G_s$  の元から induce される 即ち  $\tau \in \mathcal{F}(G_s)$   
である。

証明.  $\varphi(t, \omega) = f(T_t \omega) - f(\omega) + \varphi_0(t, \omega)$  とする。  $f$  が  
admissible だから 前の結果から  $\sigma \in G_s$  が存在して  $f = f_\sigma$ 。  
又  $\sigma$  に対応する time change function を  $\tau_\sigma$  とすると  
 $\varphi(t, \omega) = \tau_\sigma(t, \sigma\omega) = \varphi_{\sigma^{-1}}(t, \omega)$  a.e.  $\omega$  である。 故に  
 $\tau(t, \omega) = \tau_{\sigma^{-1}}(t, \omega)$  を得る。

以上から

定理 34 time change function  $\tau$  に対応する  $\varphi$  が  
可測で且つ

$$\lim_{S \rightarrow \infty} \frac{1}{S} \int_0^S [\varphi(t, \omega) - t] dt < \infty \quad \text{a.e. } \omega$$

ならば  $\tau$  は  $G_s$  の元から induce されて、  $\tau$  に基る  
time changed flow は flow  $J$  に metrically isomorphic  
になる。

こゝ迄の議論を A. Kolmogorov と I. Arnold が研究した  
ト—ラス上の flow の time change の問題へ応用してみよ  
う。

$M_2$  を 2次元トーラス,  $\mathcal{B}$  を topological Borel field,  $dx dy$  を normalized Lebesgue measure,  $T_t$  を 微分方程式

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 1 \\ \frac{dy}{dt} = \gamma \quad (\gamma \text{ is irrational number}) \end{cases}$$

により定義される変換群とし flow  $J = (M_2, \mathcal{B}, dx dy, T_t)$

と与える。又  $K(x, y)$  を  $\mathbb{R}^2$  上の周期1の関数で

$0 < K(x, y) \in C^{(k)} \quad (k \geq 3)$  と仮定する。

$$\int_0^1 \int_0^1 K(x, y) dx dy = 1$$

additive fth  $\varphi = \varphi(t, x, y)$ ;  $\varphi(t, x, y) = \int_0^t K(x+s, y+rs) ds$  を考えよ。 time changed flow  $S = (M_2, \mathcal{B}, Q, S_t)$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{1}{K(x, y)}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{\gamma}{K(x, y)} \\ dQ(x, y) = K(x, y) dx dy \end{cases}$$

に対し「flow  $J$  と  $S$  は同型か」というのが我々の問題である。それに対して次の結果を得る。

定理 3.5  $\gamma$  に対して  $H, L > 0$  が存在して

$$|m + n\gamma| > \frac{L}{(|m| + |n|)^H}, \quad 0 < H < k-2$$

がすべての整数  $m, n$  について成立するものとする。この時

flow  $J$  と flow  $S$  は測度論的に同型である。

証明  $K(x, y) = \sum_{m, n} C_{m, n} e^{2\pi i(m x + n y)}$  を  $K(x, y)$  の Fourier 展開とする

$$\varphi(t, x, y) = t + \sum_{(m, n) \neq (0, 0)} C_{m, n} \frac{e^{2\pi i(m+nr)t} - 1}{2\pi i(m+nr)} e^{2\pi i(m x + n y)}$$

より

$$\lim_{S \rightarrow \infty} \frac{1}{S} \int_0^S [\varphi - t] dt = \sum \frac{C_{m, n}}{2\pi i(m+nr)} e^{2\pi i(m x + n y)}$$

を得る。右辺が絶対収束することを示そう。

$K(x, y)$  を偏微分する 2 次元 Fourier 係数  $C_{m, n}$  の増加式が次のように得られる。

$$2^{k-1} \pi^k (|m| + |n|)^k |C_{m, n}| \leq \text{Max} \left\{ \text{Max} \frac{\partial^k K}{\partial x^k}, \text{Max} \frac{\partial^k K}{\partial y^k} \right\}$$

$$\therefore \frac{|C_{m, n}|}{2\pi(|m+n|)} \leq \frac{M}{2^k \pi^{k+1} L (|m| + |n|)^{k-H}} \equiv M$$

$N(j)$  を  $|m| + |n| = j$  とする格子点  $(m, n)$  の個数とすれば

$$N(j) \leq 2^2(j+1) \leq 2^3 j$$

(だから)

$$\begin{aligned} \frac{M}{2^k \pi^{k+1} L} \sum (|m| + |n|)^{H-k} &\leq \frac{M}{2^k \pi^{k+1} L} \sum_{j=1}^{\infty} (N(j) j)^{H-k} \\ &\leq \frac{M}{2^k \pi^{k+1} L} 2^3 \sum j^{H-k+1} \end{aligned}$$

$H < k-2$  より右辺は収束する。よって定理より  $J$  は  $S^1$  同型であることが結論される。

§4 コサイクル  $f_J$  in  $H^1(G_d, R)$ 

この節では flow  $J$  によって決まる 群  $G_d$  の コサイクル  $f_J$  を考察する。元  $\sigma \in G_d$  に対し  $f_\sigma = f_\sigma(\omega)$ ,  $\sigma\omega = T_{f_\sigma(\omega)}\omega$  が対応する 2 点を省きみたか  $\{f_\sigma; \sigma \in G_d\}$  は次の性質をみたすことが容易にわかる。

$$\text{補題 4.1 } f_{\sigma_2\sigma_1}(\omega) = f_{\sigma_1}(\omega) + f_{\sigma_2}(\sigma_1\omega) \quad \text{a.e } \omega$$

$G_d \times \Omega$  から  $R$  への mapping  $f_J$

$$f_J(\sigma, \omega) \equiv f_\sigma(\omega)$$

を定義すれば上の補題から  $f_J \in \tilde{H}^1(G_d, R)$  である。  $\tau_\theta \in \mathcal{F}(G_d)$  に対し,  $G_d \times \Omega \rightarrow R$  なる mapping  $\tau_\theta \circ f_J$  を

$$(\tau_\theta \circ f_J)(\sigma, \omega) = \tau_\theta(f_J(\sigma, \omega), \omega)$$

を定義すると

補題 4.2  $\tau_\theta \circ f_J$  は  $f_J$  に ホモロークな  $\tilde{H}^1(G_d, R)$  の コサイクルである。

$$\begin{aligned} \text{証明。 } \tau_\theta \circ f_J(\sigma_2\sigma_1, \omega) &= \tau_\theta(f_J(\sigma_2\sigma_1, \omega)) \\ &= \tau_\theta(f_J(\sigma_1, \omega), \omega) + \tau_\theta(f_J(\sigma_2, \sigma_1\omega), T_{f_J(\sigma_1, \omega)}\omega) \\ &= (\tau_\theta \circ f_J)(\sigma_1, \omega) + (\tau_\theta \circ f_J)(\sigma_2, \sigma_1\omega) \end{aligned}$$

$$\text{又 } \tau_\theta(t, \omega) = f_\theta(T_t\omega) + f_\theta(\omega) + t \quad \text{に於いて } t \equiv f_J(\sigma, \omega)$$

$$\begin{aligned} \text{とおくことに依り } \tau_\theta \circ f_J(\sigma, \omega) &= f_\theta(T_{f_J(\sigma, \omega)}\omega) - f_\theta(\omega) + f_J(\sigma, \omega) \\ &= f_\theta(\sigma\omega) - f_\theta(\omega) + f_J(\sigma, \omega) \end{aligned}$$

もし  $T_0 \circ f_J$  は エバントリ  $f_0$  に関して  $f_J$  に ホモロークである。

逆に

補題 4.3 エバントリ  $g = g(\sigma, \omega) \in \tilde{H}^1(G, \mathbb{R})$  が admissible エバントリ  $h = h(\omega)$  に関して エバントリ  $f_J$  に ホモロークならば  $G$  の元  $\theta$  が存在して  $T_\theta \circ f_J = g$  a.e.  $\omega$

証明  $\theta \omega \equiv T_{h(\omega)} \omega, \omega \in \Omega$  で  $\theta$  を定義する。  $\theta \in G$  である。  $T_\theta(t, \omega) = h(T_t \omega) - h(\omega) + t$  である。 したがって

$$\begin{aligned} (T_\theta \circ f_J)(\sigma, \omega) &= h(T_{f_J(\sigma, \omega)} \omega) - h(\omega) + f_J(\sigma, \omega) \\ &= h(\sigma \omega) - h(\omega) + f_J(\sigma, \omega) \\ &= g(\sigma, \omega). \end{aligned}$$

以上の  $\Rightarrow$  の補題から  $J$  と同じ trajectories をもつ flow が  $J$  に同型になるための条件を次のような形で与えることが出来る。

定理 4.1  $S = (\Omega, \mathcal{B}, \mathbb{Q}, S_t)$  を flow  $J$  と同じ軌道をもつ flow とする。 もし エバントリ  $f_S$  と  $f_J$  が admissible な エバントリ に関して ホモロークならば  $S$  と  $J$  は同型である。 又  $g$  が admissible エバントリ に関して  $f_J$  に ホモロークならば、  $J$  に同型な  $J$  の time changed flow  $S$  が存在して  $g = f_S$  である。

§5. カ学系  $(\Omega, \mathcal{B}_\Omega, P, A)$  と flow  $J$  の イントロ

この節ではカ学系  $A = (\Omega, \mathcal{B}_\Omega, P, A)$  の構造と  $J$  のイントロ  
 ー  $h(J)$  との関係について述べる。  $A$  の定義は次の通りで  
 ある。

timechange functions  $\tau_\sigma(t, \omega) \in \mathcal{F}(\mathcal{O}_t)$  かつ  $\forall \omega$  について、微分係数

$$\left. \frac{d\tau_\sigma(t, \omega)}{dt} \right|_{t=0} \neq 0 \quad \text{をもつ時、class } \mathcal{F}(A) \text{ に属するとし}$$

$$A = \{ \sigma \in \mathcal{O}_t \mid \tau_\sigma \in \mathcal{F}(A) \} \quad \text{とおく。}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} [\tau_\sigma(t+h, \omega) - \tau_\sigma(t, \omega)]/h = \lim_{h \rightarrow 0} \tau_\sigma(h, T_\sigma(t, \omega), \omega)/h$$

だから  $\tau_\sigma \in \mathcal{F}(A)$  は任意の  $t$  で微分可能である。又

$\sigma_1, \sigma_2 \in A$  ならば

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tau_{\sigma_1 \circ \sigma_2}(t, \omega)}{t} = \lim_{\tau_{\sigma_2} \rightarrow 0} \frac{\tau_{\sigma_1}(\tau_{\sigma_2}(t, \sigma_1^{-1} \omega), \omega)}{\tau_{\sigma_2}(t, \sigma_1^{-1} \omega)} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tau_{\sigma_2}(t, \sigma_1^{-1} \omega)}{t}$$

より  $\sigma_1, \sigma_2 \in A$  を得る。又  $t = \tau_{\sigma_1^{-1}}(\tau_\sigma(t, \sigma \omega), \omega)$  だから

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{\tau_{\sigma^{-1}}(s, \omega)}{s} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\tau_\sigma(t, \sigma \omega)} = \frac{1}{\tau_\sigma(0, \sigma \omega)}$$

即ち  $\sigma^{-1} \in A$ ,  $\forall \sigma \in A$  である。したがって  $A$  は群をなし  
 ていることがわかる。明らかに群  $\{T_x\} \subset A$  だから  
 カ学系  $A = (\Omega, \mathcal{B}_\Omega, P, A)$  は  $J = (\Omega, \mathcal{B}_\Omega, P, T_x)$  の拡張  
 になっている。

補題 5.1 (Yuzvinsky)  $T_\lambda$  is ergodic flow  $J$  の time change function  $\sigma \in A$  とすれば

$$T_\sigma(t\omega) = \lambda t \quad \text{a.e. } \omega$$

定理 5.1 flow  $J$  は ergodic なるものとする。もし  $J$  のエントロピー  $h(J)$  が  $0 < h(J) < \infty$  ならば

$$A = \mathcal{O} \cap \mathcal{C}$$

証明  $S = (\Omega, \mathcal{B}_\Omega, P, S_t)$  と  $T_\sigma \in A$  に  $J$  の time changed flow とする。

$$h(T_1) = h(S_1) = h(T_\lambda) = \lambda h(T_1)$$

従って  $\lambda = 1$ 。故に  $S_t \omega = \sigma T_t \sigma^{-1} \omega = T_t \omega$ ,  $\forall \sigma \in \mathcal{C}$ 。

一方  $A \supset \mathcal{O} \cap \mathcal{C}$  は明らかである。

定理 5.2  $J = A \cap G_\lambda$ ,  $\forall \lambda$   $J$  は ergodic なるものとする。

証明  $\sigma \in A \cap G_\lambda$  とする。  $U_\sigma(t, \omega) = f_\sigma(T_t \omega) - f_\sigma(\omega) + t$

$$\sigma T_t \omega = \overline{T_{f_\sigma(T_t \omega) + t} \omega} = T_t \sigma \omega$$

であるが上の補題から  $f_\sigma(T_t \omega) - f_\sigma(\omega) + t = \lambda t$  a.e.  $\omega$

よって  $J$  が ergodic なるから  $f_\sigma(\omega) = c(\text{const})$  a.e.  $\omega$  従って

$$\sigma \omega = \overline{T_{c, \omega} \omega} = \overline{T_c} \omega, \quad \sigma = \overline{T_c} \quad \text{a.e. } \omega.$$

系 5.1 flow  $T$  は ergodic であるとする。もし 或る  $T_0$  と交換可能でない自己同型  $\sigma \in A$  が存在すれば エントロピー  $h(T)$  は zero or infinite である。

上の系で = 通り の可能性  $h(T)=0$ ,  $h(T)=\infty$  が有り得るか 実際 に どちら の 場合 も 起り得る。後者の例としては  $T$  が Brown 運動の flow がある。前者の例としては ロバチエスキー平面上の horocycle flow などがある。

エントロピーから力学系について先の定理から  $A = \Omega \cap C$  であるが、必ず  $A = T$  とはならない。その観点から flow ではなくて automorphism について、前述の類似な approach をするにまつて 次の結果を述べることに出来る。即ち  $T = (\Omega, \mathcal{B}, P, T)$  を 普通の two sided Bernoulli shift の力学系とし、状態は有限  $x_1, \dots, x_n$  とし それが出現する確率を  $p_1, \dots, p_n$  とする。状態空間  $X = \{x_1, \dots, x_n\}$  の一つの permutation を  $L$  とし、 $\Omega$  上の変換  $\sigma_L$  を

$$\sigma_L(\dots, \omega_{-1}, \omega_0, \omega_1, \dots) = (\dots, L\omega_{-1}, L\omega_0, L\omega_1, \dots)$$

で定義する。又  $K$  を  $\Omega$  上の連続 (discrete top. に  $\tau$  2) 変換の全体とする。

定理5.2. 群  $A \cap K$  が  $T$  と全ての  $\sigma_L$  によって生成されるのは  $p_1 = p_2 = \dots = p_n$  の時且その時に限る。又  $p_i \neq p_j$  とする pair  $p_i, p_j$  が存在すれば  $A \cap K = \{T^m\}$  となる。

state が一様分布しているとは  $\{T^m\} \subseteq A$  となっている訳である。従ってこの時力学系  $(A, \mathbb{R})$  は  $\{T^m\}$  の nontrivial な拡張になっている。

以下では  $A$  の structure によって flow  $J$  のスペクトル型が異なることがあることを示す。下の定理の例として horocycle flow などを考えられたい。

定理5.3  $J$  を ergodic flow とする。

もし  $A$  が 1-parameter <sup>sub</sup>group  $\{\sigma_s\} \mid \sigma_s \in \mathcal{C}\}$  を含むならば  $J$  は連続スペクトルを ~~も~~ 持つ。