

## De Sitter 群の一様有界表現

阪大 基礎工 川 西 啓 一

### § 1. 序文

$SL(2, \mathbb{R})$  および  $SL(2, \mathbb{C})$  に関しては, それらの一様有界表現が構成され, その応用として matrix element を使ってすべての既約ユニタリ-表現が分類されている。(cf. [2], [3])  
我々はここで De Sitter 群について上記の考察を行なう。その際, [4] の表現  $g \mapsto R(g, n, s)$  が complementary series の表現を部分的に含むものであることを示し, 表現  $g \mapsto R(g, n, s)$  を使って De Sitter 群について Hausdorff-Toung の定理,  $L_p$  convolution 定理, Riemann-Lebesgue lemma を導く。最後にこれらの定理によって既約ユニタリ-表現の分類を行なう。

$G$  を De Sitter 群の universal covering group とし,  $\mathbb{H}$  を quaternion field とする。  $x = x_1 + x_2 i + x_3 j + x_4 k \in \mathbb{H}$ ,  $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}$  に対して

$$\bar{x} = x_1 - x_2 i - x_3 j - x_4 k,$$

$$\hat{x} = x_1 + x_2 i + x_3 j - x_4 k,$$

$$|x| = (x\bar{x})^{1/2} = (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2)^{1/2}$$

$$U = \{x \in \mathbb{H}; |x| = 1\}, \quad \mathbb{Z} = \{x \in \mathbb{H}; x_4 = 0\}$$

よって,  $G$  は  $2 \times 2$  quaternion matrices

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \hat{a}c = \hat{c}a, \quad \hat{b}d = \hat{d}b, \quad \hat{a}d - \hat{c}b = 1$$

全体からなる群と同一視されること ([6], Chap II) を示すこと  
 である。

$$G = K A N \text{ (Iwasawa decomposition)}$$

ただし

$$K = \left\{ \begin{pmatrix} \hat{a} & -\hat{b} \\ b & a \end{pmatrix}; |a|^2 + |b|^2 = 1, a\hat{b} = b\hat{a} \right\},$$

$$A_+ = \left\{ \begin{pmatrix} e^{\frac{t}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{t}{2}} \end{pmatrix}; t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ x & 1 \end{pmatrix}; x \in \mathbb{Z} \right\}$$

$M'$  は  $u \in M \in K$  に対して  $A_+$  の normalizer, centralizer と同じく,

$$M' = \left\{ \begin{pmatrix} \hat{u} & 0 \\ 0 & u \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -\hat{u} \\ u & 0 \end{pmatrix}; u \in U \right\}$$

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} \hat{u} & 0 \\ 0 & u \end{pmatrix}; u \in U \right\}$$

を得る。  $\theta$  は Cartan involution とし,  $V = \theta N$  とおくと,

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; z \in \mathbb{Z} \right\}$$

にある。これらの subgroups  $K$  について measure zero を除いて  $G = TMA+N$  と分解される。  $T = MA+N$ ,  $W = M/M$  (Weyl group)

とし,  $W$  の代表元として  $e = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  と  $p = \begin{pmatrix} 0 & -k \\ k & 0 \end{pmatrix}$  をとる。

そのとき Bruhat 分解  $G = T \cup TpT$  (disjoint) を得る。

次に,  $G$  は左から  $\mathbb{Z}K$  act し, 次の式で定義される。

$$g.z = (az+b)(cz+d)^{-1}$$

ただし,  $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in G$ ,  $z \in \mathbb{Z}$  である。また,

$$\begin{cases} \omega_G(g, z) = |cz+d|^2, \\ \kappa_G(g, z) = (cz+d)/|cz+d| \end{cases}$$

とおくと  $\omega_G$  および  $\kappa_G$  は multipliers である。

§ 2.  $G$  の表現について

Continuous principal series の既約ユニタリ表現は [6] に記述されている。これらは 2 つの parameters  $(n, s)$ ,  $n \geq 0$  half-integer,  $s = 3/2 + it$ , をもつ表現  $g \mapsto V_g^{n,s}$  として与えられる。  $n$  に対して  $(2n+1)$  次元 Hilbert 空間  $\mathcal{H}_n$  の  $SU(2)$  の既約ユニタリ表現  $\rho^n$  を与える。このとき  $V_g^{n,s}$  は  $\mathbb{Z}$  上で定義される  $V^n$ -valued 2 乗可積分関数全体より成る Hilbert 空間  $\mathcal{H}$  上の作用素として定義され, explicit には次の形である。

$$(2.1) \quad (V_g^{n,s} f)(z) = \omega_G(g^{-1}, z)^{-s} \rho^n(\kappa_G(g^{-1}, z)^{-1}) f(g^{-1}.z), \quad f \in \mathcal{H}$$

次に (2.1) から complementary series の既約ユニタリ表現の explicit 形を得る。

$g_{n,\sigma}$  ( $\sigma \in \mathbb{R}$ ) を  $\mathbb{Z}$  上で定義された  $V^n$ -valued 関数で

$$\|f\|_{n,\sigma}^2 = C_\sigma^n \iint_{\mathbb{Z}\mathbb{Z}} |u-v|^{-6+2\sigma} \langle f(u), f(v) \rangle_{V^n} du dv < +\infty$$

を満たす  $\mathcal{H}$  の全体の作る Hilbert 空間とする。ただし,  $C_\sigma^n = (2n+1)^{-1} 2^{3-2\sigma} \pi^{-3/2} \Gamma(-3/2+\sigma) / \Gamma(3-\sigma)$  である。そのとき

(1)  $3/2 < \sigma < 3$  に対して, 表現  $g \mapsto V_g^{0,\sigma}$  on  $g_{0,\sigma}$  は class 1 の complementary series の表現である。

(2) positive integer  $n$  と  $3/2 < \sigma < 2$  に対して, 表現  $g \mapsto V_g^{n,\sigma}$  on  $g_{n,\sigma}$  は  $n$  に対して complementary series の表現である。  
§3.  $G$  の一様有界表現

[4] と同様の方法によって次の定理を得る。得られる表現  $g \mapsto R(g, n, s)$  に関しては [4] の結果と一致するが, さらにこれは Complementary series を部分的に含むことが分る。

定理 1.  $n \geq 0$  と half-integer とする。そのとき以下の条件を満たす表現  $g \mapsto R(g, n, s)$  of  $G$  on  $\mathcal{H}$  が存在する;

(1)  $g \mapsto R(g, n, s)$  は continuous, ただし,  $n \geq 0$  half-integer,  $1/2 < \operatorname{Re} s < 5/2$ ,

(2)  $\operatorname{Re} s = 3/2$  のとき,  $g \mapsto R(g, n, s)$  は Continuous principal series の表現に  $\mathbb{C}$  等価,

(3)  $n=0$ ,  $s$  が実数で  $3/2 < s < 5/2$  のとき,  $g \mapsto R(g, n, s)$  は class 1 の Complementary series の表現に  $\mathbb{C}$  等価,

(4)  $n \geq 1$  integer,  $s$  複素数で  $3/2 < s < 2$  のとき,  $g \mapsto R(g, n, s)$  は  $n$  に対応する Complementary series の表現に  $\pm 1$  同値,

(5)  $\xi, \eta \in \mathfrak{g}$  ならば, 各 fixed  $g \in G$ ,  $n \geq 0$  half-integer に対して  $s \mapsto (R(g, n, s))_{\xi, \eta}$  は  $1/2 < \operatorname{Re} s < 5/2$  で analytic,

(6)  $\sup_{g \in G} \|R(g, n, s)\|_{\infty} \leq K_{\sigma} (1+n)(1+|t|)^4$ ,  $s = \sigma + it$ ,  $1/2 < \sigma < 5/2$ ,  $n \geq 0$  half-integer,  $\|\cdot\|_{\infty}$  は operator norm を表わし,  $K_{\sigma}$  は  $(1/2, 5/2)$  の任意の closed subinterval 上で一様有界にとれる.

(証明) (3), (4) を除いては [4] にその証明が与えられている.

(3), (4) を証明するために  $n \geq 0$  integer,  $0 < \sigma < 3$  に対して,  $\mathbb{C}^{\pm}$  で定義される  $\mathbb{V}^n$ -valued 関数で

$$\|F\|_{n, \sigma}^2 = \int_{\mathbb{C}^{\pm}} |F(z)|_{\mathbb{V}^n}^2 \cdot |z|^{3-2\sigma} dz < +\infty$$

を満たすもの全体のつくる Hilbert 空間  $\mathfrak{H}_{n, \sigma}$  を導入する.

$s_1 = \sigma_1 + it_1$ ,  $s_2 = \sigma_2 + it_2$ ,  $0 < \sigma_1, \sigma_2 < 3$ ,  $-\infty < t_1, t_2 < +\infty$  に対して

$\mathfrak{H}_{n, \sigma_1}$  上の operator  $W(s_1, s_2)$  を

$$(W(s_1, s_2)F)(z) = |z|^{s_2 - s_1} F(z), \quad F \in \mathfrak{H}_{n, \sigma_1}$$

によって定義すれば,  $W(s_1, s_2)$  は  $\mathfrak{H}_{n, \sigma_1}$  から  $\mathfrak{H}_{n, \sigma_2}$  の  $\mathbb{C}^{\pm}$  への isometry であり,  $W(s_2, s_1)$  は  $W(s_1, s_2)$  の inverse mapping である.

よって  $\mathbb{R}^{\pm}$  の Fourier 変換を  $\mathcal{F}$  で表わせば,  $\mathcal{F}\mathfrak{H}_{n, \sigma} = \mathfrak{H}_{n, \sigma}$  である.

よって命題, [4] における intertwining operator  $A(s) = \mathcal{F}^{-1}W(s, 3/2)\mathcal{F}$  for  $\operatorname{Re} s \geq 3/2$ , が成立する. これらの事と  $R(g, n, s)$  の analyticity から (3), (4) を得る. (証明終り)

§ 4.  $G$  の Fourier analysis

$f \in L_1(G)$ ,  $n \geq 0$  half-integer,  $s \in \mathbb{C}$   $1/2 < \operatorname{Re} s < 5/2$  に対して  $f$  の Fourier 変換を

$$F(n, s) = \int_G f(g) R(g, n, s) dg$$

によって定義する。fixed  $n, s$ ,  $1/2 < \operatorname{Re} s < 5/2$  に対して  $R(g, n, s)$  は一様有界表現であるから  $F(n, s)$  は well-defined で  $G$  上の bounded operator である。したがって, 各 fixed  $n$  に対して  $F(n, s)$  は  $1/2 < \operatorname{Re} s < 5/2$  において  $s$  の analytic function である。

定理 2 (Hausdorff-Young 定理)  $1 < p < 2$ ,  $1/p + 1/q = 1$ ,  $s = \sigma + it$ ,  $(1/p + 5/q)/2 < \sigma < (5/p + 1/q)/2$ ,  $\sigma \neq 3/2$  とする。このとき, 任意の  $\varepsilon > 0$  に対して  $\delta > 0$  と constant  $A(p, \sigma, \varepsilon)$  が存在して

$$(4.1) \quad \left( \int_{-\infty}^{+\infty} \|F(n, s)\|_q^p (1+|t|)^{2-4|\sigma-3/2|q-\varepsilon} dt \right)^{1/p} \leq A(p, \sigma, \varepsilon) (1+n)^{|\sigma-3/2|\tau(1+\delta)/(1-\tau)+\tau-1} \|f\|_p,$$

を満す。ただし,  $f \in S_0(G)$ ,  $G$  上の compact support を持つ simple function の全体からなる集合,  $\|A\|_p^p = \operatorname{tr}(|A|^p)$ ,  $|A| = (A^*A)^{1/2}$ ,  $\tau$  は  $1/p = 1 - \tau/2$  によって与えられ,  $0 < \tau < 1$  である。

(証明) 最初に定理 1 の (b) は次の様に強められた;

任意の  $\delta > 0$  に対して

$$\sup_{g \in G} \|R(g, n, s)\|_\infty \leq A_{\sigma, \delta} (1+n)^{|\sigma-3/2|(1+\delta)} (1+|t|)^{4|\sigma-3/2|(1+\delta)}$$

また  $\mathcal{F}(n, s)$  の定義によつて

$$\|\mathcal{F}(n, s)\|_\infty \leq \sup_{g \in G} \|R(g, n, s)\|_\infty \cdot \|f\|_1$$

これらの不等式から次のことを得る;

任意の  $\delta > 0$ ,  $1/2 < \sigma < 5/2$  に対して

$$(4.2) \quad \sup_{t \in \mathbb{R}} (1+|t|)^{-4|\sigma-3/2|(1+\delta)} \|\mathcal{F}(n, \sigma+it)\|_\infty \\ \leq A_{\sigma, \delta} (1+n)^{|\sigma-3/2|(1+\delta)} \|f\|_1, \quad f \in S_0(G)$$

が成立する。さらに  $G$  に対する Plancherel の定理 (cf. [5]) によつて

$$\|f\|_2^2 \geq \frac{1}{16\pi^2} \sum_{\substack{n \geq 0 \\ \text{half-integer}}} (2n+1) \int_{-\infty}^{+\infty} \|\mathcal{F}(n, 3/2+it)\|_2^2 [(n+1/2)^2+t^2] \\ \times t \cdot \tanh(\pi t + i\pi) dt$$

故に

$$(4.3) \quad \left( \int_{-\infty}^{+\infty} \|\mathcal{F}(n, 3/2+it)\|_2^2 \cdot |t|^3 / (1+|t|) dt \right)^{1/2} \\ \leq 4\pi (2n+1)^{-1/2} \|f\|_2$$

$(1/p + 5/q)/2 < \sigma < 3/2$  と仮定する。  $\alpha$  を  $1/2 < \alpha < \sigma < 3/2$  とし、

(4.2) を  $\sigma$  の代りに  $\alpha$  に置き換之ると、

$$(4.4) \quad \sup_{t \in \mathbb{R}} (1+|t|)^c \|\mathcal{F}(n, \alpha+it)\|_\infty \leq A_{\alpha, \delta} (1+n)^{-c/4} \|f\|_1,$$

$c = 4(\alpha - 3/2)(1+\delta)$   $\alpha$  を  $\sigma = \alpha(1-\tau) + 3\tau/2$  と取つて、(4.3) と

(4.4) は定理 4 ([2], p. 16) を適用する。定理 4 の notation で

$$c = 4(\alpha - 3/2)(1+\delta), \quad a = 3/2, \quad b = -1/2$$

と取ると

$$\left( \int_{-\infty}^{+\infty} \|\mathcal{F}(n, \sigma+it)\|_q^q (1+|t|)^{qd} dt \right)^{1/q} \leq A(\tau, \alpha, \delta, n) \|f\|_p$$

$f \in S_0(G)$  を得る。こゝで [2] におけると同様の議論により、

$$qd \geq 2 - 4q|\sigma - 3/2| - \varepsilon$$

$$A(\tau, \alpha, \delta, \kappa) = A(p, \sigma, \delta) (1 + \kappa)^{|\sigma - 3/2| \tau (1 + \delta) / (1 - \tau) + \tau - 1}$$

が得られる。 $3/2 < \sigma < (5/p + 1/q)/2$  の場合にも  $\mathcal{F}(n, s) = \mathcal{F}(n, 3-s)$  であることを使って同様に証明される。(証明終り)

$\Phi(s) = (\mathcal{F}(n, s), \xi, \eta)$ ,  $\xi, \eta \in \mathcal{H}$  に Phragmen-Lindelöf principle を適用することにより以下の系が得られる。(cf. [2])

系 2.1. 若  $p, 1 \leq p < 2$  に対して

$$(4.5) \quad \sup_{t \in \mathbb{R}} \|\mathcal{F}(n, 3/2 + it)\|_{\infty} \leq A_p \|f\|_p, \quad f \in S_0(G)$$

ただし、 $A_p$  は  $p$  のみに depend する constant である。

系 2.2. 若  $p, 1 \leq p < 2, (2/p + 5/q)/2 < \sigma < (5/p + 1/q)/2$ ,  $s = \sigma + it$  に対して、

$$(4.6) \quad \|\mathcal{F}(n, s)\|_{\infty} \leq A_{p, n, s} \|f\|_p, \quad f \in S_0(G)$$

次に Discrete series の表現を  $D^{n, r; +}$ ,  $D^{n, r; -}$  で表わす。こゝで  $n, r$ : half-integer,  $n \geq r \geq 1$ ,  $n-r$ : integer である。(cf. [6])

$$D_f^{n, r; \pm} = \int_G f(q) D_q^{n, r; \pm} dq, \quad f \in L_1(G)$$

とおく。

是理 3.  $1 \leq p \leq 2, 1/p + 1/q = 1$  とすると、

$$\frac{1}{4\pi} \left\{ \sum_{\substack{n \geq 1 \\ \text{half-integer}}} (2n+1) \sum_{\substack{n \geq r \geq 1 \\ n-r; \text{integer}}} (2r-1)(n+r)(n-r+1) (\|D_f^{n, r; +}\|_p^q + \|D_f^{n, r; -}\|_p^q) \right\}$$



$$+ \|D_f^{n,r;\pm} - \frac{1}{f}\|_p \}^{1/p} \leq \|f\|_p, \quad f \in L_1(G) \cap L_p(G)$$

これは是理 2 と同じ方法で証明される。

系 3.1. Mapping  $f \mapsto D_f^{n,r;\pm}$  は  $L_p$  全体への unique 可拡張をもち、この拡張は次の不等式を満たす。

$$(4.7) \quad \sup_{n,r;\pm} \|D_f^{n,r;\pm}\|_\infty \leq (2\pi/3)^{1-1/p} \|f\|_p, \quad 1 \leq p \leq 2$$

2つの関数  $f, h$  に対して、これらの Convolution を

$$(f * h)(g_0) = \int_G f(g_0 \bar{g}^{-1}) h(g) dg$$

で定義する。(4.5), (4.7) および Hilbert 空間上の bounded operators による Banach 空間の一般論 (cf. [2]) を結びあわせると、計算によって次の結論を得る。

是理 4.1. ( $L_p$  convolution 是理)  $f \in L_2(G), h \in L_p(G), 1 \leq p < 2$  とする。  $k = f * h$  とおくと、

$$(4.8) \quad k \in L_2(G), \quad \|k\|_2 \leq C_p \|f\|_2 \|h\|_p,$$

ただし、 $C_p$  は  $f$  および  $h$  に independent である。すなわち  $L_p$  関数 ( $1 \leq p < 2$ ) による convolution の operation は  $L_2(G)$  上の bounded operator である。

是理 4.2.  $f, h \in L_2(G), k = f * h$  とすると、

$$(4.9) \quad k \in L_q(G), \quad 2 < q \leq \infty, \quad \|k\|_q \leq C_q \|f\|_2 \|h\|_2,$$

ここで  $C_f$  は  $f$  および  $\chi$  に independent である。

(4.6) における constant  $A_{p,n,s}$  をさらに詳細に調べることに  
よって次の定理を得る。(cf. [2], [3])

定理 5 (A Riemann-Lebesgue lemma)  $n \geq 0$ ,  
half-integer,  $1 \leq p < 2$ ,  $f \in L_p(G)$  とする。このとき,  
 $\|F(n, \frac{1}{2} + it)\|_\infty$  は infinity で  $O$  になる。

§ 5. Continuous principal series a characterization  
 $g \mapsto U_g$  を Hilbert 空間  $\mathcal{H}$  における  $G$  のユニタリ-表現と  
する。

定義.  $g \mapsto U_g$  が fixed  $p$ ,  $p \geq 1$  に対して extendable  
to  $L_p(G)$  であるとは

$$\|U(f)\|_\infty \leq A \|f\|_p, \quad f \in L_1(G) \cap L_p(G)$$

が成立することである。ただし,  $A$  は  $f$  に independent で,  
 $U(f) = \int_G f(g) U_g dg$  である。

次の lemma は [2] による。

Lemma. 表現  $g \mapsto U_g$  が extendable to  $L_p(G)$  であるた  
めの必要十分条件は, 任意の  $\xi, \eta \in \mathcal{H}$  に対してすべての  
matrix element  $\phi(g) = (U_g \xi, \eta)$  が  $L_q(G)$  に属すること  
である。ここで  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$  である。

Remarks.  $G$  の正則表現は (4.8) によって  $L_p(G)$ ,  $1 \leq p < 2$   
に extendable である。再び (4.9) によって正則表現のすべて

の matrix element は  $L_q(G)$ ,  $q > 2$  に属する。

すべての matrix element は  $L_{p_0}(G)$  に属する  $\alpha$  で, matrix element が  $L_{p_0}(G)$  に属するならば, それはまた  $L_q(G)$ ,  $q \geq p_0$  に属している。故に lemma によって, 表現が  $L_{p_0}(G)$ ,  $p_0 > 1$  に extendable ならば, それはまた  $L_p(G)$ ,  $1 \leq p \leq p_0$  に extendable である。

定理 6.  $g \mapsto U_g$  を 恒等表現および non square-integrable 表現と異なる  $G$  の既約ユニタリ-表現とする。そのとき  $U$  は, (1) Continuous principal series, (2) Complementary series, (3) Discrete series, (4) Limits of Discrete series, のいずれかの表現に同値である。さらに,

(i)  $U$  が (2) または (4) の表現にユニタリ-同値。

$\Leftrightarrow U$  は  $L_p(G)$ ,  $1 \leq p < 2$  に extendable であるが,  $L_2(G)$  に extendable ではない。

$\Leftrightarrow$  すべての matrix element が  $L_q(G)$ ,  $q > 2$  に属するが,  $L_2(G)$  に属さないもの  $\alpha$  が存在する。

(ii)  $U$  が  $n=0$  に対しては  $3/2 < \sigma < 5/2$ ,  $n \geq 1$  integer に対しては  $3/2 < \sigma < 2$  である parameter  $\sigma$  に対応する (2) の表現にユニタリ-同値。

$\Rightarrow U$  は  $L_p(G)$ ,  $p < 4/(2\sigma-1)$  に extendable。

$\Leftrightarrow$  すべての matrix element が  $L_q(G)$ ,  $q > 4/(5-2\sigma)$  に

属する。

(iii)  $U$  が (3) の表現にユニタリ-同値。

$\Leftrightarrow U$  は  $L_2(G)$  に extendable。

$\Leftrightarrow$  すべての matrix element が  $L_2(G)$  に属する。

(証明) [1]において,  $G$  のすべての既約ユニタリ-表現は恒等表現および non square-integrable 表現を除いて, (1), (2), (3), (4) のいずれかの表現にユニタリ-同値であることが示されている。

(4.5) によって (1) のすべての表現は  $L_p(G)$ ,  $1 \leq p < 2$  に extendable であり, (4.7) によって (3) のすべての表現は  $L_2(G)$  に extendable である。strict half-integer  $n$  に対する表現  $g \mapsto V_g^{n, 3/2}$  は (4) の 2 つの表現の直和である。(cf. [6])  $V_g^{n, 3/2}$  は  $L_p(G)$ ,  $1 \leq p < 2$  に extendable であるから, (4) のすべての表現もまた  $L_p(G)$ ,  $1 \leq p < 2$  に extendable である。最後に (4.6) によって  $n=0$  に対して  $3/2 < \sigma < 5/2$ ,  $n \geq 1$  integer に対して  $3/2 < \sigma < 2$  である  $\sigma$  に対応する (2) の表現は  $L_p(G)$ ,  $1 \leq p < 4/(2\sigma-1)$  に extendable である。

次に (2) または (4) のすべての表現が  $L_2(G)$  に extendable ではないことを示さなければならぬ。最初に (2) について考える。

lemma によって,  $L_2(G)$  に属さない matrix element の存在を示せば十分である。[1] によって,  $n \rightarrow \infty$  のとき,

$$\phi(At) = (V_{At}^{n, s} f, f) \sim \operatorname{Re} [\lambda \exp\{(-3/2 + i(\sigma - 1/4)^{1/2})t\}],$$

ただし,  $s = 3/2 \pm i(\sigma - 1/4)^{1/2}$ ,  $\lambda \neq 0$ ,  $dq = 2\pi^2 \sinh^3 t \, dt \, dk \, dk'$   
従って,  $\phi(At) \notin L_2(G)$  である。 (4) の表現に対しては,  
 $t \rightarrow \infty$  のとき,

$$\phi(At) \sim \lambda e^{-3t/2}$$

従って,  $\phi(At) \notin L_2(G)$  である。 (証明終り)

§ 3 の補足

Normalized principal series は次の様に定義される;  
 $n \geq 0$  half-integer,  $\operatorname{Re} s = 3/2$  に対して

$$R(g, n, s) = A(s) V_g^{n, s} A(3-s), \quad g \in G$$

ただし,  $\operatorname{Re} s = 3/2$  に対しては, operator  $A(s)$  は  $\mathfrak{h}$  の  $\mathfrak{g}$  =  
 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$  - operator として  $A(s)^{-1} = A(3-s)$  である。 その explicit  
形式は

$$(A_n(s)f)(v) = \frac{1}{\gamma(s)} \int_{\mathbb{Z}} |z|^{-9/2+s} f(v-z) \, dz$$

$$\gamma(s) = 2^{-3/2+s} \pi^{3/2} \Gamma(-3/4 + s/2) / \Gamma(1/4 - s/2)$$

である。

$R(g, n, s)$  を拡張するとき本質的に用いたことは,  $G_0 =$   
 $\mathbb{R}MA_+$  としたとき,

$$R(g, n, s) = V_g^{n, 3/2}, \quad g \in G_0, \quad \operatorname{Re} s = 3/2$$

であること,  $G = G_0 \cup G_1 \cup G_2$  (disjoint), および次の不等式 ([7] の Theorem  $B_2^*$ ) である。

$\phi(v), \psi(z) \in \mathbb{R}^3 \mathcal{I}$  の関数とし,  $0 < \gamma < 3$ ,  $1 < p < \infty$ ,  $\alpha < 3/p'$ ,  $\beta < 3/q$ ,  $\alpha + \beta \geq 0$ ,  $1/q = 1/p + (\alpha + \beta + \gamma)/3 - 1$  と仮定する。  
 $p \leq q < \infty$  ならば,

$$\left| \iint_{\mathbb{R}^3 \mathbb{R}^3} \frac{\phi(v) \psi(z)}{|v|^\alpha |v-z|^\gamma |z|^\beta} dv dz \right| \leq K \|\phi\|_p \|\psi\|_{q'}$$

ただし,  $1/p + 1/p' = 1$ ,  $1/q + 1/q' = 1$ ,  $K$  は  $\phi$  および  $\psi$  に independent である。

## References

- 1 J.Dixmier: Représentations intégrables du groupe de De Sitter, Bull. Soc. Math. France, 89 (1961), 9-41.
- 2 R.A.Kunze and E.M.Stein: Uniformly bounded representations and harmonic analysis of the  $2 \times 2$  real unimodular group, Amer. J. Math., 82 (1960), 1-62.
- 3 R.L.Lipsman: Uniformly bounded representations of  $SL(2, \mathbb{C})$ , Amer. J. Math., 91 (1969), 47-66.
- 4 \_\_\_\_\_: Uniformly bounded representations of the Lorentz groups, Amer. J. Math., 91 (1969), 938-962.
- 5 K.Okamoto: On the Plancherel formulas for some types of simple Lie groups, Osaka J. Math., 2 (1965), 247-282.
- 6 R.Takahashi: Sur les représentations unitaires des groupes de Lorentz généralisés, Bull. Soc. Math. France, 91 (1963), 289-433.
- 7 E.M.Stein and G.Weiss: Fractional integrals on n-dimensional Euclidean space, J. Math. and Mechanics, 7 (1958), 503-514.