

100

解析空間の isolated singularity の代数性について
(広中の講義による)

名大 理 松村英之

§0.

先の講演者が紹介された M. Artin の論文“解析的方程式の解について”は、形式的解があれば解析的解があるといふことを主定理とするが、この定理のいくつかのヴァリエーションが可能であることを Artin みずからのべている。その中でも重要なものは次のものである:

I) k を体, $k\{x_1, \dots, x_n\} = R_0$ を (収束中級数環ではなくて) 多項式環 $k[x_1, \dots, x_n]$ の素イデアル (x_1, \dots, x_n) による局所環 $k[x]_{(x)}$ の Hensel 化とする。局所環 R_0 の完備化は形式的中級数環 $k[[x_1, \dots, x_n]]$ であり, R_0 は $k[[x]]$ の中で $k[x]$ 上に代数的な元の全体から成る部分環に外ならない。このとき, $F_\nu(Y) \in R_0[[Y_1, \dots, Y_m]]$ ($\nu = 1, 2, \dots, r$) による代数方程式 $F_\nu(Y) = 0$ が形式解 $\bar{y} = (y_1, \dots, y_m)$, $y_i \in k[[x]]$, をもてば R_0 の中で \bar{y} にいくらでも近い解 y が存在する。

つまり, 方程式が解析的方程式から代数方程式に制

限される代りに、解は収束中級数よりも小さい R_0 の中で見出せると主張する。実はこの定理の完全な証明はまだ書かれていないようだが、長が標数 0 なら多分大丈夫と思われる。さてこれを認めると、次の問題が肯定的に解決される：

II) “ X を複素解析空間、 P を X の孤立特異点とすると、 P の適当な近傍はある代数多様体の孤立特異点の近傍と同型ではないか？”

P が X の単純点なら P の近傍は affine space の開集合と同型だからもちろん代数的であり、また孤立特異点でなければ、局所的にも代数的にやらぬ解析空間の例は容易に作れることを注意しておこう。さて近傍の同型は P の局所環 \mathcal{O}_P によって定まる。更に \mathcal{O}_P の完備化を $\hat{\mathcal{O}}_P$ とすれば $\hat{\mathcal{O}}_P$ の同型から \mathcal{O}_P の同型が従う (前の講演)。従って $\hat{\mathcal{O}}_P$ が、ある代数多様体の局所環の完備化と同型であることを示せばよいわけである。 $\hat{\mathcal{O}}_P$ は $\mathbb{C}[[x_1, \dots, x_n]]/J$ (J はイデアル) の形をしているが、適当な変数変換ののちに J が $\mathbb{C}[[x_1, \dots, x_n]]$ 上代数的な元で生成されれば目的が達成される。

以下にのべるのは、1967年12月、M. Artin の結果がニュースとして伝った頃、Columbia 大学で広中氏が

~~セミナー~~ セミナーで話されたことを、筆者のノートによって
 まとめたものであり、文責は筆者にあるが、理論は広中
 氏だけのものか Artin の考えも入っているのかたしかめな
 かった。内容は I) から II) が従うことの証明である。

§1. R_0 は noetherian local ring, M_0 をその極大
 ideal とし, H_0 を R_0 の ideal, $R = \text{the } H_0\text{-adic comple-}$
 $\text{tion of } R_0$, $H = H_0 R$, $M = M_0 R$ とおく。 R は M を極
 大 ideal とする noeth. local ring である。

$J = f_1 R + \dots + f_m R$ を R の ideal, $\mathcal{O} = R/J$ とお
 く。問題: \mathcal{O} を代数化せよ。 という意味は, R_0 の ideal J_0
 で $\mathcal{O} \cong R/J_0 R$ となる如きものを求めよということであ
 る。(しからは $R/J_0 R = H_0\text{-adic completion of } R_0/J_0$ と
 あるから。) この問題を考えるために, R 加群としての
 exact seq.

$$(1.1) \quad L_2 \xrightarrow{g} L_1 \xrightarrow{f} R \xrightarrow{\varepsilon} \mathcal{O} \rightarrow 0$$

をひとつ通しておく。但し \ni に $L_1 = R^m$, $L_2 = R^l$

(l は適当な integer) で f は $f(\xi) = \sum_{i=1}^m f_i \xi_i$ で与え
 られるものとし, ε は自然な準同型とする。これを用的

で, f と g を "代數化" することにより \mathcal{O} を代數化し
 ようとしようのである. もちろん R にもつと条件をつけたいと
 この問題はとけない.

(1.1) から次の複体が得られる.

$$\mathrm{Hom}_R(L_2, \mathcal{O}) \xleftarrow{g^0} \mathrm{Hom}_R(L_1, \mathcal{O}) \xleftarrow{f^0} \mathrm{Hom}_R(R, \mathcal{O}).$$

容易に判るようには f^0 は zero map, 従つて Ext の定義か
 ら $\mathrm{Ext}_R^1(\mathcal{O}, \mathcal{O}) = \mathrm{Ker} g^0$ を得る.

一方, exact sequence

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow R \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow 0$$

から

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Hom}_R(R, \mathcal{O}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_R(J, \mathcal{O}) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}_R^1(\mathcal{O}, \mathcal{O}) \\ & \searrow & \nearrow & & \\ & 0 & & & \end{array}$$

$$\longrightarrow \mathrm{Ext}_R^1(R, \mathcal{O}) = (0)$$

なる exact seq. を得るから, canonical に

$$(1.2) \quad \mathrm{Ext}_R^1(\mathcal{O}, \mathcal{O}) \simeq \mathrm{Hom}_R(J, \mathcal{O})$$

この $\mathrm{Ext}_R^1(\mathcal{O}, \mathcal{O})$ が, "R を固定しての \mathcal{O} の deformation"
 をつかまえる", と漠然たる意味で言うことが出来る. そ
 れは次にのべるような事情からである.

R の自分自身の中への derivations の有限生成 R 加群 \mathcal{D} が与えられたとしよう。このとき, R -linear map

$$\lambda: \mathcal{D} \longrightarrow \text{Hom}_R(J, \mathcal{O})$$

を $\lambda(\delta)(j) = \delta(j) \bmod J \in \mathcal{O} \quad (\delta \in \mathcal{D}, j \in J)$ で定義する。(1.2) により, canonical homomorphism

$$\beta: \mathcal{D} \longrightarrow \text{Ext}_R^1(\mathcal{O}, \mathcal{O})$$

が得られたと言ってもよい。こゝで

$$(1.3) \quad \nabla_R(\mathcal{O}, \mathcal{D}) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Coker } \beta$$

と定義する。 $\nabla_R(\mathcal{O}, \mathcal{D})$ は intrinsic に (即ち resolution (1.1) によらなうで) 得られたものだが, (1.1) を用いて表わすこともできる。これには

$$\text{Ext}_R^1(\mathcal{O}, \mathcal{O}) = \text{Kernel of } g^0: \text{Hom}_R(L_1, \mathcal{O}) \longrightarrow \text{Hom}_R(L_2, \mathcal{O})$$

を念頭において, R -linear map

$$\gamma: \mathcal{D} \longrightarrow \text{Hom}_R(L_1, \mathcal{O})$$

を

$$\gamma(\delta)(\xi) = \sum_{i=1}^m \xi_i \delta(f_i) \bmod J \quad (\delta \in \mathcal{D}, \xi \in L_1)$$

で定義すれば

LEMMA. $\text{Im}(\partial) \subseteq \text{Ker}(g^0)$ and

$$\nabla_R(\mathcal{O}, \mathcal{D}) \cong \text{Ker}(g^0) / \text{Im}(\partial).$$

Proof.

$$L_2 \xrightarrow{g} L_1 \xrightarrow{f} J \longrightarrow 0$$

is exact as above,

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{D} & \xrightarrow{\lambda} & \text{Hom}_R(J, \mathcal{O}) \\
 \searrow \partial & & \swarrow f^* \\
 & & \text{Hom}_R(L_1, \mathcal{O}) \\
 & & \swarrow g^0 \\
 & & 0
 \end{array}$$

is commutative diagram, and in this f^* is

$$\text{Hom}_R(J, \mathcal{O}) \cong \text{Ker } g^0 = \text{Ext}_R^1(\mathcal{O}, \mathcal{O}) \text{ of the same type.}$$

It is easy to check. It is easy.

THEOREM. Let \mathcal{D} be the following two conditions:

(A) $\delta \in H^i(\mathcal{D})$ ($i > 0$) then, R has an automorphism σ such that $\sigma(u) \equiv u + \delta(u) \pmod{H^{2i}}$ (for all $u \in R$)

存在する (=これを δ による Taylor 展開と呼ぶ). (たとえ
ば $R = \mathbb{R}[[x_1, \dots, x_n]]$, $H = (x_1, \dots, x_n)$ で $\mathfrak{A} = \sum R \frac{\partial}{\partial x_i}$
ならばこの条件は成立す. $u = \varphi(x) \in R$, (1) に対し $\sigma(u) =$
 $\varphi(x_1+h_1, \dots, x_n+h_n)$ とおけばよい.)
 $\delta = \sum h_i \frac{\partial}{\partial x_i}$

(B) $H^\nu \nabla_R(\mathfrak{A}, \mathfrak{A}) = (0)$ for $\nu \gg 0$.

これらの条件の下に, 次の性質をもつ非負整数の
組 (s, t, r) が存在する:

(*) L_1, L_2 は (1.1) の通りとし, 以下の3条件を満
足する任意の

$$L_2 \xrightarrow{g'} L_1 \xrightarrow{f'} R$$

を考える.

(i) $f'g' = 0,$

(ii) $g' \equiv g \pmod{H^s L_1},$

(iii) $f' \equiv f \pmod{H^t}$ with some integer $\nu \geq t$.

このとき, R の automorphism σ を

$$\sigma \equiv \text{id}_R \pmod{H^{\nu-r}}, \quad \sigma(\text{Im } f') = J$$

を満足するものが存在する.

略言すれば, f, g は十分近い f', g' で $f'g' = 0$
が成立せば, $J = \text{Im } f$ と $J' = \text{Im } f'$ とは R の autom. による

互に移り得て, $\mathcal{O} = R/J \cong R'/J'$ が得られるというのである.

定理の証明は §2 にまわして, これを用いて $I) \Rightarrow II)$ の証明ができることを示そう.

$I) \Rightarrow II)$. ^(標本の) R を体, J を formal power series ring $k[[x_1, \dots, x_n]]$ の ideal \mathcal{I} , local ring $\mathcal{O} = k[[x]]/J$ を考える. 上の記号に合わせれば $R_0 = k\{x\}$ (= Henselization of $k[x]_{(x)}$), ~~$R = k[[x]]$~~ , $\mathcal{D} = \sum R \frac{\partial}{\partial x_i}$ とする. $H = (x_1, \dots, x_n)$ とする.

$J = (f_1, \dots, f_m)$ とし $L_2 \xrightarrow{g} L_1 = R^m \xrightarrow{f} R \rightarrow 0$ を次のように取る. \mathcal{I} 定理の仮定(B): $H^1 \nabla_R(\mathcal{O}, \mathcal{D}) = 0$ for $\nu \gg 0$ が成立つてすれば, 定理に言う如き (s, t, r) が存在する. さて $g = (g_{ij}), f = (f_j); g_{ij}, f_j \in k[[x]]$ であり $f g = (f_j)(g_{jk}) = (\sum_j f_j g_{jk}) = 0$ である.

Artin の定理 I) ~~も~~ ^(方程式) _{連立}

$$\sum_{j=1}^m Y_{ij} Z_j = 0 \quad (i=1, \dots, l)$$

に適用すれば, f, g に十分近くてしかる成分が $k\{x\}$ に入る行列 f', g' が存在して $f'g' = 0$ をみたすことが判る. すると $L_2 \xrightarrow{g'} L_1 \xrightarrow{f'} R \rightarrow 0$ は (i)(ii)(iii) をみたすから, 定理により

$\hat{\mathcal{O}} \approx$ completion of $k\{x_1, \dots, x_n\}/(f_1, \dots, f_m)$
 が得られる。各 f_i は $k\{x\}$ の元であるから $k[[x]]$ 上に
 代数的、従って $\hat{\mathcal{O}}$ は代数的環体の local ring の完
 備化と同型である。これが II) であった。しかし
 仮定 (B): $H^v \nabla_R(\hat{\mathcal{O}}, \hat{\mathcal{O}}) = (0)$ for $v \gg 0$ を示すに
 はどうしたらよいか? そのために $\hat{\mathcal{O}}$ が孤立特異点
 であるという仮定が必要に存るのである。

$\hat{\mathcal{O}}$ が孤立特異点, すなわち極大 ideal を除く $\hat{\mathcal{O}}$ の
 (0 の) ~~素~~ prime ideal \mathfrak{p} に対し $\hat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{p}}$ は regular
 local ring であるを仮定しよう。 \mathfrak{p} に対応する $R = k[[x]]$
 の prime ideal を \mathfrak{P} とする: $\mathfrak{P}/\mathfrak{J} = \mathfrak{p}$. したがって $\hat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{p}} =$
 $R_{\mathfrak{P}}/\mathfrak{J}_{\mathfrak{P}}$ で, $R_{\mathfrak{P}} \cong \hat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{p}}$ は regular であるから, $d = \dim R_{\mathfrak{P}}$
 $- \dim \hat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{p}}$ とおけば $\mathfrak{J}_{\mathfrak{P}} = (f_1, \dots, f_d)$ と書ける。この f_i
 による Koszul complex

$$\begin{array}{c} (d) \\ (2) \end{array} \quad \prod R_{\mathfrak{P}} \xrightarrow{g} \prod R_{\mathfrak{P}} \xrightarrow{f=(f_1, \dots, f_d)} R_{\mathfrak{P}}$$

を考える。[Koszul complex の定義を思い出すならば,

(2) $\prod R_{\mathfrak{P}}$ の canonical basis を $(e_j)_{1 \leq j \leq d}$ と表かし

$$g(e_j) = f_i e_j - f_j e_i, \quad f(e_i) = f_i \quad \text{で定義する。}$$

($g, f \in$)

これから

$$\text{Hom}_{R_{\mathfrak{p}}} \left(\begin{matrix} (d) \\ \Pi R_{\mathfrak{p}} \end{matrix}, \mathcal{O}_{\mathfrak{p}} \right) \xleftarrow{g^{\circ}} \text{Hom}_{R_{\mathfrak{p}}} \left(\begin{matrix} d \\ \Pi R_{\mathfrak{p}} \end{matrix}, \mathcal{O}_{\mathfrak{p}} \right) \xrightarrow{\cong} \text{Hom}_{R_{\mathfrak{p}}} \left(\begin{matrix} d \\ \Pi \mathcal{O}_{\mathfrak{p}} \end{matrix}, \mathcal{O}_{\mathfrak{p}} \right)$$

$$\uparrow \partial$$

$$\mathcal{D}_{\mathfrak{p}} = \sum R_{\mathfrak{p}} \frac{\partial}{\partial x_i}$$

を考へれば、 g の定義から $g^{\circ} = \text{zero map}$, zero map ∂ は行列 $\partial(f_1, \dots, f_d) / \partial(x_1, \dots, x_n) \pmod{\mathfrak{J}}$ によって与えられる。 $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ の正則性の Jacobian criterion によればこの Jacobian matrix は $\text{mod } \mathfrak{p}$ で rank d をもつから、 ∂ は surjective である。よって前の Lemma によつて

$$\nabla_{R_{\mathfrak{p}}}(\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}, \mathcal{D}_{\mathfrak{p}}) = (0).$$

局所化はたいていの作用と commute するから、この左辺が

$$\nabla_R(\mathcal{O}, \mathcal{D}) \text{ の } \mathfrak{p} \text{ における局所化 } (\nabla_R(\mathcal{O}, \mathcal{D}))_{\mathfrak{p}} \text{ に等しいこと}$$

はすぐたしかめられる。しかし $(\nabla_R)_{\mathfrak{p}} = (0)$ ($\mathfrak{p} \neq \text{max. ideal}$) は $\text{Supp}(\nabla_R) \subseteq \{\mathfrak{m}\}$ を意味し、 $\nabla_R = \nabla_R(\mathcal{O}, \mathcal{D})$

は有限生成の \mathcal{O} 加群だから $\mathfrak{m}^n \nabla_R = (0)$ なる n が存在する。

~~よって~~ (いま \mathfrak{H} は R の極大 ideal である。) ところが証明すべきことであつた。

(\star ∇ の定義が intrinsic であることに注意) (1.3)

§ 2. 定理の証明.

正整数 a, b, c, s' を次のように定める.

- 1) $H^a \cdot \nabla_R(\mathcal{O}, R) = (0)$,
- 2) $H^\mu \cap J \subseteq H^{\mu-b} J$ for all $\mu \geq b$,
- 3) $H^\nu \cdot \text{Hom}_R(L_1, \mathcal{O}) \cap \text{Ker } g^\circ \subseteq H^{\nu-c} \text{Ker } g^\circ$
for all $\nu \geq c$,
- 4) $H^\mu \cdot \text{Hom}_R(L_2, \mathcal{O}) \cap \text{Im } g^\circ \subseteq H^{\mu-s'} \text{Im } g^\circ$
for all $\mu \geq s'$.

2), 3), 4) には Artin-Rees の定理を用いるのである. $s = \underbrace{s'+1}_t$ と $t = 2(a+b+c+s)$, $r = a + c$ とおく. この

(s, t, r) が定理の条件をみたす. 証明すべきことは

$$(*) \quad L_2 \xrightarrow{g'} L_1 \xrightarrow{f'} R \quad \text{が条件}$$

- (i) $f'g' = 0$,
- (ii) $g' \equiv g \pmod{H^s L_1}$,
- (iii) $f' \equiv f \pmod{H^\nu}$ with $\nu \geq t$

をみたすならば, R の autom. σ で

$$\sigma \equiv \text{id}_R (H^{\nu-r}), \quad \sigma(\text{Im } f') = J$$

を満足するものが存在する

∴ $f' = f + \xi, g' = g + \eta$ とおけば, $f'g' = 0$

∴ $f\eta + \xi g + \xi\eta = 0, \quad \rightarrow \xi \equiv 0 (H^v),$

$\eta \equiv 0 (H^s), J = \text{Im}(f), f \circ \tau$

$$\xi g \equiv 0 (J + H^{v+s}).$$

$\bar{\xi} = \xi \text{ mod } J \in \text{Hom}_R(L_1, \mathcal{O})$ とおけば $g^0(\bar{\xi}) \equiv 0 (H^{v+s}\mathcal{O})$

$f \circ \tau \circ \tau \circ \tau$ 1) ∴ ∴

$$g^0(\bar{\xi}) \in H^{v+s} \cdot \text{Hom}_R(L_2, \mathcal{O}) \cap \text{Im}(g^0)$$

$$\subseteq H^{v+t} \text{Im}(g^0) = g^0(H^v \cdot \text{Hom}_R(L_1, \mathcal{O}))$$

∴ 4) ∴

$$\bar{\xi}'' \in H^{v+t} \cdot \text{Hom}_R(L_1, \mathcal{O}), \quad g^0(\bar{\xi}'') = g^0(\bar{\xi})$$

∴ $\bar{\xi}''$ が存在する. $\bar{\xi}''$ を induce する $\xi'' \in H^{v+t} \text{Hom}_R(L_1, R)$

とて $\xi' = \xi - \xi''$ とおけば, L から

$$g^0(\bar{\xi}') = g^0(\bar{\xi}) - g^0(\bar{\xi}'') = 0,$$

i.e. $\xi' g \equiv 0 (J).$

$\xi \equiv 0 (H^v), \xi'' \equiv 0 (H^{v+t})$ 故に $\xi' \equiv 0 (H^v),$

$$\bar{\xi}' \in H^v \cdot \text{Hom}_R(L_1, \mathcal{O}) \cap \text{Ker } g^0$$

$$\subseteq H^{v-c} \text{Ker } g^0.$$

∴ $\nabla_R(\mathcal{O}, R) = \text{Ker } g^0 / \partial(\mathcal{D})$ 故に 1) ∴ ∴

$H^a \cdot \text{Ker } g^0 \subseteq \partial(\mathcal{D}),$ 故に $v-c \geq t-c > a$ 故に

112

$$H^{\nu-c} \text{Ker } g^0 \subseteq H^{\nu-c-a} \partial(\mathcal{D}) = \partial(H^{\nu-c-a} \mathcal{D}). \quad \text{よって}$$

$\xi' = \partial(\delta)$ となるように $\delta \in H^{\nu-c-a} \mathcal{D}$ が存在する.

仮定 (A) により, R の autom. τ を

$$\tau(u) \equiv u + \delta(u) \quad (H^{2(\nu-c-a)}) \quad \text{for all } u \in R$$

と仮定して存在する.

$$f' - \tau(f) \equiv f' - f - \delta(f) \quad (H^{2(\nu-c-a)})$$

$$\equiv \xi - \xi' \quad (J)$$

$$= \xi'' \equiv 0 \quad (H^{\nu+1})$$

$(2\nu - 2c - 2a) - (\nu + 1) = \nu - 2(a+c) - 1 > 0$ となるから, $\tau \equiv \text{id} (H^{\nu-c-a})$
 となる.

$$f' - \tau(f) \equiv 0 \quad (\text{mod } (J + H^{\nu+1}) \cap H^{\nu-c-a})$$

$$\text{よって } (J + H^{\nu+1}) \cap H^{\nu-c-a} = (J \cap H^{\nu-c-a}) + H^{\nu+1}$$

$$\subseteq H^{\nu-c-a-b} J + H^{\nu+1}$$

よって

$$\lambda_0 \in H^{\nu-a-b-c} \text{Hom}_R(L_1, L_1),$$

$$f' - \tau(f) - f \circ \lambda_0 \equiv 0 \quad (H^{\nu+1})$$

よって λ_0 が存在する. $\lambda = \tau^{-1}(\lambda_0)$ とおけば ($\Rightarrow \tau$)

$\tau \in L_1 = R^m$ の autom. は 拡張して同じ文字で表すこと,

$$\tau \equiv \text{id} (H^{\nu-a-c}) \text{ により } \lambda \equiv 0 (H^{\nu-a-b-c}).$$

また $f \equiv \tau(f) \pmod{H^{\nu-a-c}}$ から

$$f \cdot \lambda_0 = \tau(f) \cdot \tau(\lambda) \equiv \tau(f\lambda) \pmod{H^{2\nu-2a-b-2c}}$$

$$2\nu-2a-b-2c > \nu+1 \quad \text{だから}$$

$$f' - \tau(f) - \tau(f\lambda) \equiv 0 \pmod{H^{\nu+1}}$$

さて, $1+\lambda$ は Z_1 の autom. である (何故なら $\det(1+\lambda) \equiv 1 \pmod{H}$ で $H \subseteq \text{rad}(R)$ だから $\det(1+\lambda)$ は R の unit).

これから

$$\tau^{-1} \cdot (f') \cdot (1+\lambda)^{-1} \equiv f \pmod{H^{\nu+1}}$$

よって

$$f'' = \tau^{-1} f' (1+\lambda)^{-1}, \quad g'' = (1+\lambda) \tau^{-1} g'$$

とある。すると f'', g'' は (*) の条件 (i) (ii) (iii) を ν の代りに $\nu+1$ を入れても満足する。実際 (ii) は

$$g'' \equiv (1+\lambda) \tau^{-1} g', \quad \tau \equiv \text{id} \pmod{H^{\nu-c-a}},$$

$$1+\lambda \equiv \text{id} \pmod{H^{\nu-a-b-c}},$$

$$\nu-a-b-c \geq t-a-b-c > s,$$

$$\therefore g \equiv g' \equiv g'' \pmod{H^s}.$$

また (iii) $f'' \equiv f \pmod{H^{\nu+1}}$ はすでに証明されている。

この手続きを無限に繰り返す。すると R の autom. τ_1, τ_2, \dots で $\tau_i \equiv \text{id} \pmod{H^{\nu+i-1-r}}$ なるもの, および

L_1 の autom. $1+\lambda_1, 1+\lambda_2, \dots$ で $\lambda_i \equiv 0$.
 $(H^{n+i-1-a-b-c})$ をみたすものが ~~あり~~^{得られ}, R の完備性から
 無限積 $\dots \tau_2^{-1} \tau_1^{-1}, (1+\lambda_1)^{-1} (1+\lambda_2)^{-1} \dots$ は夫々収束す
 る. これらを $\sigma (\in \text{Aut}(R)), \Lambda (\in \text{Aut}_R(L_1))$ で表し
 せば

$$\sigma \cdot f' \cdot \Lambda = f$$

従って $\sigma(\text{Im } f') = \text{Im } f = J$, 且 $\sigma \equiv \text{id} (H^{n+r})$.

Q. E. D.