

semigroups の収束性とその応用

早大, 理工 洲之内 裕男

§1 Abstract Cauchy problem と semigroups の収束

$$(1.1) \quad \frac{du}{dt} = Au, \quad u(0) = u_0.$$

E Banach 空間 X で考へる. A は densely defined, closed l. op.
 とし core D (D は dense で, $\overline{A|_D} = A$) をとりとする.

これは差分近似に対応する方法は, $\{A_n\}$ による意味
 で A を近似する有界作用素の列:

$$(1.2) \quad A_n u \rightarrow Au, \quad u \in D$$

($\epsilon > 0$ とし, $\{A_n\}$ は A と consistent とし) とし,

$$(1.3) \quad \frac{du}{dt} = A_n u, \quad u(0) = u_0.$$

この方程式の列を考へる. (1.3) は (1.1) の (semi-discrete)
 difference scheme と呼ぶ. A_n は有界作用素だから, (1.3)
 の解 u_n は

$$(1.4) \quad u_n(t) = \exp(tA_n)u_0 \equiv T_n(t)u_0.$$

つまり, $\{T_n(t); t \geq 0\}$ は unif. cont. semigroups の列である.
 この semigroups の列の適当な条件下に (1.1) の解に収束する u が存在すると, (1.1) は解 u を持つことになる. このよう
 な議論は Trotter に始まるが, Cauchy 問題の可解性は semigroups
 の列の収束性には帰着される.

定理 1. Consistency cond. の下で, (1.3) の解は,

$$(1.5) \quad \sup \| \exp(tA_n) \| < \infty \quad \text{for each } t > 0$$

$$\exists \gamma > 0; \sup \int_0^\infty e^{-\gamma t} \| \exp(tA_n) \| dt < \infty$$

$$(1.6) \quad s\text{-}\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda R(\lambda; A_n) = I, \quad \text{unif. in } n,$$

$$(1.7) \quad \rho(A) \cap \{ \lambda; \operatorname{Re} \lambda > \gamma \} \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow u_n(t) = T_n(t)u_0 \rightarrow u(t) = T(t)u_0, \quad (\text{where } \{T(t); t \geq 0\})$$

は $(0, A)$ -semigr. であり, (1.6), (1.7) の意味で (1.1) の解

が存在:

$$\frac{d T(t)u}{dt} = A T(t)u,$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} T(t)u = u$$

for $u \in D(A)$.

(1.5) の代りに,

$$(1.5^0) \quad \sup \| \exp(tA_n) \| \leq M e^{\omega t}$$

$\Rightarrow \{T(t)\}$ は (C_0) -semigroup である.

証明は, 大森 - 洲之内 [4].

∴ \mathcal{D} , semigroup $\{T(t)\}$ の $u < \mathcal{D}$ の class \mathcal{E} 上 \mathcal{D} となる。
 < 有界線形作用素の族 $\{T(t); t > 0\}$ を一般に semigroup
 と作るとは,

$$(1.8) \quad T(t)T(s) = T(t+s), \quad t, s > 0$$

$$(1.9) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} T(t)x = T(t_0)x, \quad t_0 > 0$$

としよう。このとき, type $\omega_0 = \lim_{t \rightarrow \infty} t^{-1} \log \|T(t)\|$ が定まる。

semigr. $\{T(t)\}$ の class (A) とは, $X_0 = \bigcup_{t>0} T(t)[X]$ が \mathcal{D} 上で
 dense なる, $\exists \omega_1 > \omega_0; \forall \lambda; \operatorname{Re} \lambda > \omega_1$ に於て, \mathcal{D} の l. op. $R(\lambda)$
 が定義される,

$$(a) \quad R(\lambda)x = \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} T(t)x dt, \quad x \in X_0,$$

$$(b) \quad \sup_{\operatorname{Re} \lambda > \omega_1} \|R(\lambda)\| < \infty$$

$$(c) \quad s\text{-}\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda R(\lambda) = I$$

としよう,

$$(d) \quad \int_0^1 \|T(t)x\| dt < \infty, \quad \text{または, } (d') \int_0^1 \|T(t)\| dt < \infty$$

のとき, それぞれ $(0, A)$, または $(1, A)$ -class としよう。

Abstract Cauchy problem (1.1) が定理 1 の意味で解けるとき,
 $(0, A)$ -well-posed, $(1, A)$ -well-posed といいることができる。こ
 れを一般に, semigroup の意味で well-posed が定義
 できる。

これを文は, $u_0 \in D(A \text{ core})$ に於て, 唯一の genuine

solution $u(t) = T(t)u_0$. かつ $\|T(t)u_0\| \leq M_t \|u_0\|$

と存在するとき, この $\{T(t)\}$ の集合 \rightarrow の拡張は semigr. と

可: \times 可 \rightarrow 之 \rightarrow . \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow , §1.1) は S. G. well-posed \rightarrow \rightarrow

3. (genuine sol. $u(t) = u(t, u_0)$ \rightarrow は, A.C., cont. diff. \rightarrow ,

$u(t) \in \mathcal{D}(A)$ \rightarrow , $\frac{du}{dt} = Au(t)$, $t > 0$, $u(t, u_0) \rightarrow u_0$ ($t \rightarrow 0$))

§2. Semi-discrete difference scheme の収束.

上の定理 1 は, Cauchy 問題の well-posed であることが複雑
難くないから,

定理 2. Cauchy 問題 (1.1) \rightarrow $(0, A)$ -well-posed, \rightarrow type
 $\rightarrow \omega_0$ と存在するとき, consistent \rightarrow difference scheme (1.3) \rightarrow ,
stability cond.

$$(2.1) \quad \exists \gamma (> \omega_0), L > 0; \quad \|R(\lambda; A_n)\| \leq L \quad \text{for } \operatorname{Re} \lambda > \gamma,$$

$$(2.2) \quad \sup_n \|\exp(tA_n)\| < \infty, \quad t > 0$$

$$\Rightarrow u_n(t) \rightarrow u(t) \quad \text{for } t > 0.$$

この条件は比較的見やすい。

まず之は, 定数係数の偏微分方程式

$$(2.3) \quad \frac{du}{dt} = P(D)u, \quad u(0) = u_0$$

$\in L^2(\mathbb{R}^d)$ \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow . $u \in L^2$ の Fourier 変換 $\rightarrow \hat{u}(\xi)$ \rightarrow \rightarrow

と \rightarrow , (2.3) は

$$(2.4) \quad \frac{d\hat{u}}{dt} = P(\xi)\hat{u}(\xi, t), \quad \hat{u}(\xi, 0) = \hat{u}_0$$

いま, $\frac{\partial u_j}{\partial x_k}$ の差分近似として, 中心差分

$$\frac{\delta u_j}{\delta x_k} = \frac{u_j(x + h_k e_k) - u_j(x - h_k e_k)}{2h_k}$$

(e_k は k 方向単位ベクトル) として, (2.3) の $D \varepsilon$ の中心差分を用いた ε の Fourier 変換を考えると,

$$(2.5) \quad \frac{d \hat{u}}{dt} = P(\xi, h) \hat{u}(\xi, t), \quad \hat{u}(\xi, 0) = \hat{u}_0,$$

$$\xi(h) = (\xi_1(h), \dots, \xi_d(h)) = \left(\frac{\sin(h_k \xi_k)}{h_k} \right) \quad \text{と なる.}$$

(2.5) の解は,

$$\hat{u}_h(t, \xi) = \exp(tP(\xi(h))) \hat{u}_0(\xi) = \exp(tA_h) \hat{u}_0(\xi).$$

$$\varepsilon = \delta \text{ として, } |\xi| \leq \pi/2h \text{ として, } |\xi|/2 \leq |\xi(h)| \leq |\xi| \text{ となる.}$$

よって,

$$\sup_{\xi(h)} |(\lambda I - P(\xi(h)))^{-1}| \leq \sup_{\xi} |(\lambda I - P(\xi))^{-1}|,$$

$$\sup_{\xi(h)} |\exp(tP(\xi(h)))| \leq \sup_{\xi} |\exp(tP(\xi))|$$

となり, これは (2.1), (2.2) の条件を満たす. よって,

定理 3. 定数係数の Cauchy 問題 (2.3) の $L^2(\mathbb{R}^d)$ の $(0, A)$ -, あるいは (C_0) -well-posed とする, ならば, 解は収束する difference schemes が存在する.

§3. 例と微分可能性に ついての comment.

$L^2(\mathbb{R})$ の定数係数の Cauchy 問題を考へる. Fourier 変換を \mathcal{F} とし (2.4) の形に $1 \leq \beta < \infty$,

$$(3.1) \quad P(\xi) = \begin{pmatrix} -\xi^2 + i\xi^\beta & \xi^\beta \\ -\xi^2 + i\xi^\beta & \xi^\beta \end{pmatrix}$$

に $\beta > 2$ とし. ξ^2 は exponent $h=2$ の (Shilov の意味での) parabolic eq. である.

$$(3.2) \quad \exp(tP(\xi)) = \begin{pmatrix} \exp(t(-\xi^2 + i\xi^\beta)) & t\xi^\beta \exp(t(-\xi^2 + i\xi^\beta)) \\ \exp(t(-\xi^2 + i\xi^\beta)) & \xi^\beta \exp(t(-\xi^2 + i\xi^\beta)) \end{pmatrix}$$

である, $\sup_{\xi} |\exp(tP(\xi))| < \infty$, for each $t > 0$, $\beta > 2$ S.G.-well-posed.

$$(3.3) \quad R(\lambda; P(\xi)) = \begin{pmatrix} 1/(\lambda + \xi^2 - i\xi^\beta) & \xi^\beta / (\lambda + \xi^2 - i\xi^\beta)^2 \\ 1/(\lambda + \xi^2 - i\xi^\beta) & \xi^\beta / (\lambda + \xi^2 - i\xi^\beta)^2 \end{pmatrix}$$

$\beta > 2$, $\beta > 8 \Rightarrow P(\xi)$ の resolvent set $= \emptyset$,

$\beta \leq 4 \Rightarrow (0, A)$ -well-posed,

$\beta \leq 2 \Rightarrow (C_0)$ -well-posed (Kreiss の matrix th. による)

$5 \leq \beta \leq 8 \Rightarrow (A)$ -well-posed. $\lambda = -\xi^2 + i\xi^\beta$ の sector $\Sigma = \{ \arg \lambda \leq \frac{\pi}{2} + \theta_0 \}$ を含む.

$\lambda = -\xi^2 + i\xi^\beta$. $\beta > 2$, sector $\Sigma = \{ \arg \lambda \leq \frac{\pi}{2} + \theta_0 \}$ を含む.

$\Sigma = \Sigma'$,

$$(3.4) \quad |\lambda| \|R(\lambda; P(\xi))\| \leq P(|\lambda|) \quad P \text{ は多項式.}$$

とあり, Lagnese[2]は,

$$T(t)x = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} e^{\lambda t} R(\lambda; A) x \, d\lambda$$

と定義すると, $\{T(t)\}$ は semigr. を作り, L かつ, $T(t)x$ は $t=0$ (無限回微分可能)で,

$$\frac{d^n T(t)x}{dt^n} = A^n T(t)x$$

と示すことができる。実際は, Agmon-Nirenberg[1]の表
 示した方程式の解の存在を示すのが目的。

また, semigr. の微分可能性の問題は (C_0) ($(0, A)$) であり,
 Pazy[5]で解決されている。

§4. Perturbation.

定理 [3] 2), $\{T(t)\}$ は $(1, A)$ -semigr., A は X の generator と
 するときは, perturbed op. B かつ, $\mathcal{D}(B) \supset \mathcal{D}(A)$ 2),

i) 有界作用素 B_n ; $B_n x \rightarrow Bx$, $x \in \mathcal{D}(A)$,

ii) $\sup \int_0^1 \|B_n T(t)\| \, dt < \infty$

$\Rightarrow A + \varepsilon B$ は $(1, A)$ -semigr. を生成する, $\varepsilon > 0$ の定理を示

す。3) の証明で, semigr. の perturbation は本質的に,

1) B が有界作用素のときの perturbation と,

2) semigr. の列の収束性

からなる ε と ε を示す。 u は $(0, A)$ - ε であり、 u は (A) -semi-gr. の収束性から u は ε である。 1) の u は (A) -semi-gr. である。 (2) の同様の形の perturbation から u は ε である。 u は ε の解である。

2) 大 (C_0) -semi-gr. の perturbation は相違する。 差分法の perturbation である。 \Rightarrow 3) の問題である。

Cauchy 問題 $\frac{du}{dt} = Au$, $u(0) = u_0$ は (C_0) -well-posed.

$$u((m+1)h_n) = C_n u(mh_n), \quad u(0) = u_0$$

3) difference scheme は stable である。 3) の解 $u_n([t/h_n]h_n) \rightarrow u(t)$ である。 Perturbed eq.

$$(4.1) \quad \frac{du}{dt} = Au + Bu, \quad u(0) = u_0$$

ε を与えるとき、 B は consistent である。 差分近似 B_n であるとき、 C_n, B_n より (4.1) の stable scheme を作る。

定理. B は (unbd.) l.o.p. である。 $\mathcal{D}(B) \supset \mathcal{D}(A)$,

B は consistent である。 $\{B_n\}$ である。 十分大きい λ である。

$$(4.2) \quad N_\lambda = \sup_{\|u\|=1} \sup_n h_n \sum_{j=1}^{T_n} \exp(-\lambda j h_n) \|B_n C_n^j u\| < 1$$

\Rightarrow

$$u_n(h_n) = C_n u$$

$$(4.3) \quad u_n(mh_n) = (C_n(I + h_n B_n))^{m-1} C_n u, \quad m \geq 2$$

3) scheme は (4.1) の解に収束する。

これは高次の定理の difference analogy.

この証明は (2), parabolic eq. は低次の項を ε だけ加える
 と ε を ε とする。

$$\frac{du}{dt} = P(D)u + Q(D)u,$$

$u' = P(D)u$ は (Petrovski の意味で) parabolic, order $2p$,
 $Q(D)$ の order $q < 2p$ とする。このとき, Aronson 等によ
 り, $P(D)$ は consistent, stable な parabolic difference
 scheme (amplification matrix の固有値 εp_i とする ε ,
 $|p_i| \leq 1 - \delta |\xi|^{2p}$ ε だけ加える) が存在する ε と ε だけ加
 える。このとき, $Q(D)$ は consistent な ε だけ加える,
 D は 1 階の difference operator Δ に近似する ε だけ加える,
 上の (4.2) は満足する ε だけ加える。これは,

$$\|\Delta^j C_n^{-j} u_0\| \leq C_j \cdot ((j+1)h_n)^{-j/2p} \|u_0\| \quad (j \leq 2p)$$

$$\text{よって, } h_n \sum_{j=1}^{T_n} \exp(-\lambda j h_n) \|B_n C_n^{-j} u_0\| \leq \int_0^\infty e^{-\lambda t} t^{-3/2p} \|u_0\| dt \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow \infty)$$

に於ける。

つまり, Thomée [7] に於ける L^2 での parabolic difference scheme
 での perturbation of lower order terms は常に stable な ε だけ
 加える。 (このとき, Shilov の意味で parabolic, (C_0) -well-
 posed のとき, 微分方程式の ε だけ加えると同じ ε だけ加える。)

文献

- [1] Agmon -Nirenberg: Properties of solutions of ordinary differential equations in Banach space, C.P.A.M. 16(1963) 121-239
- [2] Lagnese: On equations of evolution and parabolic equations of higher order in t , to appear.
- [3] Miyadera: Perturbation theory for semigroups of operators, 数学 20(1968) 14-25
- [4] Oharu and Sunouchi: On the convergence of semigroups of linear operators, J. Funct. Analysis, to appear.
- [5] Pazy: On the differentiability and compactness of semigroups of linear operators, J. Math. Mechn. 17(1968) 1131-1141
- [6] Sunouchi: Perturbation theory of difference schemes, Num, Math. 12(1968) 454-458
- [7] Thomée: Parabolic difference operators, Math. Scand. 19(1966) 77-107
- [8] Thomée: Stability theory for partial difference operators, SIAM Review 11(1969) 152-195