

年間の実験のビデオのマスターテープからのダビング作業、及び実験を行う度に行ってきた行動解析を全体的に再度見直しデータを精緻化する作業を行った。また、本研究課題とは別に行ったヒト幼児(1~5歳児)を被験者とした類似条件下での砂の対象操作実験結果のとりまとめも行い、本研究との系統比較を合わせて行った。砂の操作行動は、2歳齢段階では大半が砂と身体との直接的な関わりであったが、3歳齢段階以降では、道具を使っての砂の操作が現れ始め、3歳6ヶ月齢段階では明確に砂を道具間で移動させる操作等が出現し、さらに4歳齢段階以降では、砂をコップに入れて砂を飲み物に見立てた“飲むふり”を行ったと理解できる操作や、砂を他者に投げつけるという自身-砂-他者の三項関係の操作も見られた。これらの発達傾向をヒト幼児(1~5歳児)においておこなった類似条件下での砂の対象操作行動の発達とチンパンジーのそれとは実は大筋あまり違いがなく、細かな質的な差を以って両者の違いが示され得るという興味深い結果を得た。

8 絵画的奥行き知覚に関する比較認知科学的検討

伊村知子(関西学院大・院・文)

対応者:友永雅己

ニホンザルの乳児8個体(15-25週齢)とチンパンジーの成体1個体(Pan, 22歳)を対象に、影を手がかりとした物体の3次元空間位置の知覚について馴化-脱馴化法を用いて検討した。

ボールの2次元的な運動の軌跡は同じにもかかわらず、影の運動の軌跡により奥行方向にボールが運動するように知覚される動画(Depth)と、床面から浮かび上がって上昇方向に運動するように知覚される動画(Up)を作成した。「Depth」を4試行繰り返しモニターに呈示して馴化させた後、テストではその運動の軌跡を水平方向に反転させた「Depth」と「Up」を1試行ずつ呈示し、いずれを長く注視するかを分析した。1試行の刺激呈示時間は20秒とした。その結果、テストの2種類の動画はいずれも新奇な刺激であったが、ニホンザルの乳児とチンパンジーの成体は「Depth」よりも「Up」に対しより長い注視反応、すなわち新奇選好を示した。したがって、影を手がかりに物体の3次元の運動方向の差異を弁別していた可能性が示唆された。「Up」に対する注視反応の増加が3次元空間位置の違いに基づくものかを検証するためにはさらなる検討が必要である。

9 食物を介した母子間交渉の種間比較

上野有理(東京大・院・総合文化)

対応者:友永雅己

ヒト母子との比較を目指し、チンパンジー母子1ペアを対象に、食物を介した母子間交渉の発達を検討した。具体的には、参与観察場面において、実験者がチンパンジーの母親に食物を渡し、その後みられる母子間交渉を観察・分析した。子どもが10ヶ月~1歳11ヶ月齢までと、2歳~2歳11ヶ月齢までの交渉を比較したところ、母親から子どもへ食物が受け渡される頻度や、子どもの発声頻度に相違のあることが明らかになった。母親から子どもへの食物の受け渡しは、2歳齢以降でより頻繁に観察された(chi-square test; $p < 0.05$)。また母親との交渉場面において、子どもは2歳齢以降、より頻繁にフィンパーを発声した(Fisher's exact probability test; $p < 0.01$)。食物を介した交渉場面でのフィンパー発声は、要求行動の1つといわれている。発声頻度が増加した2歳齢以降において、発声のない場合に比べ、ある場合により頻繁に食物が受け渡されるかを検討したところ、発声のある場合は75%、発声のない場合は57%の割合で受け渡しがみられたが、有意差はなかった(Fisher's exact probability test; $p = 0.26$)。さらなる分析により、発声のさいの子どもの視線方向や、発声後の子どもの行動、それに付随する食物の受け渡しの有無が、時系列的に変化することも示唆され、フィンパー発声の機能を検討するためには、より多角的な分析が必要と考えられた。

10 Colobinae におけるシセンキンシコウの社会構造の特徴と由来

和田一雄

対応者:渡邊邦夫

One male unit(OMU), band, all male group からなる herd はアジアに分布する Colobinae の中でどのような位置付けになるのかを検討した。すなわち6-9つのOMU からなる band はほかの band と緩やかな社会関係を保って multi-band を形成する。それは all male group とオスの出入りを通して社会的関係を結び、herd となる。このような重層構造はわれわれが調査しているシセンキンシコウ(Rhinopithecus roxellana) でだけ知られている。

アジアには Colobinae が30種生息するが、そのうち社会構造に言及されている11種類を概観すると、全部の種類がOMUとall male groupを有する。そのうちテングザルとキンシコウ4種はさらにbandを形成する。アジアの Colobinae は late Miocene にヨーロッパからシ