

腫瘍ノ「イムペヂン」現象

第四報 可移植性動物腫瘍ノ「イムペヂン」ハ蛋白質 體側ニアルカ或ハ類脂體側ニアルカ

京都帝國大學醫學部外科學教室(鳥瀨教授指導)

講師 醫學士 藤 浪 修 一

Die Impedinerscheinung bei Geschwülsten.

IV. Mitteilung: Mit welchem Bestandteile der transplantablen Tiergeschwülste ist die Impedinwirkung verbunden?

Von

S. Fujinami, Dozenten der Klinik.

[Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Universitätsklinik **Kyoto**

(Direktor. Prof. Dr. **R. Torikata**.)]

Testmaterialien.

Wir haben die in der II. Mitteilung erwähnten Extrakte des transplantablen Hühnermyxosarkoms und Kaninchenfibrosarkoms als Ausgangsmaterialien herangezogen. Von diesen Extrakten stellen wir nach der Angabe von *Y. Aoyagi* (vgl. *R. Torikata*, Die Impedinerscheinung, *Jena* 1930. S. 813) weitere Testmaterialien, wie Orig.—Lp. und Lp. her; und zwar sowohl im nativen als auch im 30 Min. lang abgekochten Zustande.

Versuchsordnung.

Wie in der I. Mitteilung erwähnt, haben wir die Testmaterialien Orig.—Lp. und Lp. auf die Impedinerscheinung, die sich in der Förderung der normalen Phagozytose von Staphylokokken in vitro dokumentiert, geprüft.

Versuchsergebnisse.

Der Ergebnisse der Prüfungen gehen aus Fig. 1—4 deutlich hervor.




Fig. 1.

Untersuchung des entfetteten Extraktes (Orig.-I.p.) von Hühnermyxosarkom auf das Impedin.

- I=Verschiebung des Phagozytatswertes je nach der Testdosis von nativem Orig.-I.p.
- II=Do. von Orig.-I.p., das bei 100°C eine halbe Stunde lang abgekocht worden war.
- III=Phagozytat bei zu 0.5 proz. karbolisierter 0.85 proz. NaCl-Lösung ohne Testmaterialien.




Fig. 2.

Untersuchung der vom Hühnermyxosarkom in den Aether übergegangenen Substanzen (I.p. als eine Kochsalzemulsion) auf des Impedin.

- I=Verschiebung des Phagozytatswertes je nach der Testdosis von nativem Lp.
- II=Do. von Lp., die bei 100°C eine halbe Stunde lang abgekocht worden waren.
- III=wie bei Fig. 1.




Fig. 3.

Untersuchung des entfetteten Extraktes (Orig.-I.p.) von Kaninchenfibrosarkoms auf das Impedin.

- I, II u. III=wie bei Fig. 1, nur dass anstatt Hühnermyxosarkoms Kaninchenfibrosarkom herangezogen worden ist.




Fig. 4.

Untersuchung des vom Kaninchenfibrosarkom in den Aether übergegangenen Substanzen (I.p. als eine Kochsalzemulsion) auf das Impedin.

- I, II u. III=wie bei Fig. 2, doch nicht bei Hühnermyxosarkom, sondern bei Kaninchenfibrosarkom.

Zusammenfassung.

1) Die Impedinerscheinung wurde sowohl bei Hühnermyxosarkom als auch bei Kaninchenfibrosarkom *nur in den entfetteten Extrakten* nachgewiesen. *Die in den Extrakten enthaltenen Lipoiden wiesen gar keine Spur von Impedin auf.*

2) Die die Phagozytose fördernde Antigenavidität der in den Aether übergegangenen Substanzen, die ja mit einer ganz kleiner Menge vom Proteinkörpern verunreinigte Lipoid darstellen, wurde infolge der Abkochung bis zu einem gewissen Grade verkleinert (vgl. Fig. 2 u. 4). Dies lehrt uns, dass die dabei in Betracht kommenden Proteinkörper durch Siedehitze geronnen bzw. inaktiviert worden waren.

3) Auch bei transplantablen Tiergeschwülsten ist die Impedinenergie nicht mit Lipoiden, sondern nur mit koktostabilen Eiweisskörpern verbunden. *Eiweisskörper, deren Antigenavidität trotz Siedehitze nicht inaktiviert, sondern koktostabil ist stellen laut der Impedintheorie nichts anderes als mikrobiotische dar.*

4) Aus dieser Nebeneinanderstellung der Tatbestände unserer Prüfungen geht deutlich hervor, dass die Extrakte der transplantablen Tiergeschwülste *mikrobiotische Eiweisskörper* enthalten; und zwar in dem Masse, dass die Impedinerscheinung sehr deutlich an den Tag tritt.
(Autoreferat)

緒 言

人ノ肉腫及ビ可移植性動物腫瘍ニハ例外無シ「イムペヂン」ガ含有サレテ居ルコトガ立證サレタ。然ラバ此等腫瘍ノ「イムペヂン」ハ果シテ既知細菌體ニ於ケルト同様ニ蛋白質體側ニアルモノデアラウカ。

家雞粘液肉腫ニ就テハ既ニ青柳博士ガ「イムペヂン」勢力ハ蛋白質體側ニ附帶シテ居ルコトヲ立證シタ。故ニ余ハ此ノ追試ヲ行ヒ、更ニ家兎纖維肉腫ニ就テモ吟味シヨウト思フ。

檢 査 材 料

1. 黄色葡萄状球菌液(第一報参照)

2. 供試腫瘍

イ 家雞粘液肉腫

ロ 家兎纖維肉腫

3. 抗元液

供試腫瘍ヨリ次記ノ液ヲ作ツテ検査ニ供シタ。

一、生 脱 脂 液

既ニ發表シタ方法デ作ツタ生液ノ一定量ヲ液體分離器ニ採リ、メルク製「エーテル」ヲ先ヅ其ノ半分量ダケ注加シテ、次デ徐々ニ良ク振盪混合シ、更ニ同量ノ「エーテル」ヲ注入シテ、同操作ヲ繰返シ、ソノ後更ニ同量ノ「エーテル」ヲ混和シテ反覆振盪操作ヲ繰返スコト約3時間デ室溫ニ放置シ、「エーテル」ト原液トガ明白ニ分離スルヲ待ツテ、分離器下部ノ栓ヲ開キ、靜カ

=下層ニアル原液ヲ「シャーレ」中ニ移シ、37°Cノ孵卵器中ニ入レ、全ク「エーテル」臭ノ消失スルノヲ確メテ供試材料トシタ。此ノ場合水分ノ消失ハ計上シテ居ラス。

二、煮 脱 脂 液

生脱脂液ノ一部ヲ採ツテ、硝子製「アンプル」中ニ封入シ、100°Cデ沸騰シツ、アル重湯煎中ニテ30分間煮沸シタモノデアル。

三、生 類 脂 體 液

一、ノ操作ニテ得タル「エーテル」層ヲ「シャーレ」中ニ移シ、直チニ大約原液ト等量ノ0.5%石炭酸加0.85%食鹽水ヲ注加シ、良ク振盪シタ後、全體ヲ37°Cノ孵卵器中ニ靜置シ、「エーテル」臭ガ消失スルノヲ待ツテ取り出シタモノデ殆ンド水様透明デアル。

四、煮 類 脂 體 液

生類脂體液ノ一部ヲ硝子製「アンプル」ニ封入シ、100°Cデ沸騰シツ、アル重湯煎中ニテ30分間煮沸シタモノデアル。

何レノ抗元液モ煮沸後ニ沈澱物等ハ出來ナカッタ。

檢 査 方 法

既ニ發表シタ試験管内抗黄色葡萄狀球菌正常喰菌現象検査法ニ據ツタ。

實 驗 成 績


第一、家雞粘液肉腫

I, 脱脂家雞粘液肉腫液ニ就テノ検査 (第1表及ビ第1圖)

第 1 表 (第1圖參照)

抗 元 量	生				煮				對 照
	9.1	0.2	0.4	0.6	0.1	0.2	0.4	0.6	
喰	8.5	17	11.5	9	9	20.5	14	12.5	4
菌	10	23.5	17	15	13.5	26	20	16	5.5
子	18.5	40.5	28.5	24	22.5	46.5	34	28.5	9.5
子ノ百分比	39.3	86.1	60.6	51.2	50.2	100	72.3	60.6	22.3

第1圖 家雞粘液肉腫脱脂浸出液ヲ以テノ噬菌作用「イムペヂン」現象 (第1表參照)



I = 生液ノ子ノ百分比ヲ示ス曲線
 II = 煮液ノ同上
 III = 對照食鹽水ノ同上

所 見

1) 抗原量ヲ0.1, 0.2, 0.4及ビ0.6ccニ變化セシメダコトニ依リ, 上行位相及ビ下行位相ノ全反應經過ヲ觀ルコトガ出來タ。而シテ, 抗原量0.2ccノ場合ニ, 生煮何レモ最大ノ(噬菌)「子」數ヲ得テ居ル。

2) 各抗原量ニ就テ, 生煮兩液ノ(噬菌)「子」數ヲ比較スルニ, 煮液ノ(噬菌)「子」數ハ每常生液ノヨリモ大デアル。


3) 即チ「イムペヂン」現象陽性デアル(第一圖參照)。

II, 家雞粘液肉腫類脂體液ニ就テノ檢査 (第2表及ビ第2圖)

第 2 表 (第2圖參照)

抗 元 量	生				煮				對 照
	0.1	0.2	0.4	0.6	0.1	0.2	0.4	0.6	
噬	9	12	11.5	11	9	12.5	11	10	11
菌	17	21.5	14	15	16	21	14.5	14	13.5
子	26	33.5	25.5	26	25	33.5	25.5	24	24.5
子ノ百分比	80.8	100	76.4	80.8	74.9	100	76.4	71.9	73.4

第 2 圖 家雞粘液肉腫浸出液ヨリ得タル「エーテル」移行物質ヲ以テセル「催喰菌作用」 L 「イムペヂン」現象ノ吟味



I = 生液ノ子ノ百分比ヲ示ス曲線
 II = 煮液ノ同上
 III = 對照食鹽水ノ同上

所 見

抗元量ヲ0.1, 0.2, 0.4及ビ0.6ccト變化セシメテ, 反應ノ全經過ヲ知り得タ。抗元量0.1及ビ0.6ccノ場合, 生液ノ(喰菌)子ノ數ハ煮液ノヨリモ大ナルガ, 0.2及ビ0.4ccノ場合ハ生煮兩液ノ(喰菌)子ノ數ハ相等シイ。即チ催喰菌作用ハ有ルガ L 「イムペヂン」現象ハ陰性デアル。


第二 家兎纖維肉腫

I, 脫脂家兎纖維肉腫液ニ就テノ検査 (第3表及ビ第3圖)

第 3 表 (第3圖參照)

抗元量	生				煮				對 照
	0.1	0.2	0.4	0.6	0.1	0.2	0.4	0.6	
喰	6.5	6	6	6	7	7.5	9.5	7	4.5
菌	6.5	6.5	7	6	7	7.5	10	7.5	4.5
子	13	12.5	13	12	14	15	19.5	14.5	9
子ノ百分比	66.6	64.1	66.6	61.5	71.5	76.9	100	74.3	46.1

第3圖 家兎纖維肉腫脱脂浸出液ヲ以テセル催喰菌作用「イムベチン」現象 (第3表參照)



I = 生液ノ子ノ百分比ヲ示ス曲線
 II = 煮液ノ同上
 III = 對照食鹽水ノ同上

所 見

1) 抗元量ヲ0.1, 0.2, 0.4及ビ0.6ccト變化セシメタノニ, 全反應經過ヲ知り得タ。即チ抗元量ヲ0.4ccトシタ場合ニ煮液ハ最大ノ「喰菌」子ヲ得, 又生液ニ於テハ抗元量が0.1及ビ0.4ccノ場合ノ「喰菌」子數ハ相互同數(66.6)デアルガ, 他ノ0.2及ビ0.6ccノ場合ノモノヨリハ大デアル。

2) 「喰菌」現象ノ大小ヲ標示スル「喰菌」子數ヲ觀ルニ, 各抗元量ニ於テ, 煮液ノ「喰菌」子數ハ生液ノヨリモ毎常大デアル(第三圖參照)。

3) 即チ「イムベチン」現象陽性デアル。

II, 家兎纖維肉腫脱脂體液ニ就テノ検査 (第4表及ビ第4圖)

第 4 表 (第4圖參照)

抗元量	生				煮				對 照
	0.1	0.2	0.4	0.6	0.1	0.2	0.4	0.6	
喰	4	3.5	5	9	4	4.5	5	9.5	6
菌	5	5.5	5.5	11.5	5	4.5	5.5	10.5	7
子	9	9	10.5	20.5	9	9	10.5	20	13
子ノ百分比	43.9	43.9	51.7	100	43.9	43.9	51.7	97.6	63.4

莢雜ガアリ、ソレデ催喰菌作用が大トナツテ居ル次第デアルガ、煮沸ノ結果此ノ蛋白體ノ作用ガ非働性トナツタコトヲ物語ルモノデアル。煮沸熱デ催喰菌作用ガ非働性トナルガ如キ種類ノ蛋白體ハ細菌性蛋白體デハナイ。即チ此ノ類脂體ニハ極メテ微量ナガラ非細菌性ノ腫瘍蛋白體ガ莢雜シテ居タコトガ判明スル。

(ホ) 對照0.5%石炭酸加0.85%食鹽水デノ「喰菌」₁子¹數ハ脱脂生煮液、類脂生煮液ノ最大ノ「喰菌」₁子¹數ヨリモ常ニ小デアル。即チ對照0.5%石炭酸加0.85%食鹽水ノ「喰菌」₁子¹數ヲ100トシテ、各抗元液ノ最大「喰菌」₁子¹數ヲ示スト第5表ノ通りデアル。

第5表 對照0.5%石炭酸加0.85%食鹽水ニ於ケル喰菌子¹ノ100トナシタル際ノ各可檢液ノ最大喰菌子價

抗 元 液	生 液	煮 液	増 (減)	「イムベチン」 ¹
家鷄粘液肉腫脱脂液	415	494	79	陽 性
同 上 類脂體液	131	131	±	陰 性
家兎纖維肉腫脱脂液	166	216	50	陽 性
同 上 類脂體液	157	153	-4	陰 性

即チ上記ノ所見カラ次ノ事項ガ考ヘラレル。

1) 煮脱脂液ノ方が、生脱脂液ヨリモ抗元能働力ハ大デアル。之レハ生脱脂液ノ毒力ガ煮脱脂液ノヨリモ勝ツテ居ル爲デ無ク、生脱脂液ニハ「イムベチン」ナル喰菌作用ヲ阻止スル勢力ガ存在シ、且、コノ「イムベチン」ハ30分間ノ煮沸ニ依ツテ破却サレタ結果デアル。

2) 「エーテル」ヘ移行シタ物質ハ純粹ノ類脂體ノミデ無ク、蛋白體ノ莢雜モアル(青柳、上田藤田)。余等ノ實驗ニ於テモ、生液ノ方が煮液ヨリモ稍々大ナル抗元能働力ヲ示ス傾向ガアル。即チソノ量僅少デハアルガ、猶ホ蛋白體ガ存在シ、且、其ノモノハ煮沸ノ結果非働性トナツタノデ、非細菌性蛋白體ノ莢雜デアツタコトガ證明サレタ。細菌性ノ蛋白體モ同時ニ莢雜物トシテ存在シテ居タカモ知レヌガ、モシ有ツテモ「イムベチン」現象ヲ示シ得ヌ程ニ微量デアルト考ヘネバナラス。

3) 家雞粘液肉腫、家兎纖維肉腫ノ有スル「イムベチン」ハソノ蛋白體側ニ附帶シ、類脂體側ニハ附帶サレテ居ラス。

4) 所見(ホ)ハ類脂體乳劑ハ喰菌作用ヲ促進スルガ、脱脂液(類脂體ヲ大部分奪取セラレタ蛋白體)ハ更ニ強ク喰菌作用ヲ促進スル事實ヲ示シテ居ル。換言スレバ喰菌作用ヲ促進スル能力ハ『蛋白體ノ莢雜アル類脂體』ヨリモ『類脂體ノ莢雜アル蛋白體』ノ方ニ於テ大ナルモノデアル。

結 論

(一) 家雞粘液肉腫、家兎纖維肉腫ノ含有スル「イムベチン」ハ其ノ蛋白體側ニ附帶セラレタ生物學的勢力デアツテ、其ノ類脂體ハ此ノ勢力ヲ有ツテ居ラス。

(二) 而シテ此ノ蛋白體ト言フノハ『腫瘍ノ原因ヲ爲ス微生物自身ノ蛋白體』ヲ指スモノデテツテ腫瘍ノ發生シタ局所ノ當該動物組織ノ蛋白ヲ意味スルモノデハナイ。

(三) 本研究ノ結果ニヨツテ家雞粘液肉腫及ビ家兔纖維肉腫(一般ニハ可移植性動物腫瘍)中ニハ非細菌性及ビ細菌性ノ二種ノ蛋白體が含有サレテ居ルモノデアルコトが證明サレタ。