

溶血性連鎖狀球菌ヨリ得タル各種免疫元
軟膏ヲ以テセル皮膚局所免疫ノ研究
第1報 [アナワクチン] 及ビ [ワクチン]
生・煮兩抗原ノ免疫元性能動力ノ比較

京都帝國大學醫學部外科學研究室(鳥潟教授指導)

醫學士 篠 田 正 芳

Erforschung der Hautimmunität bei den Salben mit
verschiedenen Immunogenen aus haemolytischen
Streptokokken

I. Mitteilung: Vergleich der Antigenavidität der Anavakzine mit
der des Anakotigens

Von

Dr. M. Shinoda


[Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Universitätsklinik Kyoto
(Prof. Dr. R. Torikata)]

Wir haben das Filtrat der Anavakzine bzw. der Vakzine teilweise in einem bei 100°C siedenden Wasserbade 30 Min. lang erhitzt. Vom nativen sowie gekochten Antigen wurde je eine Salbe unter sonst gleichen Bedingungen verfertigt. Bei ein und demselben Kaninchen, bei dem ja die individuelle Verschiedenheit der immunisatorischen Reaktionen total ausgeschlossen ist, haben wir die Salben auf verschiedene Stellen der depilierten Haut (u. z. von einer gleicher Grösse von 4.5×4.5 cm) 24 Stunden lang appliziert, um die dabei in der Haut produzierte Menge des spezifischen Opsonins mit einander zahlenmässig vergleichen zu können.

Die Ergebnisse der Versuchen gehen aus folgender Abbildung hervor.

Fig. I

Die Menge des spezifisch gegen haemolytische Streptokokken gerichteten Opsonins
bei den mit verschiedenen Antigenalben vorbehandelten Hautstellen
bei ein und demselben Kaninchen.



H=Normale Haut.

ANZ=Haut, vorbehandelt mit der das native Filtrat der Anavakzine enthaltenden Salbe.

AZK=Do. mit der das gekochte Filtrat der Anavakzine enthaltenden Salbe.

VZN=Do. mit der das native Filtrat der Vakzine enthaltenden Salbe

VZK=Do. mit der das gekochte Filtrat der Vakzine enthaltenden Salbe.

F=Do. mit der Formolwasser (0,5%) enthaltenden 0,85 proz. NaCl-Lösung.

K=Do. mit der 0,5 proz. Carbolsäure enthaltenden 0,85 proz. NaCl-Lösung.

S=Blutserum.

NaCl=0,85 proz. NaCl-Lösung.

Zusammenfassung

1. Die Grösse des spezifisch gegen haemolytische Streptokokken gerichteten Opsonins, das ja in den durch verschiedene Salben vorbehandelten Hautstellen ausgelöst worden ist, ergab folgende Reihenfolge : Nativfiltrat der Anavakzine < Do. der Vakzine < Koktofiltrat der Vakzine < Do. der Anavakzine (i. e. Anakoktigen).
2. Die immunisierende Wirkung, die sich hier in der Auslösung spezifischen Opsonins in der lokalisierten Haut dokumentiert, ist eine beträchtlich grössere bei den gekochten Antigenen als bei den nativen ; und zwar sowohl bei der Anavakzine als auch bei der Vakzine.
3. Das Nativfiltrat der Vakzine erwies sich als stärker immunisierend als dasjenige der Anavakzine. Dies lehrt uns, dass bei der Anavakzine die Impedinwirkung eine viel grössere ist als bei der Vakzine, d. h. mit anderen Worten, dass das Impedin, beladen in den nativen antigenen Materialien, in einem grösseren Masse im Medium der Anavakzine enthalten ist als in dem der Vakzine.
4. Daher erzeugte die Anavakzine, eine halbe Stunde lang bei 100°C erhitzt und somit vom Impedin befreit, die grösste Opsoninmenge in den damit vorbehandelten Hautstellen.
5. Auch bei der Erzeugung des spezifischen Opsonins in der zirkumskripten Haut wurde die immunisatorische Ueberlegenheit der abgekochten Anavakzine (=des Anakoktigens) über alle bisher bekannten immunogenen Materialien einwandfrei nachgewiesen.

(Autoreferat)

緒 言

溶連菌_レワクチン^ノヨリモ_レアナワクチン^ノ方ガ毒力小ナリ。マタ_レワクチン^ノ生基液ヨリモ煮基液ノ方ガ毒力小ニシテ催喰菌性能効力大ナリ。_レアナワクチン^ノ生基液ヨリモ_レアナワクチン^ノヨリ得タル_レコクチゲン^ノ方ガ毒力更ニ小ニシテ催喰菌性能効力更ニ大ナリ。結局、_レアナワクチン^ノヨリ得タル_レコクチゲン^ノ(_レアナコクチゲン^ノ)ガ毒力最小、催喰菌性抗原能効力最大ナリ(拙著溶血性連鎖状球菌(溶連菌_レアナワクチン^ノニヨル_レイムペヂン^ノ現象第1報参照)。

本報告ニ於テハ_レワクチン^ノ乃至_レアナワクチン^ノヨリ生・煮兩抗原ヲ得、軟膏トナシテ實驗的ニ皮膚ニ貼用シ其ノ局所皮膚内ニ於ケル特殊オプソニン^ノノ產生ヲ指標トナスモ亦タ能ク這般ノ關係ヲ立證シ得ルヤ否ヤ、換言スレバ局所皮膚中ニ產生セラレタル催喰菌作用物質ノ程度ハ既ニ發表セラレタルガ如ク家兔睾丸等ニ於テ獲得セラレタル自働免疫ノ大小強弱ト兩々果シテ能ク一致スルヤ否ヤヲ吟味スル所アラントス。

供 試 材 料

1. 溶連菌_レアナワクチン^ノ生基液軟膏 (A. Z. N.)
2. 溶連菌_レアナワクチン^ノ煮基液軟膏 (A. Z. K.)
3. 溶連菌_レワクチン^ノ生基液軟膏 (V. Z. N.)
4. 溶連菌_レワクチン^ノ煮基液軟膏 (V. Z. K.)

溶連菌ノ0.7%葡萄糖及ビ0.5%グリセリン^ノ加寒天斜面 37° C 48時間培養ノ菌苔ヲ、0.85%食鹽水ニテ洗ヒ落シ、滅菌脱脂綿ニテ透過シ、夾雜物ヲ除キ、60° C 30分間加熱殺菌ス。本菌液ハ鳥鴨教授沈澱計ニテ菌量3度目、即チ1耗中約0.0021耗ヲ含有ス。0.5%ノ割合=石炭酸ヲ加入シ氷室内ニ貯藏ス。

此ノ溶連菌_レワクチン^ノジユワン遠心器ニテ強力40分間遠心シ、透明ナル上澄液ノミヲ取り爾他同一條件ノ下ニ軟膏ヲ調製セリ。

上記溶連菌_レワクチン^ノ上澄液ヲ 100° C =沸騰シツ、アル重湯煎中ニテ30分間煮沸シ、コノ煮基液ヲ以テ同様軟膏ヲ調製セリ。

實 驗 方 法

體重300瓦内外ノ健常雄家兔3頭ヲ一群トナシ、背部ニ於テ脊柱ヲ中心トシテ兩側ニ幅約7輻、長サ約25輻ノ帶狀部ヲ剪刀ヲ以テ務メテ短カク除毛ス。除毛部=4.5輻平方ノ領域ヲ左右兩側ニ各3個所ヲ劃シ、各個所ニ溶連菌_レアナワクチン^ノ生基液軟膏、同煮基液軟膏、同_レワクチン^ノ生基液軟膏、同煮基液軟膏及ビ對照0.5%_レフォルマリン^ノ食鹽水軟膏(F)乃至0.5%石炭酸食鹽水軟膏(K)ヲ各2瓦宛約5分間指頭ヲ以テ塗擦貼用シ保護繩帶ヲ施ス。

24時間後ニ前記各軟膏貼用部皮膚ヲ綿紗及ビ_レベンチン^ノヲ以テ清拭シ、頭部附近ニ於ケル軟膏ヲ貼用セザル正常部ト共ニ何レモ局所皮膚ヲ切除ス。

斯クシテ得タル7個所ノ皮膚片ヨリ0.5瓦宛ヲ正シク計量シ0.85%食鹽水2.0耗ヲ以テ乳剤ヲ作

リ、強力遠心沈澱シテ以テ上澄液ヲ得。是即チ皮膚浸出液ナリ。

各種皮膚浸出液、血清及ビ 0.85% 食鹽水ノ0.2耗ト溶連菌液0.2耗トヲ良ク混和シ、コノ混和液ト白血球液トヲ使用シ $\text{L}\text{O}\text{P}\text{S}\text{O}\text{N}$ 検査ヲ施行ス。

實驗成績

實驗結果ハ第1表乃至第4表及ビ第1圖ニ示サレタリ。

第1表 溶連菌 $\text{L}\text{A}\text{N}\text{A}\text{K}\text{U}\text{C}\text{H}\text{I}\text{N}$ 及ビ $\text{L}\text{W}\text{A}\text{K}\text{U}\text{C}\text{H}$

N 生・煮基液軟膏貼用ニヨリ局所皮膚内

= 產生セル特殊 $\text{L}\text{O}\text{P}\text{S}\text{O}\text{N}$ ノ比較

家兔第38號

可 檢 材 料	喰	菌	子	オ プ ソ ニ シ ュ 係 数
A.Z.N.軟膏貼用部	9.0	17.0	26.0	0.86
皮 A.Z.K.	”	18.0	40.0	1.93
膚 F.	”	10.0	23.0	1.10
浸 V.Z.N.	”	10.0	20.0	1.00
出 V.Z.K.	”	14.0	28.0	1.40
液 K.	”	11.0	23.0	1.13
健 常 部	10.0	20.0	30.0	1.00
血 清	10.0	16.0	26.0	0.86
0.85%食鹽水	13.0	28.0	41.0	1.36

A. Z. N. 溶連菌 $\text{L}\text{A}\text{N}\text{A}\text{K}\text{U}\text{C}\text{H}\text{I}\text{N}$ 生基液

A. Z. K. 煮基液

F. 0.5% $\text{L}\text{F}\text{O}\text{R}\text{M}\text{A}\text{R}\text{I}\text{N}$ 食鹽水

第3表 溶連菌 $\text{L}\text{A}\text{N}\text{A}\text{K}\text{U}\text{C}\text{H}\text{I}\text{N}$ 及ビ $\text{L}\text{W}\text{A}\text{K}\text{U}\text{C}\text{H}$

N 生・煮基液軟膏貼用ニヨリ局所皮膚内

= 產生セル特殊 $\text{L}\text{O}\text{P}\text{S}\text{O}\text{N}$ ノ比較

家兔第40號

可 檢 材 料	喰	菌	子	オ プ ソ ニ シ ュ 係 数
A.Z.N.軟膏貼用部	9.0	17.0	26.0	0.83
皮 A.Z.K.	”	18.0	41.0	1.90
膚 F.	”	10.0	24.0	1.09
浸 V.Z.N.	”	10.0	19.0	0.93
出 V.Z.K.	”	14.0	30.0	1.41
液 K.	”	12.0	22.0	1.09
健 常 部	10.0	21.0	31.0	1.00
血 清	9.0	16.0	25.0	0.80
0.85%食鹽水	15.0	29.0	44.0	1.41

第2表 溶連菌 $\text{L}\text{A}\text{N}\text{A}\text{K}\text{U}\text{C}\text{H}\text{I}\text{N}$ 及ビ $\text{L}\text{W}\text{A}\text{K}\text{U}\text{C}\text{H}$

N 生・煮基液軟膏貼用ニヨリ局所皮膚内

= 產生セル特殊 $\text{L}\text{O}\text{P}\text{S}\text{O}\text{N}$ ノ比較

家兔第39號

可 檢 材 料	喰	菌	子	オ プ ソ ニ シ ュ 係 数
A.Z.N.軟膏貼用部	10.0	16.0	26.0	0.86
皮 A.Z.K.	”	17.0	39.0	1.86
膚 F.	”	10.0	23.0	1.10
浸 V.Z.N.	”	10.0	18.0	0.93
出 V.Z.K.	”	14.0	32.0	1.53
液 K.	”	11.0	23.0	1.13
健 常 部	10.0	20.0	30.0	1.00
血 清	9.0	17.0	26.0	0.86
0.85%食鹽水	14.0	27.0	41.0	1.36

第4表 溶連菌 $\text{L}\text{A}\text{N}\text{A}\text{K}\text{U}\text{C}\text{H}\text{I}\text{N}$ 及ビ $\text{L}\text{W}\text{A}\text{K}\text{U}\text{C}\text{H}$


N 生・煮基液軟膏貼用ニヨリ局所皮膚内

= 產生セル特殊 $\text{L}\text{O}\text{P}\text{S}\text{O}\text{N}$ ノ比較

(3頭平均)

可 檢 材 料	喰	菌	子	オ プ ソ ニ シ ュ 係 数
A.Z.N.軟膏貼用部	9.3	16.6	25.9	0.85
皮 A.Z.K.	”	17.6	40.0	1.90
膚 F.	”	10.0	23.3	1.09
浸 V.Z.N.	”	10.0	19.0	0.95
出 V.Z.K.	”	14.0	30.0	1.45
液 K.	”	11.3	22.6	1.11
健 常 部	10.0	20.3	30.3	1.00
血 清	9.5	16.3	25.6	0.84
0.85%食鹽水	14.0	28.0	42.0	1.38

第1圖 溶連菌_Lアナワクチン⁷及ビ_Lワクチン⁷
生・煮基液軟膏貼用後局所皮膚内ニ產生セル
特殊_Lオプソニン⁷量ノ比較(第4表参照)



H. 健常部皮膚
 A. Z. N. 溶連菌_Lアナワクチン⁷生基液軟膏貼用部
 A. Z. K. " 煮基液 "
 V. Z. N. 溶連菌_Lワクチン⁷生基液軟膏貼用部
 V. Z. K. " 煮基液 "
 F. 0.5% フォルマリン⁷食鹽水軟膏貼用部
 K. 0.5% 石炭酸食鹽水軟膏貼用部
 S. 血 清
 NaCl 0.85% 食鹽水

4. _Lアナワクチン⁷生基液ノ效果ハ_Lワクチン⁷生基液ノ效果ヨリモ稍々僅カニ小ナリキ。
5. 0.5% フォルマリン⁷又ハ0.5% 石炭酸含有0.85% 食鹽水ヲ含有スル軟膏ノ貼用ニヨル _Lオプソニン⁷產生ハ殆ド證明セラレズ。

所見考察

所見ノ主要ナルモノ、即チ_Lオプソニン⁷係數ヲ比較ニ便ナラシメンガ爲ニ百分比ニテ示セルニ第5表ヲ得タリ。

第5表 各種可検抗元含有軟膏ノ免疫能力ノ比較(第4表参照)

可 検 材 料	A. Z. N.	A. Z. K.	V. Z. N.	V. Z. K.
_L オプソニン ⁷ 係數	0.85	1.90	0.95	1.45
比 較 %	44.7	100	50	76.3

_Lオプソニン⁷產生能動力: A.Z.N. < V.Z.N. < V.Z.K. < A.Z.K.
 A. Z. N. = _Lアナワクチン⁷生基液
 A. Z. K. = " 煮基液
 V. Z. N. = _Lワクチン⁷生基液
 V. Z. K. = " 煮基液

tisch) ナルモノタルコトヲ認ム。

毒力を催喰菌性能力トノ研究ニ於テ、_Lアナワクチン⁷ハ_Lワクチン⁷ヨリモ毒力ハ甚ダ輕減セラタルモノナレドモ、抗原性能動力(催喰菌性)ハ原_Lワクチン⁷ヨリモ却テ劣弱トナリ居ルモノナルコトヲ立證セリ。是即チ_Lアナワクチン⁷法ニヨリテ免疫元性物質ガ菌體ヲ去リテ基液中

所見概括

1. 溶連菌_Lアナワクチン⁷及ビ_Lワクチン⁷ノ何レニ於テモ、其ノ煮基液軟膏ヲ以テセルモノハ生基液軟膏貼用ニヨリテ發生セル局所皮膚内ニ特殊_Lオプソニン⁷量ヲ遙カニ凌駕セリ。

2. _Lアナワクチン⁷煮基液ハ_Lワクチン⁷煮基液ヨリモ優秀ナル免疫效果ヲ示セリ。

3. _Lアナワクチン⁷、_Lワクチン⁷何レニテモ其ノ生基液軟膏貼用ニヨリテ得タル_Lオプソニン⁷ハ健常部皮膚中ニ存在スル_Lオプソニン⁷量ヨリモ稍々小ナリキ。

前述ノ結果ニヨレバ既ニ立證シ得タル各種可検材料ノ催喰菌性抗原能動力ノ順位ト本實驗ニ於ケル局所皮肉_Lオプソニン⁷產生能動力ノ順位トハ全ク一致スルヲ認ム。即チ催喰菌作用ノ大小強弱ハ同時ニ抗体產生能力(=免疫效果)ト全ク同格 (identisch) ナルモノタルコトヲ認ム。

=移行スルコトハ事實ナレドモ、同時ニ_Lイムペデン⁷モ亦タ增加スルニ歸因スルモノナリト解釋セラレタリ。故ニ_Lアナワクチン⁷ヲ煮沸シテ以テ_Lイムペデン⁷ヲ破却スル時ハ茲ニ始メテ最大ノ抗原能効力ヲ示スニ至ルモノナルコトガ既ニ催喰菌現象ヲ指標トスルコトニヨリテ立證セラレタリシガ(溶血性連鎖状球菌(溶連菌)_Lアナワクチン⁷ニヨル_Lイムペデン⁷現象第1報參照)、今ヤ本實驗ニヨリテ免疫獲得(即チ特殊_Lオプソニン⁷ノ產生)ノ上ニモ亦タ同様ノ事實が明白ニ立證セラレタリ。以テ_Lイムペデン⁷ノ免疫學上ノ重要性ヲ知ルベク、亦タ以テ_Lアナワクチン⁷ヨリ得タル_Lコクチゲン⁷ガ最大ノ免疫力、最小ノ毒力、即チ最モ理想的ナル免疫元タルコトノ確信ニ到達シ得ベキナリ。

結論

1. 溶連菌_Lアナワクチン⁷及ビ同_Lワクチン⁷ヨリ生・煮兩基液ヲ得、軟膏ヲ作り、同一健常家兔ノ皮膚ノ各所ニ塗擦貼用スルコト24時間ニシテ、局所皮内ニ產生セラレタル_Lオプソニン⁷量ヲ比較セルニ、免疫效果(_Lオプソニン⁷產生效果)ノ順位ハ下ノ如クナリタリ。

_Lアナワクチン⁷生基液 < _Lワクチン⁷生基液 <

_Lワクチン⁷煮基液 < _Lアナワクチン⁷煮基液

2. _Lアナワクチン⁷ニテモ、_Lワクチン⁷ニテモ、其ノ生基液ヨリハ之ヲ煮沸(100°C 30')シタルモノ、方ガ免疫效果大ナリキ。此中ニテモ_Lアナワクチン⁷煮基液ノ免疫效果ハ_Lワクチン⁷煮基液ヨリモ大ニシテ、結局_Lアナコクチゲン⁷ガ凡テノ可檢材料中最大ノ免疫效果ヲ示シタリ。

3. 生基液ニ就テ觀察スルニ_Lワクチン⁷生基液ノ方ガ_Lアナワクチン⁷生基液ヨリモ却テ免疫效果稍々大ナリキ。是即チ_Lアナワクチン⁷生基液中ニハ_Lワクチン⁷生基液中ニ於ケルヨリモ_Lイムペデン⁷含量ノ大ナルニ歸因スルモノナリ。_Lアナワクチン⁷ニ於テハ_Lワクチン⁷含菌體中ノ免疫物質ガ菌體ヲ去リテ基液中ヘ移行シ、從テ_Lイムペデン⁷含量モ亦タ大トナリシモノナリ。

4. 此故ニ_Lアナワクチン⁷生基液ヲ適當ニ煮沸スル時ハ、獨リ_Lイムペデン⁷ノミガ破却セラレ、免疫元ノ作用ガ全幅的ニ復活(regenerieren)スルヲ以テ、茲ニ始メテ最大ノ免疫效果ヲ示スニ至ルモノナリ。

5. 同一使用量ニ於テハ_Lアナワクチン⁷ノ免疫效果ハ_Lワクチン⁷ヨリモ却テ幾分減弱シ居ルモノナリ(第1表、第1圖)。唯ダ毒力小ナルガ爲ニ_Lワクチン⁷ヨリモ大量使用ニ適スルヲ以テノ故ニ、實用上_Lワクチン⁷ニ優ルノミコトナリ。

6. _Lアナワクチン⁷ヲ煮沸シタルモノ、即チ_Lアナコクチゲン⁷ガ毒力最小、免疫力最大ナルノ立證明白ナルヲ以テ、_Lイムペデン⁷學說ノ主張ハ_Lアナワクチン⁷ニ向ツテ更ニ其ノ適用範圍ヲ擴大スルニ至リタルヲ認識スベシ。

7. 催喰菌性抗原能効力(甲)ハ免疫效果、即チ免疫性能効力(乙)ト全ク同格(identisch)ナルモノナリ。此故ニ甲ヲ立證シタルコトハ同時ニ乙ヲ證明シタルコト、亦タ乙ヲ證明シタルコトハ同時ニ甲ヲ證明シタルコト同格ナリ。