

On Elliptic Threefolds

東大・数理 中山 昇

§0. 3次元複素多様体は elliptic fibration を持つ時、elliptic threefold と呼ばれる。elliptic fibration とは normal complex analytic space の間の proper morphism π で general fiber が elliptic curve となるものである。elliptic threefold は 曲面論において elliptic surface がそうであった様に、3次元多様体論でも重要な class である。elliptic surface と比べて elliptic threefold が研究しやすい点は、fibration が flat とは限らない、base surface が nonsingular とは限らない、fibration が locally projective とは限らない等 いくつかある。しかし、最近の 3次元極小モデル理論 (analytic space の間の projective morphism に対応する minimal model theory + flip theorem + flop theorem etc.) [Ni] [Mi] [Ka] により、見通しが明らかになった。

§1. standard elliptic fibration.

与えられた elliptic threefold に対し、base surface を適当に blow-up すれば、fibration を flat にする事ができる。すると、fiber が 1次元であることから、これが locally projective morphism になることがわかる。

定義。 $f: Y \rightarrow T$ を normal surface T 上の elliptic fibration とする。 f が以下の条件をみたすとき、 f を standard elliptic fibration と呼ぶ:

- (1) Y は高々 terminal sing. を T 上に持つ。
- (2) Y は高々 \mathbb{Q} -factorial singularity を T 上に持つ。
- (3) f は locally projective morphism
- (4) f の各々の fiber は 1-次元
- (5) ある effective \mathbb{Q} -divisor Δ が T 上にあり、
 - (a) (T, Δ) は log-terminal
 - (b) $K_Y \sim_{\mathbb{Q}} f^*(K_T + \Delta)$

下記の定理を得る。

定理 1 $\pi: X \rightarrow S$ を surface S 上の locally projective elliptic fibration とする。このときある standard elliptic fibration $f: Y \rightarrow T$ が存在して、以下の条件をみたす。

- 1) bimeromorphic morphism $\mu: T \rightarrow S$ が存在する
- 2) π と $\mu \circ f$ は S 上で bimeromorphically equivalent
- 3) K_Y は $\mu \circ f$ -semi-ample.

証明のあたり。 π は locally projective なのだから、 S の各点 p に対してある近傍 U をとれば $\pi^{-1}(U) \rightarrow U$ は projective morphism

とする。 $N^1(\pi^{-1}(U)/U; p)$ についての minimal model program [M1] を
 実行すると、(flip存在定理 [M2] による) 実行可能、relative minimal
 model $Z_U \rightarrow U$ が与えられる。この minimal model は flop の差を
 除いて unique に定まるが、flop があろうかあるならば base surface の点 p
 は discrete である。従って、この $Z_U = S$ を取りあわせることができて、
 locally projective な minimal model $Z \rightarrow S$ が与えられる。この
 段階では K_Z は relatively nef であり、relative numerically
 trivial になっている。 (local base point free theorem による) K_Z は
 relatively semi-ample になっているので、ある $\mu: T \rightarrow S$ bimeromorphic morphism
 と、 $h: Z \rightarrow T$ があって、合成 $Z \rightarrow T \rightarrow S$ が π の morphism、 K_Z は
 μ -numerically trivial になっている。すると [N2] による T 上の effective
 \mathbb{Q} -divisor Δ が存在し、 (T, Δ) log-terminal、 $K_Z \sim_{\mathbb{Q}} h^*(K_T + \Delta)$
 とできる。次に $\mu: Z \rightarrow T$ のある fiber が irreducible component E を含
 んでいる場合を考える。この時 Z 上に effective divisor D をとって
 $D + kE$ ($k > 0$) が T 上の effective Cartier divisor の引き出しになっている
 ことができる。ここで log terminal pair $(Z, \varepsilon D)$ ($0 < \varepsilon < 1$) の
 $N^1(Z/T, \mu^{-1}(p))$ ($p = \mu \cdot h(E)$) における log-minimal model program
 を実行する。 K_Z が relatively trivial であるので flip はないとすると、flip
 の存在 [Ka] によるように可能である。もし $-E$ が μ -nef ではないならば、
 $K_Z + \varepsilon D$ についての log-extremal ray が存在し、その contraction morphism
 がある、ここで E はその contraction によって縮められる。 divisorial contraction

や flop をいかにせよと つか $-E'$ は T 上 nef になる。 かく E' は E の proper transform. かく μ の base point free theorem により, $-E'$ は T 上 semi-ample. かく μ がある birational morphism $\mu_1: T_1 \rightarrow T$ と morphism $V_1 \rightarrow T_1$ ($T=T_1$ V_1 は contraction \rightarrow flop \rightarrow 最後は μ による variety) が存在し E' は T_1 上の divisor の pullback になる。 V_1 は 高次元 canonical singularity (μ を持つ T_1 の μ の μ による crepant な partial resolution $Z_1 \rightarrow V_1$ を取りとくことができる。 この $Z_1 \rightarrow T_1$ による fiber の μ が 1 かどうか check する。 もし μ が 1 ならば今の操作をくりかえす。 Z と Z_1 は flop \rightarrow となる) $N^1(Z/T; \mu(p)) = N^1(Z_1/T; \mu(p))$ となるのでこの操作はいつかはあがる。 かく μ の fiber が 1 になる Z ならば $Z \rightarrow T$ が μ となる。 かく Z の \mathbb{Q} -factorialization $Y \rightarrow Z$ をとる ($[K_Y]$)。 かく $Y \rightarrow T$ の各 fiber μ になる μ の μ であるので $Y \rightarrow T$ は μ の locally projective となる。 かく μ がある standard model となる。

§2. Compact elliptic Kähler three fold

定理 2. X は compact Kähler 3-fold μ elliptic fibration $f: X \rightarrow S$ を持つとする。 かく X は semi-ruled μ である。 かく μ がある good minimal model μ を持つ。

ここで X が uniruled ならば ある compact surface Y があって dominant meromorphic mapping $Y \times \mathbb{P}^1 \dashrightarrow X$ が存在する ことである。good minimal model V ならば V が高々 terminal sing. のみしか持たない analytic variety として K_V が semi-ample なるのである。定理の証明には Torsion free theorem for higher direct images of dualizing sheaves, Abundance theorem on surfaces, a lemma on uniruledness が必要となる。

定理 (Torsion free theorem) $\pi: X \rightarrow V \in$ complex manifold X の complex analytic variety V 上の elliptic fibration, $f: V \rightarrow W \in$ complex analytic variety W への surjective な projective morphism, $A \in$ f -ample invertible sheaf on V とする。このとき以下が成立する。

1) $R^i \pi_* (\omega_X)$ ($i \geq 0$) は torsion free sheaves. $t \in V$ が nonsingular として π が V の normal crossing divisor の外側で smooth ならば、

$R^i \pi_* (\omega_{X/V})$ は π が定める variation of Hodge structure の canonical extension から成る locally free sheaf と同型になる。

2) $R^p f_* (R^i \pi_* (\omega_X \otimes A)) = 0$ for $p > 0, i \geq 0$.

この定理は $[K0][Mw][S]$ (巻 1) π が projective morphism の場合には証明されていた (ただし elliptic fibration である必要はない)。elliptic fibration の場合、flattening を用いて locally projective morphism とする

こと、canonical bundle formula によって、projective case の結果と

vanishing theorem [N1] により示される。次の locally projectivity を用いたための criterion は minimal model program の 1 つの 標能 する ために 必要である。

命題 3. $\pi: X \rightarrow V$ は complex manifold X から complex analytic variety V への proper surjective morphism である。ある点 $p \in V$ に対して $(R^2 \pi_* \mathcal{O}_X)_p = 0$ となるならば、このとき π が p 上で projective morphism となることは、 p にある近傍 U があって $\pi^{-1}(U)$ が Kähler metric を持つことと同値。

証明は V が 1 点の時と同様に relative な Kähler cone である。

$(R^2 \pi_* \mathcal{O}_X)_p$ の open cone であることは示すことはできる。

系 4. $f: Y \rightarrow S$ が complex Kähler manifold Y から complex manifold S への elliptic fibration である。 S 上の normal crossing divisor の外側で smooth である。このとき f は locally projective morphism である。

また Torsion free theorem に \mathbb{Q} -divisor の vanishing theorem 等を含めると、以下の定理も得る。

定理 5. $f: X \rightarrow Y$ は elliptic fibration, $g: Y \rightarrow Z$ は projective morphism, X, Y, Z は normal complex variety である。以下の 2 条件を仮定すると、 $R^2(g \circ f)_* \mathcal{O}_X = 0$ である:

(1) $(X, 0)$ は log-terminal

(2) Y 上にある g -ample な \mathbb{Q} -divisor L があって $-K_X \sim_{\mathbb{Q}} \rho L$.

Abundance theorem for surfaces とは次の結果である。

定理 6. $T \in$ class \mathcal{C} に属する (compact Kähler manifold と bimeromorphically equivalent) normal compact complex surface、 Δ は T 上の effective な \mathbb{Q} -divisor で (T, Δ) は log-terminal であるとする。もし T 上の任意の irreducible curve C に対して $(K_T + \Delta) \cdot C \geq 0$ ならば $K_T + \Delta$ は semi-ample である。

T が Moishezon の時は $[F]$ によって示されているし、その時の方が難しい。algebraic dimension $a(T)$ が 1 以下の時は、big な divisor が存在するので、簡単に証明できる。uniruledness をいう時は次の補題を使う。

補題 7. $f: X \rightarrow M$ は complex manifolds の間の proper surjective morphism で、general fiber は \mathbb{P}^1 と同型である。 X 上には相異なる prime divisors D_1, D_2 があって、さらに D_1 上には Cartier divisor D_3 があって

(1) D_1, D_2 は共に M に bimeromorphically dominate している。

(2) $\mathcal{O}_{D_1}(D_1) \cong \mathcal{O}_{D_1}(D_3)$

ならば f は projection $M \times \mathbb{P}^1 \rightarrow M$ と bimeromorphically equivalent である。

定理 2 の証明の要諦: algebraic dimension $a(X) = 3$ の時は

X は projective なるので [Mr.] により 定理 2 は示されている。従って $q(X) \leq 2$ としてよい。ところで $X, S \in \text{blow-up}$ における S は complex manifold で S 上の normal crossing divisor の外側で f は smooth とできる。すなわち系 4 により、 f は locally projective morphism となる。従って 定理 1 により f は bimeromorphically equivalent な standard elliptic fibration $h: Y \rightarrow T$ が存在し、 $K_Y \sim_{\mathbb{Q}} h^*(K_T + \Delta_T)$ となる。もし $K_T + \Delta_T$ が T 上の任意の irreducible curve C に対して $(K_T + \Delta_T) \cdot C \geq 0$ となるならば、定理 6 により、 $K_T + \Delta_T$ は semi-ample 従って K_Y も semi-ample となり Y は good minimal model となる。もし T 上に irreducible curve C が $(K_T + \Delta_T) \cdot C < 0$ かつ $C^2 < 0$ となるならば C の contraction $T \xrightarrow{\delta} T'$ を考えることが出来る。このとき $-(K_T + \Delta_T)$ は δ -ample である。命題 3、定理 5 により、 $Y \rightarrow T'$ (合成) は ^{locally} projective morphism と bimeromorphically equivalent になる。よって 定理 1 の様に $Y \rightarrow T'$ なる minimal elliptic fibration を作る事が出来るが、今十分大きな $m > 0$ に対して $\delta_* \mathcal{O}_Y(m(K_T + \Delta_T)) \cong \mathcal{O}_{T'}(m(K_{T'} + \Delta_{T'}))$ (ただし $\Delta_{T'} = \delta_* \Delta_T$) となるので、 T' 上の minimal model $h': Y' \rightarrow T'$ により $K_{Y'} \sim_{\mathbb{Q}} h'^*(K_{T'} + \Delta_{T'})$ となる。もし $(K_{T'} + \Delta_{T'}) \cdot C' \geq 0$ かつ任意の T' 上の irreducible curve C' により $(K_{T'} + \Delta_{T'}) \cdot C' \geq 0$ ならば、定理 6 により $K_{T'} + \Delta_{T'}$ は semi-ample。よって Y' が good minimal model となる。従って $(K_T + \Delta_T) \cdot C < 0$ かつ $C^2 < 0$ なる curve が存在する限り contract して、 $Y \xrightarrow{h} T$ を model change してよい。よって最終的に $h: Y \rightarrow T$ は次の条件を満たすとしてよい。

- 1) π は standard elliptic fibration τ : $K_Y \sim_{\mathbb{Q}} \pi^*(K_T + \Delta_T)$
- 2) $(K_T + \Delta_T) \cdot C < 0$ とする irreducible curve C が T 上にある。
- 3) $(K_T + \Delta_T) \cdot C < 0$ かつ $C^2 < 0$ とする irreducible curve C は無い。

二つとも $\alpha(T) < 2$ とすると、命題3 (Vの1点のcase) により $p_g(T) \neq 0$ 。
 よって $K_T + \Delta_T$ と \mathbb{Q} -linearly equivalent な effective \mathbb{Q} -divisor がある。よって
 2) を満たす C は常に $C^2 < 0$ となる。従って $\alpha(T) = 2$ 。 T
 は projective と仮定できる。 2) により $K_T + \Delta_T$ は T の extremal ray の
 contraction $\sigma: T \rightarrow Z$ に対応する。 よって $-(K_T + \Delta_T)$ が σ -ample
 となる。 命題3、定理5 により 合成 $Y \rightarrow Z$ は locally projective
 morphism と birationally equivalent。 且つ Z が 1点 t^* とすると、
 $\alpha(Y) = \alpha(X) = 3$ と仮定に反する。 よって Z は smooth curve。 $F \in Y \rightarrow$
 Z の general fiber とすると、 $-K_F$ は semi-ample と $K_F^2 = 0$ である。 且つ
 $g(F) = 0$ なる。 $R^1(\sigma_0)_* \mathcal{O}_Y = 0$ であり、 $H^2(\mathcal{O}_F) = 0$ とする。
 よって 命題3 (Vの1点のcase) により $\alpha(Y) = 3$ とする矛盾。 ゆえに F は
 elliptic curve E 上の \mathbb{P}^1 -bundle である。 $Y \rightarrow Z$ の minimal model program
 を考えれば Z 上の meromorphic mapping $\gamma: Y \dashrightarrow N$ と

- 1) N は normal non-projective surface
- 2) $N \rightarrow Z$ は elliptic fibration
- 3) general fiber F 上で γ は $F \rightarrow E$ を induce する

 という小生體をわたすことができる。

ここで $H_1, H_2 \in T$ の general ample divisors とし $D_1, D_2 \in T$ の Y への pullback とする。 D_1, D_2 は $N \in \text{dominate}$ する。 5.2 補題 7 に
 より できる) に finite covering $N' \rightarrow N \in \text{dominate}$ Y が $N' \times \mathbb{P}^1$ へ
 dominate される) である。 中には X は uniruled である。 \square
 証明の詳細は [N3] を参照。

参考文献

- [F] T. Fujita, Fractionally logarithmic canonical maps of algebraic surfaces,
 J. Fac. Sci. Univ. Tokyo IA 30 (1983), 655-695.
- [Ka] Y. Kawamata, Crepant blowing-up of 3-dimensional canonical sing.,
 Ann. Math. 127 (1988), 93-163
- [Ko] J. Kollar, Higher direct images of dualizing sheaves I, II, Annals of Math.,
123 (1986) 11-42, ibid. 124 (1986), 171-202.
- [Mr] S. Mori, Flip theorem and the existence of minimal models ..., J. AMS.
1 (1988), 117-253.
- [Mw] A. Moriwaki, Torsion freeness of higher direct images ..., Math. Ann.
276 (1987), 385-398
- [N1] N. Nakayama, The lower semi-continuity of the plurigenera ... Adv. Stud.
 Pure Math. 10 (1987) 551-590
- [N2] —, On Weierstrass Models, in Algebraic Geom. and Commutative Alg. in honor
 of M. Nagata (1987) 405-431
- [N3] —, Local structure of an elliptic fibration, preprint Univ. Tokyo (1991)
- [S] M. Saito, Modules de Hodge polarisables, Publ. RIMS, Kyoto Univ. 24
 (1988), 849-995.