

2階準線形楕円型方程式系のlarge solutionについて

広島大学・総合科学部 宇佐美 広介 (Hiroyuki Usami)

Faculty of Integrated Arts and Sciences,

Hiroshima University

尾道大学・経済情報学部 寺本 智光 (Tomomitsu Teramoto)

Faculty of Economics, Management & Information Science,

Onomichi University

1. 序・主結果

次の2階準線形楕円型方程式系の球対称なpositive large solutionの存在について考察する.

$$(1.1) \quad \begin{cases} \Delta_p u = H(|x|)v^\alpha, \\ \Delta_q v = K(|x|)u^\beta, \end{cases} \quad x \in \mathbf{R}^N,$$

ここで, $\Delta_m \cdot = \operatorname{div}(|D \cdot|^{m-2} D \cdot)$, $1 < p < N$, $1 < q < N$, $\alpha, \beta > 0$, は定数で $\alpha\beta > (p-1)(q-1)$ を満たすとする. $H(r) > 0$, $K(r) > 0$, $r = |x|$ は $[0, \infty)$ で連続で次の条件を満たすとする:

$$(1.2) \quad \begin{aligned} \int_0^\infty \left(s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} H(t) dt \right)^{\frac{1}{p-1}} ds &< \infty, \\ \int_0^\infty \left(s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} K(t) dt \right)^{\frac{1}{q-1}} ds &< \infty. \end{aligned}$$

定義 (u, v) が (1.1) の全域解であるとは, $u, v, |Du|^{p-2}Du, |Dv|^{q-2}Dv \in C^1(\mathbf{R}^N) \cap \mathbf{R}^N$ で (1.1) を満たすときをいう.

定義 (u, v) が (1.1) のlarge solutionであるとは, (u, v) が (1.1) の全域解で

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} u(x) = \infty, \quad \lim_{|x| \rightarrow \infty} v(x) = \infty$$

を満たすときをいう. (u, v) が (1.1) のsmall solutionであるとは, (u, v) が (1.1) の全域解で

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} u(x) = \text{const} > 0, \quad \lim_{|x| \rightarrow \infty} v(x) = \text{const} > 0$$

を満たすときをいう.

方程式系 (1.1) の球対称な正值全域解の存在については次のことが知られている (文献 [3]).

Theorem A H, K が (1.2) を満たすとする. このとき (1.1) の球対称なpositive small solutionが存在する.

H, K が条件 (1.2) を満たしていない場合, 球対称な正值全域解の存在について次のことが知られている (文献 [2]).

Theorem B H, K が

$$C_1 r^{-\lambda} \leq H(r) \leq C_2 r^{-\lambda}, \quad C_3 r^{-\mu} \leq K(r) \leq C_4 r^{-\mu}, \quad r \geq r_0 > 0$$

を満たすとする, ただし $C_i > 0, i = 1, \dots, 4$, は定数, λ, μ は

$$\lambda - p + \frac{\alpha(\mu - q)}{q - 1} > 0, \quad \mu - q + \frac{\beta(\lambda - p)}{p - 1} > 0$$

を満たす定数. このとき, (1.1) の球対称な正値全域解が存在し, (u, v) は

$$u(r) \leq Cr^{\frac{(\lambda-p)(q-1)+\alpha(\mu-q)}{\alpha\beta-(p-1)(q-1)}}, \quad v(r) \leq Cr^{\frac{(\mu-q)(p-1)+\beta(\lambda-p)}{\alpha\beta-(p-1)(q-1)}}, \quad r \geq r_1 > 0$$

を満たす.

注意 Theorem Bにおいて, $\lambda > p, \mu > q$ のとき, H, K は条件 (1.2) を満たす.

Theorem B より, 条件 (1.2) の下で, 球対称な positive large solution が存在する可能性がある. (条件 (1.2) の下では, (1.1) の球対称な正値全域解は small か large のどちらかになる). よって次の問題を考えられる.

- 問題** (i) 条件 (1.2) の下で, (1.1) の球対称な positive large solution が存在するか?
(ii) large solution が存在する場合、解が large になるための条件は?

$p = q = 2$ で, $\alpha > 1, \beta > 1$ の場合, 球対称な positive large solution が存在することが知られている(文献[1]). そこでは, 初期値 $(u(0), v(0))$ がある条件を満たせば解が large になることを示している.

この研究の目的は, 文献[1]の結果を方程式系 (1.1) に拡張することである。さらに, 文献[1]の $\alpha > 1, \beta > 1$ という条件を $\alpha\beta > 1$, に弱めることを目的とする。

定義 集合 G を次で定義する。

$$G = \{(a, b) \in [0, \infty)^2; u(0) = a, v(0) = b, \text{ となる } (u, v) \text{ は (1.1) の非負値全域解}\}.$$

この集合 G は次の性質をもつ。


Lemma 1 $(a, b) \in G$ ならば $[0, a] \times [0, b] \subset G$.

Lemma 2 G は連結な有界閉集合。

(注) $p = q = 2, \alpha > 1, \beta > 1$ のとき G は凸集合。

(1.1) の large solution の存在について次の結果が得られた:

Theorem $(a, b) \in \partial G$ かつ $a > 0, b > 0$ とする。このとき $(u(0), v(0)) = (a, b)$ となる (1.1) の球対称な正値全域解 (u, v) は large である。(右図)



2. 証明の概略

Lemma 1 の証明の概略 $(a, b) \in G$, $0 \leq \tilde{a} \leq a$, $0 \leq \tilde{b} \leq b$ として, $\{u_k\}, \{v_k\}$ を次のように定義する.

$$\begin{aligned} u_k(r) &= \tilde{a} + \int_0^r \left(s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} H(t) v_{k-1}(t)^\alpha dt \right)^{\frac{1}{p-1}} ds, \quad r \geq 0, k \geq 1, \\ v_k(r) &= \tilde{b} + \int_0^r \left(s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} K(t) u_k(t)^\beta dt \right)^{\frac{1}{q-1}} ds, \quad r \geq 0, k \geq 1, \\ v_0(r) &= \tilde{b}, \quad r \geq 0. \end{aligned}$$

(U, V) を $(U(0), V(0)) = (a, b)$ となる (1.1) の非負値全域解とする. 明らかに $v_0 \leq v_1$ が成立. これより $u_1 \leq u_2$ が成立. 同様にして $v_1 \leq v_2$ が成立する. また, $v_0(r) \leq V(r)$ より

$$\begin{aligned} u_1(r) &= \tilde{a} + \int_0^r \left(s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} H(t) v_0(t)^\alpha dt \right)^{\frac{1}{p-1}} ds \\ &\leq a + \int_0^r \left(s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} H(t) V(t)^\alpha dt \right)^{\frac{1}{p-1}} ds \\ &= U(r) \end{aligned}$$

が成立する. 同様にして

$$\begin{aligned} v_1(r) &= \tilde{b} + \int_0^r \left(s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} K(t) u_1(t)^\beta dt \right)^{\frac{1}{q-1}} ds \\ &\leq b + \int_0^r \left(s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} K(t) U(t)^\beta dt \right)^{\frac{1}{q-1}} ds \\ &= V(r) \end{aligned}$$

が成立する. 以下同じことを繰り返して, 次が成立:

$$\begin{aligned} u_k(r) &\leq u_{k+1}(r) \leq U(r), \quad r \in [0, \infty), k \geq 1, \\ v_k(r) &\leq v_{k+1}(r) \leq V(r), \quad r \in [0, \infty), k \geq 1. \end{aligned}$$

$(u, v) = \lim_{k \rightarrow \infty} (u_k, v_k)$ とおくと, $[0, \infty)$ で $u(r) \leq U(r)$, $v(r) \leq V(r)$ が成立し, (u, v) は $(u(0), v(0)) = (\tilde{a}, \tilde{b})$ となる (1.1) の非負値全域解になる. よって $(\tilde{a}, \tilde{b}) \in G$. (証明終)

Lemma 2 の証明の概略.

有界 G が有界であることを示すために、まず次の方程式系を考える.


$$(2.1) \quad \begin{cases} \Delta_p \bar{u} = C_1 \bar{v}^\alpha, \\ \Delta_q \bar{v} = C_2 \bar{u}^\beta. \end{cases}$$

ここで $C_1 > 0, C_2 > 0$ は定数. 文献 [2] から (2.1) の非負値全域解は $(0, 0)$ だけである ((2.1) の非自明な非負値解は必ず有限時刻で blow up する). (2.1) に対して次の Lemma が成立する.

Lemma 3 $C_1 > 0, C_2 > 0, R_0 > 0$ を任意の定数とする。このとき、次のような $\tilde{\lambda} = \tilde{\lambda}(C_1, C_2, R_0)$ が存在する。

$(u(0), v(0)) = (\lambda, 0), \lambda \geq \tilde{\lambda}$ となる (2.1) の球対称な非負値解 (u, v) は R_0 の手前で blow up する、すなわち、 $\exists R_\lambda (< R_0)$ s.t.

$$\lim_{r \nearrow R_\lambda} u(r) = \lim_{r \nearrow R_\lambda} v(r) = \infty.$$



有界性の証明. G は非有界とする。Lemma 1 より $(a, b) \in G$ ならば $[0, a] \times [0, b] \subset G$ だから $[0, \infty) \times \{0\} \subset G$ または $\{0\} \times [0, \infty) \subset G$ である。 $[0, \infty) \times \{0\} \subset G$ とする。定数 $R_* > 0$ を任意にとり, H_*, K_* を

$$H_* = \min_{0 \leq r \leq R_*} H(r) > 0, \quad K_* = \min_{0 \leq r \leq R_*} K(r) > 0$$

とおく。このとき Lemma 3 より、次のような λ_* が存在する。 (u_*, v_*) は、方程式系

$$\begin{cases} \Delta_p u_* = H_* v_*^\alpha, & u_*(0) = \lambda \geq \lambda_*, \\ \Delta_q v_* = K_* u_*^\beta, & v_*(0) = 0, \\ u'_*(0) = v'_*(0) = 0, \end{cases}$$

の球対称な非負値解で、 (u_*, v_*) は R_* の手前で blow up する、すなわち

$$\lim_{r \nearrow R_\lambda} u_*(r) = \lim_{r \nearrow R_\lambda} v_*(r) = 0, \quad 0 < \exists R_\lambda < R_*$$

(u, v) を $u(0) > \lambda, v(0) = 0$ となる (1.1) の球対称な非負値全域解とする。このとき

$$H(r) \geq H_*, \quad K(r) \geq K_*, \quad 0 \leq r \leq R_\lambda$$

$$u(0) > u_*(0), \quad v(0) = v_*(0)$$

だから

$$u(r) > u_*(r), \quad v(r) > v_*(r), \quad 0 < r \leq R_\lambda$$

が成立する。 (u, v) は全域解だから


$$\infty = \lim_{r \rightarrow R_*} u_*(r) \leq u(R_*) < \infty$$

となり矛盾。よって G は有界集合である

閉集合 次の Lemma を用いる。

Lemma 4 任意の $R_0, R_1 (0 < R_0 < R_1)$ に対して次のような数 $M = M(R_0, R_1) > 0$ が存在する。

(1.1) の $|x| = r \in [0, R_0]$ 上の球対称解 $(u(r), v(r))$ が $v(R_0) \geq M$ を満たすならば (u, v) は R_1 の手前で blow up する.



閉集合の証明 $(u(r; a, b), v(r; a, b))$ を $(u(0), v(0)) = (a, b)$ となる (1.1) の球対称解とする. $\{(a_n, b_n)\} \subset G$ を $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n, b_n) = (\bar{a}, \bar{b}) \in [0, \infty) \times [0, \infty)$ なる点列とする. G は閉集合でないとする $((\bar{a}, \bar{b}) \notin G)$. $(\bar{a}, \bar{b}) \notin G$ だから 次をみたす \bar{R} が存在する:


$$(2.2) \quad \lim_{r \nearrow \bar{R}} u(r; \bar{a}, \bar{b}) = \lim_{r \nearrow \bar{R}} v(r; \bar{a}, \bar{b}) = \infty.$$

$R_1 \in (\bar{R}, \infty)$ をひとつ固定する. Lemma 4 より 次のような数 $M = M(\bar{R}, R_1)$ が存在する.

$[0, \bar{R}]$ 上の (1.1) の球対称解 (u, v) が $v(\bar{R}) > M$ をみたせば (u, v) は R_1 の手前で blow up する.(右図 1)


(2.2) より 次をみたす $R_0 \in (0, \bar{R})$ が存在する:

$$v(R_0; \bar{a}, \bar{b}) > M.$$



初期値に対する連続性より $|(a, b) - (\bar{a}, \bar{b})| < \delta$ をみたす $\delta > 0$ が存在すれば $(u(r; a, b), v(r; a, b))$ は $[0, R_0]$ 上存在して, $v(R_0; a, b) > M$ をみたす. よって M の定義から $(u(r; a, b), v(r; a, b))$ は R_1 の手前で必ず blow up する.(右図 2)

$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n, b_n) = (\bar{a}, \bar{b})$ だから $n \in N$ が十分大きいと $|(a_n, b_n) - (\bar{a}, \bar{b})| < \delta$ を満たす $\delta > 0$ は存在する. よって $v(r; a_n, b_n)$ は R_1 の手前で blow up する. 一方 $(a_n, b_n) \in G$ だから $(u(r; a_n, b_n), v(r; a_n, b_n))$ は全域解となり矛盾. よって G は閉集合. (証明終)



Theorem の証明の概略 $(a, b) \in \partial G$, $a > 0$, $b > 0$ とする. Lemma 2 より, G は閉集合だから $(a, b) \in G$. (U, V) を $(U(0), V(0)) = (a, b)$ となる (1.1) の球対称な正値全域解とする. $n \geq 1$ に対して $(a + 1/n, b + 1/n) \notin G$. (U_n, V_n) を $(U_n(0), V_n(0)) = (a + 1/n, b + 1/n)$

なる(1.1)の球対称な正値解とすると、 (U_n, V_n) は次を満たす：

$$(2.3) \quad U_n(r) = a + \frac{1}{n} + \int_0^r s^{1-N} \left(\int_0^s t^{N-1} H(t) V_n(t)^\alpha dt \right)^{\frac{1}{p-1}} ds, \quad r \in [0, R_n],$$

$$(2.4) \quad V_n(r) = b + \frac{1}{n} + \int_0^r s^{1-N} \left(\int_0^s t^{N-1} K(t) U_n(t)^\beta dt \right)^{\frac{1}{q-1}} ds, \quad r \in [0, R_n],$$

ここで R_n は

$$\lim_{r \nearrow R_n} U_n(r) = \lim_{r \nearrow R_n} V_n(r) = \infty, \quad n \geq 1.$$

となるものである。このとき $R_n \leq R_{n+1}$ が成立。実際、 u_k, v_k を次のように定義する：

$$\begin{aligned} u_k(r) &= a + \frac{1}{n+1} + \int_0^r \left(s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} H(t) v_{k-1}(t)^\alpha dt \right)^{\frac{1}{p-1}} ds, \\ v_k(r) &= b + \frac{1}{n+1} + \int_0^r \left(s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} K(t) u_k(t)^\beta dt \right)^{\frac{1}{q-1}} ds, \\ v_0(r) &= b + \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Lemma 1 の証明と同様にして

$$(2.5) \quad \begin{aligned} u_k(r) &\leq u_{k+1}(r) \leq U_n(r), & r \in [0, R_n], \quad k \geq 1 \\ v_k(r) &\leq v_{k+1}(r) \leq V_n(r), \end{aligned}$$

が成立する。従って $\lim_{k \rightarrow \infty} (u_k, v_k)$ が存在し、 $(U_{n+1}, V_{n+1}) = \lim_{k \rightarrow \infty} (u_k, v_k)$ は $(U_{n+1}(0), V_{n+1}(0)) = (a + 1/(n+1), b + 1/(n+1))$ となる(1.1)の $[0, R_n]$ 上の球対称な正値解となる。 R_{n+1} の定義から $R_{n+1} \geq R_n$ 。

$R = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n$ とおく。 $0 \leq \forall r < R$ とする。(2.5) より

$$U_{n+1}(r) \leq U_n(r), \quad V_{n+1}(r) \leq V_n(r), \quad r \in [0, R_n]$$

が成立する。よって $\lim_{n \rightarrow \infty} (U_n, V_n)$ が存在し

$$(2.6) \quad U(r) = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n(r), \quad V(r) = \lim_{n \rightarrow \infty} V_n(r), \quad r \in [0, R)$$

は $(U(0), V(0)) = (a, b)$ を満たす(1.1)の球対称な正値解となる。

$R < \infty$ とする。 $U'_n(r) \geq 0$ だから(2.4) より

$$\begin{aligned} V_n(r) &\leq b + \frac{1}{n} + U_n(r)^{\frac{\beta}{q-1}} \int_0^\infty \left(s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} K(t) dt \right)^{\frac{1}{q-1}} ds \\ &\leq C_1 + C_2 U_n(r)^{\frac{\beta}{q-1}} \end{aligned}$$

が成立する、ここで $C_1 = b + 1, C_2 = \int_0^\infty (s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} K(t) dt)^{1/(q-1)} ds$ 。

$f(t) = (C_1 + C_2 t^{\frac{\beta}{q-1}})^\alpha$ と定義する. $\alpha\beta > (p-1)(q-1)$ だから Γ を

$$\Gamma(s) = \int_s^\infty \frac{dt}{f(t)^{\frac{1}{p-1}}}, \quad s > 0$$

とおく. このとき

$$\Gamma'(s) = -f(s)^{-\frac{1}{p-1}} < 0, \quad \Gamma''(s) = \frac{1}{p-1} f(s)^{-\frac{p}{p-1}} f'(s) > 0.$$

U_n は (1.1) の正値解だから

$$\begin{aligned} \Delta_p U_n &= H(|x|) V_n^\alpha \\ &\leq H(|x|) (C_1 + C_2 U_n^{\frac{\beta}{q-1}})^\alpha \\ &= H(|x|) f(U_n), \quad r \in [0, R_n) \end{aligned}$$

が成立する. また

$$\begin{aligned} \Delta_p \Gamma(U_n) &= -|\Gamma'(U_n)|^{p-1} \Delta_p U_n + (p-1) |\Gamma'(U_n)|^{p-2} \Gamma''(U_n) |\nabla U_n|^p \\ &\geq -\frac{1}{f(U_n)} H(|x|) f(U_n) = -H(r), \quad r \in [0, R_n) \end{aligned}$$

が成立する. 上式を書き換えて

$$(2.7) \quad \frac{d}{dr} \left(r^{N-1} \left| \frac{d}{dr} \Gamma(U_n) \right|^{p-2} \frac{d}{dr} \Gamma(U_n) \right) \geq -r^{N-1} H(r), \quad r \in (0, R_n)$$

となる. (2.7) を 2 回積分して $([0, r], [r, R_n])$

$$\Gamma(U_n(r)) \leq \int_r^{R_n} \left(s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} H(t) dt \right)^{\frac{1}{p-1}} ds, \quad r \in [0, R_n)$$

を得る. $n \rightarrow \infty$ とすると, (2.6) より

$$\Gamma(U(r)) \leq \int_r^R \left(s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} H(t) dt \right)^{\frac{1}{p-1}} ds, \quad r \in [0, R)$$

を得る. Γ は減少関数で逆関数をもつから

$$U(r) \geq \Gamma^{-1} \left(\int_r^R \left(s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} H(t) dt \right)^{\frac{1}{p-1}} ds \right), \quad r \in [0, R)$$

となる. 上式で $r \rightarrow R$ とすると, $\Gamma^{-1}(s) \rightarrow \infty (s \rightarrow 0)$ より

$$\lim_{r \rightarrow R} U(r) \geq \lim_{r \rightarrow R} \Gamma^{-1} \left(\int_r^R \left(s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} H(t) dt \right)^{\frac{1}{p-1}} ds \right) = \infty.$$

従って, $U(r)$ は R で blow up する. これは (U, V) が全域解であることに矛盾する. 従つて, $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = R = \infty$ である. よって $\lim_{r \rightarrow \infty} U(r) = \infty$. また (2.3) より

$$U(r) \leq a + V(r)^{\frac{\alpha}{p-1}} \int_0^\infty \left(s^{1-N} \int_0^s t^{N-1} H(t) dt \right)^{\frac{1}{p-1}} ds, \quad r \geq 0$$

が成立. これから明らかに $\lim_{r \rightarrow \infty} V(r) = \infty$. よって (U, V) は large solution になる.

参考文献

- [1] A. V. Lair and A. W. Shaker, Existence of entire large positive poslutions of semilinear elliptic systems, J. Diff. Eq., 164(2000), 380-394.
- [2] T. Teramoto, On nonnegative entire solutions of second order quasilinear elliptic systems, Electron. J. Qualtive Theory Diff. Eq., No 16(2002).
- [3] T. Teramoto, On positive radial entirc solutions of second order quasilinear elliptic systems, J. Math. Anal. Appl., 282(2003), 531-552.