

有限群の作用と Cartan subalgebra

都立大・理 関根義浩 (Yoshihiko Sekine)

§0. まえがき

[1] において, Jones-Popa は, II_1 -factor の MASA に関する興味深いいくつかの結果をえている。その中で, AFD type II_1 factors $R \supseteq R_0$ が "良" inclusion のとき (群作用からきたとき), R の共通の Cartan subalg. を持つか? という問題の必要十分条件を与えている。この結果が群作用から決まる一般の AFD factors の pair に対してどうなるか? ということを調べるのが目的である。

[1] におけるその他の結果やそれに関連する II_1 index theory との関連性については, それぞれの文献を見てくださる。

§1. 準備

結果を述べるのに必要な作用の分類について復習する。ここでは結果のみで, 細かい定義やその意味については, 原論文を見てくださる。また, II_1 の時には, 作用の分類のさきかげりながら Connes, Jones の結果もあるが, ここでは Ocneanu の結果のみを書いておく。

ii) type II case (A. Ocneanu)

M : AFD type II factor

G : discrete amenable group

$\alpha: G \rightarrow \text{Aut } M$ action

$\exists \tau, \alpha$ a cocycle conjugacy a complete invariant if

$(N(\alpha), \chi = [\lambda, \mu], \text{mod})$

$$\cong \tau, \quad N(\alpha) = \alpha^{-1}(\text{Int } M)$$

$\chi = [\lambda, \mu]$: characteristic invariant

$\text{mod}: G \rightarrow \mathbb{R}_+$ homomorphism

$$\tau \cdot d_g = (\text{mod } d_g) \tau, \quad \tau: \text{trace on } M$$

iii) type III case (河東 · Sutherland - 竹崎)

M : AFD type III factor

G : discrete amenable group (III , $\alpha \neq \text{id}$ finite or abel)

$\alpha: G \rightarrow \text{Aut } M$ action

$\exists \tau$ complete invariant if

$(N(\alpha), \chi = [\lambda, \mu], \nu, \text{mod})$

$$\cong \tau, \quad N(\alpha) = \alpha^{-1}(\text{Cnt } M)$$

$\chi = [\lambda, \mu]$: characteristic invariant

ν : modular invariant

mod : Connes - 竹崎 module

§2. 結果

まず最初に, III型との比較のために, AFD type II₁ factor に対する結果を述べておく.

定理 (Jones - Popa)

R : AFD type II₁ factor

G : 有限群

α : $G \rightarrow \text{Aut } R$ outer action

に対して, 次の $\alpha = \tau$ が成り立つ

(1) $R \rtimes_{\alpha} G \cong R$ かつ $(\tau = \tau \neq \alpha)$ common Cartan subalg. $\tau \neq \tau$

(2) $R \cong R^{\alpha}$ かつ common Cartan subalg. $\tau \neq \tau$ 必要十分条件 かつ

G : abel

AFD type II_∞ factor $R_{\infty,1}$ に対しては, 上と同じ statement が成り立つ. 実際は,

α : $G \rightarrow \text{Aut } R_{\infty,1}$ outer action of finite group

とすれば, Ocneanu の結果から,

$$\begin{array}{ccc} R_{\infty,1} \rtimes_{\alpha} G & & (R \rtimes_{\beta} G) \otimes B(H) \\ \text{vii} & \cong & \text{vi} \\ R_{\infty,1} & & R \otimes B(H) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} R_{\infty,1} & & R \otimes B(H) \\ \text{vii} & \cong & \text{vii} \\ (R_{\infty,1})^{\alpha} & & R^{\beta} \otimes B(H) \end{array}$$

とあることはわかったので。 $\cong \tau$ 。 β は unique outer action of G on R 。

III型に対しては、次のことが成り立つ。

定理

M : AFD type III factor

G : finite group

α : $G \rightarrow \text{Aut } M$ outer action

に対して、次のことが成り立つ。

(1) $M \rtimes_{\alpha} G \cong M$ が common Cartan subalg. $\tau \in \mathcal{E}$ 、必要十分条件は

$$N(\alpha) = \{e\} \quad (e \text{ は } G \text{ の unit})$$

(2) $M \cong M^{\alpha}$ が common Cartan subalg. $\tau \in \mathcal{E}$ 、必要十分条件は

$$\left\{ \begin{array}{l} G : \text{abel} \\ \text{mod } \alpha_g = 1, \quad g \in G \\ \lambda(g, h) = 1, \quad g \in G, h \in N(\alpha) \end{array} \right.$$

II型とIII型との本質的相違は、outer actionの“種類”が異なることである。Jonesの結果から、有限群の $R \wedge$ の作用は一意的であるが、III型 factor $M \wedge$ の作用は、上の invariant τ に対しては（小か大か）に一意的ではなく、“III型的”な作用が存在する（ただし、III₁以外の場合）。

一般に、III型 factors の pair $M \cong N$ が common Cartan

subalg. を含むとき, その flow spaces X_M, X_N の間には $X_M \cong X_N$ なる関係 (quotient を与える τ) があり, この性質に対応するものが定理の条件 τ である.

証明の idea は, 与えられた pair は conjugate τ から, common Cartan subalg. を含む model を作ることに τ がある τ , 作用の分類結果に深く依存している. また, 接合積と不動点については, お互いに "dual" な関係になり, τ である τ , index theoretic の duality を意味する次の事実が証明の key となる τ .

M : AFD factor

G : finite abelian group

$\alpha: G \rightarrow \text{Aut } M$ outer action

に対して,

$$\begin{array}{ccc} M & & (M \rtimes_{\alpha} G) \rtimes_{\hat{\alpha}} G \\ \cong & & \cong \\ M^{\times} & & M \rtimes_{\alpha} G \end{array}$$

注意.

群 G が無限群 α であるときは, 接合積と不動点の間には本質的な "差" が生じ, 同時に扱える τ である τ である τ . 上の証明の idea から, 接合積に関しては discrete amenable group に関して (II_1 のときは, abel を仮定して) 必要十分条件がわかる.

§ 3. example

次の example は、典型的な “III 型の” 作用の例である。

M : AFD type III $_{\lambda}$ factor, $0 < \lambda < 1$

$\varphi \in M^+$: faithful state such that

$$\sigma_T^{\varphi} = 1, \quad T = -2\pi / \log \lambda$$

$n \in \mathbb{N}$: fix

$$G = \mathbb{Z}_n$$

$\alpha: G \rightarrow \text{Aut } M$ outer action

$$\alpha^i = \sigma_{\frac{i}{n}T}^{\varphi}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1$$

である。 $\alpha^n = \text{id}$ 。

$$N(\alpha) = G \cdot \mathbb{Z}_n$$

$$\lambda = \mu = 1$$

$$\nu(i) = \frac{i}{n}T$$

$$\text{mod } \alpha^i = 1$$

であるから、 $M \cong M^{\alpha}$ は common Cartan subalg. $\mathcal{E} \in \mathfrak{S}$

$M \rtimes_{\alpha} G \cong M$ は \mathfrak{S} である。 $\mathfrak{S} \ni X_{M \rtimes_{\alpha} G}, X_M, X_{M^{\alpha}} \in$

\mathfrak{S} である。 $M \rtimes_{\alpha} G, M, M^{\alpha}$ の flow spaces と \mathfrak{S} の

“大小関係” がある。

$$X_{M \rtimes_{\alpha} G} = X_M \times \{1, 2, \dots, n\}$$

$$X_{M^{\alpha}} = X_M \times \{1, 2, \dots, n\}$$

これは 接合積 と 不動点 が "dual" な関係にあることの意味である。

References

- [1] V. Jones and S. Popa : Some properties of MASA's in factors , Operator Theory : Adv. Appl. 6 , Birkhäuser Verlag , Basel-Boston , 1982 , 89 - 102 .
- [2] A. Ocneanu : Actions of discrete amenable groups on von Neumann algebras , Springer Lecture Notes in Math. No. 1138 .
- [3] C. Sutherland - M. Takesaki : Actions of discrete amenable groups on injective factors of type III_λ , $\lambda < 1$. Pacific J. Math. 137 (1989) . 404 - 444 .
- Y. Kawahigashi - C. Sutherland - M. Takesaki : The structure of the automorphism group of an injective factor and the cocycle conjugacy of discrete abelian group actions , preprint .
- [4] J. Feldman - C. Sutherland - R. Zimmer : Subrelations of ergodic equivalence relations , Ergod. Th. & Dynam. Sys. 9 (1989) 239 - 269
- [5] T. Hamachi - H. Kosaki : Orbital factor map . preprint .