

Paris Harrington 原理とその周辺

Ⅲ

九大工学部 倉田令一朗 (Reijiro Kumata)

以下では Paris Harrington 原理 PH とその拡張 PH_n とその周辺を論ずる。周辺とは Reflection Principle から ω -帰納法のことである。左に考察の範囲は 1st order logic 内に限定される。

I Paris Harrington 原理

1. 定義 $M, e \in \omega$, M は $\{0, 1, \dots, M-1\}$ と同一視される。

$$[M]^e = \{X; X \subseteq M, \bar{X} = e\}$$

Partition とは map $P: [M]^e \rightarrow r (= \{0, 1, 2, \dots, r-1\})$ $q = r$.

$X \subseteq M$; homogeneous for a Partition P とは $P \upharpoonright [X]^e = \text{const}$ $q = r$ である。

$M \xrightarrow{*} (k)_r^e$ $k, e, r \in \omega$ ($k > e$) とは $\forall n \exists X \subseteq M$ $P: [M]^e \rightarrow r$ に対し、次のような $X \subseteq M$ が存在する $n = r$ である。

(i) X is homogeneous for P , (ii) $\bar{X} \geq k$, (iii) $\bar{X} \geq \min X$.

PH (Paris Harrington Principle とは次の命題を意味する)。

$$\forall r \exists k \exists M (M \xrightarrow{*} (k)_r^e)$$

$$PH^e; \forall r \forall k \exists M (M \xrightarrow{*} (k)_r^e)$$

1

同様 $[a, b] \xrightarrow{x} (k)_r^e$ ($k > e$) は $\forall P: [a, b] \rightarrow r, \exists X \subseteq [a, b]$
 s.t (i) X is P -homo (ii) $\bar{X} \geq k$ (iii) $\bar{X} \geq \min X$.

命題 PH は次の (1), (2) (3) の各は互に同値である。

$$(1) \forall a, k, r, e \exists b ([a, b] \xrightarrow{x} (k)_r^e)$$

$$(2) \forall x, z \exists y ([x, y] \xrightarrow{x} (z+1)_2^2)$$

$$(3) \forall z \exists y ([0, y] \xrightarrow{x} (z+1)_2^2)$$

2. PH は真である。

命題 (i) PH は真である。 (ii) 各 e に対し $PA \vdash PH^e$ である。

(iii) $PA, RFN_{\Sigma_1}(PA) \vdash PH$ ((ii) に代しては [17] 参照)

説明. (i) は König lemma と Infinite Ramsey theorem を用いて
 (c.f. 2 in [1]) (ii) (i) の証明より 各 e に対し $PA_2 \vdash PH^e$
 が得られる。 Σ_1 は PA の 2 階述語拡大, したがって
 各 e に対し $PA \vdash PH^e$, したがって PA の中で形式化して (iii) が得られる。

3. Lemma

PH の導出の諸定理の正のに次の補題をかくのが便利
 である。(von der Twer (2)) PH は仮定する。

与えられた $a, e, p, k (> e)$ が \forall primitive recursive function f
 に対し 次より b が存在する; 任意の $P: [a, b] \rightarrow 2$ に対し
 $X \subseteq [a, b]$ が存在して次を満足する (i) X is P -homo, (ii) $\bar{X} \geq k$
 (iii) $\min X \geq p$, (iv) $\bar{X} \geq f(\min X)$, (v) $x, y \in X, x < y \Rightarrow f(x) < y$

4. Theory T

T の言語 : $0, 1, +, \cdot, <, *$ および無限個の constants c_0, c_1, \dots

T の公理 (i) $0, 1, +, \cdot, <$ の定義式は limited formula に与えられる induction (ii) $c_i^2 < c_{i+1}$

(iii) 任意の limited formula $\varphi(y_1, \dots, y_n, z_1, \dots, z_e)$ と $i < k_1 < \dots < k_e$, $i < k'_1 < \dots < k'_e$, $\forall \psi < c_i [\varphi(\psi, c_{k_1}, \dots, c_{k_e}) \leftrightarrow \varphi(\psi, c_{k'_1}, \dots, c_{k'_e})]$

Theory T は Harrington に Σ_1^1 による Σ_1^1 の Σ_1^1 PH 原理の証明論的扱いは可能であると示した。

定義 $\varphi := Q_0 x_0 \dots Q_{n-1} x_{n-1} \psi(x_0 \dots x_{n-1}) \in PA \Rightarrow \Sigma_n$ または Π_n formula とする。 ψ は PR-formula ([6]) である。 Σ_n とする φ^* と定義する; $\varphi^*(z_0 \dots z_{n-1}) := Q_0 x_0 < z_0 \dots Q_{n-1} x_{n-1} < z_{n-1} \psi(x_0 \dots x_{n-1})$ と $\forall (z_0 \dots z_{n-1})$ は φ に z_i の variable とする。

命題 (Uesn) $\theta(y) := \theta(y_1, \dots, y_n)$ は Π_n または Σ_n -formula とし y_1, \dots, y_n 以外の自由変数はあるわけがないとする。

$PA \vdash \theta(y)$ $i < k_1 < \dots < k_n$ ならば $T \vdash \psi < c_i \rightarrow \theta^*(\psi, c_{k_1}, \dots, c_{k_n})$

これは [1] の 2.4 に対応する証明論的証明の上記 [1] に示す (奥村 [5] 2.2 による)。

系 $PA \vdash Con T \rightarrow Con PA$

5. $PA \vdash Con PA \rightarrow Con T$ $PA \not\vdash PH$

[1] では $PA, PH \Rightarrow \vdash Con T$ を導き上の系から $PA \not\vdash PH$ を導くことができる少し精密な結果が得られる。

定義 $S = S(c_0 \dots c_{n-1})$ は T の文で T の constants は $\{c_0, \dots, c_{n-1}\}$

にありの如くである。 $\hat{S} := \exists x_0 \dots \exists x_{n-1} S(x_0 \dots x_{n-1})$ とおく。

$FS_T(x)$ は "x は T の有限個の公理の conjunction の真 - 値である" とある formula, $FC_\omega(T)$ は "T の ω 上の有限部分集合は ω 上 satisfiable である" とある formula である。

よって $FC_\omega(T) := \forall x (FS_T(x) \rightarrow Tr_{\Sigma_1}(\hat{x}))$ (T の公理は Σ_1 -型)

Lemma (1) $S = S(c_0 \dots c_{n-1})$ は T の有限部分集合 である。

とあるとき d があつて $PH^d \Rightarrow \hat{S}$ は真

(2) $\text{PA} \vdash S$ である $\text{PA} \vdash \hat{S}$

(3) $\text{PA} \vdash PH \rightarrow FC_\omega(T)$

Theorem (1) $\text{PA} \not\vdash PH$, (2) $\text{PA} \vdash \text{Con PA} \rightarrow \text{Con T}$ ($\text{Con PA} \leftrightarrow \text{Con T}$)

(1) は [1] の主要結果の一つである。 $\text{PA} \vdash PH \xrightarrow{\text{Lemma 3}} FC_\omega(T) \xrightarrow{\text{Prop 4}} \text{Con T} \rightarrow \text{Con PA}$

PA より出る。 (2) は Lemma (2) から出る。

6. $PH \leftrightarrow \text{RFN}_{\Sigma_1}(\text{PA})$ 等

定義 $\text{PA}(\omega) := \text{PA} + \text{Th } \Pi_\omega(M)$ (= {true Π_ω -sentences})

Theorem $PH, FC_\omega(T), \text{Con}(\text{PA}(\omega)), \text{RFN}_{\Sigma_1}$ は PA と同値である。

[証明] $PH \xrightarrow{(1)} FC_\omega(T) \xrightarrow{(2)} \text{Con}(\text{PA}(\omega)) \xrightarrow{(3)} \text{RFN}_{\Sigma_1} \xrightarrow{(4)} \text{RFN}_{\Sigma_1} \xrightarrow{(5)} PH$

(1) は Lemma 4. (3), (4) は次章, (5) は Prop. 2 (iii)

(2) は informal に ω の k に $1 \leq k < \omega$ である。 $FC_\omega(T)$ と仮定し

$\text{PA} \vdash \theta_1 \dots \theta_n \rightarrow \perp$ (θ_i は true Π_1 sentences) である。 とあるとき $\text{PA} \vdash \theta_1^* \dots \theta_n^* \rightarrow \perp$

(Prop 4) $\theta_1^* \dots \theta_n^*$ は satisfiable on ω ($\theta_i = \forall x \psi_i(x)$ ならば $\theta_i^* := \forall x < c_0 \psi_i(x)$)

である $FC_\omega(T)$ は矛盾である。

系 PA(1) ≠ PH

7. モデル論的方法

(2), (3)等のモデル論的方法は基本的には a lemma を出発点
にある。

Lemma M は countable nonstandard model of PA である。

$c > M$ に対して $M \models [a, b] \xrightarrow{*} (c+1)_c$ 及び sequence $(e_i)_{i \in \mathbb{N}}$,

$e_i \in [a, b]$ が存在して $(M, (e_i)_{i \in \mathbb{N}}) \models T$.

$a < I < b$

$I = \{d \in M \mid \exists i \in \mathbb{N} \ d < e_i\}$ とおくと $I \subseteq_e M$ (end extension) である。

$I \models PA$, 更にこの場合 $I \subseteq_{\Sigma_0} M$, したがって Σ_0 -formula φ と $\vec{a} \in I$

に対して $I \models \varphi(\vec{a}) \iff M \models \varphi(\vec{a})$ (2.3 (ii) [2])

PA(1) ≠ PH のモデル論的証明; $M \models Th(M)$ である。

$a \in M \setminus \mathbb{N}$, $N \models PH$ である; $M \models [a, b] \xrightarrow{*} (a+1)_a$ である最小の

$b \in M$ である。上の lemma に $F > 2$ $I \subseteq_e M$ である, $I \models PA$

$I \models Th_{\pi_1}(M)$ $a < I < b$. $\forall (PA(1) \vdash PH)$ ならば $b' \in I$ である。

$I \models [a, b'] \xrightarrow{*} (a+1)_a$ であることは $M \models [a, b'] \xrightarrow{*} (a+1)_a$ ($I \subseteq_e M$)

であるから b の最小性に矛盾する。

8. Provably recursive function

$f(a) = M_b([a, b] \xrightarrow{*} (a+1)_a)$ であることは recursive

Theorem g が provably recursive in PA ならば f は g を

dominate する。すなわち $\exists n \in \mathbb{N} \ \forall m \in \mathbb{N} \ (m \geq n \rightarrow f(m) > g(m))$

である model 論的証明は至わりの簡単である (c.f. [2]). [1] へ

の2が命題1の $PH \leftrightarrow (2)$ を明確にして存の「の」の「ま」の「の」
 証明論的証明はむつかしい。これは事実上 Ketonen Solovay
 [16] にある。

von der Tuwer は(2)の序で「PA における証明の概念を完全に抹殺した」と述べた。奥村[5], 小野角田[17] 倉田[4] は「 ϵ -デリの概念を完全に抹殺した」と述べた。

9. T_n, T_∞ についての注意

定義 Theory T_n ($n=0, 1, \dots$) と T_∞ は T の公理 (i) (iii) の limited formula と Π_n -formula と Π_1 -formula とは任意の formula にかまかえし得られるものとする。 $FC_\omega(T_n)$ は PA の文に存在の次数が成り立つ。

(1) T_∞ は PA の conservative extension である。

(2) $PA \vdash Con PA \leftrightarrow Con T_n \leftrightarrow Con T_\infty$

(3) $PA \vdash PH \leftrightarrow FC_\omega(T_n)$

したがって $\{Con(T_n)\}_{n \in \omega} \equiv \{FC_\omega(T_n)\}_{n \in \omega} \equiv RFN_{\Sigma_n}(PA)$
 ($n=1, 2, \dots$) に対応する hierarchy であることはできよう。

II Reflection Principle と PH, 拡張 PH_n

10. Reflection principle

$Rfn(PA)$ (local reflection principle) $Pr_{PA}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi$, φ は文 $(PA)^0$.

$RFN(PA)$ (uniform reflection P.) $\forall x Pr_{PA}(\ulcorner \varphi(x) \urcorner) \rightarrow \forall x \varphi(x)$

$RFN'(PA)$ (second uniform r. P.) $\forall x [Pr_{PA}(\ulcorner \varphi(x) \urcorner) \rightarrow \varphi(x)]$

$\equiv \equiv \varphi \text{ is } x \rightarrow \varphi \text{ is free in } x \rightarrow \ulcorner \varphi(x) \urcorner \text{ is } \ulcorner \varphi(x) \urcorner \text{ or } \ulcorner \varphi \urcorner$

$S(\ulcorner \varphi \urcorner, x)$ is formal expression.

$Rf_{\Sigma_n(\Pi_n)}(PA), RFN_{\Sigma_n(\Pi_n)}(PA), RFN'_{\Sigma_n(\Pi_n)}(PA)$ is Rf_n, RFN, RFN' of $\varphi \in \Sigma_n(\Pi_n)$ -sentence or formula is $\#1116$ is $\#9$.

$RFN_{\Sigma_n(\Pi_n)}^G$ (Global Reflection Principle) is

$$\forall x (St_{\Sigma_n(\Pi_n)}(x) \wedge Pr_{PA}(x) \rightarrow Tr_{\Sigma_n(\Pi_n)}(x))$$

Prop (1) $PA \vdash RFN_{\Sigma_n(\Pi_n)}^G \rightarrow RFN'_{\Sigma_n(\Pi_n)}$

(2) $PA \vdash RFN_{\Sigma_n}^G \leftrightarrow Con(PA(k))$

$PA(k) = PA + Th_{\Pi_n}(M)$

(2) $RFN_{\Sigma_n}^G(PA) \Leftrightarrow \forall \varphi \in \Sigma_n (Pr_{PA}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow Tr_{\Sigma_n}(\ulcorner \varphi \urcorner))$

$\Leftrightarrow \forall \varphi \in \Sigma_n (\neg Tr_{\Sigma_n}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \neg Pr_{PA}(\ulcorner \varphi \urcorner))$

$\Leftrightarrow \forall \varphi \in \Pi_n (Tr_{\Pi_n}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \neg Pr_{PA}(\ulcorner \neg \varphi \urcorner)) \Leftrightarrow Con(PA(k))$

Theorem (6.6) (i) $PA \vdash Con_{PA} \leftrightarrow RFN_{\Pi_1}(PA)$

(ii) $PA \vdash RFN_{\Sigma_n(\Pi_n)} \leftrightarrow RFN'_{\Sigma_n(\Pi_n)}$

(iii) $PA \vdash RFN_{\Pi_{k+1}}(PA) \leftrightarrow RFN_{\Sigma_n}(PA) \quad k \geq 0$

(iv) $PA \vdash RFN_{\Pi_k} \wedge RFN_{\Sigma_n} \quad k \geq 1$

($PA + RFN_{\Pi_k}$ is consistent is fixed is

(iii) (iv) is $\#2 \geq RFN_{\Sigma_n} (n=1, 2, \dots)$ is hierarchy is $\#3$.

$PH \leftrightarrow RFN_{\Sigma_1}$ in PA is $\#3$ is $\#3$ is $PH_n \leftrightarrow RFN_{\Sigma_n}$ in PA is $\#3$

is $\#3$ is PH is $\#3$ is PH_n is $\#3$ is $\#3$.

11 PH_n is definition

(1) $\varphi \in \Pi_n$ -sentence $\forall v_0 \exists v_1 \dots \forall v_{n-1} \psi(v_0 \dots v_{n-1}) - \psi$ is PR-formula — is it? , $\varphi^*(u_0 \dots, u_{n-1})$ is

$\forall v_0 < u_0 \exists v_1 < u_1 \dots \forall v_{n-1} < u_{n-1} \psi(v_0 \dots v_{n-1})$ is it? , \bar{X} is $\{u_0 \dots u_{n-1}\}$ is φ is a variable is it?

$X = \{x_0 x_1 \dots\} (x_0 < x_1 < \dots) \in \bar{X} \geq n$ is a finite subset.

$$X \models_0 \varphi^* \iff \varphi^*(x_0, \dots, x_{n-1}) \text{ is true}$$

$$X \models \varphi^* \iff \varphi^*(x_{i_0} \dots x_{i_{n-1}}) \text{ is true for all } i_0 < i_1 < \dots < i_{n-1} < \bar{X}$$

(2) $M \xrightarrow[\ast]{\varphi} (k)_r^c (k \geq n)$ φ is Π_n -sentence is it? $n \leq r \leq \bar{M}$.
 is it? \bar{M} is a partition $P: [M]^c \rightarrow r$ is it?

$X \subseteq M$ is it? $i) X$ is homogeneous for P ,

ii) $\bar{X} \geq k$ iii) $\bar{X} \geq \min X$ iv) $X \models_0 \varphi^*$

(3) $PH_n \forall k \geq n \in, \text{rand of all true } \Pi_n\text{-sentence } \varphi, M \text{ is it?}$
 $i) M \xrightarrow[\ast]{\varphi} (k)_r^c$

Prop 1 PH_n is Π_{n+1} -sentence is it?

Π_n -formula $\tau_n(x)$ is it? $\tau_n(P) \iff \varphi$ is it? $\tau_n(P) \in \mathbb{A}$ is it?

$$PH_n \text{ is } \forall k \geq n \forall r \forall \varphi [\tau_n(P) \rightarrow \exists M (M \xrightarrow[\ast]{\varphi} (k)_r^c)]$$

Prop 2 PH_n is it? (1)(2)(3) is it? (4) is it?

$$(1) \forall \text{ true } \Pi_n\text{-}\varphi \forall a \forall k \forall r, e \exists b ([a, b] \xrightarrow[\ast]{\varphi} (k)_r^c)$$

$$(2) \forall \text{ true } \Pi_n\text{-}\varphi \forall a \subset \exists b ([a, b] \xrightarrow[\ast]{\varphi} (c+1)_c^c)$$

同値であることは示唆し。

系 2 $RFN(PA) \iff$ 大抵の単調増大算術的関数 f に対し $PH(f)$ が成立。

III $RFN(PA)$ と ϵ_0 -Induction

18 $RFN \rightarrow Ind \epsilon_0$

定義 $Ind(n, \varphi)$: ω_n までの transfinite induction として PA の formula

φ に対し成立する \iff $\forall x \in \omega_n$ において PA の formula $\varphi(x)$ が成立する。

$$\forall x (\forall y \leq x \varphi(y) \rightarrow \varphi(x)) \rightarrow \forall x \varphi(x) \quad (cf. [8])$$

$$Ind(\epsilon_0, \varphi) := \forall x Ind(x, \varphi), \quad Ind \epsilon_0 : Ind(\epsilon_0 \varphi) \text{ for every } \varphi.$$

Prop $PA \vdash RFN \rightarrow Ind \epsilon_0$

実際、PA の任意の formula $\varphi(x)$ に対し、 n に対し

$$PA \vdash Ind(n, \varphi) \quad ([7], [8], [9], [10])$$

このことは PA の形式化として $PA \vdash \forall x Pr_{PA}(\ulcorner Ind(x, \varphi) \urcorner)$ である。

19 $Ind \epsilon_0 \rightarrow RFN$ (1st proof)

PA^w : axiom は true quantifier free formula of PA

inference rule は LK の ω -rule と ω -rule と ω 。

$\varphi(x)$ は x 以外 free var. である PA の formula である。

$$PA \vdash \varphi(\bar{x}) \implies PA^w \vdash \varphi(\bar{x}) \implies PA^w \vdash \varphi(\bar{x}) \quad (\text{カットなし})$$

ここで $Ind \epsilon_0$ を用いて $\varphi(\bar{x})$ is true, である PA の形式化として

$$PA \vdash Ind \epsilon_0 \vdash Pr_{PA}(\ulcorner \varphi(\bar{x}) \urcorner) \rightarrow Tr_p(\ulcorner \varphi(\bar{x}) \urcorner)$$

$$\text{" } \vdash Pr_{PA}(\ulcorner \varphi(\bar{x}) \urcorner) \rightarrow \varphi(x)$$

ε_0 is $\varphi(x)$ of unbounded quantifier \rightarrow 数.

(cf. Schwichtenberg [15])

20 $\text{Ind}_{\varepsilon_0} \rightarrow \text{RFN}(\text{PA})$ (2nd Proof)

$$\varphi(x) := \exists x_1 \forall y_1 \dots \exists x_n \forall y_n \psi(x_1 \dots x_n, y_1 \dots y_n) \quad \psi \in \Sigma_0$$

$\varphi(x)$ is $\exists x_1 \forall y_1 \dots \exists x_n \forall y_n \varphi_H(x)$ \rightarrow 数 $\varphi(x) \rightarrow \varphi_H(x)$ in LK \rightarrow 数 2.

$$\varphi_H(x) := \exists x_1 \dots \exists x_n \psi(x, x_1 \dots x_n, f_1(x_1) \dots f_n(x_1 \dots x_n))$$

No counter example interpretation by functional $F_1 \dots F_n \in$

$$\varphi^N(x) := \varphi^N(x, F_1 \dots F_n)$$

$$= \psi(x, \bar{F}_1 \dots \bar{F}_n, f_1(\bar{F}_1) \dots f_n(\bar{F}_1 \dots \bar{F}_n)) \quad \text{「定」}$$

$$\varepsilon_0 = \bar{F}_0 = F_0(x, f_1 \dots f_n) \quad (\text{Kreisel [11]})$$

$$\vdash \text{PA} \vdash \varphi(\varepsilon_0) \quad (= \text{PA} \vdash \varphi_H(\varepsilon_0))$$

Hilbert's Substitution method is $\vdash \varphi_H(\varepsilon_0)$ of 証明 \rightarrow functional

$F_1 \dots F_n \in$ 構成 \rightarrow $\varphi^N(x, F_1 \dots F_n)$ が成立 \rightarrow

ε_0 is Σ_0 -induction $\in \text{PA}$ is 証明 \rightarrow (Ackermann [2] Tait [13])

ε_0 is Σ_0 formalization \rightarrow

Prop(1) x of φ is free is ε_0 in Σ_0 formula $\varphi(x)$ \rightarrow $\varphi(\varepsilon_0)$ of 証明 \rightarrow Functional F_1, \dots, F_n ($\bar{F}_1 \dots \bar{F}_n$ is PA' 's term) \rightarrow \vdash

$$\vdash \text{PA}' \vdash \text{Ind}_{\varepsilon_0} \vdash \text{Pr}(\text{PA}(\varphi(x)), \text{PA}) \rightarrow \varphi^N(x, F_1 \dots F_n) \quad (*)$$

ε_0 is PA' is PA is free function f_1, \dots, f_n \rightarrow μ -symbol \rightarrow PA' is Σ_0

$\text{Ind}_{\varepsilon_0}$ is PA' 's formula is $\vdash \text{PA}'$ is Σ_0 -induction

Prop(2) PA' 's term e_1, \dots, e_n \rightarrow

$$PA' \vdash \forall x_1 \dots \forall x_n \psi(x_1, \dots, x_n, e_1(x_1), \dots, e_n(x_1, \dots, x_n)) \rightarrow \varphi(x)$$

$$\text{且 } \alpha \leq \beta \text{ 且 } e_1(x_1) = \mu \gamma_1 \rightarrow \exists x_2 \forall \gamma_2 \dots \exists x_n \forall \gamma_n \psi(x_1, x_2, \dots, x_n, \gamma_1, \dots, \gamma_n)$$

$$e_2(x_1, x_2) = \mu \gamma_2 \rightarrow \exists x_3 \forall \gamma_3 \dots \exists x_n \forall \gamma_n \psi(x_1, x_2, \dots, x_n, \gamma_1, \dots, \gamma_n)$$

..... 且 亦 有 此 类 似 的 式 子 .

(*) 是 否 有 $\varphi^N(x, F_1, \dots, F_n)$ 且 $f_1, \dots, f_n \in e_1, \dots, e_n$ 的 不 同 的 延 展

prop (2) 在 \mathbb{N} 上 的 延 展

$$PA' + \text{Ind}' \varepsilon_0 \vdash \text{Pr}_{PA}(\ulcorner \varphi(x) \urcorner) \rightarrow \varphi(x)$$

且 得 到 的 $PA' + \text{Ind}' \varepsilon_0$ 是 $PA + \text{Ind} \varepsilon_0$ 的 conservative extension 的 延 展

$$\text{且 } PA + \text{Ind} \varepsilon_0 \vdash \text{Pr}_{PA}(\ulcorner \varphi(x) \urcorner) \rightarrow \varphi(x)$$

以上 是 Kreisel-Lévy [14] 的 证明 的 结果 .

Theorem $PA \vdash \text{RFN}(PA) \leftrightarrow \text{Ind} \varepsilon_0$

IV $PH_n, n=1, 2, \dots$ 且 $\text{Ind} \varepsilon_0$

PH_n 是 RFN 的 证明 且 RFN 是 $\text{Ind} \varepsilon_0$ 的 证明 且 有

子 的 延 展 且 PH_n 是 $\text{Ind} \varepsilon_0$ 的 证明 且 有 子 的 延 展 .

直接 证明 是 事实上 Ketonen-Solovay ([17]) 的 结果 . 以下 是 其

的 整理 (大 意) .

$$1. \lambda \leq \varepsilon_0, n \in \omega \text{ 且 } \exists \{ \lambda \} (n)$$

$$\lambda < \varepsilon_0 \text{ 且 } \exists \lambda = \omega^{\alpha_1 m_1} + \dots + \omega^{\alpha_n m_n} \text{ 且 } \lambda \text{ 的 Cantor}$$

normal form 是 不 同 . $\alpha_1 > \dots > \alpha_n$ 且 m_i 是 正 整 数 .

$$\lambda = \omega^\alpha (\beta + 1) \text{ 且 } \exists \beta$$

$$(1) \lambda = \omega^{\alpha+1} (\beta + 1) \text{ 且 } \exists \{ \lambda \} (n) = \omega^{\alpha+1} \beta + \omega^\alpha \cdot n$$

$$(2) \lambda = \omega^\beta (\beta + 1) \text{ is } \lambda \text{ is limit } \tau; \{ \lambda \} (n) = \omega^\beta \cdot \beta + \omega^{\beta} (n)$$

$$(3) \lambda = \varepsilon_0 \text{ is } \{ \varepsilon_0 \} (0) = \omega \quad \{ \varepsilon_0 \} (n+1) = \omega^{\{ \varepsilon_0 \} (n)}$$

$$(4) \{ \beta + 1 \} (n) = \beta, \quad \{ 0 \} (n) = 0$$

$$\text{次の成り立ち: } 0 < \alpha \leq \varepsilon_0 \Rightarrow \{ \alpha \} (n) < \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \{ \alpha \} (n) = \alpha.$$

2. α -large set

$\alpha \leq \varepsilon_0$. $S = \langle s_0, \dots, s_{n-1} \rangle \in \omega$ a finite sequence τ .

$\{ \alpha \} \langle S \rangle \in \omega$ and τ is defined τ . $\{ \alpha \} \langle \emptyset \rangle = \alpha$ (\emptyset is empty set)

$$\{ \alpha \} \langle s_0, \dots, s_{n-1} \rangle = \{ \alpha \} \langle s_0, \dots, s_{n-2} \rangle (s_{n-1})$$

ω a finite set X is τ is

$$\{ \alpha \} \langle X \rangle = \{ \alpha \} \langle x_0, x_1, \dots, x_{n-1} \rangle$$

$$\text{is } X = \{ x_0, x_1, \dots, x_{n-1} \} \quad x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} \text{ is } \tau.$$

定義 X is α -large τ is $\{ \alpha \} \langle X \rangle = 0$ のこと

命題 次の性質が成り立ち。

(i) X is ω -large τ is τ and X has finite part set is α -large τ is τ .

$$(ii) X \text{ is } m\text{-large } (n \in \omega) \iff \bar{X} \geq n$$

$$(iii) X \text{ is } \omega\text{-large} \iff \bar{X} > \min X$$

$$(iv) X \text{ is } \omega + n\text{-large} \iff X \text{ is relatively large } \tau \text{ is } \bar{X} \geq n$$

$$(v) A \subset B, A \text{ is } \alpha\text{-large} \Rightarrow B \text{ is } \alpha\text{-large}$$

$F: X \rightarrow r$ is τ and X is $\alpha \cdot r$ -large $\Rightarrow \exists j \in r, f^{-1}(j)$ is α -large

3 Ketonen Solovay's Lemma

$\alpha \geq \omega$ $2 \leq n$ $r < \omega$ $\Rightarrow \exists \perp$

$$\theta_r(\alpha) = \omega^\alpha + \omega^3 + \max(r, \|\alpha\|) + 3 < \alpha <$$

$\Rightarrow \|\alpha\|$ is $\alpha = \omega^{\alpha_1} n_1 + \dots + \omega^{\alpha_k} n_k$ (Cantor normal form)

$\Rightarrow \exists \|\alpha\| = \sum_{j=1}^k \|\alpha_j + 1\| \cdot \omega_j^n$ $\Rightarrow \exists > 2$ 定数 $\perp n \perp$

Lemma, X is $\theta_r(\alpha)$ -large set $\perp P: [X]^{n+1} \rightarrow r$ $\perp \exists$

$\exists Y \subseteq X$; Y is a α -large prehomogeneous set, $\perp \exists n \perp$

$\perp n \perp \perp$, $x_0 < \dots < x_{n+1} < y$, $x_0 < \dots < x_{n-1} < z$ from $Y \Rightarrow \exists \perp$

$$P(x_0, x_1, \dots, x_{n+1}, y) = P(x_0, x_1, \dots, x_{n+1}, z)$$

$$\theta_r^1 = \alpha, r, \theta_r^{n+1}(\alpha) = \theta_r(\theta_r^n(\alpha)) \quad n \geq 1 < \perp <. \quad \perp n \perp \perp$$

Theorem X is $\theta_r^n(\alpha)$ -large $\perp \exists \perp$ $\perp n \perp \perp$ \Rightarrow \exists a partition

$P: [X]^n \rightarrow r$ is α -large homogeneous set for $P \perp \exists \perp$

Corollary M is $\theta_r^n(\omega + n + 1)$ -large $\Rightarrow M \xrightarrow[*]{f} (n+1)_r^n$

f is 昇強單調増大関数: $\omega \rightarrow \omega < \perp \perp$

ω の有限集合 X is α -large(f) $\perp \perp$ $f(X)$ is α -large $n = \perp$

$\perp \perp \perp$

Corollary 2 M is $\theta_r^n(\omega + n + 1)$ -large(f) \Rightarrow

$$M \xrightarrow[*]{f} (n+1)_r^n$$

$\text{Ind} \perp \perp_0 \perp \text{PH}_n \quad n=1, 2, \dots$ \perp ; 直接証明する方法是等者に

は矛盾の $\perp \perp \perp$ ない。

1984 8.30.

Reference

- [1] Paris, J and Harrington, L : A mathematical incompleteness in Peano Arithmetic, in Handbook of Mathematical Logic, North Holland (1977).
- [2] T. von der Twer : Some remarks on the mathematical incompleteness of Peano's arithmetic founded by Paris and Harrington, in Set Theory and Model Theory, M.L.N. 872 (1979).
- [3] Paris, J : Some independence Results for Peano Arithmetic, in Journal of Sym. Logic vol. 43, No. 4 (1978).
- [4] Kurata, R : Paris Harrington Theory and Reflection Principles, in Saitama Journal of Math. to appear.
- [5] 奥村 薫 : Paris Harrington 定理の不可証明論的考察 (修論).
- [6] Smoryński, C : The incompleteness theorems, in Handbook of Mathematical Logic, D1, North Holland (1977)
- [7] Gentzen, G : Beweisbarkeit und Unbeweisbarkeit der transfiniten Induktion in der reinen Zahlentheorie. Math. Annalen 119 (1943).
- [8] Hilbert, D, and Bernays P : Grundlagen der Mathematik Berlin vol. II (1939).
- [9] Schütte, K : Beweistheorie, Berlin (1960).

[10] Shirai, K: A relation between transfinite induction and mathematical induction in elementary number theory; in Tsukuba J. Math. vol 1 (1977).

[11] Kreisel, G: On the interpretation of non finitist proofs, J. Sym. Logic 16 (1951) and 17 (1952).

[12] Ackermann, W: Zur Widerspruchsfreiheit der Zahlen theorie, Math. Annalen 17 (1940)

[13] Tate, W, W: The substitution method, J. Sym. Logic 30 (1965)

[14] Kreisel, G and Lévy, A: Reflection Principles and their use for establishing the complexity of axiomatic systems, in Zeitschr. J. math. Logik und Grundlagen d. Math. 14 (1968),

[15] Schmüchternberg, H: Proof theory, Some applications of cut elimination, D2 in Handbook of Math. Logic, North Holland (1977)

[16] Ketonen, J, and Solovay, R: Rapidly growing Ramsey functions. Annals of Math. vol 113 (1981).

[17] Ono, H and Kadota, N: Provably recursive functions in fragments of Peano arithmetic. to appear.