

無限階擬微分作用素の逆の構成について

近畿大理工 青木貴史 (AOKI Takashi)

擬微分作用素はその表象が表象として可逆のとき、すなわち表象の函数としての逆数がまた表象となるとき可逆となる。この主張が無限階の場合も含めて成り立つことは[3]で示されたが、その論法は次のようなものであった。表象 $P(x, \xi)$ が表象として可逆とすると $P(x, \xi) = \exp p(x, \xi)$ の形にのけることにまず注意する。そしてこのような形の表象をもつ作用素 $: \exp p(x, \xi) :$ はある作用素 $: q(x, \xi) :$ の指数函数 $\exp : q(x, \xi) :$ の形にかけるとを示す。そうすれば $: P(x, \xi) : = : \exp p(x, \xi) :$ の逆は $\exp(-: q(x, \xi) :)$ として具体的に得られる。

上の論法自体は簡単であるが具体的に逆の表象を計算するためには q の構成および $\exp(-: q :)$ の表象の計算という二段構えが必要ではじめの数項を求めようとするだけでなくかなり面倒である。そこでこの小論では形式表象に対する指数法則([3], Théorème 2.1) を用いて直接、少しでも簡単に具体的計算ができるような形で逆を構成することについてのべらる。

以下の用語・記号等のうち説明のないものについては [1], [2] を参照されたい。

1. 形式表象に対する指数法則. $X \subset \mathbb{C}^n$ を開集合, $x^* \in T^*X = T^*X - T_x^*X$ の点とする. $p = p(t; x, \xi) = \sum_{j=0}^{\infty} t^j p_j(x, \xi)$, $q = q(t; x, \xi) = \sum_{j=0}^{\infty} t^j q_j(x, \xi)$ は x^* のある錐近傍で定義された 1-0 階の形式表象とする. $(x^*, x^*) \in T^*X \times T^*X$ の近傍で定義された形式表象の列 $\{w_k\}$ ($k=0, 1, 2, \dots$) を次により定める.

$$(1.1) \quad w_0 = p(t; x, \xi) + q(t; y, \eta),$$

$$(1.2) \quad w_{k+1} = \frac{t}{k+1} (\partial_{\xi} \partial_y w_k + \sum_{\nu=0}^k \partial_{\xi} w_{\nu} \cdot \partial_y w_{k-\nu}).$$

このとき

$$(1.3) \quad r = \sum_{k=0}^{\infty} w_k(t; x, x, \xi, \xi)$$

とおくと

定理 1 r は x^* の近傍で定義された 1-0 階の形式表象で $\mathbb{C}_{x^*}^{\mathbb{R}}$ において $:\exp p::\exp q: = :\exp r:$ が成り立つ.

この定理の証明のうち形式的部分はむしろ簡単に Leibniz の法則により作用素の積を

$$:\exp p::\exp q: = :\exp(t_2 t \partial_{\xi} \partial_y) \exp\{p(t; x, \xi) + q(t; y, \eta)\} \Big|_{\substack{t_2=1 \\ y=x \\ \eta=\xi}}$$

と置き $\Pi = \exp(t_2 t \partial_{\xi} \partial_y) \exp\{p(t; x, \xi) + q(t; y, \eta)\}$ とおく. すると

Π は形式的微分方程式 $\partial_{t_2} \Pi = t \partial_{\xi} \partial_y \Pi$, $\Pi|_{t_2=0} = \exp(p+q)$

の一解となる. $\eta = \xi$ $\Pi = \exp(\sum_{k=0}^{\infty} t_2^k w_k)$ の形と仮定すると

Π がこの方程式を満たすことと (1.1), (1.2) が同値であることはあきらか
 かり, 形式的に $:\exp p::\exp q:=:\exp \sum_{k=0}^{\infty} w_k:=:\exp r:$ が
 成り立つことが示された.

r の評価を得るにはもう少し詳しく w_k のつくり方を見る必要が
 ある. その為にあらかじめ p, q の評価を書いておこう. p, q
 は x^* の錐的近傍 $\tilde{\Omega}$ で定義されているとする. $\Omega = U \times \Gamma$

($U \subset X$ 開集合, $\Gamma \subset \mathbb{C}^n$ 開錐) なる形の x^* の近傍 $\tilde{\Omega}$ として $\Omega \subset \tilde{\Omega}$

なるものを取る. このとき $0 < A_0 < 1$ なる定数 A_0 と正定数 d_0

および Γ 上で定義された正値函数 Λ_0 として $\lim_{|z| \rightarrow \infty} \Lambda_0(z)/|z| = 0$ なる

ものが存在して各 j について

$$(1.4) \quad |p_j(x, z)| \leq A_0^j \Lambda_0(z)$$

$$(1.5) \quad |q_j(x, z)| \leq A_0^j \Lambda_0(z)$$

が成り立つ ($(x, z) \in \Omega \cap \{|z| \geq (j+1)d_0\}$) について成り立つ.

さて, $\{w_{j,k}^{(l)}\} \quad (0 \leq l \leq k \leq j)$ を次に示す天下りに定めよう.

$$(1.6) \quad w_{j,0}^{(0)} = p_j(x, z) + q_j(y, \eta),$$

$$(1.7) \quad w_{j,k+1}^{(l)} = \frac{1}{k+1} (\partial_z \cdot \partial_y w_{j-1,k}^{(l)} + \sum_{\mu=0}^{j-k-1} \sum_{l_1=0}^{l-1} \sum_{v=l_1}^{k-l+l_1+1} \partial_z w_{v+\mu,v}^{(l_1)} \cdot \partial_y w_{j-v-\mu-1,k-v}^{(l-l_1-1)}).$$

$T=T^1(j, k, l)$ が $0 \leq l \leq k \leq j$ を満たすときには $w_{j,k}^{(l)} = 0$ と
 約束する. このとき $w_k = \sum_{j=k}^{\infty} t^j \sum_{l=0}^k w_{j,k}^{(l)}$ が成り立つ (こ
 うなように定めた). $w_{j,k}^{(l)}$ の評価は次のようになる.

補題 2 ある定数 $B > 0$ が存在して任意の $\Omega' \subset \Omega$ に対して

$$(1.8) \quad |w_{jk}^{(1)}(x, y, \xi, \eta)| \leq B^k (k+1)^{k-l} A_0^{j-k} \tilde{\Lambda}_0^{l+1} |\xi|^{-k} \varepsilon^{-2k}$$

かつ任意の j, k, l について $\Omega' \times \Omega' \cap \{|\xi|, |\eta| \geq (j+1)(1-\varepsilon)^{-1} d_0\}$ で

成り立つ。ただし ε は $|\xi|=1$ 上の $\partial\Omega$ と Ω' の距離, $\tilde{\Lambda}_0 = \Lambda_0(\xi) + \Lambda_0(\eta)$.

この評価の証明は [2], [3] を参照.

2. 逆の構成

定理 1 を用いて逆を構成することにより 2 次の定理を示すのが目的である.

定理 3

$P(x, \xi)$ を x^* の近傍で定義された表象とする.

$1/P(x, \xi)$ がまた x^* の近傍で定義された表象となるならば表象 $P(x, \xi)$ により定まる擬微分作用素 $:P(x, \xi):$ は $\mathcal{S}_{x^*}^{\mathbb{R}}$ で可逆である.

仮定よりある 1-0 階の表象 $p(x, \xi)$ があって $P(x, \xi) = \exp p(x, \xi)$ と書けることにまず注意する. 作用素 $:P(x, \xi): = :\exp p(x, \xi):$ の逆を構成しよう. 定理 1 において $p(t; x, \xi) = p(x, \xi)$, すなわち $p_0(x, \xi) = p(x, \xi)$, $p_1(x, \xi) \equiv p_2(x, \xi) \equiv \dots \equiv 0$ とおくと

$$:\exp p(x, \xi): = \exp q(t; x, \xi) = :\exp r(t; x, \xi):$$

の形となる. 7-2-1 r は p, q から与えられると (1.1) ~ (1.3) により構成できる. はじめの項を少し具体的に書いてみると次のようになる.

ただし $r_k(t; x, \xi) = w_k(t; x, x, \xi, \xi)$ とおき変数は略記する. また, かんたんのため 1 変数の場合を書く.

$$r_0 = p + q_0 + t q_1 + t^2 q_2 + \dots$$

$$r_1 = t \partial_{\xi} p \cdot \partial_x (q_0 + t q_1 + \dots)$$

$$= t \partial_{\xi} p \cdot \partial_x q_0 + t^2 \partial_{\xi} p \cdot \partial_x q_1 + \dots,$$

$$r_2 = t^2 \left\{ \frac{1}{2} \partial_{\xi}^2 p \cdot \partial_x^2 (q_0 + t q_1 + \dots) \right.$$

$$\left. + \frac{1}{2} (\partial_{\xi}^2 p \cdot (\partial_x (q_0 + t q_1 + \dots))^2 + (\partial_{\xi} p)^2 \cdot \partial_x^2 (q_0 + t q_1 + \dots)) \right\}$$

$$= t^2 \left\{ \frac{1}{2} \partial_{\xi}^2 p \cdot \partial_x^2 q_0 + \frac{1}{2} (\partial_{\xi}^2 p \cdot (\partial_x q_0)^2 + (\partial_{\xi} p)^2 \cdot \partial_x^2 q_0) \right\} + \dots;$$

.....

$$r(t; x, \xi) = \sum_{k=0}^{\infty} r_k(t; x, \xi) \quad \text{ゆゑ } t \text{ の } t^k \text{ を加へて } t \text{ の } t^k \text{ に}$$

ついて整理すると

$$r = p + q_0$$

$$+ t (q_1 + \partial_{\xi} p \cdot \partial_x q_0)$$

$$+ t^2 \left\{ q_2 + \partial_{\xi} p \cdot \partial_x q_1 + \frac{1}{2} (\partial_{\xi}^2 p \cdot \partial_x^2 q_0 \right.$$

$$\left. + \partial_{\xi}^2 p \cdot (\partial_x q_0)^2 + (\partial_{\xi} p)^2 \cdot \partial_x^2 q_0 \right\}$$

+

となる。 $T=T=1 \dots$ は t^3 より上の項である。 p, q が与えられ $T=0$ 1

で r を計算し $t=0$ においては $r=0$ であるから、 t の係

数を 0 とおいてみると

$$p + q_0 = 0$$

$$q_1 + \partial_{\xi} p \cdot \partial_x q_0 = 0$$

$$q_2 + \partial_{\xi} p \cdot \partial_x q_1 + \frac{1}{2} (\partial_{\xi}^2 p \cdot \partial_x^2 q_0 + \partial_{\xi}^2 p \cdot (\partial_x q_0)^2 + (\partial_{\xi} p)^2 \cdot \partial_x^2 q_0) = 0$$

.....

となり q_j は順に決めることができる:

$$q_0 = -p,$$

$$q_1 = -\partial_3 p \cdot \partial_x q_0$$

$$= \partial_3 p \cdot \partial_x p,$$

$$q_2 = -\partial_3 p \cdot \partial_x q_1 - \frac{1}{2} (\partial_3^2 p \cdot \partial_x^2 q_0 + \partial_3^2 p (\partial_x q_0)^2 + (\partial_3 p)^2 \partial_x^2 q_0)$$

$$= -\partial_3 p \cdot \partial_3 \partial_x p \cdot \partial_x p - (\partial_3 p)^2 \cdot \partial_x^2 p$$

$$+ \frac{1}{2} (\partial_3^2 p \partial_x^2 p - \partial_3^2 p \cdot (\partial_x p)^2 + (\partial_3 p)^2 \cdot \partial_x^2 p)$$

$$= \frac{1}{2} (\partial_3^2 p \cdot \partial_x^2 p - \partial_3^2 p \cdot (\partial_x p)^2 - (\partial_3 p)^2 \cdot \partial_x^2 p)$$

$$- \partial_3 p \cdot \partial_3 \partial_x p \cdot \partial_x p,$$

.....

r の t^j の係数は必ず $q_j + (p \text{ と } q_0, \dots, q_{j-1} \text{ できる項})$ の形をしているから $j \geq 3$ の場合も順に q_j は決まることに注意. さて問題はこのようなして得られた q_j からつくった $q(t; x, \xi) = \sum_{j=0}^{\infty} t^j q_j(x, \xi)$ が形式表象になるかどうかであるが, もしそうならすると補題2の評価を用いて矛盾が出ることを示せる. 従って $:p: = : \exp p :$ の右逆が得られた. 同様に左逆もつくれば, このとき両者は一致する. 具体的に数項だけ

$$(:p:)^{-1} = (: \exp p :)^{-1}$$

$$= : \exp (-p + \partial_3 p \cdot \partial_x p - \frac{1}{2} (\partial_3^2 p \cdot (\partial_x p)^2 + (\partial_3 p)^2 \cdot \partial_x^2 p)$$

$$- \partial_3 p \cdot \partial_3 \partial_x p \cdot \partial_x p + \frac{1}{2} \partial_3^2 p \cdot \partial_x^2 p + \dots) :.$$

ただし形式表象の和の順序を示すパラメータは略して書いた。

文献

- [1] 青木貴史, 無限階擬微分作用素の表象理論,
数理研講究録 468 (1982), 1~65.
- [2] ———, Calcul exponentiel des opérateurs micro-
différentiels d'ordre infini, I. Ann. Inst. Fourier,
Grenoble, 33-4 (1983), 227-250.
- [3] ———, Calcul exponentiel des opérateurs micro-
différentiels d'ordre infini, II, à paraître.