

タンパク質のX線結晶構造解析

X-ray Crystal Structure Analysis of Proteins

京都大学 化学研究所 先端ビームナノ科学センター 原子分子構造研究領域 藤井 知実

研究成果概要

芳香族化合物である γ -レゾルシン酸を唯一の炭素源として生育が可能である根粒菌 *Rhizobium* sp. strain MTP-10005 において、 γ -レゾルシン酸から始まる芳香族化合物代謝経路で働く酵素群に含まれるレゾルシノール水酸化酵素は、レゾルシノールをヒドロキシキノールに変換する酵素である。本酵素は TC-FDM (Two-component flavin diffusible monooxygenase) ファミリーに属し、還元型フラビンと酸素分子を用いて一原子酸素の添加反応を触媒するオキシゲナーゼコンポーネント (GraA) と、フラビン:NADH 酸化還元酵素であるレダクターゼコンポーネント (GraD) の二成分から構成されている。GraD は NAD(P)H を用いてフラビンを還元し、生じた還元型フラビンが拡散により GraA に受け渡される。本研究では、レゾルシノール水酸化酵素の触媒機構の構造基盤を理解するために、オキシゲナーゼコンポーネントである GraA の FAD との複合体の結晶構造解析を行った。

N 末端に His タグを付加した GraA を精製し、GraA-FAD 複合体の結晶化に供した。1 mM FAD を含む 10 mg/ml タンパク質溶液について、0.2 M 硝酸カリウムを含む 20% (w/v) PEG3350 を沈殿剤溶液とするシッティングドロップ蒸気拡散法による結晶化を行い、X線結晶構造解析に適した結晶を得た。本結晶は、空間群 $P3_221$ に属し、格子定数が $a = b = 204.4 \text{ \AA}$, $c = 299.9 \text{ \AA}$ であった。高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所・放射光科学研究施設のタンパク質結晶用ビームライン BL-5A において X 線回折実験を行い、分解能 $3.2 \text{ \AA}$ の回折強度データ収集を行った。アポ体結晶構造を初期モデルとした分子置換法により構造を決定し、分解能 $3.2 \text{ \AA}$ で精密化を行った。計算化学統合パッケージ Discovery Studio を使用し、得られた構造の検討を行った。

GraA は4つの同一サブユニットからなる四量体分子であり、本結晶の非対称単位中に4分子が含まれていた。GraA 分子は、2つのサブユニットが対となって C 末端側のヘリックス部分どうしを斜めに接近させて分子2回軸の周りに密に会合した二量体を形成し、この二量体2つが更に分子2回軸の周りに疎に会合して四量体を形成した Dimer of Dimers 構造をとっている。各サブユニットは、主に逆平行 α ヘリックスからなる N 末端ドメイン (残基 Met1-Ala121)、2枚の β シートが重なった中央ドメイン (残基 Leu122-Thr217)、長い4本の逆平行 α ヘリックス束からなる C 末端ドメイン (残基 Phe218-Tyr409) の3つのドメインで形成されている。FAD はこれらの3つのドメインにより囲まれた空間に位置しており、ポリペプチド鎖に親水性および疎水性相互作用で結合している。アポ体結晶構造ではディスオーダーしていた 13 残基のループ領域 (残基 Gly271-Asn283) が別サブユニットの FAD を覆って固定しており、ループのターン部分が推定活性部位の入口を塞いでいる。