

文 献

- 1) M. Suzuki and R. Kubo, J. Phys. Soc. Japan **24** (1968), 51.
- 2) H. Yahata and M. Suzuki, J. Phys. Soc. Japan **27** (1969), 1421.
- 3) M. Suzuki, Prog. Theor. Phys. **43** (1970), 882.
- 4) M. Suzuki, Int. J. Mag. **1** (1971), 123. See also
M. Suzuki, and H. Ikeda, Prog. Theor. Phys. **55** (1976), 2041.
- 5) M. Suzuki, K. Kaneko and F. Sasagawa, Prog. Theor. Phys. **65** (1981), 828.
- 6) M. Suzuki, Prog. Theor. Phys. **51** (1974), 361.
- 7) L. Brenig and N. Banai, Physica D (in press).
- 8) M. Suzuki and K. Kaneko, Prog. Theor. Phys. (submitted).
- 9) A. Schenzle and H. Brand, Phys. Rev. **20A** (1979), 1628.
- 10) Y. Hamada, Prog. Theor. Phys. **64** (1980), 1127; **65** (1981), 850.
- 11) M. Suzuki, Adv. Chem. Phys. **46** (1981), 195.
- 12) M. Suzuki, J. Math. Phys.

転移点以下での XY モデルの流体力学について

名大・理 白田理一郎, 三宅和正, 伊藤正和, 山田一雄

XYモデルの秩序相においては、オーダーパラメーターであるX-Y スピン成分の連続的な対称性は破れる。この時オーダーパラメーターの横成分 σ_T は南部・Goldstone モードであり、動的にはスピン波のモードとして特長づけられる。このスピン波は、超流動ヘリウムの流体力学である2流体モデルを基礎とした考えに従えば、 σ_T と保存量である σ_Z の2変数で記述できると考えられる。しかし、そもそも外場 H_Z が存在する場合、 σ_Z の対称性が破れることにより、オーダーパラメーターの縦成分である σ_L も σ_T と σ_Z の運動に関与して来る。Halperin と Hohenberg は直観的に σ_L , σ_T , σ_Z の3変数についての運動方程式を以下のように書き下して、スピン波の分散関係を調べた¹⁾

$$\partial \sigma_L(k)/\partial t = -\frac{1}{\tau_k} [\sigma_L(k) - \sigma_L^0(k)] \quad (1.a)$$

$$\partial \sigma_Z(k)/\partial t = -gM\tilde{\rho}_S k^2 \sigma_T(k) - \frac{\lambda}{\chi_Z} k^2 \sigma_Z(k) \quad (1.b)$$

$$\partial \sigma_T(k)/\partial t = gM \left\{ \frac{1}{\chi_Z} \sigma_Z(k) - b [\sigma_L(k) - \sigma_L^0(k)] \right\} + O(k^2). \quad (1.c)$$

ここで g はオーダーパラメーターと σ_Z の交換関係 $[\sigma_X + i\sigma_Y, \sigma_Z] = -g(\sigma_X + i\sigma_Y)$ で定義され、 M は自発磁化、そして $\tilde{\rho}_S$ は σ_T のスティフネスである。又 $\sigma_L^0(k)$ は $\sigma_Z(k)$ で決まる σ_L の局所平衡値である。 $[\sigma_L^0(k) = (\partial \sigma_L / \partial \sigma_Z) \sigma_Z(k)]$ もし σ_L の緩和時間 τ_k がミクロな長さであれば、スピン波を記述する際に σ_L の露はな運動は無視できる。従来の2流体モデルでは τ_k がミクロな長さであることが前提となっていた。しかし以前より定性的には知られていたことであるが、^{1), 2), 3)} われわれは臨界点近傍で有効な ϵ 展開の方法を用いて σ_L の動的帯磁率 $\chi_L(k, t)$ の振舞いを調べ、 $k \rightarrow 0$ の極限では $\chi_L(0, t)$ が long time-tail を示すこと、又緩和時間 $\tau_L(k=0) = \Phi_L(k, \omega) / \chi_L(k)|_{k, \omega=0}$ が発散することを確認した⁴⁾。ここで Φ_L は波数・振動数依存性を持った σ_L の輸送係数である。よって上記の前提は成り立たず、2流体モデルは再考を要することになる。例えば(1)式よりスピン波の減衰定数 Γ_k は、

$$\Gamma_k = k^2 \tau_k g M \tilde{\rho}_S b \left(\frac{\partial \sigma_L}{\partial \sigma_Z} \right) + r k^2 \quad (2)$$

となるが、 b が $k \rightarrow 0$ である有限な値を持てば Γ_k は k^{2-x} に比例する、ここで $\tau_k \propto k^{-x}$, ($0 < x \leq 1$) とした。もしこのように Γ_k が k^2 に比例しないならば従来の2流体モデルの考え方は誤っていたということになる。そこで、われわれは b の波数依存性を調べて、 Γ_k の長波長での振舞いを見ることにした。

まず Halperin らの直観的な運動方程式(1)の代りに、森公式に従って $\sigma_L, \sigma_T, \sigma_Z$ を変数とする線型な Langevin 方程式を作り、(1.c) 式の $b [\sigma_L - \sigma_L^0]$ に対応する項の構造を見ると以下のようになる、

$$\begin{aligned} \partial \sigma_T(k)/\partial t = gM \left[\frac{\chi_L(k)}{D_k} \sigma_Z(k) - \frac{\chi_{LZ}(k)}{D_k} \sigma_L(k) \right] \\ + \frac{\chi_Z}{D_k} \Phi_{LT}(k) \cdot [\sigma_L(k) - \frac{\chi_{LZ}}{\chi_Z} \sigma_Z(k)]. \end{aligned} \quad (3)$$

ここで $A \cdot B \equiv \int_0^t ds A(s) B(t-s)$, $D_k = \chi_Z \chi_L(k) - \chi_{LZ}(k)^2$, そして Φ_{LT} は σ_L と σ_T のメモリー一項で力学的な運動を示す。(3)式において $(\chi_{LZ}(k)/\chi_Z) \sigma_Z(k)$ と $[\chi_{LZ} - \frac{1}{gM} \chi_Z \Phi_{LT}] D_k^{-1}$ が(1)式の σ_L^0 と b にそれぞれ対応する。われわれは $\chi_{LZ}(k)$ について ϵ 展開を用いて $k \rightarrow 0$ で発散せずある定数になることを調べた。なお $\chi_L(k)$ は長波長で $\chi_k(k) \propto k^{-1}$ となり、よって D_k は χ_L と同じく長波長で $\chi_k(k) \propto k^{-1}$ となる。又 Φ_{LT} はこの Langevin 方程式の中で σ_Z が保存量である

という性質を用いると以下のように書けることがわかる。

$$\phi_{LT}(k=0, t) = -2 \frac{\chi_{LZ}}{\chi_Z} g M \delta(t) \quad (4)$$

以上より(1)式の b に対応する項 $[\chi_{LZ} - \frac{1}{gM} \chi_Z \phi_{LT}] \times D_k^{-1}$ は k に比例することになる。よって(2)式より Γ_k は長波長において k^2 に比例するという結論が得られる。この結果は2流体モデルに従って得られるものと一致する。

以上わかったことをまとめると次のようになる。 σ_L の局所平衡への緩和時間 τ_k は $k \rightarrow 0$ で決してミクロな大きさではなく、逆に発散する。しかしそれにもかかわらず σ_L はスピン波を記述する変数にはなり得ない。なぜならば、スピン波を表す変数 σ_T の運動方程式に入ってくる σ_L の係数 b が k に比例し、長波長で σ_L と σ_T が運動方程式において非常に弱い結合しかもたぬようになるからである。又それによってスピン波の減衰定数 Γ_k も k^2 に比例する。

文 献

- 1) B. I. Halperin and P. C. Hohenberg, Phys. Rev. **188** (1969) 898.
- 2) D. L. Huber, Phys. Rev. **B3** (1970) 805.
- 3) J. Villain, Solid State Comm. **8** (1970) 31.
- 4) R. Shirota, K. Miyake, M. Ito and K. Yamada, Prog. Theor. Phys. **66** (1981) No. 2.

Real Space Renormalization Group Approach to the Kinetic Ising Model

東大・理 高 野 宏

実空間くりこみ群の方法は2次元のイジング的スピン系に用いられ静的臨界現象に関し良い結果を与えている。¹⁾ 最近、この実空間くりこみ群の方法を用いて2次元キネティック・イジング模型(KIM)の動的臨界現象を調べようという試みがいろいろ行なわれている。^{2), 3)}

時刻 t においてイジング・スピンの配置が $\{\sigma\}$ である確率分布を $P_t(\{\sigma\})$ とすると、KIM ではこの P_t の時間発展は

$$\partial_t P_t = \Gamma P_t \quad (1)$$