

京都大学本部試験地見本園の樹木目録

安藤 信・田中 壮一・山本 俊明

はじめに

京都大学演習林本部試験地は京都市市街地の北東部、京都大学北部キャンパスの北に位置する。大正12(1923)年、農学部が設置されるとともに林学科の苗圃として出発したが、事業の性質上演習林で管理することになったものである。それ以来、学生の演習、教官の研究、演習林の試験研究のなかでも、とくに精密な観測や観察、特殊な装置の使用を必要とするものを行う場として利用されてきた。昭和3(1928)年の演習林概要¹⁾によれば、面積約1.4haを3つの区域に大別し、キャンパスと民地の境界に沿う狭長な部分をわが国の北から南に産する樹木種を順次東から西に向かって植栽する見本園、中央部の大部分は各種試験地や苗圃、その周辺はわが国や海外から収集された観賞用樹木の見本園とし、当時植栽されていた樹木種総数は170種と記録されている。その後も積極的な樹木の植栽が試みられたようで、昭和25(1950)年の報告では600種に及んでいる²⁾。それ以来40年間、当試験地ではサクラ(*Prunus*)、ツバキ(*Camellia*)、カエデ(*Acer*)、ツツジ(*Rhododendron*)、アジサイ(*Hydrangea*)属をはじめ多くの園芸品種の収集も行われてきた。一方、植栽木の大径化に伴う周辺民家への影響も見逃せず、伐採、過度の剪定による消滅、あるいは過密による陽生低木の枯損も著しく、刻々と構成種は変化している。昭和60年台から当見本園を再整備するための作業が続けられ、平成2(1990)年に真鍋はそれまでに同定できた420種あまりの樹種の樹木目録を作成し、その中で構成種の開花期と原産地を紹介した³⁾。

このような状況の中で、平成2(1991)年11月から植栽木のサイズと状況、正確な位置図を作成することを目的に第1回目の全域調査を実施した。調査内容は種名、直径、樹高の測定、形態についての記録からなり、平成4年9月にこれらの調査結果をもとに樹種名の確認調査を実施した。これらの調査は浅野善和、北和也、榎木達也、田中弘之、真鍋逸平、山根大樹の各氏をはじめ多くの演習林関係者に協力していただいた。本報告はこれら2回の調査結果と残された導入後の記録をもとに樹木目録を作成したものである。

目録には樹種名、1回目の調査時点の最大の胸高直径cm(樹高m)(ほとんど同一個体である)、原産地、位置図(図1~5)上の番号を示し、2回目の調査時まで枯死した個体は番号の後に×印で示し、欧米の樹種は英名を付記した。また蔓の形態を示すもの、生垣などで刈り込まれたものなど、人為的作業によって樹高が左右されている場合も付記することにした。原産地は日:日本、

Makoto ANDO, Soich TANAKA and Toshiaki YAMAMOTO

A List of Trees in the Arboretum of Experimental Nursery on Campus in Kyoto University Forests

中：中国（台湾を含む）、朝：朝鮮、樺：樺太、亜：アジア、欧：ヨーロッパ、北米：北アメリカ、豪：オーストラリアのように略記するとともに、園芸目的などによる交配種は栽培とした。科の選定、種の配列はほぼ上原の樹木大図説⁴⁻⁶⁾に準拠し、学名、種名はわが国自生種の場合は北村ら^{7, 8)}を、導入種、園芸種は上原、塚本⁹⁾、Rehder¹⁰⁾を、中国原産種は中国科学院¹¹⁻¹⁷⁾、北米原産種はBurns^{18, 19)}、Farrar²⁰⁾を主に参考に、いくつかの図鑑で補足した²¹⁻²⁸⁾。

Ginkgoaceae いちょう科

<i>Ginkgo biloba</i> L.	イチョウ	4.6(4.8)	中・朝	437, 1035
-------------------------	------	----------	-----	-----------

Taxaceae いちい科

<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc.	イチイ	22.2(7.8)	日・朝・中	82, 83, 1049, 1064
var. <i>nana</i> Hort. ex Rehder.	キアラホク	(0.9)	日	89, 90
<i>T. baccata</i> L.	セイヨウイチイ	9.4(4.6)	欧・西亜	11, 52, 279, 648, 351 他
	(ヨーロッパイチイ English Yew)			
<i>T. floridana</i> Chap.	フロリダイチイ	7.0(5.9)	北米南	566, 567
	(Florida Yew)			
<i>T. media</i> Rehder. (<i>T. cuspidata</i> × <i>T. baccata</i>) 交配種		9.3(4.5)	栽培	288, 289, 290, 291
<i>Torreya nucifera</i> Sieb. et Zucc.	カヤ	37.6(12.3)	日	1141, 1142, 1143

Podocarpaceae まき科

<i>Podocarpus Nagi</i> Zollinger et Moritzi	ナギ	30.8(13.6)	日・中	1140
<i>P. macrophyllus</i> D. Don	イヌマキ	20.5(11.7)	日・中	1139
var. <i>Maki</i> Sieb.	ラカンマキ	9.6(10.4)	日・中	1138

Cephalotaxaceae いぬがや科

Cephalotaxus Harringtonia K. Koch

<i>f. drupacea</i> Kitamura	イヌガヤ	10.7(7.1)	日・中	565, 1134, 1228 他
<i>f. fastigiata</i> Rehder.	チョウセンマキ	1.5(2.4)	栽培	538, 1136, 1137
var. <i>nana</i> Rehder.	ハイイヌガヤ	2.8(2.7)	日・朝	1166, 1168

Araucariaceae なんようすぎ科

<i>Araucaria angustifolia</i> O. Kuntze	パラジールマツ	25.2(8.5)	南米パラジール	98
	(Parana Pine)			

Pinaceae まつ科

<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc.	アカマツ	34.2(11.5)	日・朝	143, 145, 1258 302(変異体)
var. <i>umbraculifera</i> Mayr	タキョウシヨウ	9.3(4.5)	栽培	396
var. <i>oculus-draconis</i> Mayr	ジヤノメアカマツ	4.2(2.2)	栽培	185

<i>P. thunbergii</i> Parlatore	クロマツ	9.0(4.1)	日・朝	144
var. <i>oculus-draconis</i> Mayr	シヤノメクロマツ	9.8(4.2)	栽培	189
<i>P. parviflora</i> Sieb. et Zucc.				
var. <i>pentaphylla</i> Henry	キタコヨウ	12.3(7.4)	日	1078, 1079
<i>P. pumila</i> Regal				
var. <i>brevifolia</i> Mayer	アイスコヨウ	7.2(3.6)	日	1247
<i>P. Koraiensis</i> Sieb. et Zucc.	チョウセンマツ	29.6(9.0)	日・朝	471
var. <i>variegata</i> Mayr	フイリチョウセンマツ	18.1(5.7)	栽培	394
<i>P. Armandii</i> Franchet				
var. <i>amamiana</i> Hatusima	アマミコヨウ	43.2(12.5)	日	441
<i>P. tabulaeformis</i> Carr.	マンシュウクロマツ	53.9(30.0)	中	314
<i>P. Bungeana</i> Zucc.	ハクシヨウ	26.5(10.9)	中	7, 8, 9, 10
	(シロマツ)			
<i>P. excelsa</i> Wall.	ヒマラヤコヨウ	48.1(12.7)	ヒマラヤ	140, 306
	(フータンマツ)			
<i>P. strobus</i> L.	ストローブマツ	38.6(11.2)	北米東	40, 41
	(Eastern White Pine)			
<i>P. palustris</i> Mill.	タノイウシヨウ	55.4(18.5)	北米南東	315, 316
	(Longleaf Pine)			
<i>P. rigida</i> Mill.	リキタマツ	10.2(4.7)	北米東	312, 317
	(Pitch Pine)			
<i>P. taeda</i> L.	テータマツ	80.2(22.5)	北米南東	55, 327, 328, 330
	(Loblolly Pine)			
<i>P. Banksiana</i> Lam.	バンクスマツ	21.3(10.2)	北米中東	43, 44
	(Jack Pine)			
<i>P. Elliottii</i> Engelm.	スラッシュマツ	43.0(16.5)	北米南東	592
	(Slash Pine)			
<i>P. echinata</i> Mill.	エチナタマツ	37.1(15.0)	北米南東	583
	(Shortleaf Pine)			
<i>Abies firma</i> Sieb.	モミ	26.9(10.7)	日	58, 225, 358, 1070 他
<i>A. sachalinensis</i> Mast.	トドマツ	2.5(1.0)	日・樺	1043
<i>A. holophylla</i> Maxim.	チョウセンモミ	36.6(10.8)	朝・中	20, 274, 461, 539, 1077
<i>Picea polita</i> Carr.	ハリモミ	36.1(13.3)	日	18, 21, 22, 1131, 1132
	(ハラモミ)			
<i>P. jezoensis</i> Carr.				
var. <i>hondoensis</i> Rehd.	トウヒ	6.4(4.3)	日	1042, 1044, 1080, 1086
<i>P. Glehnii</i> Mast.	アカエゾマツ	9.5(2.7)	日・樺・中	1040, 1081, 1082
<i>P. Maximowiczii</i> Regel	ヒメハラモミ	23.1(9.1)	日	700, 701
<i>P. Abies</i> Karsten	ヨーロッパトウヒ	17.6(9.1)	欧	19, 308
	(ドイツトウヒ Norway Spruce)			

<i>P. Morinda</i> Link	モリンタ [＊] トウヒ (ヒマラヤハリモミ)	28.4(10.9)	ヒマラヤ	56
<i>Tsuga Sieboldii</i> Carr.	ツカ [＊]	30.1(8.6)	日	64, 65, 159, 160, 161
<i>T. canadensis</i> Carr.	カナダ [＊] ツカ [＊] (Eastern Hemlock)	13.2(8.6)	北米東	304, 305
<i>Pseudotsuga japonica</i> Beiss.	トカ [＊] サワラ	28.0(15.2)	日	685, 1029
<i>Larix Kaempferi</i> Carr.	カラマツ	28.3(10.8)	日	666
<i>Pseudolarix amabilis</i> Rehd.	イヌカラマツ	28.1(14.0)	中	42
<i>Keteleeria Davidiana</i> Beiss. var. <i>formosana</i> Hayata	ユサン (アブ [＊] ラスキ [＊])	58.6(19.0)	中	39
Taxodiaceae すぎ科				
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don	スキ [＊]	23.1(13.8)	日	807, 1147, 1220, 1250 他 1221(ヤクスキ [＊])
var. <i>radicans</i> Nakai	アシウスキ [＊]	15.6(11.4)	日	694 28, 30, 32, 823 他(キヤマスキ [＊])
var. <i>araucarioides</i> Henk. et Hochst.	エンコウスキ [＊]	4.5(2.3)	栽培	586, 588
var. <i>cristata</i> Beiss.	セツカスキ [＊]	4.8(2.7)	栽培	585, 587, 589
var. <i>aurea</i> Hort.	オウゴンスキ [＊]	8.4(4.5)	栽培	591
f. <i>Mankitiana</i> Hort.	マンキチスキ [＊]	11.7(4.5)	栽培	339, 340, 540, 619
f. <i>viridis</i> Hort.	ミト [＊] リスキ [＊]	9.7(7.2)	日	840, 841, 842, 843, 844 他
var. <i>Okina</i> Hort.	オキナスキ [＊]	7.5(4.1)	栽培	535
<i>Cunninghamia lanceolata</i> Hook.	コウヨウサン (ランタ [＊] イスキ [＊])	55.4(17.0)	中	404, 405, 406, 417, 425 他
<i>Taiwania cryptomerioides</i> Hayata	タイワンスキ [＊]	62.6(20.4)	中	832, 837, 1144
<i>Taxodium distichum</i> Rich.	ヌマスキ [＊] (ラクウショウ Baldcypress)	84.5(24.8)	北米東南	255, 1001-2, 1004-2
<i>T. mucronatum</i> Tenore	メキシコラクウショウ (Montezuma Baldcypress)	28.4(10.1)	メキシコ	261
<i>Glyptostrobus pensilis</i> K. Koch	スイショウ	7.7(6.7)	中	997, 1000, 1001, 1003
<i>Sequoia sempervirens</i> Endl.	セコイア (センペ [＊] ルセコイア・セコイアスキ [＊] Redwood, Coast Redwood)	102.9(24.5)	北米西	51, 293, 1005
<i>Sequoiadendron giganteum</i> Buch	セコイアデント [＊] ロン (キ [＊] カ [＊] ントセコイア・セコイアスキ [＊] Giant sequia, Sierra Redwood)	22.6(7.7)	北米西	173, 1004
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Cheng	メタセコイア (Dawn Redwood)	54.5(18.5)	中	1001-3, 1002, 1120 303, 708(オウゴンメタセコイア)

Cupressaceae ひのき科

<i>Chamaecyparis obtusa</i> Endl.	ヒノキ	36.5(13.8)	日	385, 736, 1017, 1161 他
var. <i>breviramea</i> Beiss.	カマクラヒハ	6.9(5.5)	栽培	581, 582
var. <i>pendula</i> Mast.	スイリュウヒハ	4.8(4.3)	栽培	572, 681
f. <i>aurea</i> K. Onuma	オウゴンスイリュウヒハ	8.3(6.0)	栽培	6, 536
	(オウゴンイトヒハ)			
var. <i>filicoides</i> Beiss.	クジヤクヒハ	9.6(7.3)	栽培	654, 655
<i>C. pisifera</i> Endl.	サワラ	生垣(1.7)	日	794, 795 他
var. <i>filifera</i> Beiss. et Hochst.	ヒヨクヒハ	17.1(6.3)	栽培	1, 2, 3, 4, 5
	(イトヒハ)			
var. <i>plumosa</i> Beiss.	シノブヒハ	9.5(8.6)	栽培	413, 533
var. <i>squarrosa</i> Beiss. et Hochst.	ヒムロ	24.6(8.6)	栽培	365, 370, 679, 680 他
f. <i>intermedia</i> Hornib.	ツクモヒハ	11.5(6.8)	栽培	578
<i>C. formosensis</i> Matsum.	ヘニヒ	34.5(9.6)	中	323, 325, 326
<i>Thuja Standishii</i> Carr.	ネスコ	4.5(2.8)	日	1162
	(クロヘ)			
<i>T. occidentalis</i> L.	ニオイヒハ	15.2(7.3)	北米東	93, 318, 321, 322
	(Northern White-cedar)			
<i>T. orientalis</i> L.	コノテガシワ	20.4(7.4)	中	71, 319, 371
	(Oriental Cedar)			
<i>Thujopsis dolabrata</i> Sieb. et Zucc.	アスナロ	3.2(3.6)	日	1163
var. <i>nana</i> Sieb. et Zucc.	ヒメアスナロ	(0.8)	栽培	732, 1164
f. <i>variegata</i> Hort.	フイリアスナロ	(1.3)	栽培	1165
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	イタリアサイプレス	25.5(9.8)	欧・西亜	57, 310, 584
	(セイヨウヒノキ Common Cypress, Italian Syprress)			
<i>C. funebris</i> Endl.	シタレイトスキ	34.0(14.8)	中	529, 530
<i>Libocedrus macrolepis</i> Benth. et Hook.	ショウナンボク	31.4(10.3)	中	621
<i>L. decurrens</i> Torr.	オニヒハ	60.8(17.0)	北米西	38
	(Incense-cedar)			
<i>Juniperus chinensis</i> L.	イブキ	39.7(7.8)	日・朝・中	72, 73, 124, 125, 1260
	(ビヤクシン)			
var. <i>globosa</i> Hornib.	タマイブキ	(0.9)	栽培	861, 918, 941, 988 他
	(タマビヤクシン)			
var. <i>Sargentii</i> Henry	ミヤマビヤクシン	生垣(0.7)	日・樺・朝	435
var. <i>procumbens</i> Endl.	ハイビヤクシン	(0.3)	日・朝	149-2
<i>J. rigida</i> Sieb. et Zucc.	ネスミサシ	28.4(6.2)	日・朝・中	702, 1171
<i>J. communis</i> L.	セイヨウネスミサシ	17.9(9.5)	欧・北亜・北米北	706
	(Common Juniper)			
<i>J. virginiana</i> L.	エンビツビヤクシン	63.5(17.0)	北米東	25
	(Eastern Redcedar)			

Salicaceae やなぎ科

♂ *Salix Matsudana* Koidz.

<i>var. tortuosa</i> Vilm.	ウンリュウヤナギ	9.4(3.1)	中	464
<i>Populus koreana</i> Rehd.	チリメントロ	57.9(16.5)	朝・中	1285
<i>P. Simonii</i> Carr.	テリハトロノキ	64.1(18.0)	朝・中	1284

Myricaceae やまもも科

<i>Myrica rubra</i> Sieb. et Zucc.	ヤマモモ	15.4(6.8)	日・朝・中	180, 1256, 1257
------------------------------------	------	-----------	-------	-----------------

Juglandaceae くるみ科

Juglans mandshurica Maxim.

<i>subsp. Sieboldiana</i> Kitamura	オニク [△] ルミ	30.8(7.5)	日・樺	1087
------------------------------------	---------------------	-----------	-----	------

<i>J. regia</i> L.	ペ [△] ルシヤク [△] ルミ	3.1(2.7)	欧・西亜	253
--------------------	-------------------------------------	----------	------	-----

(セイヨウクルミ English Walnut, Persian Walnut)

<i>var. orientis</i> Kitamura	テウチク [△] ルミ	11.8(9.1)	栽培	1091
-------------------------------	----------------------	-----------	----	------

(カシク[△]ルミ)

<i>J. nigra</i> L.	クロク [△] ルミ	43.5(11.8)	北米東	272
--------------------	---------------------	------------	-----	-----

(Black Walnut)

<i>J. cinerea</i> L.	ハ [△] ターナツツ	8.6(4.7)	北米東	271
----------------------	----------------------	----------	-----	-----

(Butternut)

<i>Platycarya strobilacea</i> Sieb. et Zucc.	ノク [△] ルミ	40.3(13.8)	日・朝・中	1308
--	--------------------	------------	-------	------

<i>Pterocarya stenoptera</i> DC.	シナサク [△] ルミ	48.5(16.3)	中	420
----------------------------------	----------------------	------------	---	-----

<i>Carya ovata</i> K. Koch	ヒッコリー	35.6(12.3)	北米東	507
----------------------------	-------	------------	-----	-----

(Shagbark Hickory)

Betulaceae かばのき科

<i>Betula grossa</i> Sieb. et Zucc.	ミス [△] メ	26.5(10.4)	日	1167
-------------------------------------	-------------------	------------	---	------

<i>Carpinus Tschonoskii</i> Maxim.	イヌシテ [△]	28.6(17.0)	日・朝・中	450
------------------------------------	-------------------	------------	-------	-----

<i>C. laxiflora</i> Blume	アカシテ [△]	30.0(10.8)	日・朝・中	524, 526
---------------------------	-------------------	------------	-------	----------

<i>C. cordata</i> Blume	サワシハ [△]	5.4(3.2)	日・朝・中	1232
-------------------------	-------------------	----------	-------	------

<i>Corylus heterophylla</i> Fisch.	ハシハ [△] ミ	4.0(3.7)	日・朝・中	519, 1225
------------------------------------	--------------------	----------	-------	-----------

<i>C. Sieboldiana</i> Blume	ツノハシハ [△] ミ	1.9(2.6)	日・朝・中	506
-----------------------------	----------------------	----------	-------	-----

<i>C. Avellana</i> L.				
-----------------------	--	--	--	--

<i>var. atropupurea</i> Kirch.	ムラサキハシハ [△] ミ	3.3(3.3)	欧	270
--------------------------------	------------------------	----------	---	-----

Fagaceae ぶな科

<i>Fagus crenata</i> Blume	ブ [△] ナ	39.8(14.0)	日	1185, 1186, 1187
----------------------------	------------------	------------	---	------------------

<i>F. undulata</i> Buerger.	コハブ [△] ナ	19.9(10.4)	日	712, 713
-----------------------------	--------------------	------------	---	----------

<i>F. japonica</i> Maxim.	イヌブ [△] ナ	37.2(10.7)	日	1184
---------------------------	--------------------	------------	---	------

Castanea crenata Sieb. et Zucc.

<i>f. gigantea</i> Makino	タンハク ^リ	48.2(13.0)	栽培	1013, 1014
---------------------------	-------------------	------------	----	------------

<i>Castanopsis cuspidata</i> Schottky	ツブラシ ^イ (コシ ^イ)	28.9(8.2)	日・朝・中	1366
---------------------------------------	---	-----------	-------	------

<i>var. Sieboldii</i> Nakai	スタシ ^イ	62.5(11.3)	日・朝	1335
-----------------------------	------------------	------------	-----	------

<i>Pasania edulis</i> Makino	マテハ ^シ	19.5(6.2)	日	1336, 1337, 1338
------------------------------	------------------	-----------	---	------------------

<i>P. glabra</i> Oerst.	シリブ ^{カカシ}	3.0(3.7)	日・中	1345
-------------------------	--------------------	----------	-----	------

<i>Quercus myrsinaefolia</i> Blume	シラ ^{カシ}	35.0(9.2)	日・朝・中	60, 229, 1341, 1342, 1344
------------------------------------	------------------	-----------	-------	---------------------------

<i>Q. phillyraeoides</i> A. Gray	ウハ ^{メカシ}	54.0(13.9)	日・朝・中	1348, 1349
----------------------------------	-------------------	------------	-------	------------

<i>Q. glauca</i> Thunb.	アラ ^{カシ}	27.5(6.6)	日・朝・中	217, 221, 725, 727, 789 他
-------------------------	------------------	-----------	-------	---------------------------

<i>Q. gilva</i> Blume	イチイ ^{カシ}	7.8(5.6)	日・朝・中	1346
-----------------------	-------------------	----------	-------	------

<i>Q. salicina</i> Blume	ウラシ ^{ロカシ}	9.7(6.2)	日・朝	1174, 1178
--------------------------	--------------------	----------	-----	------------

<i>Q. aliena</i> Blume	ナラ ^{カシ}	61.1(21.0)	日・朝・中	1222, 1227
------------------------	------------------	------------	-------	------------

<i>Q. crispula</i> Blume	ミス ^{ナラ}	22.5(11.1)	日・樺	1110
--------------------------	------------------	------------	-----	------

<i>Q. serrata</i> Murray	コナラ	9.3(4.9)	日・朝・中	1271, 1272
--------------------------	-----	----------	-------	------------

<i>Q. acutissima</i> Carruth.	クヌキ ^{ナラ}	58.6(22.0)	日・朝・中	1276, 1278, 1281
-------------------------------	-------------------	------------	-------	------------------

<i>Q. variabilis</i> Blume	アヘ ^{マキ}	47.8(13.5)	日・朝・中	717
----------------------------	------------------	------------	-------	-----

<i>Q. mongolica</i> Fisch.	モンコ ^{リナラ}	14.4(7.8)	朝・中	1112, 1113
----------------------------	--------------------	-----------	-----	------------

<i>Q. Robur</i> L.	ヨーロッパ ^{ナラ} (インク ^{リッシュ} オーク English Oak)	6.5(5.3)	欧・西亜	46, 313
--------------------	--	----------	------	---------

<i>Q. imbricaria</i> Michx.	シンク ^ル オーク (Shingle Oak)	7.5(7.2)	北米中	341, 342
-----------------------------	---------------------------------------	----------	-----	----------

<i>Q. prinus</i> L.	チェスナツ ^ツ オーク (Chestnut Oak)	4.3(3.5)	北米東	311
---------------------	--	----------	-----	-----

<i>Q. macrocarpa</i> Michx.	バー ^{ナラ} オーク (Bur Oak)	12.6(6.4)	北米東	331, 710, 711
-----------------------------	-----------------------------------	-----------	-----	---------------

Ulmaceae にれ科

<i>Aphananthe aspera</i> Planc.	ムクノキ	78.5(14.8)	日・朝・中	1310
---------------------------------	------	------------	-------	------

<i>Celtis sinensis</i> Pers.	エノキ	108.7(20.0)	日・朝・中	209, 1309
------------------------------	-----	-------------	-------	-----------

<i>Ulmus Davidiana</i> Planch. <i>var. japonica</i> Nakai	ハルニレ	40.8(19.0)	日・朝・中	449, 1095
--	------	------------	-------	-----------

<i>U. parvifolia</i> Jacq.	アキニレ	60.8(14.3)	日・朝・中	1287, 1334
----------------------------	------	------------	-------	------------

<i>U. coreana</i> Nakai	チョウセン ^{アキニレ}	53.2(14.3)	朝	513
-------------------------	-----------------------	------------	---	-----

<i>U. americana</i> L.	アメリカ ^{ニレ} (American Elm, White Elm)	60.5(19.0)	北米東	258, 259
------------------------	---	------------	-----	----------

<i>Zelkova serrata</i> Makino	ケヤキ	77.1(21.0)	日・朝・中	218, 364, 1242
-------------------------------	-----	------------	-------	----------------

Moraceae くわ科

<i>Ficus erecta</i> Thunb.	イヌビワ	8.7(4.3)	日・朝	285
<i>Morus bombycis</i> Koidz.	ヤマブキ	7.2(2.9)	日・樺・朝・中	446
<i>M. latifolia</i> Poir.				
<i>f. sprata</i> Hotta	ウンリユウクワ	2.2(2.5)	栽培	445
<i>Broussonetia papyrifera</i> Vent.	カシノキ	20.7(8.2)	日・朝・中	1376
<i>B. kazinoki</i> Sieb.	コウゾ	3.7(3.0)	日・朝・中	989
<i>Cudrania cochinchinensis</i> Kudo et Masam.				
<i>var. gerontogea</i> Kudo et Masam.	カカツカユ	3.5(6.2)	日・朝・中	1387
<i>C. tricuspidata</i> Bur.	ハリタマ	7.3(6.9)	朝・中	1236, 1237

Cercidiphyllaceae かつら科

<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. et Zucc.	カツラ	54.0(9.7)	日	1199
<i>f. pendula</i> Ohwi	シタレカツラ	7.3(4.3)	日	45

Lardizabalaceae あけび科

<i>Stauntonia hexaphylla</i> Decne.	ムヘ	蔓 0.4(2.7)	日・朝	739, 746
<i>Akebia quinata</i> Decne.	アケビ	蔓 0.3(3.0)	日・朝・中	743

Berberidaceae めぎ科

<i>Nandina domestica</i> Thunb.	ナンテン	2.0(3.3)	日・中	112, 350, 786, 1295 他
<i>var. leucocarpa</i> Yanagita	シロミナンテン	0.7(1.7)	栽培	347, 348, 349
<i>var. capillaris</i> Makino	キンシナンテン	1.0(2.0)	栽培	354, 912
<i>Mahonia japonica</i> DC.	ヒイラキナンテン	1.2(1.9)	中・ヒマラヤ	111
<i>M. aquifolium</i> Nutt.	アメリカヒイラキナンテン	(1.2)	北米西	118, 119, 120
	(マホニア Tall Oregon-Grape)			
<i>Berberis Sieboldii</i> Miq.	ヘビノボラス	0.2(1.4)	日	436
<i>B. Hookeri</i> Lem.	フッカーメギ	生垣(1.1)	ヒマラヤ	817
<i>B. ottawensis</i> Schneid.	オタウエンシスメギ	0.7(1.9)	栽培	598, 599, 600, 601, 602
(<i>B. thunbergii</i> × <i>B. Vulgaris</i>)				

Magnoliaceae もくれん科

<i>Magnolia grandiflora</i> L.	タイサンボク	31.7(9.7)	北米南	50
	(Southern Magnolia)			
<i>M. denudata</i> Desr.	ハクモクレン	3.0(2.6)	中	866
<i>M. liliflora</i> Desr.	モクレン	4.6(3.8)	中	871
	(シモクレン)			
<i>M. Kobus</i> DC.	コブシ	8.0(7.1)	日・朝	875
<i>M. obovata</i> Thunb.	ホオノキ	3.5(2.8)	日・中	1246

<i>M. Watsonii</i> Hook. f.	ウケサ ^キ オヤマレンケ [〃]	0.5(1.6)	栽培	1055
<i>M. salicifolia</i> Maxim.	タムシハ [〃]	20.9(8.9)	日	1198
<i>M. Soulangeana</i> Soul.	ニシキモクレン	13.2(7.2)	栽培	534
	(ビ [〃] ンクマク [〃] ノリア Pink Magnolia Saucer Magnolia)			
var. <i>Lennei</i> Rehd.	レーネイ	2.5(2.5)	栽培	872
	(Large Red Magnolia)			
var. <i>Alexandrina</i> Hort.	アレキサント [〃] リーナ	2.4(1.6)	栽培	874
<i>Michelia compressa</i> Sarg.	オカ [〃] タマノキ	35.8(10.5)	日	1362, 1364
<i>M. fuscata</i> Blume	カラタネオカ [〃] タマ	11.7(7.3)	中	439
	(トウオカ [〃] タマ)			
<i>Liriodendron Tulipifera</i> L.	ユリノキ	10.8(7.8)	北米東南	362
	(Yellow-Poplar, Tuliptree)			
<i>Kadsura japonica</i> Dunal	サネカス [〃] ラ	蔓 1.8(2.4)	日・朝・中	386, 1015
	(ビ [〃] ナンカス [〃] ラ)			
f. <i>variegata</i> Makino	フイリビ [〃] ナンカス [〃] ラ	蔓(1.1)	栽培	268
<i>Illicium anisatum</i> L.	シキミ	6.0(2.3)	日・朝・中	1319

Calycanthaceae ろうばい科

<i>Chimonanthus praecox</i> Link	ロウハ [〃] イ	3.5(3.8)	中	398, 525, 527
f. <i>concolor</i> Makino	ソシンロウハ [〃] イ	1.8(2.2)	中	852
<i>Calycanthus fertilis</i> Walt.	クロハ [〃] ナロウハ [〃] イ	2.5(2.7)	北米東	262, 263, 481
	(アメリカロウハ [〃] イ Smooth Sweet Shrub)			

Annonaceae ばんれいし科

<i>Asimina triloba</i> Dunal	ホ [〃] -ホ [〃] -	13.7(5.9)	北米東	195, 196
	(Pawpaw)			

Lauraceae くすのき科

<i>Laurus nobilis</i> L.	ケ [〃] ツケイジ [〃] ユ	12.9(4.0)	欧	151
	(Laurel, Bay Tree)			
<i>Cinnamomum Camphora</i> Sieb.	クスノキ	53.5(10.5)	日・中	913
<i>C. Sieboldii</i> Meisn.	ニツケイ	23.3(8.5)	中	85
<i>C. japonicum</i> Sieb.	ヤブ [〃] ニツケイ	44.3(11.6)	日・朝・中	1365
<i>Machilus thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	タブ [〃] ノキ	15.6(6.8)	日・朝・中	1351
<i>Litsea japonica</i> Juss.	ハマビ [〃] ワ	3.8(3.4)	日・朝	990
<i>Lindera umbellata</i> Thunb.	クロモシ [〃]	3.6(2.7)	日・中	1169, 1170
<i>L. obtusiloba</i> Blume	ダンコウハ [〃] イ	4.1(2.8)	日・朝・中	448
<i>L. glauca</i> Blume	ヤマコウハ [〃] シ	8.9(5.6)	日・朝・中	451, 1312
<i>L. erythrocarpa</i> Makino	カナクキ [〃] ノキ	14.4(4.8)	日・朝・中	422, 1316

<i>L. strychnifolia</i> F.Vill.	テンタ [°] イウヤク	1.5(2.2)	中	409, 411
<i>Phoebe shearerii</i> Gambl.	ムラサキイスク [°] ス	29.7(10.5)	中	440

Saxifragaceae ゆきのした科

Hydrangea macrophylla Seringe

<i>f. macrophylla</i> Wils.	アシ [°] サイ	1.3(1.8)	栽培	103, 105, 152, 545, 562 他
<i>subsp. serrata</i> Makino <i>f. prolifer</i> Ohwi	シチダ [°] ンカ	(0.6)	栽培	101
<i>H. paniculata</i> Sieb.	ナリウツキ [°]	2.0(2.3)	日・中	1206
<i>H. involucrata</i> Sieb.	タマアシ [°] サイ	(0.6)	日	1059
<i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc.	ウツキ [°]	2.6(3.6)	日・中	473, 475, 477, 1304 他
<i>D. gracilis</i> Sieb. et Zucc.	ヒメウツキ [°]	0.2(1.3)	日	603, 605, 609, 613, 617 他
<i>D. scabra</i> Thunb.	マルハ [°] ウツキ [°]	0.8(1.9)	日	1223
<i>D. Maximowicziana</i> Makino	ウラシ [°] ロウツキ [°]	0.6(1.8)	日	1224
<i>Philadelphus grandiflorus</i> Willd.	セイヨウハ [°] イカウツキ [°]	2.8(2.4)	北米西	335, 337
	(Grossblumiger Garten)			
<i>P. coronarius</i> L.	モックオレンジ [°]	1.1(3.4)	南欧・小亜	292
	(Mock-orange)			
<i>Pileostegia viburnoides</i> Hook. et Thoms.				
<i>var. parviflora</i> Oliver	シマユキカス [°] ラ	蔓 0.3(1.6)	日・中	775
	(ナツユキカス [°] ラ)			

Pittosporaceae とべら科

<i>Pittosporum Tobira</i> Aiton	トベ [°] ラ	8.0(5.9)	日・朝・中	1038, 1265(×)
---------------------------------	-------------------	----------	-------	---------------

Hamamelidaceae まんさく科

<i>Corylopsis spicata</i> Sieb. et Zucc.	トサミ [°] キ	2.3(3.2)	日	1075, 1076
<i>C. pauciflora</i> Sieb. et Zucc.	ヒユウカ [°] ミ [°] キ	生垣(1.2)	日	1083, 1085, 1105, 1108 他
<i>Liquidambar formosana</i> Hance	フウ	58.7(20.5)	中	343, 1012
<i>L. styraciflua</i> L.	モシ [°] ハ [°] フウ	46.0(19.0)	北米南東	1027
	(Sweetgum)			
<i>Hamamelis japonica</i> Sieb. et Zucc.	マンサク	7.0(4.8)	日	511, 1201
<i>H. mollis</i> Oliver	シナマンサク	8.2(4.7)	中	1293, 1294
<i>Parrotia persica</i> C.A. Mey.	ハ [°] ロティ [°] ア	10.7(5.9)	ヒマラヤ	444, 447
<i>Disanthus cercidifolius</i> Maxim.	マルハ [°] ノキ	1.6(2.6)	日	1104
<i>Distylium racemosum</i> Sieb. et Zucc.	イスノキ	28.3(5.3)	中	1373

Eucommiaceae とちゅう科

<i>Eucommia ulmoides</i> Oliver	トチュウ	43.8(11.6)	中	480
---------------------------------	------	------------	---	-----

Platanaceae すずかけのき科

Platanus acerifolia Willd.モシ^ハス^スカ^ケノ^キ 54.0(11.7) 栽培 719

Rosaceae ばら科

Prunus Jamasakura Sieb.ヤマサ^クラ 24.9(10.1) 日 1060, 1380*P. Sargentii* Rehd.オオヤマサ^クラ 11.5(7.9) 日・樺・朝 1097, 1098*P. subhirtella* Miq.ヒガ^ンサ^クラ 21.8(8.7) 日 457, 458, 1347*P. Itosakura* Sieb.シタ^レサ^クラ 31.5(7.9) 栽培 1020, 1047*f. plena-rosea* Nemotoヤエヘ^ニシタ^レ 39.6(8.3) 栽培 26*P. Lannesiana* Wils.サトサ^クラ 8.7(5.3) 栽培 1358, 1377, 1379*f. Ariake* Wils.アリア^ケ(有明) 10.2(4.2) 栽培 1360*f. Moutan* Wils.ホ^ンタン(牡丹) 16.6(7.0) 栽培 1359*f. Kongosan* Wils.コンコ^ウサ^ン(金剛山) 9.4(4.5) 栽培 1393*f. Shujaku* Haraシュジ^{ヤク}(朱雀) 11.5(6.2) 栽培 1314*f. Horinji* Haraホウリンジ^ノ(法輪寺) 11.0(5.9) 栽培 1368*f. albo-rosea* Haraフケ^ンソウ(普賢象) 14.6(5.4) 栽培 1330, 1331*f. Sekiyama* Hara

セキヤマ(関山) 5.1(3.9) 栽培 1315

f. imose Wils.

イモセ(妹背) 9.4(5.5) 栽培 1381

P. lannesiana Wils.*var. speciosa* Makinoオオシマサ^クラ 12.2(7.7) 日 1034*P. yedoensis* Matsum.

ソメイヨシノ 36.7(11.2) 栽培 35, 37, 472, 476, 1048

P. cerasoides D. Don*var. campanulata* Koidz.ヒカンサ^クラ 16.4(7.3) 中 1322, 1323, 1324*P. verecunda* Koehneカスミサ^クラ 14.8(8.6) 日 1100, 1101, 1102*P. Grayana* Maxim.ウワミス^サク^ラ 29.0(9.2) 日 1045*P. Ssiori* Fr. Schm.シウリサ^クラ 34.0(11.3) 日・樺・中 1046, 1053*P. Persica* Batsch.*var. camelliaeflora* Dipp.ハナモモ 10.3(4.9) 栽培 573, 828, 1290, 1291
(ヘ^ニモモ)*P. tomentosa* Thunb.

ユスラウメ 3.1(2.3) 朝・中 509, 686, 1305

P. Zippeliana Miq.ハ^クチノ^キ 20.9(8.1) 日・中 1382, 1384*P. Laurocerasus* L.セイヨウハ^クチノ^キ 9.2(5.5) 東南欧・西亜 74, 77, 80, 683, 684 他
(Charry Laurel)*Chaenomeles sinensis* Koehne

カリン 14.5(8.4) 中 430, 431

Kerria japonica DC.ヤマフ^キ (0.5) 日・中 181*f. plena* C. K. Schn.ヤエヤマフ^キ 0.6(2.6) 栽培 266, 1289, 1307*Rhodotypos scandens* Makinoシロヤマフ^キ 0.5(1.8) 栽培 175, 176, 177, 178, 179*Amelanchier asiatica* Endl.サ^イフリホ^ク 4.4(4.3) 日・朝 267*A. canadensis* Medic.アメリカサ^イフリホ^ク 4.7(5.5) 北米中 532
(Oblongleaf Juneberry)

<i>Rhaphiolepis umbellata</i> Makino	シャリンハ ^イ	26.2(7.4)	日・朝	1306, 1332, 1333
var. <i>mertensii</i> Makino	マルハ ^イ シャリンハ ^イ	(0.7)	日・朝・中	677, 678, 805
var. <i>minor</i> Makino	ヒメシャリンハ ^イ	1.3(2.6)	栽培	673, 674, 675, 676
<i>Cotoneaster Franchetii</i> Bois.	ウンナンコトネアスター (フランシエシャリントウ)	(0.9)	中	750, 751, 752, 756
<i>C. pannosa</i> Franch.	キンヨウシャリントウ	(0.9)	中	761
<i>Pyracantha angustifolia</i> Schneid.	タチハ ^イ ナモト ^キ	(0.9)	中	131, 132
<i>P. coccinea</i> Roem.	トキワサンサ ^シ	3.2(3.0)	南欧・小亜	280, 281, 282, 283 他 (Fiery Thorn)
<i>P. crenulata</i> Roem.	ヒマラヤトキワサンサ ^シ	6.5(4.3)	ヒマラヤ	128, 703, 704, 705 他
<i>Spiraea Thunbergii</i> Sieb.	ユキヤナキ ^キ	0.3(1.9)	日・中	862, 887, 916
<i>S. prunifolia</i> Sieb.	シシ ^ミ ハ ^ナ	1.3(2.6)	中	999
<i>S. tosaensis</i> Yatabe	トサシモツケ	(1.2)	日	656
<i>Rosa laevigata</i> Michx.	ナニワイハ ^ラ	蔓 1.0(3.1)	日・中	205
<i>R. hirtula</i> Nakai	サンショウハ ^ラ	4.0(4.4)	日	1088, 1092
<i>R. rugosa</i> Thunb.				
var. <i>plena</i> Regel	マイカイ	0.4(1.4)	中	94
<i>Photinia glabra</i> Maxim.	カナメチ	生垣(2.8)	日・中	174(×), 838, 908
<i>P. serrulata</i> Lindl.	オオカナメチ	17.0(7.3)	中	568, 1200
<i>Pourthiaea villosa</i> Decne				
var. <i>laevis</i> Stapf.	カマツカ	2.0(1.4)	日	1152
Leguminosae まめ科				
<i>Wisteria floribunda</i> DC.	フジ ^キ	蔓 5.5(2.8)	日・朝	763
<i>Cercis chinensis</i> Bunge	ハナス ^キ オウ	2.2(3.1)	中	653
<i>C. canadensis</i> L.	アメリカハナス ^キ オウ	9.1(5.3)	北米中東	661 (Eastern Redbud, Redbud)
<i>C. siliquastrum</i> L.	セイヨウス ^キ オウ	12.7(5.0)	南欧・西亜	667 (Judas Tree, Love Tree)
<i>Robinia pseudo-acacia</i> L.				
var. <i>inermis</i> DC.	トゲ ^キ ナシニセアカシア	2.8(3.5)	北米	1273, 1274, 1275 (Unbewehrter Schotendorn)
var. <i>Bessoniana</i> Kirch.	チンタオトゲ ^キ ナシニセアカシア	21.9(10.7)	北米	665 (Pink-flowered Acasia)
var. <i>umbraculifera</i> DC.	イ ^キ リストゲ ^キ ナシニセアカシア	0.5(1.4)	北米	659-2, 660 (Parasol Acasia)
<i>Lespedeza penduliflora</i> Nakai	ミヤキ ^キ ノハ ^キ	(1.0)	日	889
var. <i>albiflora</i> Ohwi	シロハ ^キ ノハ ^キ	0.8(1.9)	朝	881 (シロハ ^キ)

L. bicolor Turcz.

<i>f. acutifolia</i> Matsum.	ヤマハキ*	1.2(2.7)	日	876
<i>L. Buergeri</i> Miq.	キハキ*	4.2(4.2)	日	489
<i>L. virgata</i> DC.	マキエハキ*	(0.3)	日・朝・中	149
<i>L. Maximowiczii</i> C. K. Schn.	チョウセンキハキ*	1.4(2.1)	日・朝	576
<i>Sophora japonica</i> L.	エンシ*ユ	47.9(14.0)	中	410
<i>var. pendula</i> Loud.	シタ*レエンシ*ユ	13.6(3.6)	栽培	929, 1024
<i>Cladrastis platycarpa</i> Makino	フジ*キ	69.2(13.2)	日・中	1219
<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	サイカチ	68.4(12.5)	日・朝・中	1321
<i>Acasia melanoxylon</i> R. Br.	メラノキシロンアカシア	19.7(9.9)	豪東	993
	(Blackwood Acacia)			
<i>Indigofera Gerardiana</i> Wall.	キタ*チニワフシ*	0.6(2.7)	ヒマラヤ	299

Rutaceae みかん科

<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	キハタ*	59.8(12.9)	日・朝・中	1343
<i>Zanthoxylum piperitum</i> DC.	サンショウ	(1.2)	日・朝	760
<i>Citrus Tachibana</i> C. Tanaka	タチバナ	2.0(1.7)	日・朝	771, 772, 773, 774
<i>Fortunella japonica</i> Swingle	キンカン	2.6(2.9)	中	408-2
<i>Evodia Daniellii</i> Hemsl.	チョウセンゴ*シユ	29.9(14.3)	中	433
<i>Orixa japonica</i> Thunb.	コクサキ*	3.8(3.3)	日・朝	1238, 1239, 1240, 1353

Simaroubaceae にがき科

<i>Ailanthus altissima</i> Swingle	ニワウルシ (シンシ*ユ)	4.9(4.4)	中	329
------------------------------------	------------------	----------	---	-----

Meliaceae せんだん科

<i>Melia Azedarach</i> L.				
<i>var. japonica</i> Makino	センタ*ン	36.2(7.4)	日	1378

Euphorbiaceae とうだいぐさ科

<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.	ユス*リハ	10.6(6.9)	日・朝・中	1121, 1129
<i>D. Teijsmanni</i> Zoll.	ヒメユス*リハ	12.2(6.0)	日・朝・中	1118, 1119, 1266, 1268 他
<i>Aleurites Fordii</i> Hemsl.	シアア*ラキ*リ	8.6(4.8)	中	657
<i>Mallotus japonicus</i> Muell. Arg.	アカメガ*シワ	18.2(6.5)	日・中	1245
<i>Sapium sebiferum</i> Roxb.	ナンキンハセ*	25.5(9.5)	中	483

Buxaceae つげ科

<i>Buxus microphylla</i> Sieb. et Zucc.				
<i>var. japonica</i> Rehd. et Wils.	ツゲ*	(0.7)	日	99, 919

Anacardiaceae うるし科

<i>Rhus succedanea</i> L.	ハセノキ	6.5(6.3)	日・朝・中	1189, 1191, 1192, 1193
<i>R. verniciflua</i> Stokes	ウルシ	7.7(5.6)	中	1188
<i>R. cotinus</i> L.	スモークツリー (ハグマノキ Smoke Tree)	5.2(2.0)	中・南欧・中・ヒマラヤ	17
<i>Pistacia formosana</i> Matsum.	ランシンボク	23.4(9.1)	中	478

Aquifoliaceae もちのき科

<i>Ilex integra</i> Thunb.	モチノキ	22.7(9.6)	日・朝・中	1157, 1158
<i>I. crenata</i> Thunb.	イヌツゲ	生垣(0.8)	日・朝	70, 95, 100, 797 他
<i>I. latifolia</i> Thunb.	タラヨウ	24.3(6.5)	日・朝・中	1031, 1383(×)
<i>I. chinensis</i> Sims	ナナメノキ	20.5(10.6)	日・中	1339
<i>I. pedunculosa</i> Miq.	ソヨゴ	6.9(4.7)	日・中	1116, 1117
<i>I. rotunda</i> Thunb.	クロガネモチ	49.8(13.0)	日・朝・中	718, 1153, 1355, 1356 他
<i>I. Buergeri</i> Miq.	シイモチ	13.1(5.8)	日	1154
<i>I. Aquifolium</i> L.	セイヨウヒイラギ (English Holly, Holly)	1.5(1.9)	欧・西亜	542, 754 他
<i>I. opaca</i> Ait.	アメリカヒイラギ (American Holly)	27.5(8.4)	北米東南	300, 301
<i>I. cornuta</i> Lindl.	ヒイラギモトノキ	10.2(5.7)	朝・中	541
<i>I. serrata</i> Thunb.	ウメモトノキ	4.3(2.9)	日	1194
<i>I. macropoda</i> Miq.	アホハダ	15.0(9.1)	日・朝・中	1072, 1093
<i>I. verticillata</i> A. Gray	アメリカイヌウメモトノキ (Common Winterberry, Black Alder)	4.5(4.4)	北米東	544

Celastraceae にしきぎ科

<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	マサキ	17.4(8.4)	日・朝・中	392, 992, 1039, 1329 他
var. <i>aureo-variegatus</i> Lowe	フイリマサキ	2.3(1.9)	栽培	359(×)
<i>E. Fortunei</i> Hand. -Mazz.	ツルマサキ	蔓0.5(1.8)	日・朝・中	808, 809
<i>E. alatus</i> Sieb.	ニシキギ	1.6(2.0)	日・朝・中	1213
<i>E. Sieboldianus</i> Blume	マユミ	22.0(7.1)	日・樺・朝	493(×), 1099, 1208(×)
<i>E. oxyphyllus</i> Miq.	ツリハナ	3.5(2.4)	日・朝・中	1175, 1176
<i>E. Chibae</i> Makino	ヒゼンマユミ	22.2(6.8)	日・朝	1207
<i>Microtropis japonica</i> H. Hallier	モクレイシ	12.3(6.5)	日	1369, 1370, 1372

Aceraceae かえで科

<i>Acer palmatum</i> Thunb.	イロハモシジ	10.0(6.0)	日・朝・中	1209
subsp. <i>amoenum</i> Hara	オオモシジ	8.1(4.5)	日	106
subsp. <i>Matsumurae</i> Koidz.	ヤマモシジ	4.9(3.8)	日	102, 107

<i>A. japonicum</i> Thunb.	ハウチワカエテ°	4.6(4.5)	日	831, 835, 1114, 1115
<i>A. Sieboldianum</i> Miq.	コハウチワカエテ°	3.3(2.3)	日	833
<i>A. crataegifolium</i> Sieb. et Zucc.	ウリカエテ°	2.8(2.8)	日	1215
<i>A. Mono</i> Maxim.				
<i>subsp. marmoratum</i> Kitamura	イタヤカエテ°	42.3(12.1)	日・朝・中	1026-2, 1032-2, 1210
<i>subsp. Mayrii</i> Kitamura	アカイタヤ	21.1(8.1)	日	1231
<i>A. pycnanthum</i> K. Koch	ハナノキ	9.4(7.4)	日	352, 1211, 1212
<i>A. nipponicum</i> Hara	テツカエテ°	18.5(8.4)	日	1203, 1205
<i>A. carpinifolium</i> Sieb. et Zucc.	チト°リノキ (ヤマシハ°カエテ°)	23.5(5.4)	日	1270, 1299
<i>A. Buergerianum</i> Miq.	トウカエテ°	30.3(14.3)	中	345, 346
<i>A. Negundo</i> L.	ネク°ント°カエテ°	33.9(12.3)	北米中東	333 (トネリコハ°ノカエテ° Box Elder, Ashleaf Maple)
<i>A. rubrum</i> L.	アメリカハナノキ (Red Maple)	4.8(3.6)	北米東	332

Hippocastanaceae とちのき科

<i>Aesculus turbinata</i> Blume	トチノキ	35.2(11.4)	日	1214
<i>A. glabra</i> Willd.	アメリカトチノキ (Ohio Buckeye)	5.2(4.2)	北米中	309

Sapindaceae むくろじ科

<i>Sapindus Mukorossi</i> Gaertn.	ムクロジ°	45.5(13.8)	日・中	1066, 1067, 1068
<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	モクケ°ンシ°	3.4(4.2)	日・朝・中	671, 672

Sabiaceae あわぶき科

<i>Meliosma rigida</i> Sieb. et Zucc.	ヤマビ°ワ	2.4(2.7)	日・中	991
---------------------------------------	-------	----------	-----	-----

Rhamnaceae くろうめもどき科

<i>Zizyphus Jujuba</i> Mill.	サネフ°トナツメ (Common Jujube)	7.4(3.9)	南東欧・南東亜	515, 517
<i>var. inermis</i> Rehd.	ナツメ	4.1(3.8)	中	459, 460
<i>Hovenia tomentella</i> Makino	ケンホ°ナシ	6.4(6.1)	日	523
<i>Rhamnella franguloides</i> Weber.	ネコノチ	8.6(5.4)	日・朝・中	1089, 1094

Vitaceae ぶどう科

<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> Tr.	ノブ°トウ	蔓 0.3(1.8)	日・朝・中	738
--	-------	------------	-------	-----

Elaeocarpaceae ほるとのき科

Elaeocarpus sylvestris Poir.var. *ellipticus* Hara

ホトノキ 19.6(7.0) 日 1361

E. japonicus Sieb. et Zucc.

コハンモチ 12.3(7.9) 日・朝・中 1357

Tiliaceae しなのき科

Tilia japonica Simonkai

シナノキ 36.5(13.3) 日 432, 434

T. kiusiana Makino et Shirasawa

ヘラノキ 56.8(9.8) 日 1248

T. platyphyllos Scop.

ナツホ・ダイシユ 27.7(10.9) 欧中南 198, 307

(Large-leaved Linden)

T. americana L.

アメリカシナノキ 54.8(15.5) 北米中東 273

(American Basswood)

Malvaceae あおい科

Hibiscus syriacus L.

ムクゲ 9.5(4.2) 中 508, 623, 628, 1292 他

H. mutabilis L.f. *versicolor* Makino

スイフヨウ 4.5(3.5) 栽培 14, 15

Sterculiaceae あおぎり科

Firmiana simplex W.F. Wight

アオギリ 35.7(7.8) 中 1386

Actinidiaceae またたび科

Actinidia rufa Planch.

シマサルナン 蔓 2.5(3.0) 日 744, 745

A. chinensis Planch.

キウイ 蔓 5.0(3.1) 中 61, 62, 63

(オニマタタビ・シナサルナン)

Theaceae つばき科

Camellia japonica L.

ツバキ 12.2(6.1) 日・朝 1033, 1315

var. *lilifolia* Makino

ユリツバキ 2.6(2.4) 栽培 910

var. *polypetala* Makino

チリツバキ 6.4(4.0) 栽培 133, 257

subsp. *rusticana* Kitamura

ユキツバキ 0.8(1.7) 日 650

C. Sasanqua Thunb.

ササノカ 6.9(4.2) 日 1090, 1096, 1103

C. reticulata Lindl.f. *subvidula* Makino

モイロワビスケ 5.0(3.7) 栽培 1156

f. *shitsetou* Yu

オオタニツツバキ 1.5(2.5) 栽培 97

C. sinensis O. Kuntze

チャ 生垣(0.9) 日・朝・中 528, 720

Ternstroemia gymnanthera Sprague

モッコク 6.7(4.7) 日・朝・中 184, 1252, 1254, 1255 他

Eurya japonica Thunb.

ヒサカキ 2.1(1.7) 日・朝・中 138, 146

E. emarginata Makino

ハマヒサカキ 6.2(3.8) 日・朝・中 137, 400

<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	サカキ	11.1(5.5)	日・朝・中	402, 403, 1037
<i>Stewartia pseudo-camellia</i> Maxim.	ナツツハ ^キ	3.8(2.0)	日	1030
<i>S.monadelpha</i> Sieb.et Zucc.	ヒメシヤラ	25.8(10.5)	日・朝	716
<i>S.sinensis</i> Rehd.et Wils.	シナナツツハ ^キ (トウヒメシヤラ)	4.8(2.8)	中	512
<i>Gordonia axillaris</i> Szysz	タイワンツツハ ^キ	2.2(2.4)	中	821, 822
<i>Schima Wallichii</i> Korth. subsp. <i>Noronhae</i> Bloemberger	イシ ^ユ	15.4(8.2)	日・中	491
Tamaricaceae ギョリユウ科				
<i>Tamarix tenuissima</i> Nakai	キ ^{ヨリユウ}	7.6(4.3)	中	590
Flacourtiaceae いいざり科				
<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	イキ ^リ	32.3(12.9)	日・朝・中	1352
<i>Xylosma congestum</i> Merr.	クスト ^{イケ}	11.8(5.0)	日・朝・中	1371
Thymelaeaceae じんちょうげ科				
<i>Wikstroemia sikokiana</i> Fr.et Sav.	カン ^ビ	1.5(1.7)	日	408
<i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl.	ミツマタ	1.1(1.8)	中	668(×), 669, 670
Elaeagnaceae ぐみ科				
<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>hortensis</i> Serv.	トウク ^ミ	10.6(4.4)	中	484, 485, 487, 488, 753
<i>E.pungens</i> Thunb.	ナワシロク ^ミ	6.7(3.3)	日・中	495(×)
<i>E.glabra</i> Thunb.	ツルク ^ミ	2.5(3.5)	日・朝・中	1263, 1264
Lythraceae みそはぎ科				
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	サルスベ ^リ	9.9(5.5)	中	416
<i>L.subcostata</i> Koehne	シマサルスベ ^リ	45.7(17.0)	日・中	423, 428
Punicaceae ざくろ科				
<i>Punica Granatum</i> L.	ザ ^{クロ}	3.8(3.4)	南東欧・西亜	496, 497, 500, 503 他 (Pomegranata)
f. <i>multiplex</i> Sweet	シロヤエザ ^{クロ}	5.4(3.8)	栽培	498, 502
Alangiaceae うりのき科				
<i>Alangium platanifolium</i> Harms var. <i>trilobum</i> Ohwi	ウリノキ	2.2(3.3)	日・朝・中	490

Myrtaceae ふともも科

<i>Callistemon rigidum</i> R.Br.	マキバ [°] フラッシノキ	7.1(3.4)	豪	389, 390
	(Bottle Brush)			

Araliaceae うこぎ科

<i>Fatsia japonica</i> Decnc.et Planch.	ヤツテ [°]	3.9(2.8)	日	91, 121, 213, 214, 355 他
<i>Dendropanax trifidus</i> Makino	カクレミノ	13.6(5.9)	日	1032
<i>Hedera Helix</i> L.	セイヨウキヅ [°] タ	蔓(1.3)	欧・亜	157
	(English Ivy)			
var. <i>tricolor</i> Hibb.	ニシキヅ [°] タ	蔓(1.8)	栽培	156
<i>Acanthopanax spinosus</i> Miq.	ヤマウコキ [°]	10.0(5.0)	日	1350
<i>A. sessiliflorum</i> Seem.	マンシュウウコキ [°]	1.0(2.1)	朝・中	429

Cornaceae みずき科

<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	アオキ	4.5(2.6)	日・朝	109, 122, 215, 361 他
f. <i>variegata</i> Rehd.	フイリアオキ	1.5(2.5)	栽培	108, 1280
f. <i>fukurin</i> Hort.	フクリンアオキ	0.5(2.0)	栽培	117, 130
<i>Cornus controversa</i> Hemsl.	ミス [°] キ	40.6(10.8)	日・朝・中	514
<i>C. macrophylla</i> Wall.	クマノミス [°] キ	49.3(12.3)	日・朝・中	456
<i>C. Kousa</i> Buerger.	ヤマホ [°] ウシ	6.1(3.2)	日・朝・中	1041
var. <i>chinensis</i> Wils.	シナヤマホ [°] ウシ	8.2(6.3)	中	510, 518
	(シナミス [°] キ)			
<i>C. florida</i> L.	ハナミス [°] キ	11.5(5.7)	北米東	13, 47, 276, 924, 1007 他
	(アメリカヤマホ [°] ウシ Flowering Dogwood)			
<i>C. officinalis</i> Sieb.et Zucc.	サンシュユ	10.2(8.3)	朝・中	1326, 1327
<i>C. stolonifera</i> Michx.	アカケキミス [°] キ	2.1(2.9)	北米中北	320
	(Red-osier Dogwood)			

Nyssaceae ぬまみずき科

<i>Camptotheca acuminata</i> Decne.	カンレンホ [°] ク	26.7(13.3)	中	504
-------------------------------------	----------------------	------------	---	-----

Ericaceae つつじ科

<i>Rhododendron tasiroi</i> Maxim.	サクラツツジ [°]	(1.1)	日・中	
<i>R. mucronatum</i> G.Don	リュウキユウツツジ [°]	生垣(1.1)	栽培	250
<i>R. Kaempferi</i> Planch.	ヤマツツジ [°]	(0.6)	日	569
<i>R. obtusum</i> Planch.	キシマ	生垣(0.9)	栽培	863, 882, 923, 937 他
<i>R. japonicum</i> Suringer				
f. <i>flavum</i> Nakai	キレンケ [°] ツツジ [°]	生垣(1.2)	日	767, 768
<i>R. macrosepalum</i> Maxim.	モチツツジ [°]	生垣(1.0)	日	136, 139, 788

<i>R. ripense</i> Makino	キシツツジ	(1.1)	日	757
<i>R. mucronulatum</i> Turcz.				
<i>f. albiflorum</i> Okuyama	シロハナゲンカイツツジ	0.9(1.9)	日	1008
<i>R. Oomurasaki</i> Makino	オオムラサキ	生垣(1.8)	栽培	53, 183, 187, 249
<i>R. scabrum</i> G. Don	ケラマツツジ	2.8(1.8)	日	24, 707, 729 他
<i>Enkianthus perulatus</i> Schneid.	トウタツツジ	1.0(1.8)	日	88
<i>E. campanulatus</i> Nichols.	サラサトウタツ	1.0(1.8)	日	87
<i>E. cernuus</i> Makino				
<i>f. rubens</i> Ohwi	ヘニトウタツ	(1.0)	日	84
<i>Pieris japonica</i> D. Don	アセビ	8.3(3.7)	日	186, 543, 1181, 1183 他
<i>f. rosea</i> Makino	ウスヘニアセビ	(1.2)	栽培	733
	(アケボノアセビ)			
<i>Leucothoe Catesbaei</i> Gray	ヨウシュイワナンテン	0.4(1.8)	北米南	766, 814, 815
	(アメリカイワナンテン・アメリカナベリノキ Drooping Laurel)			
<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	シャシヤンホ	0.3(1.4)	日・朝・中	1126
Myrsinaceae やぶこうじ科				
<i>Ardisia crispa</i> DC.	カラタチハナ	(0.4)	日・中	116
<i>A. japonica</i> Blume	ヤブコウジ	(0.5)	日・朝・中	728
Plumbaginaceae いそまつ科				
<i>Cerastostigma Willmottianum</i> Stapf	コタチルリマツリ	生垣(0.7)	中	395
Ebenaceae かきのき科				
<i>Diospyros Kaki</i> Thunb.	カキノキ	23.1(8.6)	栽培	388, 401
<i>var. sylvestris</i> Makino	ヤマカキ	15.7(6.7)	日・朝・中	265
<i>D. Lotus</i> L. <i>var. glabra</i> Makino	シナノカキ	10.6(7.3)	日・朝・中	714
<i>D. virginiana</i> L.	アメリカカキ	24.5(14.0)	北米中南	275, 284
	(Common Persimmon)			
Symplocaceae はいのき科				
<i>Symplocos chinensis</i> Druce <i>var. leucocarpa</i> Ohwi				
<i>f. pilosa</i> Ohwi	サワフタギ	7.2(4.3)	日・朝・中・ヒマラヤ	516
Styracaceae えごのき科				
<i>Styrax Obassia</i> Sieb. et Zucc.	ハウソノキ	15.0(9.6)	日・朝・中	438
<i>S. japonica</i> Sieb. et Zucc.	エゴノキ	10.2(6.7)	日・朝・中	1122, 1124, 1125

Oleaceae もくせい科

<i>Osmanthus fragrans</i> Lour.	キンモクセイ (モクセイ)	2.0(2.8)	中	67
<i>var. aurantiacus</i> Makino	キンモクセイ	9.3(3.2)	中	69, 92
<i>var. Thunbergii</i> Makino	ウスキンモクセイ	5.8(3.7)	日・中	68, 134
<i>O. heterophyllus</i> P.S.Green	ヒイラキ	2.0(2.2)	日・中	188, 1259
<i>O. Fortunei</i> Carr.	ヒイラキンモクセイ	22.9(8.0)	栽培	442, 1006
<i>Forsythia suspensa</i> Vahl	レンキンヨウ	1.8(2.6)	中	574, 575
<i>F. koreana</i> Nakai	チョウセンレンキンヨウ	4.2(3.1)	朝・中	492, 494, 499
<i>Jasminum humile</i> L.				
<i>var. revolutum</i> Stokes	キンケイ	4.8(3.4)	ヒマラヤ	790, 791, 792, 793
<i>J. Mesnyi</i> Hance	ウンナンオウハイ	1.2(2.6)	中	594, 595, 596, 597
(<i>J. primulinum</i> Hemsl.)				
<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	ネスミモチ	4.8(3.4)	日	380, 381, 382
<i>L. lucidum</i> Ait.	トウネスミモチ	13.3(7.4)	中	373, 374, 377, 378
<i>L. obtusifolium</i> Sieb. et Zucc.	イボタノキ	2.8(2.7)	日・朝	715
<i>L. ovalifolium</i> Hassk.	オオハイボタ	3.5(3.6)	日・朝	709
<i>var. aureo-marginatum</i> Hort.	フイリオオハイボタ	2.4(2.9)	栽培	649, 651
<i>L. delavayanum</i> Harriot	ブーリヘット	生垣(1.1)	中	810, 812
<i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxton	ヒトツバタコ	30.3(14.6)	日・朝・中	452, 455
<i>Olea europaea</i> L.	オリーブ	0.8(1.7)	西亜	12
	(Olive Tree)			
<i>Fraxinus japonica</i> Blume	トネリコ	15.3(9.5)	日	453
<i>F. mandshurica</i> Rupr.				
<i>var. japonica</i> Maxim.	ヤチタモ	40.6(12.3)	日・樺・朝・中	1127, 1130
<i>F. lanuginosa</i> Koidz.				
<i>f. serrata</i> Murata	アオタモ	9.1(6.9)	日・朝	454, 1054, 1057
<i>F. Sieboldiana</i> Blume	マルハアオタモ	11.8(5.4)	日・朝	1218
<i>F. Griffithii</i> C.B. Clarke	シマトネリコ	37.5(18.0)	日・中	1011, 1016, 1036, 1261
<i>F. rhynchophylla</i> Hance	チョウセントネリコ	20.0(6.7)	朝・中	192, 193, 194, 197, 199
<i>F. pennsylvanica</i> Marsh.	ヒロートネリコ	4.7(7.9)	北米東	334, 338
	(Green Ash, Red Ash)			
<i>F. chiisanensis</i> Nakai	チイサントネリコ	8.5(6.0)	朝・中	1216
	(チイサンヤチタモ・トネリコヤチタモ)			
<i>Abeliophyllum distichum</i> Nakai	ウチワノキ	0.4(1.7)	朝	798, 799

Loganiaceae ふじうつぎ科

<i>Buddleja davidii</i> Franch.	フサフサウツギ	2.6(2.3)	中	505
<i>Gelsemium sempervirens</i> Ait.	カロライナジャズミン蔓	1.1(1.6)	北米東	778
	(Carolina Yellow Jessamine)			

Apocynaceae きょうちくとう科

Nerium indicum Mill. キョウチクトウ 7.4(5.0) 南西亜 414

Boraginaceae むらさき科

Ehretia ovalifolia Hassk. チシャノキ 54.6(10.5) 日・中 1388, 1389

E. Dicksonii Hance マルバチシャノキ 33.7(7.1) 日・中 482, 1385, 1390, 1392

Verbenaceae くまつづら科

Callicarpa japonica Thunb. ムラサキシキブ 3.8(2.9) 日・朝・中 462, 463, 465, 468, 470

f. albibacca Hara シロシキブ 0.7(2.1) 栽培 466, 467

var. luxurians Rehd. オオムラサキシキブ 6.7(4.9) 日 520, 521, 522, 1243

C. dichotoma K. Koch コムラサキ 0.9(1.8) 日・朝・中 469

(コシキブ)

C. mollis Sieb. et Zucc. ヤブムラサキ 1.5(3.1) 日・朝 1109

Clerodendron trichotomum Thunb. クサキ 5.7(4.1) 日・朝・中 1303

Vitex cannabifolia Sieb. ニンジンホク 5.8(5.0) 中 399

Solanaceae なす科

Lycium chinense Mill. クロ 1.0(1.4) 日・朝・中 190, 191, 641(×), 1106

Scrophulariaceae ごまのはぐさ科

Paulownia tomentosa Steud. キリ 18.8(9.9) 不明 1317

P. Kawakamii Ito タイワンウスバキリ 70.4(12.5) 中 1374

Bignoniaceae のうぜんかずら科

Campsis grandiflora K. Schum. ノウゼンカスラ 蔓 6.0(6.6) 中 731

Catalpa ovata G. Don キササ 10.2(4.9) 中 264

Bignonia capreolata L. ツリカネツツラ 蔓 2.5(1.6) 北米東南 781

(Trumpet Flower, Cross Vine)

Rubiaceae あかね科

Gardenia jasminoides Ellis

var. radicans Makino コクチナン (0.9) 栽培 148

f. ovalifolia Hara ヤエクチナン 1.0(2.3) 栽培 994, 995, 996

Serissa japonica Thunb. ハクチョウゲ 生垣(0.9) 中・東南亜 737, 764

var. pleniflora Makino ヤエハクチョウゲ 生垣(0.8) 栽培 243, 244, 245, 246, 247 他

Caprifoliaceae すいかずら科

<i>Viburnum odoratissimum</i> Ker.	サンゴシユ	24.2(8.6)	日・朝・中	1197, 1204, 1367
<i>V. suspensum</i> Lindl.	ゴモシユ	5.2(2.9)	日・中	81
<i>V. plicatum</i> Thunb.				
<i>f. plicatum</i> Maxim.	オオテマリ	3.9(4.1)	栽培	658, 659, 662
<i>V. dilatatum</i> Thunb.	カマスミ	1.8(1.8)	日・朝・中	1177(×), 1179
<i>V. erosum</i> Thunb.	コハノカマスミ	(1.3)	日・朝・中	1180(×)
<i>V. Sieboldii</i> Miq.	ゴマキ	27.1(7.2)	日	1302
<i>Abelia spathulata</i> Sieb. et Zucc.	ツクハネウツキ	1.1(2.0)	日	1128
<i>A. grandiflora</i> Rehd.	ハナゾノツクハネウツキ	生垣(1.2)	栽培	242
	(アヘリア)			
<i>Weigela hortensis</i> K. Koch	タニウツキ	3.3(3.0)	日	1202
<i>W. florida</i> DC.	オオヘニウツキ	3.3(2.7)	日・朝	1195, 1196
<i>Lonicera sempervirens</i> L.	ツクシキニトウ	2.0(2.4)	北米東	387, 391, 734, 735
	(Trumpet Honeysuckle)			
<i>L. Periclymenum</i> L.	ニオイニトウ	0.4(1.6)	中南欧	776, 777
	(Woodbine)			
<i>Sambucus racemosa</i> L.				
<i>subsp. sieboldiana</i> Hara	ニワトコ	14.2(5.2)	日・朝・中	412, 1300

Compositae きく科

<i>Baccharis halimifolia</i> L.	ハツカリス	1.8(2.3)	北米南東	251, 252
	(Groundsel Tree)			

Gramineae いね科

<i>Phyllostachys aurea</i>				
Carr. ex A. Riv. et C. Riv.	ホテイタケ	生垣(4.1)	中	54
<i>P. nigra</i> Munro	クロタケ	生垣(4.1)	栽培	54
<i>Pseudosasa japonica</i> Makino				
<i>var. Tsutsumiana</i> Yanagita	ラッキョウヤタケ	2.1(2.8)	不明	785

Palmae やし科

<i>Trachycarpus Fortunei</i> H. Wendl.	シュロ	12.4(8.5)	日・中	240, 241
<i>T. Wagnerianus</i> Becc.	トウシユロ	16.3(4.9)	中	238, 239
<i>Yucca gloriosa</i> L.	アメリカミカヨラン	6.0(2.1)	北米南東	877, 911, 927
	(アツハミミカヨラン Moundlily Yucca)			
<i>Y. aloifolia</i> L.	センシユラン	8.5(3.0)	北米南	933
	(キンホウラン Spanish Bayonet, Aloe Yucca)			
<i>Cordyline australis</i> Hook. f.	ニオイシュロラン	(1.0)	ニューシラント	740, 741, 742, 747
	(Green Dracena)			

お わ り に


本見本園では設立当時の趣旨に沿って、北側の帯状の地区にはわが国自生の樹木が、中央部東側には主に欧米の、西側にはアジアの樹木とカエデ、スギ、ヒノキ、アジサイなどの多くの園芸品種が植栽されている。しかし、これらの苗木の前歴、およびその後の生育の記録は散逸している。その中で、旧演習林事務所周辺の樹木については記録がいくらか残っている。例えば、旧演習林本部門扉脇のソメイヨシノは、サクラが枯死した跡地には再びサクラは育たないという言い伝えの中で、吉川勝好旧本部試験地主任が昭和45（1970）年に接ぎ木苗を植栽したもので、毎年みごとに開花している。反対側のキタヤマスギは昭和7（1932）年と昭和42（1967）年、ヒヨクヒバは昭和13（1938）年、ハクショウは昭和23（1948）年に植栽されたものである。西側のスィフヨウは昭和63（1988）年に演習林初代教授上田弘一郎宅のものを株分けしたもので、ヤエベニシダレは京都円山公園のものの子孫で、昭和28（1953）年に植栽された。東側のヨーロッパナラは、昭和11年のベルリンオリンピックにおいて三段跳びで優勝した本学の田島直人選手がドイツから持ち帰り農学部グラウンド北端に植栽されていたもの^{4, 29, 30}の根萌芽から養成した苗を昭和41（1966）年に植栽したもので、アメリカヤマボウシ（ヤエアルパプレナ）は昭和53年度林学科4回生の卒業記念樹、シダレカツラは平成元（1989）年に伊佐義朗旧演習林教官寄贈のもの、胸高直径が1 mを越え、樹高がほぼ25mに達するセコイアは、林学科造林学講座初代教授沼田大学が北米より送付した種子に由来するもので、大正14（1925）年に植栽されたなど、多くの樹木が京都大学北部構内の昭和史を物語っている。一方、近年、植栽空間の不足と修景的な目的で生産されたサクラ、ツツジ、ツバキなどの品種の苗木を見本園内各所に植栽したために一部混乱を招き、平成2年と4年の2回の調査の間に調査木11本が枯れ、貴重な樹種の減少も著しい。本目録ではほぼ500種の樹木種を掲載した。園芸品種、海外からの導入樹種を中心に同定が終わっていないものも数多く、早急に構成種を確認するとともに、植栽場所が不適当な樹木を整理し、入手し易い国内産の樹種を中心に補充するなど、今後さらに本見本園の樹木の生育環境を整備していく必要がある。

本報告は筆者がカナダ国のUniversity of British Columbiaに滞在中に執筆したものである。研究環境を整備し、快くこの機会を与えて下さった森林科学部教授Dr. James. P. Kimmins, 謝国民, そしてカナダ国有林のDr. Graham Pageの各氏、さらに貴重な参考文献を閲覧させていただいた同大学Asian Centreの権並恒治氏をはじめとする皆様、本見本園の調査に協力していただいた多くの演習林教職員各位に対し、ここに記し感謝の意を表す。


引 用 文 献

- 1) 京都大学農学部附属演習林（1928）演習林概要。京都大学農学部附属演習林。37 - 45.
- 2) 伊佐義朗・長谷川勝好（1951）京都大学演習林本部試験地・上賀茂試験地植物誌。京大演集報 1. 1 - 19.
- 3) 真鍋逸平（1990）本部試験地の樹木目録。京大演集報 20. 68 - 87.
- 4) 上原敬二（1961）樹木大図説Ⅰ。pp. 1300. 有明書房。東京.
- 5) 上原敬二（1961）樹木大図説Ⅱ。pp. 1203. 有明書房。東京.
- 6) 上原敬二（1961）樹木大図説Ⅲ。pp. 1276. 有明書房。東京.
- 7) 北村四郎・村田 源（1971）原色日本植物図鑑（木本編Ⅰ）。pp. 401. 保育社。大阪.


- 8) 北村四郎・村田 源 (1979)原色日本植物図鑑 (木本編Ⅱ). pp. 545. 保育社. 大阪.
- 9) 塚本洋太郎 (1988)原色茶花大事典. pp. 869. 淡交社. 京都.
- 10) Rehder.A.(1974)Manual of cultivated trees and shrubs.pp.996.Macmillan Publishing Co.,Inc..New York.
- 11) 中国科学院植物研究所 (1972)中国高等植物図鑑第一冊. pp. 1157. 科学出版社. 北京.
- 12) 中国科学院植物研究所 (1972)中国高等植物図鑑第二冊. pp. 1312. 科学出版社. 北京.
- 13) 中国科学院北京植物研究所 (1974)中国高等植物図鑑第三冊. pp. 1083. 科学出版社. 北京.
- 14) 中国科学院北京植物研究所 (1975)中国高等植物図鑑第四冊. pp. 932. 科学出版社. 北京.
- 15) 中国科学院北京植物研究所 (1976)中国高等植物図鑑第五冊. pp. 1146. 科学出版社. 北京.
- 16) 中国科学院植物研究所 (1985)中国高等植物図鑑補編第一冊. pp. 806. 科学出版社. 北京.
- 17) 中国科学院植物研究所 (1985)中国高等植物図鑑補編第二冊. pp. 879. 科学出版社. 北京.
- 18) Burns R.M. and B.H.Honkala(1990)Silvics of North America:1.Conifers.Agriculture Handbook 654.pp.675.U.S.Department of Agriculture,Forest Service.Washington,DC.
- 19) Burns R.M. and B.H.Honkala(1990)Silvics of North America:2.Hardwoods.Agriculture Handbook 654.pp.877.U.S.Department of Agriculture,Forest Service.Washington,DC.
- 20) Farrar J.L.(1995)Trees in Canada.pp.502.Fitzhenry & Whiteside Limited and the Canadian Forest Service in cooperation with the Canada Communication Group-Publishing,supply and Services Canada.Ontario.
- 21) Pojar J.and A.Mackinnon(1994)Plants of coastal British Columbia including Washington,Oregon & Alaska.pp.527.Lone Pine Publishing.Vancouver.
- 22) Parish R.,R.Coupe and D.Lloyd(1996)Plants of southern interior British Columbia.pp.463.Lone Pine Publishing.Vancouver.
- 23) Petrides G.A. (1988)A Field Guide to Eastern Trees,Eastern United States and Canada. pp.272.Houghton Mifflin Company.Boston.
- 24) 牧野富太郎 (1961)牧野新日本植物図鑑. pp. 1060. 北隆館. 東京.
- 25) 岡本省吾 (1966)標準原色図鑑全集 8 樹木. pp. 173. 保育社. 大阪.
- 26) 鈴木貞夫 (1978)日本タケ科植物総目録. pp. 384. 学習研究社. 東京.
- 27) 日本林業技術協会 (1964)原色日本林業樹木図鑑. pp. 217. 地球出版. 東京.
- 28) 増淵法之 (1988)日本中国植物名比較対照辞典. pp. 264. 東方書店. 東京.
- 29) 片桐英郎 (1977)オリンピックオーク. 京大広報 145. 4.
- 30) 真鍋逸平・安藤 信・川那辺三郎 (1991)京都大学構内植生調査Ⅰー大径木の樹種構成と管理状況の構内ブロック間の比較ー. 京大演集報 21. 65ー77.




本部試験地樹木位置図




本部試験地樹木位置図



本部試験地樹木位置図



本部試験地樹木位置図



本部試験地樹木位置図