

分布. 北一九, 琉, 台, 朝, 満, 中国, 比, アフガニスタン。

Artemisia keiskeana Miq.—Nakai, Fl. Kor. II, 29 (1911) et Fl. Sylv. Kor. XIV, 100 (1923)—Kitamura, H. P. J. I, 55 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1191 (1959).

イヌヨモギ. 下部草地にまれに生ず。

採集地. 碧松寺, 地藏堂—白武洞, 楸城里, 雲峰。 分布. 北一九, 朝, 満, 中国北部。

Artemisia princeps Pamp.—Kitamura, H. P. J. I, 57 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1196 (1959).

ヨモギ. カズザキヨモギ. 下部原野に生ず。

採集地. 臥雲。 分布. 本一九, 小, 朝。

Artemisia rubripes Nakai in B. M. T. 31: 112 (1917)—Fl. Sylv. Kor. XIV, 101 (1923)—Kitamura, H. P. J. I, 57 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1196 (1959).

ヤブヨモギ. オオホソバヨモギ. ヨモギに似ている。下部草地にまれに生ず。

採集地. 上峰谷。 分布. 九, 朝, 満, 中国, 北部。

Artemisia scoparia Waldst. et Kit.—Nakai, Fl. Kor. II, 32 (1911) et Fl. Sylv. Kor. XIV, 101 (1923)—Kitamura, H. P. J. I, 54 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1190 (1959).

ハマヨモギ. 下部路傍や河原にまれに生ず。

採集地. 悟道峠—馬川, 雲峰。

分布. 本, 朝, 満, 中国, 印度北部, シベリア, ヨーロッパ。

Artemisia stolonifera Kom.—Nakai, Fl. Kor. II, 29 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV, 102 (1923)—Kitamura, H. P. J. I, 56 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1195 (1959).

ヒロハヤマヨモギ. ヒロハノヒトツバヨモギ. 各所に生ず。

採集地. 三峰山, 白武洞, ウンボンモデミ, 八郎峠, 徳頭山, 般若峰, 正嶺峠。

分布. 本州西部, 九, 朝, 満。

備考. 以上の外 *A. debilis* Kitam. ウスバヨモギ (葉は2回羽状中裂で両面とも緑色でうすく頭花は大きな球形で数は少ない) や, ヨモギに似てやや大形の *A. montana* Pamp. ヤマヨモギが知られている。

Aster L. シオン属

1 { ソウ果はやや円柱状, 根出葉は心形, 長柄, 上部のものは次第に小さくなり卵形乃至卵状披針形, 柄は短い……………シラヤマギク

ソウ果は扁平, 葉は上記と異なる……………2

2 { 葉は披針形又は線形で鋸歯なく下面には毛があつて白く且つ腺点がある。花は小さく白色で多数つき冠毛は白い……………ヒメシオン

葉は狭楕円形又は楕円状披針形, ややざらつく, 花は大きく少ない……………チョウセンノコンギク

Aster ageratoides Turcz.—Kitamura, J. J. B. XII, 642 (1936).

チョウセンノコンギク. 各所の原野路傍に生ずる多年草で花は淡紫色だが白花品もある。

採集地. 臥雲, 上峰谷, 三峰山, 三丁里, 智異山登山道, 細石—碧宵嶺, 般若峰, 雲峰, 屏峠, 正嶺峠, 徳頭山。 分布. 朝, 満, 中国。

Aster fastigiatus Fisch.—Nakai, Fl. Kor. II, 10 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV 103 (1923)—Kitamura, H. P. J. I, 82 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1158 (1959).

ヒメシオン. 下部草地にまれに生ず。

採集地. 悟道峠—馬川, 登九峠, 八郎峠, 雲峰。 分布. 本一九, 朝, 満, ダフリア。

Aster scabra Thunb.—Nakai, Fl. Kor. II, 10 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV, 104 (1923)—Kitamura, H. P. J. I, 81 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1157 (1959).

シラヤマギク. 各所の路傍や草地, 疎林地内等に生ず。

採集地. 艾峠一馬巖, 楸城里, 月坪里, 七仙洞, 三峰山, 白武洞, 蓮洞越, 雲峰, 地藏堂, ウンボ
ンモデミ。 分布. 北一九, 朝, 満, 中国。

Atractylodes DC. オケラ属

Atractylodes japonica Koidz.—Kitamura, H. P. J. I, 18 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1203 (1959).

オケラ. 中腹以下の草地や疎林地に生ず。

採集地. 浮雲里, 水落, 碧松寺, 三峰山, 山德里, 正嶺峠, 九竜里一碧松寺, 法華山, 白武洞, 扉
峠, 徳頭山, 八郎峠。 分布. 本一九, 朝, 満。

Bidens L. センダングサ属

- | | | | |
|---|---|---|------------|
| 1 | { | ソウ果はひらたく倒卵状くさび形, 先きにとげがある。葉は通例3~5裂…………… | タウコギ |
| | | ソウ果は線形で先きはせばまる。葉は1~数回の羽状に深裂する…………… | 2 |
| 2 | { | ソウ果には2本のとげがある。葉は2~3回羽状分裂, 裂片は線状…………… | ホソバノセンダングサ |
| | | ソウ果は3~4本のとげがある。葉の裂片はやや卵形又は卵状楕円形…………… | 3 |
| 3 | { | 葉は通常3出, 総苞外片はさじ形で上端はひろがる…………… | コセンダングサ |
| | | 葉は通常2回3出, 総苞外片は披針形で先きは長くとがる…………… | センダングサ |

Bidens biternata Merr. et Sherff—Kitamura, H. P. J. I, 66 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1202 (1959).

センダングサ. 低地路傍にまれに生ず。

採集地. 悟道峠一馬川。

分布. 本一九, 朝, 満, 中国, 印度, マレーシア, オーストラリア, 小アジア, アフリカ。

Bidens parviflora Willd.—Nakai, Fl. Kor. II, 21 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV, 105 (1923)
—Kitamura, H. P. J. I, 65 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1202 (1959).

ホソバノセンダングサ. 低地の路傍に普通である。

採集地. 白武洞, 雲峰。 分布. 本一九, 朝, 満, 中国, 東シベリア。

Bidens pilosa L.—Nakai, Fl. Kor. II, 20 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV, 105 (1923)—Ohwi,
Fl. Jap. 1202 (1959).

コセンダングサ. 低地の路傍にまれに生ず。

採集地. 馬川, 達宮, 悟道峠, 臥雲, 斗地洞。 分布. 九, 朝, 熱帯一般。

Bidens tripartita L.—Nakai, Fl. Kor. II, 20 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV, 105 (1923)—
Kitamura, H. P. J. I, 65 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1201 (1959).

タウコギ. 湿潤な路傍, 草地等に生ず。

採集地. 細石, 雲峰, 達宮, 五峰, 登九峠。

分布. 北一台, 朝, 中国, アジア, ヨーロッパ, 北アフリカ, オーストラリア。

Cacalia L. コウモリソウ属

- | | | |
|---|--|-------------|
| { | 茎は中空, 葉は3角状菱形, 花序は多数分岐する…………… | ヨブスマソウ |
| | 茎は中空でなく堅い。根葉は長柄, 茎葉は2~3枚, 掌状中裂, 裂片には不正の鋭鋸歯がある
…………… | チョウセンタイミンガサ |

Cacalia hastata L. subsp. ***orientalis*** Kitamura, H. P. J. I, 48 (1957).

ヨブスマソウ. 中腹以上の谷間の森林内にまれに生ずる大形の多年草。

採集地. 上峰谷, 馬巖。 分布. 樺, 千一本, 朝, 満, カムチャッカ。

Cacalia pseudo-taimingasa Nakai in B. M. T. 29: 8 (1915)—Fl. Sylv. Kor. XIV, 106 (1923).

チョウセンタイミンガサ. 中腹以上の谷間にまれに生ず。

採集地. カネソ谷奥, 細石, 臥雲谷。 分布. 智異山の特産。

Carduus L. ヒレアザミ属

Carduus crispus L.—Nakai, Fl. Kor. II, 45 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV, 106 (1923)—Kitamura, H. P. J. I, 22 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1203 (1959).

ヒレアザミ. ヤハズアザミ. 低地の路傍にまれに見る2年草。

採集地. 白武洞, 楸城里, 徳洞, 臥雲谷。

分布. 本一九, 東亜, シベリア, コーカサス, ヨーロッパ。

Carpesium L. ヤブタバコ属

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | { | 頭花には柄がない, 多数つく, 下部の葉は広楕円形—長楕円形……………ヤブタバコ | |
| | | 頭花には柄がある。葉は卵形又は卵状長楕円形……………2 | |
| 2 | { | 葉の基部は長く翼のある柄となる。総苞片は皆同長……………3 | |
| | | 葉の基部は短かいくさび形で急に狭くなり柄に翼がない。茎葉は卵形で基部は円形又はやや心形……………ガンクビソウ | |
| 3 | { | 葉の基部は次第に狭くなる。総苞は巾15~18mm. ……………コヤブタバコ | |
| | | 葉の基部は急に細まる。総苞は巾6~12mm. ……………ミヤマヤブタバコ | |

Carpesium abrotanoides L.—Nakai, Fl. Kor. II, 17 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV, 107 (1923)—Kitamura, H. P. J. I, 71 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1140 (1959).

ヤブタバコ. 低地の草地にまれに生ず。

分布. 日本全土, 朝, 中国。

Carpesium cernuum L.—Kitamura, H. P. J. I, 71 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1141 (1959).

コヤブタバコ. 低地の山野にまれに生ず。

採集地. 水落。 分布. 日本全土, アジア, ヨーロッパ。

Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc.—Nakai, Fl. Kor. II, 18 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV, 107 (1923)—Kitamura, H. P. J. I, 72 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1141 (1959).

ガンクビソウ. 中腹以下の路傍や林地にまれに生ず。コヤブタバコよりも頭花は小さく葉は卵形である。

採集地. 三峰山, 臥雲, 正嶺峠。 分布. 本一台, 朝, 満, 中国。

Carpesium triste Maxim.—Nakai, Fl. Kor. II, 18 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV, 107 (1923)—Kitamura, H. P. J. I, 72 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1142 (1959).

ミヤマヤブタバコ. ガンクビヤブタバコ. 谷間の森林内にまれに生ず。

採集地. 上峰谷, 白武洞, カネソ谷奥, ウンボンモデミ, 正嶺峠, 般若峰。

分布. 本一九, 朝, 満。

備考. 以上の外コヤブタバコに似たチョウセンガンクビソウ (*Carpesium glossophylloides* Nakai) が知られている。

Centipeda Lour. トキンソウ属

Centipeda minima A. Br. et Aschers.—Nakai, Fl. Kor. II, 26 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV, 107 (1923)—Kitamura, H. P. J. I, 62 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1181 (1959).

トキンソウ. 畦畔路傍等に生ずる小形の1年草で地面にはりついている。

採集地. 悟道峠—馬川, 雲峰, 達宮, 咸陽, 白武洞。

分布. 北一台, 朝, 中国, 印度, 東シベリア, マレーシア, オーストラリア, 北米 (帰化)。

Cephalonoplos Necker アレチアザミ属

Cephalonoplos segetum Kitamura in A. P. G. III, 8 (1934)—Ohwi, Fl. Jap. 1222 (1959).

アレチアザミ. 低地の路傍にまれに生ずる多年草で根茎がある。アザミに似た頭花をつける。

採集地. 馬川, 義灘里, 咸陽。 分布. 九(対馬), 朝, 満, 中国。

Chrysanthemum L. キク属

- { 頭花は小さく黄色で多数つく, 茎も多数枝わかれする……………キクタニギク
- { 頭花は大きく白色で少ない。茎はあまり枝わかれしない……………イワギク

Chrysanthemum boreale Makino—Kitamura, H. P. J. I. 61 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1187 (1959).

キクタニギク. アワコガネギク. アブラギク. 低地の路傍や草地に生ず。

採集地. 白武洞, 悟道峠。 分布. 本, 九(老岐, 対馬), 朝, 満, 中国(北部)。

Chrysanthemum zawadskii Herbich—Kitamura, H. P. J. I. 61 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1186 (1959).

イワギク. やや乾燥するような草地, 路傍或は岩場に多く生ず。

採集地. 智異登山道, ウンボンモデミ, 楸城里, 月坪里, 般若峰, 三丁里, 臥雲, 馬巖一天王峰, 法華山, 地藏堂, 徳頭山, 八郎峠。 分布. 本一九, 朝, 満, シベリア, 中国(北部)。

Cirsium Adans. アザミ属

- 1 { 葉は皆羽状深裂, 多刺, 花は鮮赤紫色……………カラノアザミ
- 1 { 葉は通例羽状深裂ではなく刺は少ない……………2
- 2 { 葉は卵形, 心形又は卵状楕円形, 花は黄白色……………チョウレイアザミ
- 2 { 葉は披針形, 花は紫色……………チョウセンヤナギアザミ

Cirsium chanroenicum Nakai in B. M. T. 26: 368 (1912)—Fl. Sylv. Kor. XIV. 109 (1923).

チョウレイアザミ. 各所の路傍や草地に生じ葉形は様々で不正の鋭鋸歯縁か或は羽状裂で刺は著しくない。

採集地. 浮雲峠, 細石, 地藏堂, ウンボンモデミ—人參谷, 達宮, 徳頭山, 白武洞, 三峰山, 般若峰, 八郎峠。 分布. 朝鮮。

Cirsium maackii Prim.—Nakai, Fl. Kor. II. 47 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV. 109 (1923).

カラノアザミ. 低地の路傍に生ず。

採集地. 白武洞, 臥雲, 馬巖, 扉峠, 浮雲峠。 分布. 朝, 満, 中国, ウスリー。

Cirsium setidens Nakai in B. M. T. 34: 54 (1920)—Fl. Sylv. Kor. XIV. 100 (1923).

チョウセンヤナギアザミ. 低地の原野にまれに生ず。

採集地. 高基里, 徳頭山。 分布. 朝鮮。

Echinops L. ヒゴタイ属

Echinops setifer Iljin—Kitamura, H. P. J. I. 29 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1233 (1959).

ヒゴタイ. 低地にまれに生ず。

分布. 本一九, 朝。

Eclipta L. タカサブロウ属

Eclipta prostrata L.—Kitamura, H. P. J. I. 51 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1199 (1959).

タカサブロウ. 湿潤な路傍, 溝辺等にまれに生ず。

採集地. 悟道峠—馬川, 登九峠, 法華寺。

分布. 本一九, 台, 朝, 中国, 世界の暖地に広く分布する。

Erigeron L. ムカシヨモギ属

- { 葉は披針形又は倒披針形, 鋸齒縁, 頭花は大きく舌状花は目立つ……………ヒメジョオン
 { 葉は線状披針形, 全縁, 毛縁, 頭花は小さく直径 3mm. 位……………ヒメムカシヨモギ

Erigeron annuus Pers.—Kitamura, H. P. J. I. 78 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1155 (1959).

ヒメジョオン. 路傍, 草地等に生ずる越年草。

採集地. 咸陽。 分布. 北米原産の帰化植物。

Erigeron canadensis L.—Nakai, Fl. Kor. II. 12 (1911)—Kitamura, H. P. J. I. 79 (1957)
 Ohwi, Fl. Jap. 1156 (1959).

ヒメムカシヨモギ. 平地の路傍, 荒地等に生ず。

採集地. 三丁里, 臥雲, 楸城里, 咸陽, 悟道峠。 分布. 北米原産の帰化植物。

Eupatorium L. フジバカマ属

- { 葉は無柄で狭く三行脈が目立ち時に 3 裂するものもある……………サワヒヨドリ
 { 葉は有柄, 先きはとがる。卵状楕円形。羽状脈……………ヒヨドリバナ

Eupatorium chinense L. var. *simplicifolium* Kitamura—H. P. J. I. 88 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1148 (1959).

ヒヨドリバナ. 中腹以下の林地や路傍にまれに生ず。

採集地. 碧松寺—苳嶺, ウンボンモデミ—人參谷, 扉峠。

分布. 北一九, 朝, 満, 中国, 比。

Eupatorium lindleyanum DC.—Nakai, Fl. Kor. II. 5 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV. 112 (1923)—Kitamura, H. P. J. I. 87 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1147 (1959).

サワヒヨドリ. 湿潤な草地や路傍に生ずる多年草。

採集地. 馬川—白武洞, 水落, 高基里, 三峰山, 法華山, 正嶺峠, 八郎峠。

分布. 北一台, 朝, 満, 中国, 比, マレーシア, 印度支那, シャム, 印度。

Gnaphalium L. ハハコグサ属

- 1 { 総苞は黄色, 1~越年草, 茎は下部で枝分れする。葉は両面に白い綿毛がある……………ハハコグサ
 { 総苞は褐色……………2
 2 { 多年草で根葉は線状倒披針形, 花時にもある。茎は直立し分岐しない。花は茎頂に集つてつく……………チチコグサ
 { 1~越年草, 根葉は花時には枯れている。葉は線形, 茎は多数の枝を出す……………ヒメチチコグサ

Gnaphalium affine D. Don—Kitamura, H. P. J. I. 73 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1134 (1959).

ハハコグサ. ホウコグサ. オギョウ. 下部の路傍に生ず。

採集地. 雲峰, 浮雲峠, 義灘里, 咸陽。

分布. 北一台, 朝, 中国, 印度支那, マレーシア, 印度。

Gnaphalium japonicum Thunb.—Nakai, Fl. Kor. II. 14 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV. 112 (1923)—Kitamura, H. P. J. I. 74 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1134 (1959).

チチコグサ. 下部路傍にまれに生ず。

採集地. 浮雲峠, 義灘里, 三峰山下部。 分布. 北一台, 朝, 中国。

Gnaphalium uliginosum L.—Nakai, Fl. Kor. II. 14 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV. 112 (1923)—Kitamura, H. P. J. I. 74 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1134 (1959).

ヒメチチコグサ. エゾノチチコグサ. 下部路傍に生ず。

採集地. 義灘里, 江清里, 咸陽。

分布. 北, 本, 朝, 満, 中国(北部), シベリア, カムチャッカ, ヨーロッパ, 北米(帰化)。

Gymnaster Kitam. ミヤマヨメナ属

Gymnaster koraiensis Kitam., Comp. Jap. I. 303 (1937).

チョウセンヨメナ. 下部路傍に生ず。葉は狭長, 茎の下部のものは 10cm. に及ぶ。柄に翼があり, 縁に疎鋸歯がある。

採集地. 馬川—白武洞, 義灘里。 分布. 朝。

Hemistepta Bunge キツネアザミ属

Hemistepta lyrata Bunge—Kitamura, H. P. J. I. 23 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1222 (1959).

キツネアザミ. 下部の耕地や路傍に生ず。

採集地. 雲峰, 楸城里, 臥雲, 浮雲峠, 咸陽。

分布. 本—台, 朝, 満, 中国, 印度, オーストラリア。

Heteropappus Less. ハマベノギク属

Heteropappus hispidus Less.—Kitamura, H. P. J. I. 84 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1152 (1959).

ヤマチノギク. アレノノギク. 各所の原野, 路傍に生ずる越年草で花は通常淡紫色だがまれには濃紫色や白色のものもある。

採集地. 楸城里, 智異登山道, コレボン, 細石, 三峰山, 般若峰, 天王峰, 花水里, 臥雲, 白武洞, 徳頭山. 三丁里, 孔安里, 義灘里。

分布. 本—九, 台, 朝, 満, 中国。

Hieracium L. ヤナギタンポポ属 (ミヤマコウゾリナ属)

Hieracium umbellatum L.—Nakai, Fl. Kor. II. 58 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV. 113 (1923)—Kitamura, H. P. J. I. 11 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1241 (1959).

ヤナギタンポポ. 中腹以下の草地に生ず。

採集地. 三峰山, 月坪里, 八郎峠, 法華山, 馬川—三丁里, 九竜里—碧松寺。

分布. 樺—九. 朝, 北半球に広く分布する。

Hololeion Kitamura スイラン属

Hololeion maximowiczii Kitamura—H. P. J. I. 10 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1242 (1959).

チョウセンスイラン. イトスイラン. マンシュウスイラン. 下部の湿地に生じ葉は線状披針形, 花は黄色, 冠毛は灰褐色である。

採集地. 登九峠, 八郎峠, 高基里。 分布. 九, 朝, 満, 中国(中部), アムール。

Inula L. オグルマ属

Inula britannica L. subsp. *linariaefolia* Kitamura—H. P. J. I. 70 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. (var.) 1139 (1959).

ホソバオグルマ. 原野に生ずる多年草で茎は直立し高さ 30~80cm. となる。花は黄色。

採集地. 浮雲里, 馬川—三丁里, 九竜里—碧松寺, 三丁里—霊源寺, 馬川—白武洞, 雲峰, 伴仙洞, 扉峠。 分布. 本, 九, 朝, 満, 中国。

Ixeris Cass. ニガナ属

- | | | | |
|---|---|--|------|
| 1 | { | 茎は直立して葉がある。通例匍枝はない…………… | 2 |
| | | 茎は地中又は地面をはつて葉をつける。花茎にはほとんど葉がない…………… | デシバリ |
| 2 | { | 越年草, 茎葉の基部はやじり形でとがる。花は黄色, 終ればうつむく…………… | ノニガナ |
| | | 多年草。花が終つてもうつむかない。葉の基部はやじり形とならない…………… | 3 |

- 根出葉は長柄がありさじ形で茎葉の基部は茎を抱く、花は通例黄色、ソウ果のくちばしはソウ果の $\frac{1}{2}$ ~ $\frac{1}{3}$ ……………ニガナ
- 3 { 根出葉は細長く倒披針形で歯牙又は切れこみがある。花は通例白色で淡紫色を帯び、ソウ果のくちばしはソウ果と同長か又はそれよりも長い……………タカサゴソウ

Ixeris chinensis Nakai subsp. **strigosa** Kitamura in B. M. T. 49: 283 (1935)——H. P. J. I. 5 (1957)——Ohwi, Fl. Jap. (var.) 1247 (1959).

タカサゴソウ。下部路傍にまれに生ず。

採集地。馬川、セコル山、臥雲。 分布。本一九、朝。

subsp. **versicolor** Kitamura in B. M. T. 49: 283 (1935).

マンシュウタカサゴソウ。各所の原野や路傍に生じ花は黄色又は淡紅紫色。

採集地。セコル山、浮雲峠、扉峠、三丁里、般若峰。

分布。朝、満、中国(北部)、シベリア。

Ixeris dentata Nakai——Fl. Sylv. Kor. XIV. 114 (1923),——Kitamura, H. P. J. I. 6 (1957)——Ohwi, Fl. Jap. 1246 (1959).

ニガナ。各所の原野や路傍に生ず。

採集地。碧松寺、三峰山、細石、白武洞、地藏堂、セコル山。

分布。千一琉、朝、中国(中部)。

var. **albiflora** Nakai, Fl. Sylv. Kor. XIV. 114 (1923)——Kitamura, H. P. J. I. 7 (1957).

シロバナニガナ。低地の陽地に生ず。

採集地。臥雲、浮雲峠。 分布。同上。

Ixeris japonica Nakai in B. M. T. 40: 574 (1926).——Ohwi, Fl. Jap. 1245 (1959).

チシバリ。オオヂシバリ。耕地、路傍等に生ず。

採集地。雲峰、馬川。 分布。北一琉、朝。

Ixeris polycephala Cass.——Kitamura, H. P. J. I. 5 (1957)——Ohwi, Fl. Jap. 1246 (1959).

ノニガナ。路傍、畦畔等に生ず。

採集地。江清里。 分布。本一台、朝、中国、印度、コーカサス。

備考。以上の外イワニガナ (*Ixeris stolonifera* A. Gray) が知られている。

Kalimeris Cass. ヨメナ属

Kalimeris incisa DC.——Kitamura, H. P. J. I. 85 (1957)——Ohwi, Fl. Jap. 1151 (1959).

オオユウガギク。チョウセンヨメナ。中腹以下の草地に生ず。葉は狭長楕円形、倒披針形又は披針形、長さ通例6cm.以下、やや羽状裂様の鋸歯がある。

採集地。浮雲峠、三峰山、雲峰、悟道峠。

分布。本一九、朝、満、中国(北部)、シベリア。

Lactuca L. アキノノゲシ属

- 1 { 葉は長大、羽状裂するか又は全縁、基部は茎を抱かない。花は黄色……………アキノノゲシ
- 1 { 葉は不正歯牙縁又は2~3対の羽状に中裂する。柄に翼がある……………2
- 2 { 葉身はやや3角形、葉柄の基部は耳状になつて茎を抱く……………ミヤマアキノノゲシ
- 2 { 葉身は卵状楕円形、2~3対の羽状に中裂するか又は裂けない……………ヤマニガナ

Lactuca indica L.——Kitamura, H. P. J. I. 8 (1957).

アキノノゲシ。下部の路傍や耕地に生ず。

採集地。悟道一馬川、雲峰。

分布。本一台、朝、満、中国、印度支那、比、ジャバ、スマトラ。

備考. 葉が裂けないものをホソバアキノノゲシという。

採集地. 馬川—白武洞, 臥雲。 分布. 同上。

Lactuca raddeana Maxim. var. **raddeana**—Kitamura, H. P. J. I. 8 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1249 (1959).

チョウセンヤマニガナ. 下部の路傍や草地にまれに生ず。

採集地. 水落, 霊源寺, 三丁里, 正嶺峠。 分布. 九, 朝, 東亜温帯。

Lactuca triangulata Maxim.—Nakai, Fl. Kor. II. 55 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV. 114 (1923)—Kitamura, H. P. J. I. 8 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1249 (1959).

ミヤマアキノノゲシ. 山地にまれに見る2年草で花は黄色, 冠毛はやや白色, ソウ果は黒色で両面に凸起する肋がある。

採集地. 上峰谷, 智異登山道。

分布. 北, 本, 朝, 満, ウスリー, アムール。

Leibnitzia Cass. センボンヤリ属

Leibnitzia anardria Nakai, Fl. Kor. II. 50 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV. 112 (1923)—Kitamura, H. P. J. I. 21 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1142 (1959).

センボンヤリ. 中腹以下の草地や路傍に生ずる多年草。

採集地. 水落, 五峰, 法華山, 白武洞, 雲峰, 三丁里。

分布. 樺一九, 朝, 満, 中国, シベリア。

Leontopodium R. Br. ウスユキソウ属

Leontopodium leontopodioides Breau.—Kitamura, Comp. Jap. 1: 227 (1937).

ノウスユキソウ. 下部草地にまれに生ずる多年草で白色綿毛を密布する。

採集地. 高基里, 三峰山下部, 徳頭山, 法華山, 浮雲峠, セコル山。

分布. 朝, 満, 中国, シベリア。

Ligularia Cass. メタカラコウ属

Ligularia fischerii Turcz.—Kitamura, H. P. J. I. 41 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1168 (1959).

オタカラコウ. 谷間又は湿潤地にまれに生ずる大形多年草で高さ1m.内外に達し黄花を総状につづる。

採集地. 上峰谷, 地藏堂, 正嶺峠。

分布. 本一九, 朝, 満, 中国, 東シベリア。

Matricaria L. シカギク属

Matricaria maritima L. subsp. **limosa** Kitamura, Comp. Jap. 2: 335 (1940).

チョウセンカミツレ. 中腹以下の原野, 路傍, 河岸等にまれに生ずる1年草。茎は直立, 高さ20~40cm. 分岐する。葉は2~3回羽状分裂, 裂片は線形。

採集地. ウンボンモデミ, 咸陽。 分布. 朝, 満, アムール。

Petasites Hill. フキ属

Petasites japonicus Maxim.—Nakai, Fl. Kor. II. 27 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV. 116 (1923)—Kitamura, H. P. J. I. 68 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 1165 (1959).

フキ. 下部にまれに生ず。

採集地. 浮雲里。 分布. 本一琉, 朝, 中国。

Picris L. コウゾリナ属

Picris hieracioides L. subsp. **japonica** Krylv. var. **koreana** Kitamura in A. P. G. VIII. 125

(1939)——Comp. Jap. 4: 93 (1955).

チョウセンコウゾリナ. 下部草地にまれに生ず。茎や葉に剛毛を生じ葉は無柄で披針形、花は黄色、総苞は長さ約9mm. 冠毛は淡褐灰色、長さ約7mm.

採集地. 三峰山下部, 三丁里, 登九峠, 八郎峠。

分布. 朝, 満, 蒙。

Prenanthes L. フクオウソウ属

Prenanthes ochroleuca Hemsl.——Kitamura, Comp. Jap. 5: 153 (1956).

コウライオオニガナ. 中腹以下の湿潤な草地にまれに生ずる高さ50~80cm. の直立する草本で茎の下部や根出葉には長柄がある。花は黄色。

採集地. ウンボンモデミ, 正嶺峠。

分布. 朝, 満。

Saussurea DC. トウヒレン属

- | | | | |
|---|---|--|-------------|
| 1 | { | 根生葉は長柄, 卵状心形でさけない…………… | 2 |
| | | 根生葉は羽状深裂又は全裂, さけない場合は狭披針形で両端とがる…………… | 4 |
| 2 | { | 葉はやや長三角形, 下面白綿毛を密布する…………… | ホクチアザミ |
| | | 葉は卵状心形又は卵状披針形, 下面は淡緑色で無毛又は脈上に褐色微毛を生ず…………… | 3 |
| 3 | { | 頭花はやや大, 総苞の先端は僅か尖る…………… | マンシュウシラネアザミ |
| | | 頭花はやや小, 総苞の先端は長く尾状に伸びる…………… | ヒメシラネアザミ |
| 4 | { | 葉は茎の基部のものの少数が羽状裂するのみで多くは長楕円形又は長楕円状披針形, 両端尖る, 茎面の稜は顕著で多くは紫色を呈す。頭花はやや半球形, 直径約8~10mm. 花は紫色…………… | ヒメヒゴタイ |
| | | 茎の中部以下又はほとんど全部の葉が羽状全裂又は深裂す。頭花はやや筒状…………… | 5 |
| 5 | { | 葉は通例羽状裂, 裂片は鋸歯又は2~3の欠刻を有す。頭花は直径5mm. 内外…………… | キクバヒゴタイ |
| | | 茎の中部以下の葉は羽状裂, 上部のものは倒披針形又は狭披針形, 頭花は直径約5mm. 内外, 総苞は帯紫色…………… | ミヤコアザミ |

Saussurea gracilis Maxim.——Kitamura, A. P. G. IV, 7 (1935)——H. P. J. I, 25 (1957)——Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 1226 (1959).

ホクチアザミ. 多くは中腹以上の原野に生ず。葉の下面に白毛を密布する。

採集地. 馬巖一天王峰, 智異登山道, ウンボンモデミ, 般若峰。

分布. 本, 四, 九, 朝。

Saussurea grandifolia Maxim.——Kitamura, Comp. Jap. 1: 186 (1937).

マンシュウシラネアザミ. 全株無毛, 下葉は長柄, 心状卵形, 粗歯牙縁, 上葉はほとんど無柄, 卵状披針形, 総苞は凸端, 瓦列, 冠毛は淡褐灰色, 羽状, 長さ1cm.

採集地. 三峰山, 智異登山道, 上峰谷。

分布. 朝, 満, アムール。

Saussurea macrolepis Kitam.——A. P. G. II, 18 (1933)——Comp. Jap. 1: 195 (1937).

ヒメシラネアザミ. 中腹以上の林地や原野に普通生ずるもので前種に比し総苞は尾状端で反捲する。葉柄には翼がある。

採集地. 天王峰, 上峰谷, 般若峰, ウンボンモデミ, 細石, 地藏堂。

分布. 朝。

Saussurea maximowiczii Herder——Nakai, Fl. Kor. II, 43 (1911)——Fl. Sylv. Kor. XIV, 119 (1923)——Kitamura, Comp. Jap. 1: 198 (1937)——H. P. J. I, 25 (1957)——Ohwi, Fl. Jap. 3ed. 1231 (1959).

ミヤコアザミ. 下部原野にまれに生ず。

採集地. 法華寺下。

分布. 本, 九, 朝, 満, アムール。

Saussurea odontolepis Schultz——Kitamura, A. P. G. IV, 5 (1935)——Comp. Jap. 1: 150 (19

37).

キクバヒゴタイ. 下部草地にまれに生ず。葉は羽状深裂，頭花は枝端にやや群生する。総苞は凸端。
採集地. 三丁里—靈源寺，三峰山，八郎峠，達宮，法華山，五峰，徳頭山。 分布. 朝。

Saussurea pulchella Fisch.—Kitamura, H. P. J. I, 25 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 1224 (1959).

ヒメヒゴタイ. 中腹以下の草地に生ず。

採集地. 三峰山，浮雲里，三丁里，白武洞，月坪里，法華山，扉峠，八郎峠。

分布. 樺一九，朝，満，東シベリア。

Scorzonera L. フタナミソウ属

Scorzonera albicaulis Bunge—Nakai, Fl. Kor. II, 52 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV, 121 (1923)—Kitamura, Comp. Jap. 4: 86 (1955).

ヤナギババラモンジン. 下部草地にまれに生ず，茎には明瞭な条線がある。葉は長い線状で側脈は主脈にやや平行し下面に顕著，総苞は披針形。冠毛は灰白色，羽状，種子と同長かやや長い。

採集地. 知安峠，三峰山，臥雲，達宮，楸城里。

分布. 対馬，朝，満，蒙，シベリア，ダフリア。

Senecio L. キオン属

1 { 葉は羽状に細裂する。茎及び葉はほとんど無毛，花数は多い……………コウリンギク
葉は鈍鋸歯縁，倒披針形又は長橢円形，茎とともに白色綿毛を生ず。花数は少ない……………2

2 { ソウ果は有毛，長さ約2.5mm. 乾いた草地に生える。全体に白綿毛が多い……………オグルマ
ソウ果は無毛，長さ約4mm. 湿地性，全体白綿毛が少ない……………サワオグルマ

Senecio argunensis Turcz.—Nakai, Fl. Kor. II, 37 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV, 121 (1923)—Kitamura, H. P. J. I, 46 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 1172 (1959).

コウリンギク. 下部草地に生ずる。葉は1～2回羽状深裂又は全裂し花は黄色。

採集地. 浮雲峠，三峰山，八郎峠，登九峠。

分布. 九，朝，満，中国，ダフリア。

Senecio integrifolius Clairv. subsp. **fauriei** Kitamura, Comp. Jap. 3: 240 (1942)—H. P. J. I, 45 (1957).

オカオグルマ. 草地に生ず。

採集地. ウンボンモデミ。白武洞。

分布. 本一九，朝，満，中国，台。

Senecio pierotii Miq.—Kitamura, H. P. J. I, 45 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 1173 (1959).

サワオグルマ. 中腹以下の湿性草地に生ず。

採集地. 浮雲峠。

分布. 本一琉，朝。

Serratula L. タムラソウ属

Serratula coronata L. subsp. **insularis** Kitamura, H. P. J. I, 22 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. (var.) 3 ed. 1132 (1959).

タムラソウ. 下部原野にまれに生ず。

採集地. 白武洞，三峰山，八郎峠，法華山。

分布. 本一九，朝。

Siegesbeckia L. メナモミ属

{ 茎や葉には長い毛を密生する。花柄には通常有柄の腺がある。ソウ果の長さ2.5～3.5mm. ……メナモミ
……………メナモミ
{ 茎や葉には毛が少ない。花柄に腺毛がない。ソウ果の長さ2mm. 位……………コメナモミ

Siegesbeckia glabrescens Makino—Kitamura, H. P. J. I, 67 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed.

1198 (1959).

コメナモミ. 下部の林地や路傍にまれに生ず。

採集地. 臥雲, 三丁里, 雲峰, 登九峠。

分布. 本一九, 朝。

Siegesbeckia pubescens Makino—Nakai, Fl. Sylv. Kor. XIV, 122 (1923)—Kitamura, H. P. J. I, 66 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 1198 (1959).

メナモミ. 下部路傍にまれに生ず。

採集地. 五峰, 雲峰, 高基里, 登九峠。

分布. 本一琉, 朝。

Solidago L. アキノキリンソウ属

Solidago virgaurea L. subsp. **asiatica** Kitamura, H. P. J. I, 86 (1957).

アキノキリンソウ. 中腹以下の原野, 林地, 路傍等に生ず。

採集地. 上峰谷, 三丁里, 水落, 八郎峠, 法華山, 徳頭山, 臥雲。

分布. 北一九, 朝。

Sonchus L. ノゲン属

Sonchus brachyotus DC.—Kitamura, H. P. J. I, 3 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 1249 (1959).

ハチジョウナ. 下部路傍に生ず。

採集地. 山内。

分布. 樺一九, 朝, 中国, ダフリア, アルタイ。

Syneilesis Maxim. ヤブレガサ属

Syneilesis palmata Maxim.—Kitamura, H. P. J. I, 49 (1959)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 1179 (1959).

ヤブレガサ. 中腹以下の森林内にまれに生ず。

採集地. 白武洞, 三峰山, 三丁里, 楸城里, 扉峠, 臥雲, 碧松寺。

分布. 本一九, 朝。

Synurus Iljin ヤマボクチ属

Synurus palmatopinnatifidus Kitam. var. **indivisus** Kitamura, H. P. J. I, 23 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 1233 (1959).

ヤマボクチ. 全山各所に生ず。

採集地. ウンボンモデミ—人參谷, カネソ谷上部, 智異登山道, 水落, 艾嶺—馬巖, 白武洞, ウンボンモデミ, 扉峠, 地藏堂, 般若峰, 臥雲, 徳頭山。

分布. 本一九, 朝。

Taraxacum Wiggers タンポポ属

Taraxacum coreanum Nakai, Fl. Sylv. Kor. XIV, 123 (1923)—Kitamura, Comp. Jap. 6: 39 (1957).

ケイリンシロタンポポ. コウライタンポポ. 下部路傍に生ず。

採集地. 臥雲, 地藏堂, 咸陽, 浮雲峠, 達宮, 白武洞, 雲峰, 徳田, 三丁里。

分布. 朝, 満。

Xanthium L. オナモミ属

Xanthium strumarium L.—Nakai, Fl. Kor. II, 18 (1911)—Fl. Sylv. Kor. XIV, 123 (1923)—Kitamura, H. P. J. I, 89 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 1146 (1959).

オナモミ. 下部路傍に生ず。

採集地. 悟道峠。

分布. 日本全土, アジア, ヨーロッパ, 北米(帰化)。

Youngia Cass オニタビラコ属

- 1 { 全体有毛, 花期に根葉がある。茎は直立, 僅かに枝わかれする……………オニタビラコ
 全体無毛 (*Paraixeris*), 花期には根葉がない。茎は多岐, 果実はやや棍棒状……………2
- 2 { 小花は5~6, 葉は羽状全裂する……………クサノオオバノギク
 小花は13~19, 葉は羽状に分裂しない。鈍鋸歯又は歯牙縁……………3
- 3 { 葉は歯牙状欠刻を有し, 基部は広く茎を抱く……………イヌヤクシソウ
 葉は不明鈍鋸歯縁, 基部は多少せばまる……………ヤクシソウ

Youngia chelidoniifolia Kitamura, H. P. J. I, 4 (1957).

クサノオオバノギク. 各所の林地に多い。

採集地. 浮雲里, 白武洞, 三峰山, 碧松寺—艾嶺, 徳頭山。

分布. 本, 四, 朝, 満。

Youngia denticulata Kitamura, H. P. J. I, 4 (1957).

ヤクシソウ. 下部路傍に生ず。

採集地. 悟道—馬川, 三丁里, 水落, 白武洞, 臥雲雲, 雲峰。

分布. 日本全土, 朝, 中国, 印度支那。

Youngia japonica DC.—Kitamura, H. P. J. I, 3 (1957)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 1250 (1959).

オニタビラコ. 下部路傍や耕地に生ず。

採集地. 浮雲峠, 咸陽。

分布. 日本全土, 朝, 中国, 印度, ヒマラヤ, ミクロネシア, オーストラリア。

Youngia sonchifolia Maxim.—Kitamura, Comp. Jap. 4: 123 (1955).

イヌヤクシソウ. 下部路傍に生ず。ヤクシソウに比し花は小さく葉は3角状で基部は広くなつて茎を抱く。

採集地. 白武洞, 馬川, 楸城里, 臥雲, 浮雲峠, 雲峰, 孔安里, ウンボンモデミ。

分布. 朝, 満, 中国。

MONOCOTYLEDONEAE 単子葉植物

SPARGANIACEAE ミクリ科

Sparganium L. ミクリ属

Sparganium japonicum Rothert.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 52 (1959).

ナガエミクリ. コミクリ. 下部溝辺に生ずる水草で茎高30~50cm.となり葉は剣状である。

採集地. 雲峰。

分布. 本, 九, 朝。

POTAMOGETONACEAE ヒルミムロ科

Potamogeton L. ヒルムシロ属

{ 浮水葉は大形, 長さ5~12cm. 巾2.5~5cm. 沈水葉は葉身がなく子房は4個ある…オヒルムシロ
 { 浮水葉は小形, 沈水葉は線形, 根茎も茎も線形……………ミズヒキモ

Potamogeton natans L.—Nakai, Fl. Kor. II, 277 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 54 (1959)

—*P. morongii* A. Benn.

オヒルムシロ. オオヒルムシロ. メヒルムシロ. 池中に生ず。

採集地. 山徳里, 三丁里, 細石。

分布. 北, 本, 四, 九, 北半球の温帯一般。

Potamogeton octandrus Poir. var. *miduhikimo* Hara—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 55 (1959).

ミズヒキモ. 水中に生ず。

採集地. 馬川。

分布. 本一九, 朝。

NAJADACEAE イバラモ科

Najas L. イバラモ属

Najas japonica Nakai in J. J. B. 13, 853 (1937)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 59 (1959).

イトトリゲモ. 溝や沼の中に生ずる水草で葉は線形である。

採集地. 馬川。

分布. 本一九, 朝。

ALISMATACEAE オモダカ科

Sagittaria L. オモダカ属

{ 雌花は1花序に1個, 柄はない。葉は線形又は線状倒披針形, ソウ果は背面に鶏冠状の突起が少しある。全体小形……………ウリカワ

{ 雌花は数個, 柄がある。ソウ果は全縁, 葉は箭形, 頂片及び脚片は線状披針形…ホソバオモダカ

Sagittaria pygmaea Miq.—Nakai, Fl. Kor. II, 274 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 63 (1959).

ウリカワ. 水田に生ず。

採集地. 三丁里, 徳田。

分布. 本一九, 台, 朝, 中国。

Sagittaria trifolia L. f. *longiloba* Makino in J. J. B. I, 11, 37 (1918)—S. t. var. *longiloba* Turcz.—Nakai, Fl. Kor. II, 274 (1959).

ホソバオモダカ. 池溝や水田に生ず。オモダカの細葉品である。

採集地. 浮雲里, 江清里。

分布. 本, 台, 朝。

HYDROCHARITACEAE トチカガミ科

Hydrilla Richard クロモ属

Hydrilla verticillata Casp.—Nakai, Fl. Kor. II, 216 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 67 (1959).

クロモ. 1年生水草, 葉は線形で4~8片を輪生する。

採集地. 馬川。

分布. 北一九, 朝, ヨーロッパ, マダカスカル, アジア熱帯, マレーシア, オーストラリア。

Ottelia Pers. ミズオオバコ属

Ottelia japonica Miq.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 67 (1959).

ミズオオバコ. 水田に見られる1年生水草で葉は卵形又は披針形, 心脚又は楔脚。

採集地. 雲峰。

分布. 本一九, 朝。

BAMBUSACEAE タケ科

Pseudosasa Makino ヤダケ属

Pseudosasa japonica Makino in J. J. B. II-4, 15 (1920)—Nakai, Fl. Sylv. Kor. XX, 17 (1933).

ヤダケ. 下部でまれに見る。

採集地. 義灘里, 水落。

分布. 本一九, 朝。

Sasamorpha Nakai スズ属

Sasamorpha chiisanensis Nakai in B. M. T. 46: 37 (1932)—Fl. Sylv. Kor. XX, 28 (1933).

コウライスズ. 中腹以下に普通見られ高さ1~2m.となる。

採集地. 臥雲, 白武洞, セコル山, 徳田, 徳洞, 浮雲里, 般若峰。

分布. 朝。

GRAMINEAE イネ科

Achnatherum P. Beauv. ハネガヤ属

***Achnatherum pekinense* Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 101 (1959).**—*Stipa pekinensis* Hance

ハネガヤ. 各所の疎林地に生ず。

採集地. 三峰山, 地藏堂—細石, ウンボンモデミ—人參谷, 般若峰, 達宮, 高基里, 八郎峠。

分布. 樺, 本, 朝, 中国北部, 東シベリア。

Agropyron Gaertn. カモジグサ属

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | { | 護穎は内穎と同長, 葉鞘の外縁は通常多少の縁毛がある……………カモジグサ | |
| | | 護穎は内穎よりも明らかに長い……………2 | |
| 2 | { | 花穂は彎曲する。護穎は狭長橢円形, 長剛毛を散生する……………アオカモジグサ | |
| | | 花穂は直立。護穎は無毛又は縁辺に近く剛毛がある……………タチカモジ | |

***Agropyron ciliare* Franch. var. *minus* Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 105 (1959).**

アオカモジグサ. 下部路傍に生ずる多年草。

採集地. 九竜里—碧松寺, 地藏堂—白武洞, 徳洞, 浮雲峠, 雲峰, 咸陽。

分布. 北—九, 朝, 満, 中国。

var. *pilosum* Honda—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 105 (1959).

タチカモジ. 下部路傍に生ず。

採集地. 九竜里—碧松寺, 三丁里, 地藏堂。

分布. 本—九, 朝, 満, 中国, ウスリー。

***Agropyron tsukushiense* Ohwi var. *transiens* Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 106 (1959).**

カモジグサ. 下部路傍に生ず。

採集地. 地藏堂—白武洞, 徳洞, 馬川, 雲峰, 三丁里, 咸陽。

分布. 北—琉, 朝, 満, 中国。

Agrostis L. コスカグサ属

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | { | 茎の基部は膝曲して節から根を出し又芽を出す。花穂の枝は纖細……………マンセンヌカボ | |
| | | 茎の基部は殆んど膝曲しない, 多少膝曲しても根や芽を出さない……………2 | |
| 2 | { | 内穎は長さ護穎の $\frac{1}{2}$ 以上。花序の枝は花時開出し花後直立する……………コスカグサ | |
| | | 内穎は長さ護穎の $\frac{1}{2}$ 以下。護穎は苞穎より明らかに短い……………3 | |
| 3 | { | 芒は明らかに捩れて曲る。護穎の側脈はほとんど突出しない……………ミヤマヌカボ | |
| | | 芒は無い。花序の枝は絲状……………ヤマヌカボ | |

***Agrostis clavata* Trin.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 88 (1959).**

ヤマヌカボ. 各所の草地に良く見られる多年草で変化に富み高さ30~70cm.となる。

採集地. 臥雲, 般若峰, 細石。

分布. 北—九, 東欧からシベリア, カムチャッカに及ぶ。

***Agrostis divaricatissima* Mez.—Ohwi, A. P. G. 6: 15 (1937)—B. M. T. 55: 352 (1941).**

マンセンヌカボ. 下部路傍にまれに生ず。

採集地. 馬川, 咸陽。

分布. 朝, 満。

***Agrostis flaccida* Hack.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 87 (1957).**

ミヤマヌカボ. 上部の草地にまれに生ず。

採集地. 天王峰。

分布. 北—九, 朝, 千。

Agrostis palustris Huds.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 86 (1959).

コヌカグサ. 下部の路傍や草地に生ず。

採集地. 雲峰。 分布. 北一九, 朝, 北半球の北地一般。

Alopecurus L. スズメノテッポウ属

Alopecurus aequalis Sobol.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 84 (1959).

スズメノテッポウ. 下部路傍, 田畑等に生ず。

採集地. 浮雲峠, 咸陽。 分布. 北一九, 朝, 満, 中国, 東シベリア。

Andropogon L. ウシクサ属

Andropogon brevifolius Swartz—Nakai, Fl. Kor. II. 343 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 160 (1959).

ウシクサ. 下部路傍にまれに生ずる1年草。

採集地. 八郎峠, 法華寺。 分布. 本一九, 朝, 世界の熱帯—暖帯。

Arthraxon P. Beauv. コブナグサ属

Arthraxon hispidus Makino var. **hispidus**—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 159 (1959).

コブナグサ. 各所の路傍に生ずる変異の多い草本で芒の長いもの, 短いもの, 無いもの又は穂の色が紫色のもの, 緑色のもの等がある。

採集地. 臥雲, 浮雲峠, 達宮, 雲峰, 碧松嶺, 楸城里。 分布. 北一九, 朝。

Arundinella Raddi. トダンバ属

Arundinella hirta C. Tanaka—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 140 (1959).

トダンバ. 各所の草地, 路傍に生ず。

採集地. 細石—碧宵嶺, 白武洞, 悟道峠—馬川, 三峰山, 馬川—三丁里, 臥雲, 八郎峠, 雲峰, 法華山。 分布. 北一九, 朝, 満, 中国, ウスリー。

備考. 変化に富む種で標準品は毛が多く var. **hirta** (ケトダンバ) ともいわれ, 毛の少ないものは var. **ciliata** Koidz. (ウスケトダンバ) といわれている。

Bothriochloa O. Kuntze モンツキガヤ属

主軸は伸長し, 総よりも著しく長く, 花序は円錐状, 葉鞘, 鞘口, 桿の節部等には特に白毛多く, 穎は暗紫色, 芒は長い……………ヒメアブラススキ
主軸は下方の総よりも短かく房状花序となる, 上部の部分は無毛又はやや無毛, 茎は強靱, 膝曲, 総苞毛は白色……………カモノハシガヤ

Bothriochloa ischaemum Geng—Ohwi, A. P. G. 11: 168 (1942).

カモノハシガヤ. 下部路傍にまれに生ず。

採集地. 馬川。 分布. 朝, 台, 旧世界の熱帯から温帯。

Bothriochloa parviflora Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 159 (1959).

ヒメアブラススキ. ヒメアブラガヤ. 下部の路傍, 草地, 林縁等に生ずる多年草。

採集地. 八郎峠, 法華寺, 登九峠。

分布. 本—台, 朝, 満, 中国, 印度, マレーシア, オーストラリア。

Bromus L. スズメノチャヒキ属

芒のある穎の先端は2裂しその間から芒が出る。小穂は長楕円形……………スズメノチャヒキ
芒のある穎の先端は裂けない。故にその先端から芒は出る。小穂は狭披針形……………キツネガヤ

Bromus japonicus Thunb.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 110 (1959).

スズメノチャヒキ. 下部路傍, 原野に生ずる1年草。

採集地. 江清里, 臥雲, 雲峰, 咸陽。 分布. 北一九, 朝, 北半球の温帯。

Bromus remotiflorus Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 109 (1959).

キツネガヤ. 下部の林地又は路傍に生ず。

採集地. 江清里, 義灘里。 分布. 北一九, 朝, 中国。

Calamagrostis Adans. ノガリヤス属

〔苞穎は線状披針形又はやや線形, 円錐花序は直立し密, 芒は護穎の背面から出る…………ヤマアワ

苞穎は披針形又は狭卵形, 円錐花序はやや疎, 枝は細く長い…………ノガリヤス

Calamagrostis arundinacea Roth var. **brachytricha** Hack.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 94 (1959).

ノガリヤス. サイトウガヤ. 各所の草地に生じ変化に富む多年草である。

採集地. ウンボンモデミー臥雲, 般若峰, 三丁里, 八郎峠, 屏峠, 細石—碧宵嶺, 地藏堂。

分布. 北一九, 朝。

備考. 稈がやや細く花序は淡緑色で第1苞穎は先端やや尾状に伸びるものを var. *inaequata* Hack.

サイシュウノガリヤスといい九州北部と朝鮮に産す。

Calamagrostis epigeios Roth—Nakai, Fl. Kor. II. 357 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 91 (1959).

ヤマアワ. 下部草地にまれに生ず。

採集地. 三丁里, 雲峰, 咸陽。

分布. 北一九, 朝, ヨーロッパ, アジア, 北米の一部の温帯。

Cinna L. フサガヤ属

Cinna latifolia Griseb.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 111 (1959).

フサガヤ. 疎林地にまれに生ずる多年草で芒は短かく無きが如く穂は散開性でなよなよしている。

採集地. 地藏堂北面, 上峰谷, 般若峰。

分布. 北, 本, 朝, 満, アムール, カムチャッカ, 北米, シベリア, ヨーロッパ東北部。

Cleistogenes Keng. チョウセンカリヤス属

Cleistogenes hackelii Honda in B. M. T. 50: 437 (1936)—Ohwi, in B. M. T. 55: 309 (1941)—Fl. Jap. 3 ed. 133 (1959).

チョウセンカリヤス. 下部の路傍や草地にまれに生ずる多年草で葉は披針形, 葉鞘には長毛あるか或は無毛, 鞘口には長毛がある。

採集地. 伴仙洞, 雲峰, 高基里, 臥雲。 分布. 本一九, 朝, 中国。

var. **nakaii** Ohwi in B. M. T. 55: 309 (1941).

ヒロハチョウセンカリヤス. 下部の草地や路傍に生ずる前種の変種で葉は長披針形, 葉鞘や鞘口に長毛がなく穂は密である。

採集地. 馬川—白武洞。 分布. 朝, 満。

Cymbopogon Spreng. オガルガヤ属

Cymbopogon tortilis Hitchc. var. **goeringii** Hand.-Mazz.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 160 (1959).

オガルガヤ. 下部の草地や路傍に生ず。

採集地. 水落, 馬川—白武洞, 登九峠。 分布. 本一九, 朝。

Diarrhena P. Beauv. タツノヒゲ属

Diarrhena fauriei Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 130 (1959).

ヒロハヌマガヤ. 中腹以下の林地に生ずる多年草でタツノヒゲに似ているが全体やや直立し剛硬である。

採集地. 般若峰, 白武洞, 臥雲, 地藏堂—白武洞, 上林, 上峰谷。

分布. 本(稀), 朝, 満, ウスリー。

Digitaria Heist. メヒシバ属

- { 小穂は披針形, 長さ 2.5~3mm. 小梗に 3 稜がある。花軸の翼は縁辺ざらつく, 鞘にはおおむね
 開出する長毛がある……………メヒシバ
 { 小穂は卵状楕円形, 長さ 1.5~2mm. 小梗は円い, 鞘は無毛……………アキメヒシバ

Digitaria adscendens Henr.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 146 (1957).

メヒシバ. 下部の耕地や路傍に生ず。

採集地. 悟道峠, 雲峰, 咸陽。

分布. 北一九, 朝, 全世界の熱帯から温帯。

Digitaria violascens Link.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 146 (1959).

アキメヒシバ. 下部路傍に生ず。

採集地. 三丁里, 浮雲峠, 悟道峠—馬川, 雲峰, 達宮。

分布. 北一九, 朝, 中国, 南米(帰化)。

Dimeria R. Br. カリマタガヤ属

Dimeria ornithopoda Trin. var. *tenera* Hack.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 152 (1957).

カリマタガヤ. 下部路傍にまれに生ず。

採集地. 高基里, 正嶺峠。

分布. 北一九, 朝。

Echinochloa P. Beauv. ヒエ属

Echinochloa crus-galli P. Beauv. var. *caudata* Kitagawa—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 149 (1959).

イヌビエ. 下部の水田や湿地に生ずる 1 年草で稈は基部から分岐する。穂には普通長芒がある。タ
イヌビエ var. *hispidula* Honda は稈は基部から直立し穂の芒は無いか或は短かいものである。

採集地. 悟道峠—馬川, 臥雲, 咸陽。

分布. 本一九, 朝, 中国。

Eragrostis P. Beauv. スズメガヤ属

- 1 { 小穂, 小梗, 葉下面, 葉鞘等の少なくとも一部には無柄で往々凹入する腺点がある……………2
 { 上記の如き腺はない。1 年草, 小穂の巾は 1.5mm. に達しない……………3
 2 { 多年草で小穂は暗紫色で腺がない。鞘口に白毛がある……………カゼクサ
 { 1 年草, 小穂は帯鉛淡緑色, 鞘は上部両側に長毛がある……………スズメガヤ
 3 { 葉鞘の口部及び花序の腋に長毛がある。通例山地に生ず……………オオニワホコリ
 { 葉鞘及び花序には長毛がない。通例人家附近に生ず……………ニワホコリ

Eragrostis ferruginea P. Beauv.—Nakai, Fl. Kor. II, 365 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 132 (1959).

カゼクサ 下部路傍に生ず。

採集地. 三峰山, 雲峰, 咸陽。

分布. 本一九, 朝, 満, 中国, ヒマラヤ。

Eragrostis megastachya Link.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 131 (1959).

スズメガヤ. 下部路傍にまれに生ずる 1 年草。

採集地. 咸陽。

分布. 本一九, 朝, 世界の熱帯から温帯。

Eragrostis multicaulis Steud.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 132 (1959).

ニワホコリ. 下部路傍に生ず。

採集地. 白武洞, 江清里, 咸陽。

分布. 樺一台, 朝, 中国, ウスリー, アムール, マレーシア, ヨーロッパ及び北米(帰化)。

Eragrostis pilosa P. Beauv.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 132 (1959).

オオニワホコリ. 下部路傍に生ず。

採集地. 蛇谷, 三丁里, 悟道峠—馬川, 咸陽。

分布. 本—九, 朝, 世界の温帯から熱帯。

Eriochloa H. B. K. ナルコビエ属

***Eriochloa villosa* Kunth**—Nakai, Fl. Kor. II, 346 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 148 (1959).

ナルコビエ. 下部路傍にまれに生ず。

採集地. 雲峰, 達宮, 正嶺峠。

分布. 本—琉, 朝, 中国, ウスリー。

Festuca L. ウシノケグサ属

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | { | 葉の巾 6~12mm. 護穎に長芒がある。茎は高さ 1m. 内外となる……………オオトボシガラ |
| | | 葉の巾は 5mm. に達しない。護穎は芒を生じない……………2 |
| 2 | { | 第 1 苞穎は長さ最下護穎の 1/2 以上ある。披針形で鋭頭。芒は極く短かいか或はない……………ウシノケグサ |
| | | 第 1 苞穎は極く短かく卵形で鈍頭, 最下の護穎は長さ 4.5~6mm. 通例芒がある ……トボシガラ |

***Festuca extremiorientalis* Ohwi**, Fl. Jap. 3 ed. 114 (1959).

オオトボシガラ. オオトボシガラ. トウトボシガラ. 中腹以上の林地にまれに生ず。

採集地. 智異登山道。

分布. 北, 本, 朝, 中国北部, 東シベリア。

***Festuca ovina* L. var. *ovina* (L.)**—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 113 (1959).

ウシノケグサ. シンウシノケグサ. 各所の草地に生ず。

採集地. ウンボンモデミ, 靈源寺, 三丁里—靈源寺, 地藏堂—白武洞, 馬巖—天王峰。

分布. 北, 本, 朝, 北半球一般。

***Festuca parvigluma* Steud.**—Nakai, Fl. Kor. II, 373 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 114 (1959).

トボシガラ. 下部の疎林地にまれに生ず。

採集地. 浮雲峠, 達宮, 臥雲。

分布. 北—九, 台, 朝, 中国。

Glyceria R. Br. ドジョウツナギ属

- | | |
|---|--|
| { | 全形大, 高さ 1~2m. 葉の巾 5~8mm. 基部の葉の鞘はざらつく, 葉舌は長さ 1mm. 内外, 護穎は長さ 2.5~4mm. 内穎はほとんど彎曲しない……………ヒロハノドジョウツナギ |
| | 茎の基部は匍匐斜上性, 葉の巾狭く無毛平滑, 護穎は長さ 2.2mm. 内穎及び小軸は強く彎曲する……………ドジョウツナギ |

***Glyceria ischyronura* Steud.**—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 123 (1959).

ドジョウツナギ. 下部水辺にまれに生ず。

採集地. 浮雲峠, 楸城里, 三丁里。

分布. 北—九, 朝。

***Glyceria leptolepis* Ohwi** in B. M. T. 45: 381 (1931)—Fl. Jap. 3 ed. 123 (1959).

ヒロハノドジョウツナギ. 中腹以上の水湿地にまれに生ずる多年草。

採集地. 般若峰中腹, 臥雲谷。

分布. 北, 本, 九, 朝, 満, 中国, 台, ウスリー。

Hemarthria R. Br. ウシノシッペイ属

***Hemarthria sibirica* Ohwi**, Fl. Jap. 3 ed. 163 (1959).

ウシノシッペイ. 下部路傍にまれに生ず。

採集地. 水落, 八郎峠, 雲峰。

分布. 本—九, 朝, 満, 中国, 沿海州。

Imperata Cyrillo. チガヤ属

***Imperata cylindrica* P. Beauv. var. *koenigii* Durand et Schinz**—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 153 (1959).

チガヤ. フシゲチガヤ. 下部草地に生ず。

採集地. セコル山, 白武洞, 徳田。 分布. 北一九, 朝, 東亜温帯。

Isachne R. Br. チゴザサ属

Isachne globosa O. Ktze.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 151 (1959).

チゴザサ. 下部の湿地に生ずる多年草。

採集地. 雲峰, 馬川, 咸陽。 分布. 北一九, 朝, 中国, 東南アジア, オーストラリア。

Ischaemum L. カモノハシ属

Ischaemum crassipes Thell.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 161 (1959).

カモノハシ. 下部の河原に生ずる多年草。

採集地. 雲峰。 分布. 本一九, 朝, 満。

Koeleria Pers. ミノボロ属

Koeleria cristata Pers.—Nakai, Fl. Kor. II, 367 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 99 (1959).

ミノボロ. 下部原野, 路傍等にまれに生ず。

採集地. 浮雲峠, 咸陽。 分布. 本一九, 朝, 北半球の温帯。

Melica L. コメガヤ属

茎は軟らかく高さ 50cm. 以下, 穂は垂れ単総状で分岐しない。護穎は長楕円形, 葉は 1 茎に 2 ~ 3 枚……………コメガヤ
茎はやや剛直, 高さ 1m. 内外に達す。穂は大形で分岐する。護穎は披針形, 葉は 1 茎に 10 枚内外ある……………ミチシバ

Melica nutans L.—Nakai, Fl. Kor. II, 368 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 125 (1959).

コメガヤ. 中腹の草地, 林地等に生ず。

採集地. 般若峰, 細石, 蓮洞越。

分布. 樺一九, 朝, 中国よりシベリア, ヨーロッパに渡つて生ず。

Melica onoei Fr. et Sav.—Nakai, Fl. Kor. II, 368 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 124 (1959).

ミチシバ. ハナビガヤ. 下部の草地や林縁にまれに生ずる多年草, 全体無毛, 高さ 1m. 内外に及び花序は狭長, 小花梗の上部には白色の細毛がある。

採集地. 臥雲, 楸城里。 分布. 本一九, 朝, 中国。

Microstegium Nees. アンボソ属

Microstegium vimineum A. Camus var. ***polystachyum*** Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 157 (1959).

アンボソ. 下部路傍に生ずる 1 年草で長芒がある。

採集地. 蛇谷, 登九峠, 雲峰。

分布. 北一台, 朝, 中国, マレーシア, 印度, コーカサス。

Milium L. イブキヌカボ属

Milium effusum L.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 102 (1959).

イブキヌカボ. 中腹以上の樹陰地に生ず。

採集地. 般若峰, 天王峰, ウンボンモデミ, 蓮洞越。

分布. 北一九, 朝, 北半球の温帯から亜熱帯。

Miscanthus Anderss. ススキ属

Miscanthus sinensis Anderss.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 154 (1959).

ススキ. 原野, 路傍に見られる多年草で甚だ変化に富む。

採集地. 雲峰, 月坪里, 三丁里, 徳頭山, 八郎峠。

分布. 千一台, 朝, 中国。

Moliniopsis Hayata スマガヤ属

Moliniopsis japonica Hayata—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 130 (1959).

スマガヤ. 下部の水湿地に生ずる高さ 30~100cm. になる多年草。

採集地. 高基里。

分布. 北, 本, 九, 朝, 南千島。

Muhlenbergia Steud. ネズミガヤ属

{ 全形やや小, 稈の基部は匍匐, 分枝する。匍枝はない。葉の巾 2~4mm. ネズミガヤ
 { 全形大, やや直立し匍匐しない。鱗片葉を有する長い匍枝を生ず。葉の巾 3~8mm. オオネズミガヤ

Muhlenbergia japonica Steud.—Nakai, Fl. Kor. II, 354 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 138 (1959).

ネズミガヤ. 中腹以下の路傍に生ずる多年草。

採集地. 碧宵嶺—三丁里, 正嶺峠, 法華山, 雲峰。

分布. 北—九, 朝, 中国, ウスリー。

Muhlenbergia longistolon Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 138 (1959).

オオネズミガヤ. 中腹以下の路傍や林地に生ずる多年草で前者に比し全体大きい。

採集地. 上峰谷, 臥雲, 水落。

分布. 北—九, 朝, 中国, アムール。

Oplismenus P. Beauv. チジミザサ属

{ 稈や葉に毛多く花序の中軸に長毛がある ケチジミザサ
 { 稈や葉に毛少なく花序の中軸に長毛がない。全体やや小さい コチジミザサ

Oplismenus undulatifolius Roem. et Schultes—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 149 (1959).

ケチジミザサ. 下部の路傍や林地に生ず。

採集地. 白武洞, 臥雲。

分布. 北—九, 朝, 中国, 旧世界の温帯から亜熱帯。

var. ***japonicus*** Koidz. in B. M. T. 39 : 302 (1927)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 149 (1959).

コチジミザサ. チジミザサ. 下部林地にまれに生ず。

採集地. 白武洞。

分布. 同上。

Panicum L. キビ属

Panicum bisulcatum Thunb.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 145 (1959).

ヌカキビ. 下部路傍にまれに生ず。

採集地. 三丁里, 白武洞, 達宮。

分布. 北—九, 朝, 満, 中国, ウスリー, 印度。

Paspalum L. スズメノヒエ属

Paspalum thunbergii Kunth—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 148 (1959).

スズメノヒエ. 下部路傍に生ず。

採集地. 悟道峠—馬川, 浮雲里, 雲峰, 咸陽。

分布. 本—琉, 朝, 中国。

Pennisetum Rich. チカラシバ属

Pennisetum alopecuroides Spreng.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 141 (1959).

チカラシバ. 下部路傍に生ず。

採集地. 月坪里, 浮雲里, 水落, 達宮, 咸陽。

分布. 北—台, 朝, 中国, 比。

Phalaris L. クサヨシ属

Phalaris arundinacea L.—Nakai, Fl. Kor. II, 352 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 102 (1959).

クサヨシ. 下部の水辺, 溝辺等に生ず。

採集地. 臥雲, 義灘里。 分布. 北一九, 朝, 北半球の温帯。

Phragmites Adans. ヨシ属

Phragmites japonica Steud.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 128 (1959).

ツルヨシ. デシバリ. 下部の河辺や水湿地に生ずる多年草で長い匍枝を生ず。

採集地. 金盤里, 臥雲, 法華山, 八郎峠。 分布. 本一台, 朝, 中国, ウスリー。

Poa L. イチゴツナギ属

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | { | 1~2年草, 稈は軟弱, 平滑, 花序の枝はややざらつき花時開出し繊細でややたれる……………ミゾイチゴツナギ |
| | | 多年草, 稈は剛強, 通直, ややざらつくか或は平滑, 葉は狭く穂は長く抽出し枝は短かく垂れない……………2 |
| 2 | { | 匍枝がない。稈のざらつきは節の下部が著しい。葉舌は披針形, 長さ3~8mm. 鋭頭……………イチゴツナギ |
| | | 細い匍枝がある。稈は平滑でやや硬い。葉舌は切形, 長さ1~2mm.……………ナガハグサ |

Poa acroleuca Steud.—Nakai, Fl. Kor. II, 370 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 118 (1959).

ミゾイチゴツナギ. 下部の路傍や草地に生ず。

採集地. セコル山, 徳田, 咸陽, 臥雲。 分布. 北一台, 朝, 中国。

Poa pratensis L.—Nakai, Fl. Kor. II, 370 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 122 (1959).

ナガハグサ. 上中部草地にまれに生ず。

採集地. 地藏堂—天王峰, 臥雲谷, ウンボンモデミ。 分布. 北一九, 朝, 北半球の温帯。

Poa sphondylodes Trin.—Nakai, Fl. Kor. II, 371 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 121 (1959).

イチゴツナギ. ザラツキイチゴツナギ. 下部路傍, 草地等に生ず。

採集地. 達宮, 咸陽, 三丁里。 分布. 北一九, 朝, 中国, 台湾, 東シベリア。

Pseudopogonatherum A. Camus. ウンヌケ属

Pseudopogonatherum speciosum Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 158 (1959).

ウンヌケ. ホナガコススキ. 下部原野に生ずる多年草で稈の基部に黄褐色の毛を密生する。芒は黄色でちじむ。

採集地. 雲峰, 法華寺。 分布. 本, 九, 朝, 中国, 印度。

Sacciolepis Nash. スメリグサ属

Sacciolepis indica Chase var. *oryztorum* Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 144 (1959).

スマリグサ. 下部路傍や水湿地に生ず。

採集地. 白武洞, 達宮, 雲峰。 分布. 本一台, 朝, 中国。

Schizachne Hack. フォーリーギャ属

Schizachne purpurascens Swallen—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 125 (1959).

フォーリーギャ. 中腹の広葉樹林内にまれに生ずる多年草。

採集地. 臥雲谷。 分布. 北, 本, 朝, 樺, ウスリー, カムチャッカ, 東シベリア, 北米。

Spodiopogon Trin. オオアブラススキ属

Spodiopogon sibiricus Trin.—Nakai, Fl. Kor. II, 341 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 155 (1959).

オオアブラススキ. 下部草地や林地に生ずる多年草で高さ1m.内外となる。

採集地. 水落, 三峰山, 雲峰, 白武洞。 分布. 北一九, 朝, 満, 中国, シベリア。

Sporobolus R. Br. ネズミノオ属

- { 多年草，高さ 30~80cm. 根生葉は明瞭，穂はやや通直，15~40cm. に達す……………ネズミノオ
 { 1 年草，高さ 5~20cm. 葉は狭披針形で葉鞘に長縁毛がある。小穂は濃褐色……………ヒゲシバ

Sporobolus elongatus R. Br.—Nakai, Fl. Kor. II, 355 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 137 (1959).

ネズミノオ. 下部路傍に生ずる多年草。

採集地. 達宮。 分布. 本一九，朝，中国，印度，マレーシア，オーストラリア。

Sporobolus japonicus Maxim.—Nakai, Fl. Kor. II, 355 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 137 (1959).

ヒゲシバ. ヒゲクサ. 中腹以下の日当たり良い路傍に生ず。

採集地. 浮雲峠，達宮，徳頭山，三丁里。 分布. 本一九，朝，中国。

Themeda Forsk. メガルガヤ属

Themeda japonica C. Tanaka—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 161 (1959).

メガルガヤ. 下部路傍，草地に生ずる高さ 1m. 内外に及ぶ多年草。

採集地. 水落，江清里，三丁里，高基里，法華寺，八郎峠，雲峰。

分布. 本一九，朝，満，中国，印度。

Trisetum Pers. カニツリグサ属

- { 護穎の先きは 2 個の短芒となる。背面に著しい突起があつてざらつく，稈の高さ 40~80cm. 葉の
 { 巾，3~5mm.……………カニツリグサ
 { 護穎の先きは 2 微齒となる。背面に細点突起がある。稈高 50~100cm. 葉の巾 4~10mm.……………
 { ……………チシマカニツリ

Trisetum bifidum Ohwi in B. M. T. 45: 191 (1931)—Fl. Jap. 3 ed. 98 (1959).

カニツリグサ. 下部路傍や原野に生ず。

採集地. 臥雲，浮雲峠。 分布. 北一九，朝，中国，台湾。

Trisetum sibiricum Rupr.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 99 (1959).

チシマカニツリ. 上部草地にまれに生ず。

採集地. 細石，天王峰。

分布. 樺一九，朝，満，中国，アラスカ，カムチャッカ，シベリア，東ヨーロッパ。

Zoisia Willd. シバ属

Zoisia japonica Steud.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 139 (1959).

シバ. 中腹以下の路傍，草地に生ず。

採集地. 智異登山道，浮雲峠。 分布. 北一九，朝，中国。

CYPERACEAE カヤツリグサ科

Bulbostylis Kunth. ハタガヤ属

- { 小穂や鱗片は汚錆色，鱗片の先きに外曲する芒がある。果は平滑，稈は絨状……………ハタガヤ
 { 小穂や鱗片は栗褐色，鱗片は全縁，果には不明の波状小点がある。稈は絨状……………
 { ……………イトハナビテンツキ

Bulbostylis barbata Kunth—Nakai, Fl. Kor. II, 295 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 226 (1959).

ハタガヤ. 中腹以下の草地に生ず。

採集地. 三峰山，雲峰，法華山。

分布. 本一台，朝，中国，印度，マレーシア，オーストラリア。

Bulbostylis densa Hand.-Mazz.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 226 (1959).

イトハナビテンツキ。中腹以下の草地に普通見られる。

採集地。白武洞, 浮雲峠, 雲峰, 徳頭山, 法華山。

分布。本一九, 朝, 中国, 台, 印度。

Carex L. スゲ属

Carex augustinowiczii Meinsh.—Nakai, Fl. Kor. II. 313 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 188 (1959).

ヒラギシスゲ。エゾアセスゲ。下部谷間に生ず。

採集地。臥雲谷, 白武洞。

分布。樺一本, 朝, ウスリー, カムチャッカ。

Carex bostrychostigma Maxim.—Nakai, Fl. Kor. II. 101 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 208 (1959).

ヤマチスゲ。中腹以上の林地, 路傍, 草地等に生ず。

採集地。智異登山道, 浮雲峠, 細石, 達宮, 般若峰。

分布。本一九, 朝, 満, ウスリー。

Carex breviculmis R. Br.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 194 (1959).

アオスゲ。路傍, 疎林地, 草地等に生ず。

採集地。般若峰, 細石, 三丁里, セコル山。

分布。北一九, 朝, 中国, 印度, ニューギニア, オーストラリア。

Carex ciliato-marginata Nakai in B. M. T. 28: 518 (1914)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 206 (1959).

ケタガネソウ。下部草地や林縁にまれに生ずる多年草でタガネソウに比し少くとも葉縁下方には長縁毛がある。

採集地。三峰山。

分布。本一九, 朝。

Carex dickinsii Fr. et Sav.—Nakai, Fl. Kor. II. 331 (1911).—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 214 (1959).

オニスゲ。ミクリスゲ。下部水辺にまれに生ず。

採集地。山德里, 浮雲峠。

分布。北, 本, 九, 朝。

Carex erythrobasis Lév. et Van.—Nakai, Fl. Kor. II. 323 (1911)—Ohwi, Cyp. Jap. 398 (1936).

タンナカンスゲ。中腹以上の林地にまれに生ず。

採集地。臥雲谷, 白武洞, 般若峰。

分布。朝。

Carex fernaldiana Lév. et Van.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 196 (1959).

イトスゲ。中腹以下の草地にまれに生ず。

採集地。浮雲峠。

分布。北一九, 朝, 台。

Carex filipes Fr. et Sav.—Nakai, Fl. Kor. II. 330 (1911).—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 204 (1959).

タマツリスゲ。上部林地又は草地に生ず。

採集地。蓮洞越, 細石, 般若峰。

分布。本, 四, 朝, 満。

Carex forficula Fr. et Sav.—Nakai, Fl. Kor. II. 311 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 185 (1959).

タニガワスゲ。谷間の陽地にまれに生ず。

採集地。臥雲谷, 浮雲峠。

分布。北一九, 朝, 中国北部。

Carex fusanensis Ohwi in A. P. G. 1: 74 (1932)—Cyp. Jap. I. 407 (1936).

アカヒナスゲ。下部草地にまれに生ず。

採集地. 浮雲峠。 分布. 朝。

Carex gibba Wahlenb.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 179 (1959).

マスクサ. 下部路傍, 林地等にまれに生ず。

採集地. 三丁里, 碧松寺, 孔安里。 分布. 本一九, 朝, 中国。

Carex glabrescens Ohwi in Mem. Coll. Sci. Kyoto. Imp. ser. B, 6. 245 (1931)—Cyp. Jap. I. 509 (1936).

スナチスゲ. イヌカサスゲ. 河原の砂地にまれに生ず。

採集地. 義灘里。 分布. 朝。

Carex hakonensis Fr. et Sav.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 206 (1959).

コハリスゲ. コケスゲ. 中腹以上の林地に生ず。

採集地. 般若峰, 浮雲峠, 臥雲谷, 達宮。 分布. 本一九, 朝。

Carex heterolepis Bunge—Nakai, Fl. Kor. II. 310 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 185 (1959).

ヤマアセスゲ. 湿性草地に生ず。

採集地. 浮雲峠, 雲峰。 分布. 本, 九, 朝, 中国北部。

Carex humilis Leyss. var. *nana* Ohwi—Fl. Jap. 3 ed. 201 (1959).

ホソバヒカゲスゲ. ヒメヒカゲスゲ. 上部草地にまれに生ず。

採集地. 天王峰, 細石, 五峰。 分布. 本一九, 朝, 中国, 東シベリア。

Carex jaluensis Komar.—Nakai, Fl. Kor. II. 314 (1911)—Ohwi, Cyp. Jap. I. 436 (1936).

チョウセンカサスゲ. 中腹以上の樹林地に生ず。

採集地. 細石, 馬巖—天王峰, 般若峰, ウンボンモデミ, 臥雲谷。 分布. 朝, 満, 中国。

Carex japonica Thunb.—Nakai, Fl. Kor. II. 327 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 209 (1959).

ヒゴクサ. 中腹以下の林地に生ず。

採集地. ウンボンモデミ, 臥雲, 碧松寺。 分布. 本一九, 朝, 中国。

Carex laevis Nakai in B. M. T. 28: 518 (1914)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 178 (1959).

ヒメミコシガヤ. 中腹以上の林地や草地に生ず。

採集地. 馬巖—天王峰, 艾嶺—馬巖, 浮雲峠, 地藏堂, セコル山。

分布. 本, 朝, ウスリー。

Carex lanceolata Boott—Nakai, Fl. Kor. II. 136 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 201 (1959).

ヒカゲスゲ. 中腹以下の草地, 疎林地に生ず。

採集地. セコル山, 徳田, 臥雲谷。 分布. 本一九, 朝, 満, ウスリー。

Carex leiophylla C. A. Mey.—Nakai, Fl. Kor. II. 305 (1911)—Ohwi, Cyp. Jap. I. 243 (1936).

ヤマミコシガヤ. 下部路傍, 草地に普通。

採集地. 悟道峠, 臥雲, 浮雲峠, 三丁里, セコル山, 咸陽。

分布. 朝, 満, 中国, アムール, ダフリア, アラスカ。

Carex ligulata Nees var. *austrokoreensis* Ohwi, Cyp. Jap. I. 505 (1936).—A. P. G. 16. 40 (1955).

ウスイロサツマスゲ. 下部林地に生ず。

採集地. 碧松寺。 分布. 朝。

Carex maximowiczii Miq.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 185 (1959).

ゴウソ. 中腹以下の湿性草地に生ず。

採集地. 浮雲峠。 分布. 本—琉, 朝, 中国。

Carex mira Kükenth.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 202 (1959).

サワヒメスゲ. 下部路傍にまれに生ず。

採集地. 徳田, 義灘里。 分布. 本, 朝。

Carex nervata Fr. et Sav.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 193 (1959).

シバスゲ. 中腹以下の草地に生ず。

採集地. 浮雲峠。 分布. 北—九, 朝。

Carex neurocarpa Maxim.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 178 (1959).

ミコシガヤ. 下部のやや湿気ある草地に生ず。

採集地. 咸陽(上林)。 分布. 本, 朝, 中国, アムール。

Carex okamotoi Ohwi in A. P. G. V. 53 (1936)—Cyp. Jap. I. 429 (1936).

チイサントガネソウ. 中腹の林地に生ずるタガネソウに似た多年草であるが葉狭く軟弱, 平滑, 小面積ではあるが単純群落をなす。

採集地. 三峰山, 霊源寺, 臥雲谷, 白武洞。 分布. 朝。

Carex parciflora Boott var. **macroGLOSSA** Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 205 (1959).

コジュズスゲ. 下部路傍に生ず。

採集地. 江清里。 分布. 北, 本, 九, 朝。

Carex peiktusani Komar.—Ohwi, Cyp. Jap. I. 315 (1936).

マンシュウクロカワスゲ. 上部草地に生ず。

採集地. 天王峰, 地藏堂, 臥雲。 分布. 朝, 満。

Carex planiculmis Komar.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 209 (1959).

ヒカゲシラスゲ. 中腹以下の谷間に生ず。

採集地. 上峰谷, 臥雲谷, 般若峰, 細石, 白武洞, セコル山, 達宮。

分布. 樺一本, 朝, 満, ウスリー。

Carex polyschoena Lév. et Van.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 195 (1959).

シロホンモンジスゲ. 下部草地, 林地等にまれに生ず。

採集地. 五峰, 碧松寺。 分布. 九(対馬), 朝, 満。

Carex sabynensis Less.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 194 (1959).

カミカワスゲ. チョウセンアオスゲ. 中腹以下の草地に生ず。

採集地. 浮雲峠。 分布. 樺一本, 朝, 東シベリア。

var. **leiosperma** Ohwi, Cyp. Jap. I. 353 (1936).

チイサンシバスゲ. カミカワスゲの無毛品である。

採集地. 臥雲谷。 分布. 朝。

var. **rostrata** Ohwi, Cyp. Jap. I. 353 (1936)—Fl. Jap. 3 ed. 194 (1959).

ツルカミカワスゲ. 匍枝を生ずる変種で中腹以上の草地や疎林地に生ず。

採集地. 臥雲谷, 般若峰, 細石, 浮雲峠。 分布. 本, 九, 朝, 東シベリア。

Carex siderosticta Hance—Nakai, Fl. Kor. II. 322 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 206 (1959).

タガネソウ. 各所の林地に普通。

採集地. 三峰山, 上峰谷, ウンボンモデミ, 地藏堂, 白武洞, 馬巖—天王峰, 達宮, 般若峰, 雲峰。

分布. 北—九, 朝, 満, 中国, ウスリー。

Carex tegulata Lév. et Van.—Ohwi, Cyp. Jap. I. 287 (1936).

アワツブスゲ. マルミスゲ. 下部河岸の陽地に生ず。

採集地. 馬川(河原), 義灘里(河原)。

分布. 朝。

Carex tenuiformis Lév. et Van. var. *neo-filipes* Ohwi, Cyp. Jap. I, 449 (1936).

ミヤマイトスゲ. ナガミオノエスゲ. 上部の林地や草地にまれに生ず。

採集地. 天王峰—地藏堂, 細石, 般若峰。

分布. 朝。

Cyperus L. カヤツリグサ属

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | { 小穂は皆無梗或は 2~3 有梗のものを混ず..... | 2 |
| | { 小穂は無梗のものと長梗のものとを混ず..... | 4 |
| 2 | { 茎は短かく小穂は無梗のためにかたまる..... | アオガヤツリ |
| | { 茎は長く 30cm. に達す。小穂は有梗のものが 2~3 ある..... | 3 |
| 3 | { 小穂は長楕円形又は卵状楕円形, 数個..... | ミズガヤツリ |
| | { 小穂はややかたまる。茎や葉はやや硬い..... | カワラスガナ |
| 4 | { 果は細小, 小穂は球状にかたまる..... | タマガヤツリ |
| | { 果はやや大, 小穂は球状にかたまらない..... | 5 |
| 5 | { 最後の小穂はやや規則正しく併列し何れもほぼ同長..... | 6 |
| | { 最後の小穂はやや不規則に配列する..... | 8 |
| 6 | { 茎は壮大, 長梗を有す, 穂は更に分岐する..... | カンエンガヤツリ |
| | { 茎は小, 10cm. 許り..... | ヒナガヤツリ |
| | { 茎は中大 カヤツリグサ類..... | 7 |
| 7 | { 果は暗褐色, 葉や茎は細い..... | アゼガヤツリ |
| | { 果は褐色(緑色を帯ぶ)..... | チャガヤツリ |
| | { 果は鮮褐色又は緑色..... | カヤツリグサ |
| 8 | { 穂は黄色又は黄褐色..... | コゴメガヤツリ |
| | { 穂は赤褐色又は黒褐色..... | 9 |
| 9 | { 穂は多数出る, 円錐形, 黒褐色..... | ウシクダ |
| | { 穂は小数, 小穂は短かく上部程短かい, 赤褐色..... | タチガヤツリ |

Cyperus amuricus Maxim.—Nakai, Fl. Kor. II. 286 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 244 (1959).

チャガヤツリ. 下部路傍に生ず。

採集地. 悟道—馬川, 雲峰。

分布. 本—九, 朝, 満, 中国, アムール, ウスリー, 台。

Cyperus difformis Linn.—Nakai, Fl. Kor. II. 286 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 245 (1959).

タマガヤツリ. 下部路傍, 畦畔等に生ず。

採集地. 雲峰。

分布. 北—台, 朝, 満, 中国, 印度, マレーシア, オーストラリア, 南ヨーロッパ。

Cyperus globosus All.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 242 (1959).

アゼガヤツリ. 下部路傍に生ず。

採集地. 悟道—馬川, 達宮, 雲峰。

分布. 本—九, 朝, 満, 中国, 台, マレーシア, 印度, オーストラリア, 南ヨーロッパ。

Cyperus hakonensis Fr. et Sav.—Nakai, Fl. Kor. II. 288 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 245 (1959).

ヒナガヤツリ. 下部路傍, 畦畔に生ず。

採集地. 楸城里, 雲峰。

分布. 本—九, 朝, 中国。

Cyperus iria L.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 244 (1959).

コゴメガヤツリ. 下部路傍, 畦畔に生ず。

採集地. 悟道峠, 登九峠。 分布. 本一, 台, 朝, 中国, 印度, マレーシア。

Cyperus iwaskii Makino—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 244 (1959).

カンエンガヤツリ. 下部池畔に生ず (栽培)。

採集地. 伴仙洞。 分布. 本, 朝。

Cyperus microiria Steud.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 244 (1959)—*C. japonicus* Makino

カヤツリグサ. キガヤツリ. 下部路傍, 畦畔に普通。

採集地. 咸陽, 雲峰, 達宮, 悟道峠。 分布. 本一九, 朝, 満, 中国。

Cyperus nipponicus Fr. et Sav.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 246 (1959).

アオガヤツリ. オオタマガヤツリ. 下部路傍, 畦畔に生ず。

採集地. 咸陽, 雲峰。 分布. 本一九, 朝, 満, 中国。

Cyperus orthostachyus Fr. et Sav.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 244 (1959).

ウシクグ. 下部路傍, 畦畔に生ず。

採集地. 蛇谷, 悟道峠一馬川, 達宮, 雲峰, 水落。

分布. 北一九, 朝, 満, 中国, ウスリー, アムール, ダフリア。

Cyperus sanguinolentus Vahl—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 242 (1959).

カワラスガナ. 下部路傍, 畦畔に生ず。

採集地. 悟道峠一馬川, 達宮, 雲峰。

分布. 北一九, 朝, 満, 中国, アムール, 印度, マレーシア, オーストラリア。

Cyperus serotinus Rottb.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 241 (1959).

ミズガヤツリ. 下部路傍, 畦畔に生じ匍枝を出す。

採集地. 雲峰。 分布. 北一九, 朝, 満, 中国, 台, 印度, ヨーロッパ。

Cyperus setiformis Korsh.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 242 (1959).

タチガヤツリ. ヒトリガヤツリ. 下部路傍に生ず。ややカワラスガナに似る。

採集地. 悟道峠一馬川。 分布. 本, 小笠原, 朝, 満, アムール。

Eleocharis R. Br. ハリイ属

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | { | 柱頭は2個, 果は両凸形, 小穂は披針形又は卵形, 稈は太く軟, 鱗片は錆褐色…オオヌマハリイ |
| | | 柱頭は3個, 果は3稜形……………2 |
| 2 | { | 全体繊細, 稈は絲状又は毛管状, 高さ3~10cm. 花序の鱗片は数個, 果に縦肋がある…………… |
| | | ……………マツバイ |
| | | 稈は絲状でなく高さ20~50cm. 4 (3~5) 稜がある。鱗片は多数, 果は平滑……………シカクイ |

Eleocharis acicularis Roem. et Schult. var. *longiseta* Svenson—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 223 (1959).

マツバイ. 下部畦畔に生ず。

採集地. 三丁里, 江清里。 分布. 本一, 台, 朝, 満, 中国。

Eleocharis mamillata Lindb. f. var. *cyclocarpa* Kitagawa—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 225 (1959).

オオヌマハリイ. スマハリイ. 下部溝辺に生ず。

採集地. 雲峰, 咸陽。 分布. 北一九, 朝, 満, ウスリー。

Eleocharis wichurai Bückl. —Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 224 (1959).

シカクイ. 下部の湿性草地に生ず。

採集地. 雲峰。 分布. 北一九, 朝, 満, ウスリー。

Fimbristylis Vahl. テンツキ属

- 1 { 花柱は細く無毛又は僅かに細毛がある。柱頭は3 2
 { 花柱は扁平, 上方に通常縁毛がある。柱頭は常に2, 果は両凸形 3
- 2 { 花茎の下部に鞘がない。小穂は披針形又は長橢円状披針形 ヒメヒラテンツキ
 { 花茎の下部に鞘がある。小穂は球形—長橢円形 ヒデリコ
- 3 { 小穂の巾は約1.5mm. で稜角がある。花柱の基部に長毛がある。葉はやわらかく絲状
 { アゼテンツキ
- 4 { 小穂の巾は2~7mm. 円くて稜角はない 4
 { 果は平滑又はほとんど平滑, 花序は1個の小穂からなる ヤマイ
 { 果は隆起する明らかな横長橢円形の網目がある。小穂は多数, 1部栗褐色 テンツキ

Fimbristylis autumnalis Roem. et Schultes—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 229 (1959).

ヒメヒラテンツキ. 下部路傍, 畦畔に生ず。

採集地. 馬川—白武洞, 雲峰, 達宮。 分布. 北—琉, 朝, 北米。

Fimbristylis dichotoma Vahl.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 231 (1959).

テンツキ. 下部路傍, 畦畔に生ず。

採集地. 悟道峠—馬川, 雲峰。

分布. 北—台, 朝, 中国, 印度, マレーシア, アフリカ, オーストラリア。

Fimbristylis miliacea Vahl.—Nakai, Fl. Kor. II, 290, 514 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 230 (1959).

ヒデリコ. 下部路傍, 畦畔に生ず。

採集地. 馬川—白武洞, 雲峰, 悟道峠, 達宮。

分布. 本—台, 朝, 中国, 印度, マレーシア, オーストラリア, 北米。

Fimbristylis squarrosa Vahl.—Nakai, Fl. Kor. II, 299 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 231 (1959).

アゼテンツキ. 下部畦畔路傍に生ず。

採集地. 義灘里, 江清里。

分布. 北, 本, 朝, 満, 中国, 印度, アフリカ, 南ヨーロッパ。

Fimbristylis subbispicata Nees et Meyen—Nakai, Fl. Kor. II, 291 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 230 (1959).

ヤマイ. 中腹以下の草地や路傍に生ず。

採集地. 水落, コレボン, 馬川—三丁里, 雲峰。

分布. 北—台, 朝, 満, 中国, 印度, マレーシア。

Kyllingia Rottb. ヒメクグ属

Kyllingia brevifolia Rottb. var. *leiolepis* Hara—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 247 (1959).

ヒメクグ. 下部路傍, 畦畔に生ず。

採集地. 水落, 雲峰。 分布. 北—九, 朝, 中国(?)。

Lipocarpa R. Br. ヒンジガヤツリ属

Lipocarpa microcephala Kunth—Nakai, Fl. Kor. II, 284 (1951)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 240 (1959).

ヒンジガヤツリ. 下部畦畔に生ずる1年草。

採集地. 馬川—白武洞, 達宮, 楸城里, 悟道峠。

分布. 本—九, 朝, 満, 中国, 台, 印度, マレーシア, オーストラリア。

Scirpus L. ホタルイ属

- 1 { 花序はイのように側生状を呈す。稈は丸く軟らかく濃緑色、葉は鱗片状……………ホタルイ
花序は頂生と側生とがある。稈は3稜形で堅く葉縁はざらつく……………2
- 2 { 葉の横小脈は不明。側生の分花序は5~10個の小穂の集団からなる……………ヒメマツカサススキ
葉の下面及び葉鞘に著しい横小脈がある。側生の分花序は小形……………エゾアブラガヤ

Scirpus juncoides Roxb.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 237 (1959).

ホタルイ。下部畦畔，路傍の湿地に生ず。

採集地。雲峰。 分布。北一九，朝，中国，台，印度。

Scirpus karuizawensis Makino—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 236 (1959).

ヒメマツカサススキ。チョウセンマツカサススキ。中腹の湿潤な草地に生ず。

採集地。コレボン，浮雲峠，正嶺峠，法華山。 分布。本，朝，満。

Scirpus wichurai Böckl. forma *borealis* Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 236 (1959).

エゾアブラガヤ。下部の湿地に生ず。

採集地。浮雲峠，馬川—白武洞，正嶺峠，扉峠。 分布。北，朝，満，ウスリー。

ARACEAE サトイモ科

Acorus L. ショウブ属

- { 葉の中央に中肋がある。花時の花序の長さは4~7cm.巾6~10mm.全体やや大きく葉は直立する……………ショウブ
葉にはほとんど中肋がない。花時の花序の長さは5~10cm.巾3~4mm.全体小形で葉は斜上，やや長刀状に曲る……………セキショウ

Acorus calamus L. var. *angustatus* Bess.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 260 (1959).

ショウブ。湿地に生ず。

採集地。城山(五峰)。 分布。北一九。朝，中国，東亜，シベリア。

Acorus gramineus Soland.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 260 (1959).

セキショウ。下部水辺に生ず。

採集地。山徳里。 分布。本一九，朝，中国，台，印度。

Arisaema Mart. テンナンショウ属

- { 花穂の先端附属物は鞭状に伸長し，葉は1枚で小葉は5~7枚，中央のものは小形……………
……………マイヅルテンナンショウ
{ 花穂の先端附属物はやや円筒状で先きは円い。葉は2枚……………コウライテンナンショウ

Arisaema angustatum Fr. et Sav. var. *peninsulae* Nakai—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 256 (1959).

コウライテンナンショウ。中腹以下の林地にまれに生ず。

採集地。白武洞，ウンボンモデミ，セコル山，碧松寺，三丁里，般若峰，臥雲。

分布。南千島一本，九，朝，満。

Arisaema heterophyllum Blume—Nakai, Fl. Kor. II, 271 (1911)—B. M. T. 43: 525 (1929)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 252 (1959).

マイヅルテンナンショウ。下部でまれに見る。

採集地。三丁里。 分布。本一九，朝，中国，台。

Pinellia Tenore ハンゲ属

Pinellia ternata Breitenbach—Nakai, Fl. Kor. II, 272 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 249 (1959).

カラスビシャク。下部路傍や畑地に生ず。

採集地。白武洞，昌元里，楸城里，臥雲，咸陽，艾嶺。

分布。北一九，朝，中国。

LEMNACEAE ウキクサ科

Lemna L. アオウキクサ属

Lemna paucicostata Hegelm.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 261 (1959).

アオウキクサ。水田に生ず。

採集地。白武洞。 分布。北一九，朝，広く熱帯に生ず。

Spirodela Schleid. ウキクサ属

Spirodela polyrhiza Schleid.—Nakai, Fl. Kor. II. 273 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 260 (1959).

ウキクサ。水田に生ず。

採集地。山徳里，白武洞。

分布。樺一九，朝，中国，シベリア，印度，マレーシア，アフリカ，オーストラリア，アメリカ，ヨーロッパ。

ERIOCAULACEAE ホシクサ科

Eriocaulon L. ホシクサ属

- | | | | |
|---|---|--|-----------|
| 1 | { | 花の諸部分は全く2数のみから成る。葉は線形，鋭尖頭，3～5脈，花茎は葉より長い | コイヌノヒゲ |
| | | 花は少なくとも1部分3数からなる | 2 |
| 2 | { | 雌花の萼片は離生，2～3，総苞片は萼より短かく萼は黒藍色，茎は殆んどない。花床に毛を密生，葉の巾1～2mm. | クロホシクサ |
| | | 雌花の萼片は3個癒合する。総苞は通常頭花より長い或は短い | 3 |
| 3 | { | 総苞片は狭披針形，頭花の2～3倍長，葉の長さ6～20cm. 巾3～4mm. | イヌノヒゲ |
| | | 総苞片は頭花より短かい。葉の長さ5～17cm. 巾5～8mm. | ヒロハノイヌノヒゲ |

Eriocaulon decemflorum Maxim.—Nakai, Fl. Kor. II, 282 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 263 (1959).

コイヌノヒゲ。下部水田に生ず。

採集地。雲峰，臥雲。 分布。本，九，朝，中国(?)。

Eriocaulon miquelianum Koern.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 266 (1959).

イヌノヒゲ。下部水田に生ず。

採集地。雲峰。 分布。本一九，朝。

Eriocaulon parvum Koern.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 264 (1959).

クロホシクサ。下部水田に生ず。

採集地。達宮。 分布。本一九，朝。

Eriocaulon robustius Makino—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 265 (1959).

ヒロハノイヌノヒゲ。下部水田に生ず。

採集地。達宮，雲峰。 分布。北一九，朝，満，シベリア。

COMMELINACEAE ツユクサ科

Aneilema R. Br. イボクサ属

Aneilema japonicum Kunth—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 269 (1959).

イボクサ. 下部の水田や溝に生ず。

採集地. 馬川—白武洞, 楸城里, 雲峰。

分布. 本—琉, 朝, 中国。

Commelina L. ツユクサ属

Commelina communis L.—Nakai, Fl. Kor. II, 264 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 269 (1959).

ツユクサ. 下部路傍, 畑地等に生ず。

採集地. 昌元里, 白武洞—馬川, 咸陽。

分布. 樺一九, 朝, 満, 中国, ウスリー。

備考. 全形やや繊細で葉の狭長なものを var. *angustifolia* Nakai, Fl. Kor. II, 265 (1911) ホソバツユクサという。下部路傍, 畑地等に普通。

採集地. 白武洞, 雲峰, 馬川, 悟道峠, 扉峠, 臥雲, 楸城里, 三峰山。 分布. 朝。

PONTEDERIACEAE ミズアオイ科

Monochoria Presl. ミズアオイ属

{ 茎高 30cm. 内外, 葉は心形, 花序は葉より長くぬき出で多数の花をつける。花は紫碧色

..... ミズアオイ

{ 茎高 10cm. 内外, 花序は葉よりも著しく短かく花数は少ない..... コナギ

Monochoria korsakowii Regel et Maack—Nakai, Fl. Kor. II, 263 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 270 (1959).

ミズアオイ. 池や水田に生ず。

採集地. 山徳里。

分布. 北一九, 朝, 中国, ウスリー。

Monochoria vaginalis Presl. var. *plantaginea* Solms. Laub.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 270 (1959).

コナギ. 下部水田に生ず。

採集地. 雲峰, 馬川。

分布. 本—台, 朝, 満, 中国, 印度, マレーシア。

JUNCACEAE イグサ科

Juncus L. イグサ属

1 { 茎は細長, 円柱形, 基部に鱗片状の葉がある..... 2

{ 茎は円柱形又は扁平。葉は扁平又は円柱形で先端は尖る。茎の基部の葉は長い..... 3

2 { 蒴果は3稜状楕円形..... イ

{ 蒴果は卵状球形..... ホソイ

3 { 茎は円柱形, 葉はやや円柱形, 先端尖る。雄蕊は3..... ホソバナコウガイゼキシウ

{ 茎は扁平, 葉も扁平..... 4

4 { 茎に翼がある..... ハナビゼキシウ

{ 茎に翼がない..... コウガイゼキシウ

Juncus alatus Fr. et Sav.—Nakai, Fl. Kor. II, 267 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 278 (1959).

ハナビゼキシウ. 下部路傍の湿地に生ず。

採集地. 馬川, 三丁里。

分布. 本—九, 朝, 中国。

Juncus effusus L. var. *decipiens* Buch.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 275 (1959).

イ. トウシンソウ. 各所の湿地に生ず。

採集地. 馬川—白武洞, 細石, 雲峰。

分布. 北一九, 朝, 中国, ウスリー, 北米。

Juncus leschenaultii Gay—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 278 (1959).

コウガイゼキショウ. 下部湿地に生ず。

採集地. 水落, 雲峰, 馬川一三丁里。

分布. 北一九, 朝, 中国, 台, 印度, カムチャッカ。

Juncus papillosus Fr. et Sav.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 278 (1959).

アオコウガイゼキショウ. 下部湿地に生ず。

採集地. 雲峰, 水落, 細石。

分布. 北一九, 朝, 中国, 東シベリア。

Juncus setchuensis Buch. var. **effusoides** Buch.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 276 (1959).

ホソイ. 下部路傍の湿地に生ず。

採集地. 馬川, 咸陽。

分布. 本一九, 朝, 中国。

Luzula DC. スズメノヤリ属

- {花序はやや球状に集合する……………スズメノヤリ
- {花序は短かい枝を出す。花は小球状に集団する……………ヤマスズメノヒエ
- {花序の枝は絲状, その先きに数個の花をつける……………スカボシソウ

Luzula capitata Miq.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 272 (1959).

スズメノヤリ. スズメノヒエ. 下部路傍, 草地に生ず。

採集地. 臥雲。

分布. 樺一九, 朝, 中国, 東シベリア, カムチャッカ。

Luzula multiflora Lejeune—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 272 (1959).

ヤマスズメノヒエ. 下部路傍, 草地, 疎林地等に生ず。

採集地. 雲峰。

分布. 樺一九, 朝, 中国, 北半球の温帯一般, オーストラリア。

Luzula plumosa E. Meyer var. **macrocarpa** Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 272 (1959).

ヌカボシソウ. クロボシソウ. ミヤマクロボシソウ. 山地に生ず。

採集地. 般若峰, 地藏堂, 蓮洞越。

分布. 北一九, 朝, 中国, アムール。

LILIACEAE ユリ科

Aletris L. ソクシンラン属

Aletris fauriei Lév.—Nakai, Rep. Veg. Mt. Chirisan 26 (1915).

チョウセンノギラン. 上部の草地に生ずる多年草で花序の部分はねばる。

採集地. 天王峰。

分布. 朝。

Allium L. ネギ属

- 1 {葉は広く中央部の巾約4cm. ……………ギョウジャニンニク
- 1 {葉は細く線形……………2
- 2 {花序に珠芽を多数生ず, 花は帯紅色, 茎の高さ50cm.内外……………チョウセンノビル
- 2 {花序に珠芽が出来ないかまれに数個を生ず……………3
- 3 {花は白色, 散梗は2cm.内外, 葉は鈍頭……………ニラ
- 3 {花は淡紅色又は紅紫色……………4
- 4 {花は淡紅色, まれに珠芽を生ず, 茎高50cm.内外, 散梗は1.5cm内外……………タカラッキョウ
- 4 {花は紅紫色, 茎高20~50cm. 散梗は通例0.5~1.0cm. ……………チョウセンヤマラッキョウ

Allium macrostemon Bunge—Nakai, Fl. Kor. II. 262 (1911)—Mori, Enum. Pl. Cor. 85 (1922).

チョウセンノビル. 路傍に生ず。

採集地. 徳洞, 三丁里, 臥雲, 浮雲峠。

分布. 朝, 満。

Allium ouensanense Nakai, in B. M. T. 27 : 215 (1913)—Mori, Enum. Pl. Cor. 85 (1922).

タカラッキョウ. 下部草地に生ず。

採集地. 徳田, 地藏堂—白武洞。 分布. 朝。

Allium sacculiferum Maxim.—Mori, Enum. Pl. Cor. 85 (1922).

チョウセンヤマラッキョウ. 主として上部草地に生ず。

採集地. 三峰山, 天王峰, 法華山, 正嶺峠, 五峰, 般若峰, 八郎峠。

分布. 朝, 満, 中国。

Allium tuberosum Rottl.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 302 (1959).

ニラ. 下部路傍に生じ臭気を有する多年草。

採集地. 水落, 伴仙洞。 分布. 本, 九, 朝, 中国, 印度, シベリア, ヨーロッパ。

Allium victorialis L. var. *platyphyllum* Makino—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 302 (1959).

ギョウジャニンニク. 強い臭気のある多年草で中腹の森林内の水辺に生ず。

採集地. ウンボンモデミ。 分布. 樺一本, 朝, 中国, 東シベリア, カムチャッカ。

Asparagus L. クサスギカズラ属

Asparagus schoberioides Kunth—Nakai, Fl. Kor. II. 242 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 312 (1959).

キジカクシ. 下部草地にまれに生ず。

採集地. 白武洞—馬川, 臥雲, 三丁里, 碧松寺, 五峰。

分布. 樺一九, 朝, 満, ダフリア, ウスリー, 台。

Clintonia Rafin. ツバメオモト属

Clintonia udensis Trautv. et Meyer—Nakai, Fl. Kor. II. 240 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 316 (1959).

ツバメオモト. 中腹以上の林内に生ず。

採集地. ウンボンモデミ, 馬巖—天王峰, 地藏堂, 般若峰。

分布. 樺一本, 朝, 満, 中国, 東シベリア。

Convallaria L. スズラン属

Convallaria keiskei Miq.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 319 (1959).

スズラン. キミカゲソウ. 下部草地, 低木林等に生ず。

採集地. 徳頭山下部, 月坪里。 分布. 樺一九, 朝, 中国, 東シベリア。

Disporum Salisb. チゴユリ属

- | | | | |
|---|---|---|------------|
| 1 | { | 葉は皆無柄, 基部は茎をいだく, 花は茎頂に 1~3 個, 果実ははじめ 3 稜角あるも熟せば卵形 | コングウソウ |
| | | となり黄赤色を呈す | |
| 2 | { | 葉は短柄を有す | 2 |
| | | | |
| 2 | { | 茎は無分岐か或は多少分岐する。茎高 30cm. 以下, 花卉は長さ 1cm. 以下 | チゴユリ |
| | | 茎は分岐し (まれに無分岐) 高さ 30~50cm. 花卉は長さ 1cm. 以上 | |
| 3 | { | 花卉は披針形, 長さ 1.5cm. 内外 | オオチゴユリ |
| | | 花卉はさじ形, 長さ 2~3.5cm. | |
| 4 | { | 葉の巾広く殆んど円形に近い広卵形, 先きは短かくとがる。花は帯黄色 | コガネハウチャクソウ |
| | | | |
| 4 | { | 葉は楕円形—広楕円形, 鋭頭, 花は帯緑白色 | ハウチャクソウ |
| | | | |

Disporum flavens Kitagawa, in B. M. T. 48 : 92 (1934).

コガネハウチャクソウ. 中腹以下の広葉樹林内にまれに生ず。

採集地. 白武洞, 三丁里, 徳洞。 分布. 朝, 満。

Disporum ovale Ohwi, in B. M. T. 48: 385 (1931).

コンゴウソウ. 中腹以上の林地特に針葉樹林内に生ずる多年草, 一見タケシマランに似ている。

採集地. 地藏堂—白武洞, 般若峰, 細石—碧宵嶺, 天王峰, 臥雲谷, ウンボンモデミ。

分布. 朝。

Disporum sessile Don—Ohwi, Fl. Jap. 3. ed. 318 (1959).

ハウチャクソウ. 中腹以下の林内に生ず。

採集地. 白武洞, 五峰, 三丁里。

分布. 樺—琉, 朝。

Disporum smilacinum A. Gray—Nakai, Fl. Kor. II. 245 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 318 (1959).

チゴユリ. 下部林地にまれに生ず。

採集地. 水落, 浮雲峠, 雲峰。

分布. 北—九, 朝。

Disporum viridescens Nakai, Fl. Kor. II. 246 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 318 (1959).

オオチゴユリ. アオチゴユリ. 中腹以下の林地に生ずる多年草で一見ハウチャクソウに似るが花はチゴユリのようなものである。

採集地. ウンボンモデミ, 三丁里, 白武洞, 五峰, 臥雲谷, 碧松寺, 浮雲峠, 般若峰, 徳洞。

分布. 本, 朝, 満, ウスリー。

Erythronium L. カタクリ属

Erythronium japonicum Decne.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 307 (1959).

カタクリ. 広葉樹林内にまれに生ず。

採集地. 臥雲谷, 地藏堂—白武洞, 雲峰。

分布. 北—四, 朝。

Heloniopsis A. Gray ショウジョウバカマ属

Heloniopsis orientalis C. Tanaka—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 285 (1959).

ショウジョウバカマ. 草原にまれに生ず。

採集地. 細石。

分布. 北, 本, 九, 朝。

Hemerocallis L. ワスレグサ属

- | | | |
|---|--|----------|
| | { 花序は通例短縮, 花筒長く, 花は黄色, 葯も黄色..... | チョウセンキスゲ |
| 1 | { 花序は2叉状に分岐す。葉の巾は広い..... | 2 |
| | { 花序は岐散状又はほぼ総状, 花筒長く花被は黄色, 葉の巾1cm. 内外..... | 3 |
| 2 | { 花被及び葯は紅色..... | ベニカンゾウ |
| | { 花被及び葯は橙色..... | ワスレグサ |
| 3 | { 葉の巾2~2.5cm. 花は小形, やや黄色, 花筒は1.5cm. 内外, 花被片は4cm. 内外..... | カンヨウキスゲ |
| | { 葉の巾2cm. 以下, 花は大きく花被片は6cm. 以上ある..... | 4 |
| 4 | { 葉の巾1cm. 内外, やや革質を帯び通例花茎より短い..... | ホソバキスゲ |
| | { 葉の巾1~2cm. やや柔軟, 通例花茎と同長..... | ハクウンキスゲ |

Hemerocallis aurantiaca Baker—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 299 (1959).

ワスレグサ. 下部草地に生ず, 逸出品かも知れぬ。

採集地. 咸陽。

分布. 中国, まれに栽培する。

Hemerocallis coreana Nakai, in B. M. T. 46: 123 (1932).

チョウセンキスゲ. 草地に生ず。

採集地. 三峰山, 白武洞。

分布. 朝, 満, 蒙。

Hemerocallis hakuunensis Nakai

ハクウンキスゲ. 草地に生ず。

採集地. ウンボンモデミ。 分布. 朝。

Hemerocallis longituba Miq.—Nakai, in B. M. T. 46 : 116 (1932)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 299 (1959).

ノカンゾウ. ベニカンゾウ, 草地, 荒地に生ず。

採集地. 雲峰, 三峰山。 分布. 本一台, 朝, 中国。

Hemerocallis micranthus Nakai

カンヨウキスゲ. 下部人家附近に生ず。

採集地. 咸陽。 分布. 朝。

Hemerocallis minor Mill.—Nakai, Fl. Kor. II. 252 (1911)—B. M. T. 46 : 120 (1932).

ホソバキスゲ. 草原となつた河原に生ず。

採集地. 馬川, 三峰山下部, 悟道峠。

分布. 朝, 満, 中国北部, ウスリー, 東部シベリア。

Hosta Trattin. ギボウシ属

葉身は卵形, 卵状心形又は円心形, 長柄を有す……………イワギボウシ
葉身は細長くへら形で葉柄に流れる……………ミズギボウシ

Hosta longissima Honda var. **brevifolia** F. Maekawa—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 294 (1959).

ミズギボウシ. サジギボウシ. 下部河岸に生ず。

採集地. 馬川。 分布. 本, 朝。

Hosta longipes Matsum.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 395 (1959).

イワギボウシ. 主として中腹以下の谷間に生ず。花は淡紫を帯びまれに純白色のものがある。

採集地. 上峰谷, 地藏堂—白武洞, 霊源寺, 馬巖—天王峰, 艾嶺—馬巖, 三峰山, 臥雲谷。

分布. 本, 九, 朝。

Lilium L. ユリ属

- | | | | |
|---|---|--|---------------------|
| 1 | { | 葉は輪生状に集つて生じ, やや倒披針形…………… | 2 |
| | | 葉は互生する…………… | 3 |
| 2 | { | 花は上を向く…………… | チ ョ ウ セ ン カ サ ユ リ |
| | | 花は横を向く…………… | チ ョ ウ セ ン ク ル マ ユ リ |
| 3 | { | 葉腋に珠芽を生ず, 花は大, 葉は披針形, 茎に白軟毛を生ず…………… | オ ニ ユ リ |
| | | 珠芽を生じない…………… | 4 |
| 4 | { | 茎や葉に短毛がある。花は横又は下を向き花被片はそりかえる。葉は披針形又は線状披針形…………… | コ マ ユ リ |
| | | 茎や葉は無毛, 花は上向, 花被片はそりかえられない。葉は線状披針形…………… | ア カ ヒ メ ユ リ |

Lilium amabile Palib.—Nakai, Fl. Kor. II. 258 (1911).

コマユリ. 下部草原に生ず。

採集地. 臥雲, 三峰山, 碧松寺—艾嶺, 正嶺峠, 江清里, 白武洞, 楸城里, 三丁里。

分布. 朝鮮。

Lilium concolor Salisb. var. **pulchellum** Elwes.—Nakai, Fl. Kor. II. 259 (1911).

アカヒメユリ. 下部草地に生ず。

採集地. 三峰山, 白武洞—馬川, 三丁里。

分布. 朝, 満, 中国北部, アムール, ダフリア。

Lilium distichum Nakai in B. M. T. 31: 6 (1917).

チョウセンクルマユリ. タチクルマユリ. 中腹以上の草地, 林間に生ず。

採集地. 九竜里—碧松寺, 中峰, 上峰谷, 智異登山道。 分布. 朝。

Lilium lancifolium Thunb.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 306 (1959).

オニユリ. 下部原野に生じ且つ栽培される。

採集地. 白武洞, 三丁里, 楸城里。 分布. 北一九, 朝, 中国。

Lilium tsingtauense Gilg.—Nakai in B. M. T. 31: 8 (1917).

チョウセンカサユリ. 中腹以下の原野, 疎林地に生ず。

採集地. 三丁里, 八郎峠, 馬巖, 三峰山, 城山, 悟道峠, 山徳里, 高基里, 地藏堂。

分布. 朝, 中国。

Liriope Lour. ヤブラン属

Liriope platyphylla Wang et Tang—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 322 (1959).

ヤブラン. 下部路傍に生ず。

採集地. 馬川—白武洞, 扉峠, 楸城里, 咸陽, 法華寺, 九竜里—碧松寺。

分布. 本一台, 朝, 中国。

Lloydia Salisb. チシマアマナ属

Lloydia triflora Baker—Nakai, Fl. Kor. II. 255 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 308 (1959).

ホソバナアマナ. 中腹以下の林縁にまれに生じ高さ 15cm. 内外になる。

採集地. 白武洞, 雲峰。

分布. 樺一九, 朝, 中国北部, ウスリー, シベリア, カムチャッカ。

Maianthemum Weber. マイズルソウ属

{ 全体無毛, 葉縁の細胞は鋸歯状ではない。小花梗はやや太く少し短かい……………マイズルソウ
 { 有毛, 葉の基部には特に毛がある。葉縁の細胞は鋸歯状にならぶ, 小花梗は細くやや長い……………ヒメマイズルソウ

Maianthemum bifolium F. W. Schmidt—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 317 (1959).

ヒメマイズルソウ. 中腹以上の林内に生ず。

採集地. 地藏堂—細石, 天王峰—地藏堂, 般若峰。

分布. 北, 本, 朝, 北半球の温帯北部及び亜寒帯。

Maianthemum dilatatum Nels. et Macbr.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 317 (1959).

マイズルソウ. 中腹以上の林地に生ず。

採集地. ウンボンモデミ, 細石。

分布. 樺一九, 朝, 満, 東シベリア, カムチャッカ, 北米。

Paris L. ツクバネソウ属

Paris verticillata M. v. Bieb.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 320 (1959).

クルマバツクバネソウ. 中腹以上の林地に生ず。葉は通常 8 片の輪生。

採集地. 三峰山, 艾嶺—馬巖—天王峰, 地藏堂, 雲峰, 細石, セコル山, 臥雲谷, 般若峰。

分布. 樺一九, 朝, 中国, シベリア。

Polygonatum Adans. アマドコロ属

1 { 花梗に苞がない……………2
 { 花梗には明らかに苞がある……………3

- 2 { 茎は有稜，花は鐘形白色，花糸は無毛……………アマドコロ
 { 茎は円く花は鐘形白色，花糸は多細胞の長軟毛を密生する……………チョウセンナルコユリ
- 3 { 苞は膜質で1脈，小花梗と同長又は少し短かい，花は緑色，花筒内面に毛がある。葉は卵状楕
 { 円形……………ミドリヨウラク
 { 葉は広楕円形—円状卵形……………マルバミドリヨウラク
 { 苞は卵形やや葉質で数脈，小梗よりも著しく長い……………ワニグチソウ

Polygonatum inflatum Komar.—Nakai, Fl. Kor. II. 248 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 314 (1959).

ミドリヨウラク. 中腹以下の樹陰地にまれに生ず。

採集地. 臥雲，上峰谷，白武洞，細石，三峰山，達宮。 分布. 九，朝，満。

var. **rotundifolium** Hatusima, Rep. Pl. Nansen Exp. Forest Kyushu Imp. Univ. 232 (1934).

マルバミドリヨウラク. 中腹以下の林地に生ず。

採集地. 徳洞，般若峰中腹，臥雲谷。 分布. 朝。

Polygonatum involucreatum Maxim.—Nakai, Fl. Kor. II 249 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 315 (1959).

ワニグチソウ. 下部原野にまれに生ず。

採集地. 三丁里，セコル山。 分布. 北一九，朝，満，ウスリー。

Polygonatum lasianthum Maxim. var. **coreanum** Nakai, Rep. Veg. Mt. Chirisan 26 (1915)—Mori, Enum. Pl. Cor. 92 (1922).

チョウセンナルコユリ. 各所の林地に生ず。

採集地. 臥雲，般若峰，浮雲峠，扉峠，三丁里，白武洞—地藏堂，馬川，三峰山，上峰谷，碧松寺。
 分布. 朝。

Polygonatum odoratum Druce var. **pluriflorum** Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 313 (1959).

アマドコロ. 中腹以下の林地や草原に生ず。

採集地. 浮雲峠，雲峰，白武洞，三峰山，碧松寺，ウンボンモデミ，扉峠—馬巖。

分布. 北一九，朝，中国。

Scilla L. ツルボ属

Scilla scilloides Druce—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 310 (1959).

ツルボ. 下部畦畔，路傍，草地等に生ず。

採集地. 伴仙洞，馬川—白武洞，水落，雲峰，五峰，悟道峠。

分布. 北一台，朝，満，中国，ウスリー。

Smilacina Desf. ユキザサ属

{ 全体ほとんど無毛である……………エビチャザサ

{ 全体有毛，茎の上部には粗毛がある……………ユキザサ

Smilacina bicolor Nakai, Fedde, Rep. 13. 247 (1914)—Rep. Veg. Mt. Chirisan 26 (1915).

エビチャザサ. 中腹以上の林地に生ず。

採集地. ウンボンモデミ，地藏堂，細石，馬巖—天王峰，白武洞，臥雲谷，般若峰。

分布. 朝。

Smilacina japonica A. Gray—Nakai, Fl. Kor. II, 243 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 316 (1959).

ユキザサ. 中腹以上の林地に生ず。

採集地. ウンボンモデミ，地藏堂—細石—碧宵嶺，智異登山道，臥雲谷，般若峰。

分布. 北一九, 朝, 満, 中国, ウスリー, アムール。

Smilax L. シオデ属

- | | | | |
|---|---|---|---------|
| 1 | { | 草本, 無刺, 葉は草質…………… | 2 |
| | | 木本, 有刺, 葉は硬い…………… | 3 |
| 2 | { | 葉は卵形又は卵状長楕円形, 基部は通例心形, 花は蔓の中部以上につく…………… | シオデ |
| | | 葉は卵状長楕円形—卵形, 基部は円形又は切形を常とす。花は茎の基部に生ず…………… | タチシオデ |
| 3 | { | 茎に細い針を多数生ず。果実は黒い…………… | ヤマカシュウ |
| | | 茎には鋭い鉤刺を生ず。刺の基部は太まる。果実は橙赤色に熟す…………… | サルトリイバラ |

Smilax china L.—Nakai, Fl. Kor. II, 237 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 325 (1959).

サルトリイバラ. 下部林地に生ず。

採集地. 知安峠, 雲峰。 分布. 北一九, 朝, 中国。

Smilax nipponica Miq.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 324 (1959).

タチシオデ. 下部林地にまれに生ず。

採集地. 白武洞, 三峰山, 三丁里, 雲峰。 分布. 本一九, 朝, 中国。

Smilax oldhami Miq.—Nakai, Fl. Kor. II, 238 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 325 (1959).

シオデ. 下部の低木林や林縁に生ず。

採集地. 上林, 三丁里, 江清里, 楸城里。 分布. 北一九, 朝。

Smilax sieboldi Miq.—Nakai, Fl. Kor. II, 237 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 326 (1959).

ヤマカシュウ. 下部の低木林, 林地, 林縁等に生ず。

採集地. 水落, 白武洞, 三峰山, 浮雲峠, 三丁里, 九竜里—碧松寺, 咸陽。

分布. 本一九, 朝, 中国。

Tricyrtis Wall. ホトトギス属

Tricyrtis dilatata Nakai, Fedde, Rep. 13, 248 (1914)—B. M. T. 44 : (39) (1930)—Mori, Enum. Pl. Cor. 95 (1922).

チョウセンホトトギス. 下部林縁に生ずる多年草で高さ 40~100cm. となり直立し葉は大きく広卵形, 急に先きはとがり柄は短かい。両面共に粗毛を生ず。花は腋出又は頂生, 腺毛を布く。

採集地. 三丁里, 浮雲里, 八郎峠, 正嶺峠。 分布. 朝。

Veratrum L. シュロソウ属

- | | | | |
|---|---|--|------------|
| 1 | { | 全体大形, 小梗は花被片より短かい。花は緑白色, 葉は広楕円形—卵状楕円形, 下面有毛…………… | バイケイソウ |
| | | 全体やや小形, 小梗は花被片より長いか或は同長, 花は暗紫褐色…………… | 2 |
| 2 | { | 葉は長楕円状披針形, 巾 3~5cm.…………… | チョウセンシュロソウ |
| | | 葉は線形, 巾 1~2.5cm.…………… | ナガバシシュロソウ |

Veratrum grandiflorum Loesen. fil.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 287 (1959).

バイケイソウ. 上部の湿潤な原野又は樹陰地に生ず。

採集地. 地藏堂, 細石, 天王峰, 般若峰。 分布. 北, 本, 朝。

Veratrum maackii Regel.—Mori, Enum. Pl. Cor. 95 (1922)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 288 (1959).

ナガバシシュロソウ. ホソバシシュロソウ. 中腹の原野又は林地にまれに生ず。

採集地. 馬巖, ウンボンモデミ。 分布. 本一九, 朝。

Veratrum nigrum L.—Mori, Enum. Pl. Cor. 96 (1922).

チウセンシュロソウ. 上部の原野に普通。

採集地. 三峰山, ウンボンモデミ, 細石—碧宵嶺, 般若峰。

分布. 朝, 満, 中国北部, シベリア。

DIOSCOREACEAE ヤマノイモ科

Dioscorea L. ヤマノイモ属

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | { | 葉は対生, 卵形或は卵状楕円形, 心脚, 葉腋にムカゴを生ず……………ナガイモ | |
| | | 葉は互生, 掌状裂, ムカゴを生じない……………2 | |
| 2 | { | 裂片は通例7~11, 鋭頭, 最も側方のものは鈍頭, ややシワ質で両面に粗毛がある。種子の翼は1方にのみある……………ウチワドコロ | |
| | | 裂片は5~7, 中央裂片を除き皆鈍頭, シワなく毛は少ない。種子の翼はその全周にある……………カエデドコロ | |

Dioscorea batatas Decne.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 330 (1959).

ナガイモ. 下部疎林地に生ず。

採集地. 白武洞, 三丁里, 九竜里—碧松寺, 徳田, 達宮, 咸陽。

分布. 北—九. 朝, 中国, 台。

Dioscorea nipponica Makino—Nakai, Fl. Kor. II, 235 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 331 (1959).

ウチワドコロ. 中腹以下の林地に生ず。

採集地. 霊源寺—臥雲, 般若峰, 細石—碧宵嶺, 白武洞, ウンボンモデミ, 悟道峠。

分布. 北, 本, 朝, 中国。

Dioscorea quinqueloba Thunb.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 331 (1959).

カエデドコロ. 各所の疎林地, 林縁, 低木林等に生ず。

採集地. 義灘里, 碧松寺, 犀峠。 分布. 本—琉, 朝, 中国。

IRIDACEAE アヤメ科

Iris L. アヤメ属

- | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|
| 1 | { | 葉の中肋は著しい。花は大, 美しい……………ノハナショウブ | |
| | | 葉の中肋は不明……………2 | |
| 2 | { | 花茎は葉よりも長い。葉の巾5~12mm.……………アヤメ | |
| | | 花茎は細く短い。葉の巾2~5mm.……………エヒメアヤメ | |

Iris ensata Thunb. var. *spontanea* Nakai, Veg. Mt. Apoi 78 (1930)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 333 (1959).

ノハナショウブ. 下部の湿潤な草地に生ず。

採集地. 月坪里, 山徳里, 三峰山, 法華山。

分布. 北, 本, 九, 朝, 満, 東シベリア。

Iris rossii Baker.—Nakai, Fl. Kor. II, 232 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 332 (1959).

エヒメアヤメ. 下部草地にまれに生ず。

採集地. 雲峰。

分布. 本—九, 朝, 満, 中国北部。

Iris sanguinea Hornem.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 333 (1959).

アヤメ. 中腹以下の草地に生ず。

採集地. 三丁里, 三峰山, 浮雲峠。

分布. 北, 本, 九, 朝, 東シベリア。

ORCHIDACEAE ラン科

Amitostigma Schltr. ヒナラン属

Amitostigma gracile Schltr.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 348 (1959).

ヒナラン. 中腹以下の岩の間等にまれに生ずる高さ5~15cm.の小草で1枚の葉がある。

採集地. 三峰山, セコル山, 白武洞。 分布. 本一九, 朝。

Cephalanthera L. C. Richard. キンラン属

Cephalanthera longibracteata Blume—Nakai, Fl. Kor. II, 222 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 361 (1959).

ササバギンラン. 主として中腹以上の林地や林縁に生ず。

採集地. 霊源寺, ウンボンモデミ, 白武洞, 智異登山道, 上峰谷, 臥雲, 般若峰, セコル山, 細石, 碧松寺。 分布. 北一九, 朝。

Cypripedium L. アツモリソウ属

Cypripedium macranthum Sw.—Nakai, Fl. Kor. II, 229 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 342 (1959).

アツモリソウ. 中腹の疎林地にまれに生ず。

採集地. 浮雲峠, 般若峰, セコル山, 白武洞, ウンボンモデミ, 細石。

分布. 北, 本, 朝, 満, 中国北部, シベリア, カムチャッカ, 欧露。

Epipactis R. Br. カキラン属

Epipactis thunbergii A. Gray—Nakai, Fl. Kor. II, 222 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 361 (1959).

カキラン. スズラン. 下部河岸の草地や谷間の陽地にまれに生ず。

採集地. 三峰山, 伴仙洞, 馬川。 分布. 北一九, 朝, 満, ウスリー。

Gastrodia R. Br. オニノヤガラ属

Gastrodia elata Blume—Nakai, Fl. Kor. II, 228 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 359 (1959).

オニノヤガラ. 中腹以下の林地にまれに生ずる寄生草。

採集地. 霊源寺, セコル山, 艾嶺—馬巖。 分布. 北, 本, 朝, 中国, 台。

Habenaria Willd. ミズトンボ属

Habenaria linearifolia Maxim.—Mak. et Nem., Fl. Jap. 1651 (1931)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 343 (1959).

サワトンボ. 下部草地にまれに生ず。葉は線状で距は長く彎曲する。

採集地. コレボン。 分布. 北, 本, 朝, 満, ウスリー, アムール。

Liparis L. C. Rich. クモキリソウ属

Liparis japonica Maxim.—Nakai, Fl. Kor. II, 224 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 379 (1959).

セイタカスズムシソウ. 中腹以下の林地に生ず。

採集地. 三峰山, 白武洞, 上峰谷, 臥雲, 三丁里, 霊源寺。

分布. 北一九, 朝, 満, アムール。

Orchis L. ハクサンチドリ属

Orchis cyclochila Maxim.—Nakai, Fl. Kor. II, 223 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 346 (1959).

カモメラン．中腹以上の林地又は低木林の間等にやや群落をなして生ず。

採集地．般若峰，蓮洞越，達宮，ウンボンモデミ，細石，地藏堂。

分布．北，本，四，朝，ウスリー。

var. *albiflora* Hatusima, Rep. Fl. Pl. Nansen Exp. Forest Kyushu Imp. Univ. no. 5, 239 (1934).

シロバナカモメラン．

採集地．天王峰。 分布．朝。

Oreorchis Lindl. コケイラン属

Oreorchis patens Lindl.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 384 (1959).

コケイラン．ヒメケイラン．中腹のチョウセンミズナラ林内にまれに生ず。

採集地．般若峰—老姑壇。 分布．樺一九，朝，中国，ウスリー，カムチャッカ。

Platanthera L. C. Rich. ツレサギソウ属

葉は長楕円形又は狭長楕円形，やや鈍頭，長さ7~12cm. 巾2.5~3.5cm.……オオバノトンボソウ

葉は長楕円形又は楕円形，鋭頭又は鈍頭，長さ13~17cm. 巾3.5~7cm.……コウライチドリ

Platanthera chloranthella Nakai, Rep. Veg. Exp. Forest Koryo, Chosen 28 (1932)—F.

Maekawa, J. J. B. 11: 302 (1935).

コウライチドリ．中腹以上の林地に生ず。

採集地．地藏堂—白武洞，臥雲，細石，般若峰，セコル山，三峰山。

分布．朝，満。

? *Platanthera minor* Reichb. f.—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 354 (1959).

オオバノトンボソウ?

採集地．細石，伴仙洞。

分布．本一九，朝。

Pogonia Juss. トキソウ属

Pogonia japonica Reichb. f.—Nakai, Fl. Kor. II, 227 (1911)—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 358 (1959).

トキソウ．中腹以下の水湿地にまれに生ず。

採集地．浮雲峠，山德里。

分布．北一九，朝，中国。

Spiranthes L. C. Rich. ネジバナ属

Spiranthes sinensis Ames—Ohwi, Fl. Jap. 3 ed. 364 (1959).

ネジバナ．モジズリ．下部草地にまれに生ず。

採集地．九竜里—碧松寺，浮雲峠，山德里，月坪里，楸城里。

分布．樺一台，朝，満，中国，シベリア，印度，マレーシア，オーストラリア。

主なる参考文献

- 植物学雑誌. (B. M. T.)
 植物研究雑誌. (J. J. B.)
 植物分類地理. (A. P. G.)
 T. Nakai : Flora Koreana I-II, (1909, 1911)
 T. Nakai : Polygonaceae Koreanae (1908)
 T. Nakai : Caprifoliacearum Japonicarum (1921)
 T. Nakai : 智異山植物調査報告 Vegetation of the Mt. Chirisan (1915)
 T. Nakai : 朝鮮森林植物編 Flora Sylvatica Koreana 1-22, (1915-1939)
 T. Nakai : 萩類の研究 Lespedeza of Japan and Korea (1927)
 中井猛之進, 小泉源一 : 大日本樹木誌 Trees and Shrubs Indigenous in Japan Proper (1927)
 中井猛之進, 北川政夫 : 熱河省産新植物 Plantae Novae Jeholensis (1934)
 中井猛之進, 本田正次, 北川政夫 : 満州植物誌料 Contributio ad Cognitionem Florae Manchuriaie (1935)
 中井猛之進, 本田正次, 佐竹義輔, 北川政夫 : 熱河省ニ自生スル高等植物目録 Index Florae Jeholensis (1936)
 初島住彦 : 南鮮演習林植物調査 (予報) Preliminary Report of the Flowering Plants and Ferns (1934)
 T. Mori : An Enumeration of Plants from Corea (1921)
 コマロフ : 満州植物誌 (満鉄編 1-7 卷 1927-1933)
 三浦道哉 : 満州植物誌, 第二輯 荳科 (1926)
 山蔦一海 : 満州植物目録 A List of the Manchurian Plants (1930)
 牧野富太郎, 根本莞爾 : 日本植物総覧 Flora of Japan (1931)
 大井次三郎 : 日本植物誌 Flora of Japan (1953)
 大井次三郎 : Cyperaceae Japonicae I-II (1936, 1944)
 北村四郎 : 原色日本植物図鑑 Coloured Illustrations of Herbaceous Plants of Japan (1957)
 北村四郎 : Compositae Japonicae 1-6, (1937-1957)
 田川基二 : 原色日本羊歯植物図鑑 Coloured Illustrations of the Japanese Pteridophyta (1959)
 岡本省吾 : 原色日本樹木図鑑 Coloured Illustrations of Trees and Shrubs of Japan (1958)
 原 寛 : 日本植物誌 No. 3 ユキノシタ科 Nova Flora Japonica (Saxifragaceae) (1939)
 原 寛 : 日本種子植物集覧 1-3 冊 Enumeration Spermatophytarum Japonicarum (1948-1954)
 G. Koidzumi : Conspectus Rosacearum Japonicarum (1913)
 宮部金吾, 三宅勉 : 樺太植物誌 Flora of Saghalin (1915)
 工藤祐舜 : 北樺太植物調査書 (1924)
 K. Miyabe and Y. Kudo : Flora of Hokkaido and Saghalien (1930-1934)
 A. Rehder : Bibliography of Cultivated Trees and Shrubs Hardy in the cooler temperate regions of the northern hemisphere (1949)
 A. Rehder : Manual of Cultivated Trees and Shrubs Hardy in North America. (1954)
 E. Hulten : Flora of Kamtschatka and the adjacent Islands (1927-1930)
 C. K. Schneider : Handbuch der Laubholzkunde I-II, (1904, 1912)
 L. Dippel : Handbuch der Laubholzkunde I-III, (1889-1893)

学名索引

【A】

- Abies*18
holophylla18
koreana18
Acalypha69
australis69
Acanthaceae110
Acanthopanax85
chiisanense85
senticosus85
Acer73
barbinervis73
var. glabrescens73
ginnala73
mandshuricum74
mono74
var. ambiguum74
pseudo-sieboldianum74
tegmentosum74
triflorum74
tschonoskii74
ukurunduense74
Aceraceae73
Achillea119
sibirica119
var. discoidea119
Achnatherum134
pekinensis134
Achyranthes34
japonica34
Aconitum38
austro-koreense38
chiisanense38
ciliare38
koreanum38
longecassidatum38
pseudo-laeve39
uchiyamai38
var. dissectum39
Acorus149
calamus
var. angustatus149
gramineus149
Actaea39
asiatica39
Actinidia78
arguta78
kolomikta79
polygama79
Actinidiaceae78
Adenocaulon119
himalaicum120
Adenophora117
divaricata118
palustris118
remotiflora118
forma angustifolia118
triphylla118
forma lancifolia118
Agastache100
rugosa100
forma albiflora100
Agrimonia55
pilosa55
Agropyron134
ciliare
var. minus134
var. pilosum134
tsukushiense
var. transiens134
Agrostis134
clavata134
divaricatissima134
flaccida134
palustris135
Ainsliaea120
acerifolia
var. subapoda120
Aizoaceae35
Ajuga100
decumbens100
Akebia43
quinata43
Alangiaceae83
Alangium83
platanifolium
var. macrophyllum83
var. platanifolium83
Albizzia60
julibrissin60
Aletris152
fauriei152
Alismataceae133
Allium152
macrostemon152
ouensanensis153
sacculiferum153
tuberosum153
victoralis
var. platyphyllum153
Alnus20
japonica21
hirsuta21
var. sibirica21
Alopecurus135
aequalis135
Amaranthaceae34
Amaranthus34
ascendens34
Amethystea100
caerulea100
Amitostigma160
gracile160
Ampelopsis76
brevipedunculata
var. maximowiczii76
Amphicarpaea60
edgeworthii
var. trisperma60
Amygdaloideae59
Anacardiaceae70
Andropogon135
brevifolius135
Androsace92
filiformis92
umbellata92
Aneilema150
japonicum151
Anemone39
hepatica
var. japonica
forma nipponica39
raddeana39
Angelica86
anomala86
cartilagino-marginata86
dahurica86
decursiva86
gigas86
polymorpha87
tenuissima87
Anthriscus87
nemorosa87
Aphananthe25
aspera25
Aquifoliaceae70
Arabis45
columnalis46
gemmifera46
glabra46
glauca46
hirsuta46
Araceae149
Aralia85
cordata85
elata85
Araliaceae85

- ciliato-marginata143
 dickinsii143
 erythrobasis143
 fernaldiana143
 filipes143
 forficula143
 fusanensis143
 gibba144
 glabrescens144
 hakonensis144
 heterolepis144
 humilis
 var. nana144
 jaluensis144
 japonica144
 laevis144
 lanceolata144
 leiorhyncha144
 ligulata
 var. austrokorensis144
 maximowiczii144
 mira145
 nervata145
 neurocarpa145
 okamotoi145
 parciflora
 var. macroglossa145
 peiktusani145
 planiculmis145
 polyschoena145
 sabyensis145
 var. leiosperma145
 var. rostrata145
 siderosticta145
 tegulata145
 tenuiformis
 var. neo-filipes146
 Carpesium123
 arbotanoides123
 cernuum123
 divaricatum123
 glossophylloides123
 triste123
 Carpinus22
 cordata22
 fargesiana22
 laxiflora22
 var. macrophylla22
 tschonoskii22
 var. eximia22
 Caryophyllaceae35
 Caryopteris100
 divaricata100
 Cassia60
 nomame60
 Castanea23
 bungeana23
 Caulophyllum43
 robustum43
 Celastraceae71
 Celastrus71
 flagellaris71
 insularis71
 orbiculatus71
 Celtis25
 jessoensis25
 sinensis
 var. japonica25
 forma rotundata25
 Centipeda123
 minima123
 Cephalanthera160
 longibracteata160
 Cephalonoplos124
 segetum124
 Cephalotaxaceae17
 Cephalotaxus17
 koreana17
 Cerastium35
 caespitosum35
 Ceratophyllaceae37
 Ceratophyllum37
 demersum37
 Cercis60
 chinensis61
 Chelidonium45
 hylomeconoides45
 majus
 var. asiaticum45
 Chenopodiaceae34
 Chenopodium34
 album34
 ficifolium34
 koraiense34
 Chionanthus94
 retusus94
 Chloranthaceae19
 Chloranthus19
 japonicus19
 Chrysanthemum124
 boreale124
 zawadskii124
 Chrysosplenium50
 baicalense50
 flagelliferum50
 pilosum50
 Cimicifuga39
 dahurica39
 heracleifolia40
 simplex40
 Cinna136
 latifolia136
 Circaea83
 alpina83
 cordata83
 erubescens83
 mollis83
 Cirsium124
 chanroenicum124
 maackii124
 setidens124
 Cleistogenes136
 hackelii136
 var. nakaii136
 Clematis40
 apiifolia40
 brachyura40
 komarovii40
 maximowicziana41
 patens41
 trichotoma41
 urticifolia41
 forma rosea41
 Clerodendron100
 trichotomum100
 Clinopodium100
 chinense100
 var. shibetschense100
 var. glabrescens101
 Clintonia153
 udensis153
 Cocculus43
 trilobus43
 Codonopsis118
 lanceolata118
 Commelina151
 communis151
 var. angustifolia151
 Commelinaceae150
 Compositae119
 Convallaria153
 keiskei153
 Convolvulaceae98
 Corchoropsis77
 psilocarpa77
 tomentosa77
 Cornopteris13
 coreana13
 Cornaceae90
 Cornus90
 brachypoda90
 controversa90
 coreana90
 kousa90
 Corydalis45
 ochotensis45
 speciosa45
 turtshianovii45

Corylopsis	52
gotoana	52
Corylus	22
heterophylla	23
sieboldiana	23
var. mandshurica	23
var. mitis	23
Crassulaceae	48
Crotalaria	61
sessiliflora	61
Cruciferae	45
Crypsinus	16
hastatus	16
Cryptotaenia	87
japonica	87
Cucubalus	35
baccifer	35
Cucurbitaceae	117
Cudrania	26
tricuspidata	26
Cupressaceae	18
Cuscuta	98
australis	98
japonica	98
Cymbopogon	136
tortilis	136
Cynanchum	97
ascyrfolium	97
atratum	98
wilfordi	98
Cyperaceae	142
Cyperus	146
amuricus	146
difformis	146
globosus	146
hakonensis	146
iria	146
iwaskii	147
microiria	147
nipponicus	147
orthostachyus	147
sanguinolentus	147
serotinus	147
setiformis	147
Cypripedium	160
macranthum	160

【D】

Daphne	82
kamtschatica	82
Datula	105
metel	105
Daucus	87
carota	87
Davallia	11

mariesii	11
Davalliaceae	11
Denstaedtia	11
hirsuta	11
wilfordii	11
Descurainia	47
sophia	47
Desmodium	61
oldhamii	61
racemosum	61
var. mandshuricum	61
var. villosum	61
Deutzia	50
coreana var. tozawae	50
var. triradiata	50
glabrata	51
parviflora	51
Dianthus	35
chinensis	36
superbus	36
var. longicalycinus	36
Diarrhena	136
fauriei	136
Dicentra	45
spectabilis	45
Dictamnus	69
albus	69
Diervilla subsessilis	116
Digitaria	137
adscendens	137
violascens	137
Dimeria	137
ornithopoda	137
var. tenera	137
Dioscorea	159
batatas	159
nipponica	159
quinqueloba	159
Dioscoreaceae	159
Diospyros	93
kaki	93
lotus	93
Disporum	153
flavens	153
ovale	154
sessile	154
smilacinum	154
viridescens	154
Dontostemon	47
dentatus	47
Draba	47
nemorosa	47
var. hebecarpa	47
var. leiocarpa	47
Dryopteris	13
austriaca	14

chinensis	14
crassirrhizoma	14
lacera	14
monticola	14
tokyoensis	14
varia	14
Duchesnea	55
indica	55
major	56

【E】

Ebenaceae	93
Echinochloa	137
crus-galli	137
var. caudata	137
Echinops	124
setifer	124
Eclipta	124
prostrata	124
Elaeagnaceae	82
Elaeagnus	82
umbellata	82
Elatinaceae	80
Elatine	80
triandra	80
Eleocharis	147
acicularis	147
var. longiseta	147
mamillata	147
wichurai	147
Elsholtzia	101
ciliata	101
oldhami	101
splendens	101
Epilobium	84
cephalostigma	84
glandulosum	84
hirsutum	84
var. villosum	84
montanum	84
pyrricholophum	84
Epipactis	160
thunbergii	160
Equisetaceae	10
Equisetum	10
arvense	10
Eragrostis	137
ferruginea	137
megastachys	137
multicaulis	137
pilosa	137
Ericaceae	91
Erigeron	125
annuus	125
canadensis	125

Eriocaulaceae	150
Eriocaulon	150
decemflorum	150
miquelianum	150
parvum	150
robustus	150
Eriochloa	138
villosa	138
Erythronium	154
japonicum	154
Euonymus	71
alatus	71
forma pilosus	71
forma subtriflorus	71
forma apterus	71
bungeana	72
maackii	72
macropterus	72
oxyphyllus	72
pauciflorus	72
planipes	72
sieboldianus	72
Eupatorium	125
chinense	
var. simplicifolium	125
lindleyanum	125
Euphrasia	106
maximowiczii	106
Euphorbia	69
pseudochamaesyce	69
supina	69
Euphorbiaceae	69
Evodia	68
daniellii	68

【F】

Fagaceae	23
Fatoua	27
villosa	27
Festuca	138
extremiorientalis	138
ovina	
var. ovina	138
parvigluma	138
Filipendula	56
glaberrima	56
formosa	56
Fimbristylis	147
autumnalis	148
dichotoma	148
miliacea	148
squarrosa	148
subbispicata	148
Fraxinus	94
chiisanensis	94

var. stenophylla	95
lanuginosa	
var. serrata	95
mandshurica	95
rhynchophylla	95
sieboldiana	95

【G】

Galium	111
aparine	112
gracile	112
gracilens	111
kamtschaticum	
forma intermedium	111
koreanum	111
paradoxum	111
pogonanthum	112
pseudo-asprellum	112
setuliflorum	112
spurium	
var. echinospermon	112
trachyspermum	112
verum	112
Gastrodia	160
elata	160
Gentiana	96
scabra	97
var. orientalis	97
squarrosa	97
triflora	
var. coreana	97
zollingeri	97
Gentianaceae	96
Geraniaceae	67
Geranium	67
koreanum	67
nepalense	67
sibiricum	67
wilfordii	67
Geum	56
aleppicum	56
Girardinia	28
cuspidata	28
Gleditsia	61
koraiensis	61
Glyceria	138
ischyroneura	138
leptolepis	138
Glycine	61
soja	61
Gnaphalium	125
affine	125
japonicum	125
uliginosum	125
Gonocormus	10

minutus	10
Gramineae	134
Guttiferae	79
Gymnaster	126
koraiensis	126
Gynostemma	117
pentaphyllum	117

【H】

Habenaria	160
linearifolia	160
Haloragaceae	84
Haloragis	84
micrantha	85
Hamamelidaceae	52
Heloniopsis	154
orientalis	154
Hemarthria	138
sibirica	138
Hemerocallis	154
aurantiaca	154
coreana	154
hakuunensis	155
longituba	155
micranthus	155
minor	155
Hemiptelea	25
davidii	25
Hemistepha	126
lyrata	126
Heracleum	87
moellendorffii	87
Heteropappus	126
hispidus	126
Hibiscus	78
syriacus	78
Hieracium	126
umbellatum	126
Hololeion	126
maximowiczii	126
Hosta	155
longipes	155
longissima	
var. brevifolia	155
Houttuynia	19
cordata	19
Hovenia	75
dulcis	75
Humulus	27
japonicus	27
Hydrangea	51
acuminata var. pubescens	51
cuspidata	51
macrophylla	
var. acuminata	51

Hydrilla	133
verticillata	133
Hymenocarpaceae	133
Hydrocotyle	88
maritima	88
sibthorpioides	88
Hymenophyllaceae	10
Hymenophyllum coreanum	11
Hypericum	79
ascyron	
var. longistylum	79
attenuatum	80
erectum	
var. caespitosum	80
var. erectum	80
var. obtusifolium	80
fujisanense	80
laxum	80
oliganthum	80
Hyphear	29
tanakae	29

【I】

Ilex	70
macropoda	70
forma pseudomacropoda	71
Impatiens	75
noli-tangere	75
textori	75
forma pallescens	75
Imperata	138
cylindrica	
var. koenigii	138
Indigofera	62
kirilowi	62
Inula	126
britannica	
subsp. linariaefolia	126
Iridaceae	159
Iris	159
ensata	
var. spontanea	159
rossii	159
sanguinea	159
Isachne	139
globosa	139
Ischaemum	139
crassipes	139
Isodon	101
inflexus	101
japonicus	102
var. glaucocalyx	102
kameba	102
var. chiisanensis	102
var. coreanus	102

var. micranthus	102
Isopyrum	41
raddeanum	41
Ixeris	126
chinensis	
subsp. strigosa	127
subsp. versicolor	127
dentata	127
var. albiflora	127
japonica	127
polycephala	127
stolonifera	127

【J】

Japonobotrychium	10
virginianum	10
Juglandaceae	20
Juncaceae	151
Juncus	151
alatus	151
effusus	
var. decipiens	151
leschenaultii	152
papillosus	152
setchuensis	
var. effusoides	152
Juniperus	18
rigida	18
sargentii	19
Jussiaea	84
prostrata	84
Justicia	110
procumbens	110
var. leucantha	110

【K】

Kalimeris	127
incisa	127
Kalopanax	85
septemlobus	85
Koeleria	139
cristata	139
Kummerovia	62
striata	62
stipulacea	62
Kyllingia	148
brevifolia	
var. leiolepis	148

【L】

Labiatae	100
Lactuca	127
indica	127

raddeana	
var. raddeana	127
triangulata	127
Lamium	102
album	
var. barbatum	102
amplexicaule	102
Laportea	28
bulbifera	28
Lardizabalaceae	43
Lastrea	14
japonica	14
thelypteris	15
Lathyrus	62
davidii	62
quinquenervius	62
Lauraceae	44
Leguminosae	60
Leibnitzia	128
anandria	128
Lemna	150
paucicostata	150
Lemnaceae	150
Lentibulariaceae	110
Leontopodium	128
leontopodioides	128
Leonurus	102
macranthus	102
sibiricus	103
Lepisorus	16
ussuriensis	
var. distans	16
Lespedeza	62
bicolor	63
cuneata	63
cyrtobotrya	63
japonica	63
var. intermedia	63
maximowiczii	63
var. tomentella	63
var. elongata	63
var. tricolor	63
melanantha	63
pilosa	64
tomentosa	64
virgata	64
Ligularia	128
fischerii	128
Ligustrum	95
obtusifolium	95
tschonoskii	95
Liliaceae	152
Lilium	155
amabile	155
concolor	155
var. pulchellum	156

distichum	156
lanceifolium	156
tsingtauense	156
Linaceae	68
Lindera	44
erythrocarpa	44
grauca	44
obtusiloba	44
Lindernia	106
angustifolia	106
pyxidaria	106
Linum	68
stellarioides	68
Liparis	160
japonica	160
Lipocarpa	148
microcephala	148
Liriope	156
platyphylla	156
Lithospermum	99
arvense	99
erythrorhizon	99
Lloydia	156
triflora	156
Lobelia	119
chinensis	119
radicans	119
sessilifolia	119
Loganiaceae	96
Lonicera	113
chrysantha	114
diamantiaca	114
japonica	114
okamotoana	114
var. latifolia	114
maximowiczii	114
praeiflorens	114
sachalinensis	114
subsessilis	114
vidalii	114
Loranthaceae	29
Lotus	64
corniculatus	
var. japonicus	64
Luzula	152
capitata	152
multiflora	152
plumosa	
var. macrocarpa	152
Lychnis	36
cognata	36
Lycopodiaceae	9
Lycopodium	9
chinense	9
clavatum	9
var. nipponicum	9

obscurum	9
serratum	9
Lycopus	103
lucidus	103
Lysimachia	92
chlethroides	92
japonica	93
vulgaris	
var. davurica	93
Lythraceae	82
Lythrum	82
salicina	82

[M]

Maackia	64
amurensis	64
Magnolia	44
sieboldii	44
Magnoliaceae	44
Maianthemum	156
bifolium	156
dilatatum	156
Malus	54
baccata	
var. mandshurica	54
sieboldii	54
Malvaceae	78
Marsilea	17
quadrifolia	17
Marsileaceae	17
Matricaria	128
maritima	
subsp. limosa	128
Matteuccia	15
orientalis	15
Mazus	107
japonicus	107
Mecodium	11
coreanum	11
wrightii	11
Meehania	103
urticifolia	103
Megaleranthis	41
saniculifolia	41
Melampyrum	107
ciliare	107
barbellatum	107
japonicum	107
ovalifolium	107
roseum	107
forma albiflorum	107
Melandrium	36
firmum	36
seoulense	36
Melica	139

nutans	139
onoei	139
Meliosma	75
myriantha	75
oldhami	75
Menispermaceae	43
Menispermum	43
dauricum	43
Mentha	103
arvensis	
var. piperascens	103
Metaplexis	98
japonica	98
Microlespedeza	62
Microstegium	139
vimineum	
var. polystachyum	139
Milium	139
effusum	139
Mimulus	107
inflatus	107
Miscanthus	139
sinensis	139
Mitrasacme	96
capillaris	96
nudicaulis	96
polymorpha	96
Moliniopsis	140
japonica	140
Mollugo	35
stricta	35
Monochoria	151
korsakowii	151
vaginalis	
var. plantaginea	151
Monotropastrum	90
globosum	90
Moraceae	26
Morus	27
bombycis	27
tiliaefolia	27
Mosla	103
dianthera	103
punctulata	103
Muehlenbergia	140
japonica	140
longistolon	140

[N]

Najadaceae	133
Najas	133
japonica	133
Nanocnide	28
japonica	28

【O】

Oenanthe	88
javanica	88
Oenotheraceae	83
Onoclea	15
sensibilis	
var. interrupta	15
Oleaceae	94
Ophioglossaceae	10
Oplismenus	140
undulatifolius	140
var. japonicus	140
Oplopanax	85
elatum	85
Orchidaceae	160
Orchis	160
cyclochila	160
var. albiflora	161
Oreorchis	161
patens	161
Orobanchaceae	109
Orobanche	109
coerulescens	109
Orostachys	48
erubescens	48
sikokianus	48
Osmorhiza	88
aristata	88
Osmunda	10
japonica	10
Osmundaceae	10
Osmundastrum	10
cinnamomeum	
var. fokiense	10
Ostericum	88
grosseserratum	88
sieboldii	88
Ottelia	133
japonica	133
Oxalidaceae	67
Oxalis	67
acetosella	67
corniculata	68
obtriangulata	68

【P】

Paederia	112
chinensis	112
scandens	112
Paeonia	41
japonica	41
Panax	86
schin-seng	86

Panicum	140
bisulcatum	140
Papaveraceae	45
Paris	156
verticillata	156
Parnassia	51
palustris	51
Parthenocissus	76
tricuspidata	76
Paspalum	140
thunbergii	140
Patrinia	116
saniculaefolia	116
scabiosaefolia	117
villosa	117
Pedicularis	107
resupinata	107
var. oppositifolia	108
forma albiflora	108
var. umbrosa	108
Pennisetum	140
alopecuroides	140
Petasites	128
japonicus	128
Peucedanum	88
terebinthaceum	88
Phalaris	140
arundinacea	140
Phegopteris	15
decursive-pinnata	15
polypodioides	15
Phellodendron	68
amurense	68
forma molle	68
molle	68
Philadelphus	51
pekinensis	52
scabra	51
var. glabrescens	51
schrenckii	52
tenuifolius	51
var. pekinensis	52
var. schrenckii	52
tenuifolius X P. scabra	51
Phlomis	103
maximowiczii	103
Phragmites	141
japonica	141
Phryma	110
leptostachya	110
var. asiatica	110
Phrymaceae	110
Phtheirospermum	108
japonicum	108
chinense	108
Phyllanthus	69
ussuriensis	69
Physalis	105
alkekengi	
var. francheti	105
angulata	105
Phyteuma	119
japonicum	119
Phytolacca	35
esculenta	35
Phytolaccaceae	35
Picea	18
jezoensis	18
Picrasma	69
quassioides	69
Picris	128
hieracioides	
subsp. japonica	
var. koreana	128
Pilea	28
japonica	28
mongolica	29
peplodes	29
Pimpinella	88
brachycarpa	89
koreana	89
Pinaceae	18
Pinellia	149
ternata	149
Pinus	18
densiflora	18
koraiensis	18
Pirola	90
japonica	90
Pirolaceae	90
Plantaginaceae	110
Plantago	110
asiatica	
major	
var. asiatica	110
Platanthera	161
chloranthella	161
minor	161
Platycarya	20
strobilacea	20
Platycodon	119
grandiflorum	119
Pleuropterus	
ciliinervis	31
Pleurospermum	89
camtschaticum	89
Poa	141
acroleuca	141
pratensis	141
spondylodes	141
Pogonia	161
japonica	161

- Polygala69
 japonica69
 Polygalaceae69
 Polygonaceae30
 Polygonatum156
 inflatum157
 var. rotundifolium157
 involcratum157
 lasianthum157
 var. coreanum157
 odoratum157
 var. pluriflorum157
 Polygonum30
 aviculare31
 bistorta31
 caespitosum31
 ciliinervis31
 convolvulus32
 debile31
 dentato-alatum31
 fauriei32
 filiforme32
 hydropiper32
 lapathifolium32
 longisetum32
 nepalense32
 nipponense32
 nodosum32
 orientale32
 perfoliatum32
 persicaria32
 senticosum33
 sieboldi33
 thunbergii33
 forma leucantha33
 viscoferum33
 var. robustum33
 viscosum33
 Polypodiaceae16
 Polystichopsis16
 maximowiczii16
 miqueliana16
 Polystichum15
 aculeatum15
 var. coraiense16
 braunii15
 retroso-paleaceum15
 var. coraiense16
 tripteron15
 Pomoideae54
 Pontederiaceae151
 Populus19
 davidiana19
 Portulaca35
 oleracea35
 Portulacaceae35
- Potamogeton132
 natans132
 octandrus132
 var. miduhikimo132
 Potamogetonaceae132
 Potentilla56
 chinensis56
 cryptotaeniae56
 dickinsii57
 fragerioides var. major57
 var. stolonifera57
 freyniana57
 kleiniana57
 yokusaiana57
 Pourthiaea54
 villosa54
 var. longipes54
 Prenanthes129
 ochroleuca129
 Primula93
 jesoana93
 Primulaceae92
 Prunella103
 vulgaris103
 var. lilacina103
 Prunus59
 ansu59
 léveilleana59
 padus60
 persica60
 subhirtella60
 var. pendula60
 forma ascendens60
 Pseudopogonatherum141
 speciosum141
 Pseudosasa133
 japonica133
 Pseudostellaria36
 davidi36
 heterophylla37
 okamotoi37
 palibiniana37
 Pteridaceae11
 Pteridium11
 aquilinum11
 var. latiusculum11
 Pueraria64
 lobata64
 Pursatilla41
 koreana42
 Pyrrosia17
 linearifolia17
 Pyrus54
 calleryana54
 macrostipes54
 maximowicziana54
- ovoidea55
 pyrifolia55

【Q】

- Quercus23
 acutissima24
 aliena24
 dentata24
 major24
 mongolica24
 var. mandshurica24
 neoglandulifera24
 paucilepis24
 serrata24
 var. donarium25
 variabilis25

【R】

- Ranunculaceae38
 Ranunculus42
 cantoniensis42
 chinensis42
 japonicus42
 tachiroei42
 Rhamnaceae75
 Rhamnella75
 franguloides75
 Rhamnus75
 davurica75
 var. nipponica76
 koriensis76
 schneideri76
 var. manshurica76
 Rhododendron91
 fauriei91
 mucronulatum91
 var. ciliatum91
 schlippenbachii91
 tschonoskii91
 yedoense91
 var. poukhanense91
 Rhus70
 chinensis70
 sylvestris70
 trichocarpa70
 verniciiflua70
 Rhynchosia64
 acuminatifolia64
 Ribes52
 mandshuricum52
 var. subglabrum52
 maximowiczianum52
 Rorippa47
 atrovirens48

cantoniensis	48
islandica	48
Rosa	57
acicularis	57
maximowicziana	57
multiflora	
var. adenochaeta	58
var. adenophora	58
wichuraiana	58
Rosaceae	53
Rosoideae	55
Rotala	82
indica	82
leptopetala	
var. littorea	83
Rubia	112
akane	113
chinensis	113
var. glabrescens	113
cordata	113
cordifolia	
var. pratensis	113
Rubiaceae	110
Rubus	58
coreanus	58
crataegifolius	58
parvifolius	58
phoenicolasius	58
pungens	58
Rumex	33
acetosa	33
acetosella	33
conglomeratus	33
domesticus	34
japonicus	34
longifolius	34
Rutaceae	68

【S】

Sabiaceae	75
Sacciolepis	141
indica	
var. oryzetorum	141
Sagina	37
japonica	37
Salicetaria	133
pygmaea	133
trifolia	
forma longiloba	133
Salicaceae	19
Salix	19
chaenomeloides	20
glandulosa	20
gracilistyla	19
hallaisanensis	20

forma longifolia	20
var. orbicularis	20
koreensis	20
koriyanagi	20
pseudo-lasiogyne	20
Salvia	104
plebeia	104
Salvinia	17
natans	17
Salviniaceae	17
Sambucus	114
gracilis	114
Sanguisorba	59
hakusanensis	59
officinalis	59
tenuifolia var. alba	59
var. purpurea	59
Sanicula	89
chinensis	89
Santalaceae	29
Sapium	70
japonicum	70
Sasamorphia	133
chiisanensis	133
Saxifraga	52
fortunei	52
oblongifolia	52
Saxifragaceae	49
Saururaceae	19
Saussurea	129
gracilis	129
grandifolia	129
macrolepis	129
maximowiczii	129
odontolepis	129
pulchella	130
Sceptridium	10
ternatum	10
Schisandra	44
chinensis	44
Schizachne	141
purpurascens	141
Scilla	157
scilloides	157
Scirpus	149
juncoides	149
karuizawensis	149
wichurai	
forma borealis	149
Scorzonera	130
albicaulis	130
Scrophularia	108
grayana	108
kakudensis	108
Scrophulariaceae	106
Scutellaria	104

baicalensis	104
indica	104
pekinensis	104
var. transita	104
shikokiana	104
Securinega	70
suffruticosa	70
Sedum	48
aizoon	49
bulbiferum	49
rosulato-bulbosum	49
sarmentosum	49
telephium	
var. purpureum	49
verticillatum	49
yabeianum	49
Selaginella	9
rossi	9
Selaginellaceae	9
Senecio	130
argunensis	130
integrifolia	
subsp. fauriei	130
pierotii	130
Serratula	130
coronata	130
subsp. insularis	130
Siegesbeckia	130
glabrescens	130
pubescens	131
Simaroubaceae	69
Siphonostegia	108
chinensis	108
Sium	89
ninsi	89
suave	89
Smilacina	157
bicolor	157
japonica	157
Smilax	158
china	158
nipponica	158
oldhami	158
sieboldi	158
Solanaceae	105
Solanum	106
japonense	106
lyratum	106
nigrum	106
Solidago	131
virgaurea	
subsp. asiatica	131
Sonchus	131
brachyotus	131
Sophora	64
angustifolia	64

flavescens	65
japonica	65
Sorbus	55
alnifolia	55
var. hirtella	55
commixta	55
var. pilosa	55
Sparganiaceae	132
Sparganium	132
japonicum	132
Spiraea	53
microgyna	53
prunifolia	53
salicifolia	53
Spiraeoideae	53
Spiranthes	161
sinensis	161
Spirodela	150
polyrhiza	150
Spodiopogon	141
sibiricus	141
Sporobolus	141
elongatus	142
japonicus	142
Stachys	105
japonica	105
var. intermedia	105
riederi	105
var. intermedia	105
var. japonica	105
Staphylea	72
bumalda	73
var. latifolia	73
Staphyleaceae	72
Stellaria	37
aquatica	37
alsine	37
Stephanandra	53
incisa	53
Stewartia	79
koreana	79
pseudo-camellia	79
Stipa pekinensis	134
Styracaceae	94
Styrax	94
japonica	94
obassia	94
shiraiana	94
var. discolor	94
Swertia	97
pseudochinensis	97
tetrapetala	97
Symplocaceae	93
Symplocos	93
chinensis	
var. leuocarpa	93

forma pilosa	93
paniculata	
var. pubescens	93
Syneilesis	131
palmata	131
Synurus	131
palmatopinnatifidus	
var. indivisus	131
Syringa	96
amurensis	
var. genuina	96
palibiniana	96
reticulata	96
var. mandshurica	96

[T]

Tamaricaceae	80
Tamarix	80
juniperina	80
Taraxacum	131
coreanum	131
Taxaceae	17
Taxus	17
cuspidata	17
Teucrium	105
japonicum	105
viscidum	
var. miquelianum	105
Thalaspis	48
arvense	48
Thalictrum	42
actaeifolium	42
aquilegifolium	42
filamentosum	43
thunbergii	43
Theaceae	79
Themeda	142
japonica	142
Thesium	29
chinense	29
Thymelaeaceae	82
Tilia	77
amurensis	78
forma polyantha	78
ovalis	78
taquetii	78
Tiliaceae	78
Torilis	89
japonica	89
Trichosanthes	117
kirilowii	117
Tricyrtis	158
dilatata	158
Trientalis	93
europaea	

var. arctica	93
Trifolium	65
repens	65
Trigonotis	99
peduncularis	99
radicans	99
Tripterigium	72
regelii	72
Trisetum	142
bifidum	142
sibiricum	142
Triumfetta	78
japonica	78

[U]

Ulmaceae	25
Ulmus	25
coreana	26
davidiana	26
forma suberosa	26
laciniata	26
manshurica	26
Umbelliferae	86
Urticaceae	27
Urtica	29
angustifolia	29
Utricularia	110
tenuicaulis	110

[V]

Vaccinium	92
koreanum	92
oldhami	92
Valeriana	117
fauriei	117
officinale	117
Valerianaceae	116
Vandellia angustifolia	106
Veratrum	158
grandiflorum	158
maackii	158
nigrum	158
Verbenaceae	99
Veronica	108
coreana	109
kiusiana	109
linariaefolia	109
ovata	109
peregrina	109
var. xalapensis	109
sibirica	109
sprina	109
var. maxima	109
Veronicastrum	109

sibiricum	
var. japonicum	109
Viburnum	115
dilatatum	115
erosum	115
koreanum	115
pauciflorum	115
pubinerve	115
forma glabrum	115
forma puberulum	116
sargentii	115
wrightii	116
var. stipellatum	116
Vicia	65
amoena	65
amurensis	66
anguste-pinnata	65
angustifolia	
var. segetalis	65
cracca	66
hirticalycina	66
japonica	66
var. pratensis	66
nipponica	66
pallida var. pratensis	66
pseudo-orobus	66
tetrasperma	66
unijuga	66
villosa	66
Viola	80
acuminata	80
albida	81
chaerophylloides	81
japonica	81

forma variegata	81
keiskei	81
lactiflora	81
mandshurica	81
orientalis	81
phalacrocarpa	81
repens	82
rossii	81
selkirkii	81
vaginata	82
variegata	82
forma variegata	82
verecunda	82
Violaceae	80
Viscum	29
album	
var. corolatum	29
Vitaceae	76
Vitis	77
amurensis	77
flexuosa	77
thunbergii	77
var. sinuata	77
var. glabrata	77

【W】

Weigela	116
florida	
var. glabra	116
subsessilis	116
Woodsia	16
manchuriensis	16
polystichoides	16

【X】

Xanthium	131
strumarium	131

【Y】

Youngia	132
chelidoniifolia	132
denticulata	132
japonica	132
sonchifolia	132

【Z】

Zanthoxylum	68
piperitum	68
planispinum	69
schinifolium	68
var. inermis	69
Zelkova	26
serrata	26
Zizyphus	76
jujuba	76
var. inermis	76
Zoisia	142
japonica	142

和 名 索 引

〔ア〕

アイズイヌナズナ	47
アイナエ	96
アイナエ属	96
アオイ科	78
アオウキクサ	150
アオウキクサ属	150
アオガヤツリ	147
アオカモジグサ	134
アオコウガイゼキショウ	152
アオスゲ	143
アオダモ	95
アオチゴユリ	154
アオツツラフジ	43
アオツツラフジ属	43
アオナラガシワ	24
アオハダ	70
アオミズ	29
アオミヤマトウバナ	101
アカメヤナギ	20
アカゲネコノメソウ	50
アカザ科	34
アカザ属	34
アカシデ	22
アカネ	113
アカネ科	110
アカネ属	112
アカネスミレ	81
アカバナ	84
アカバナ科	83
アカバナ属	84
アカヒナスゲ	143
アカヒメユリ	155
アカマツ	18
アキラマツ	43
アキギリ属	104
アキグミ	82
アキノウナギツカミ	33
アキノキリンソウ	131
アキノキリンソウ属	131
アキノノゲシ	127
アキノノゲシ属	127
アキメヒシバ	137
アケビ	43
アケビ科	43
アケビ属	43
アケボノスミレ	81
アザミ属	124
アジサイ属	51
アシボソ	139
アシボソ属	139
アズキナシ	55

アズマイチゲ	39
アズマアカバナ	84
アズマヒガン	60
アゼオトギリ	80
アゼガヤツリ	146
アゼテンツキ	148
アゼトウガラシ	106
アゼトウガラシ属	106
アゼナ	106
アゼムシロ	119
アツシ	26
アツニ	26
アツモリソウ	160
アツモリソウ属	16
アブラギク	124
アブラナ科	45
アベマキ	25
アマ科	68
アマ属	68
アマチャヅル	117
アマチャヅル属	117
アマドコロ	157
アマドコロ属	156
アムールシナノキ	78
アヤメ	159
アヤメ科	159
アヤメ属	159
アラゲガマズミ	115
アリノトウグサ	85
アリノトウグサ科	84
アリノトウグサ属	84
アレチアザミ	124
アレチアザミ属	124
アレチギンギシ	34
アレノノギク	126
アワコガネギク	124
アワツブスゲ	145
アワブキ	75
アワブキ科	75
アワブキ属	75
アンズ	59

〔イ〕

イ	151
イグサ科	151
イグサ属	151
イシミカワ	32
イタチササゲ	62
イタヤカエデ	74
イチイ	17
イチイ科	17
イチイ属	17
イチゲキスミレ	81

イチゲスミレ	81
イチゲフウロ	67
イチゲワダソウ	37
イチゴツナギ	141
イチゴツナギ属	141
イチヤクソウ	91
イチヤクソウ科	90
イチヤクソウ属	90
イチリンザキセンニンソウ	40
イチリンソウ属	39
イッポンショウマ	40
イトスイラン	126
イトスゲ	143
イトトリゲモ	133
イトハナビテンツキ	143
イトマユミ	72
イスエンジュ属	64
イスカサスゲ	144
イスガヤ科	17
イスガヤ属	17
イスガラシ	48
イスガラシ属	47
イスガンソク	15
イスゴマ	105
イスゴマ属	105
イスコウジュ	103
イスコウジュ属	103
イスザンショウ	69
イスシダ	11
イスシデ	22
イススミレ	81
イスタバ	32
イスタヌキモ	110
イスナズナ	47
イスナズナ属	47
イスノヒゲ	150
イスハギ	64
イスビエ	137
イスビユ	34
イスホウズキ	106
イスムラサキ	99
イスヤクシソウ	132
イスヤマブキソウ	45
イスヨモギ	121
イスワラビ	13
イネ科	134
イノコヅチ	34
イノコヅチ属	34
イノデ属	15
イノモトソウ科	11
イバラモ科	133
イバラモ属	133
イブキトラノオ	31

イブキヌカボ	139
イブキヌカボ属	139
イボクサ	151
イボクサ属	150
イボタノキ	95
イボタノキ属	95
イラクサ科	27
イラクサ属	29
イワアカザ	34
イワアカバナ	84
イワイヌラビ	12
イワメヅル	71
イワガク	51
イワギク	124
イワギボウシ	155
イワクラマゴケ	9
イワシロイノデ	16
イワシミレ	82
イワデンダ	16
イワデンダ属	16
イワニガナ	127
イワハタザオ	46
イワヒバ科	9
イワヒバ属	9
イワヨモギ	120
イワレンゲ属	48

〔ウ〕

ウキクサ	150
ウキクサ科	150
ウキクサ属	150
ウコギ科	85
ウコギ属	85
ウシクグ	147
ウシクサ	135
ウシクサ属	135
ウシタキソウ	83
ウシノケグサ	138
ウシノケグサ属	138
ウシノシッペイ	138
ウシノシッペイ属	138
ウシハコベ	37
ウスイロサツマスゲ	144
ウスギトリカブト	38
ウスゲオガラバナ	74
ウスゲエビヅル	77
ウスゲカエデ	73
ウスゲトダンバ	135
ウスゲナナカマド	55
ウスゲヤマカエデ	73
ウスババイカウツギ	51
ウスバヘビノネゴザ	13
ウスバヤブマメ	60
ウスバヨモギ	121
ウスユキソウ属	128
ウチワゴケ	10

ウチワゴケ属	10
ウチワドコロ	159
ウツギ属	50
ウツボグサ	103
ウツボグサ属	103
ウド	85
ウマノアシガタ	42
ウマノスズクサ科	29
ウマノスズクサ属	30
ウマノミツバ	89
ウマノミツバ属	89
ウメパチソウ	51
ウメパチソウ属	51
ウラジロイチゴ	58
ウラジロコハクウンボク	94
ウラジロヒョウタンボク	114
ウラベニイチゲ	39
ウラボシ科	16
ウリ科	117
ウリカワ	133
ウリノキ	83
ウリノキ科	83
ウリノキ属	83
ウルシ	70
ウルシ科	70
ウルシ属	70
ウンゼンマンネングサ	49
ウンヌケ	141
ウンヌケ属	141

〔エ〕

エゴノキ	94
エゴノキ科	94
エゴノキ属	94
エゾアカバナ	84
エゾアジサイ	51
エゾアゼスゲ	143
エゾアブラガヤ	149
エゾイボタ	96
エゾウコギ	85
エゾエノキ	25
エゾオオヨロイグサ	86
エゾキケマン	45
エゾクマイチゴ	58
エゾクマバナ	101
エゾタツナミソウ	104
エゾノウワミズザクラ	60
エゾノコリンゴ	54
エゾノタチツボスミレ	81
エゾノチチコグサ	125
エゾノヨロイグサ	86
エゾヒナノウスツボ	108
エゾマツ	18
エゾミソハギ	82
エゾヤマハギ	63
エドヒガン	60

エノキ	25
エノキ属	25
エノキグサ	69
エノキグサ属	69
エビガライチゴ	58
エビチャザサ	157
エビヅル	77
エヒメアヤメ	159
エンジュ	65

〔オ〕

オウゴン	105
オウレンシダ	11
オオアカシデ	22
オオアカバナ	84
オオアブラススキ	141
オオアブラススキ属	141
オオイヌシデ	22
オオイヌタデ	32
オオカサモチ	89
オオカサモチ属	89
オオキスタソウ	113
オオクルマアカネ	113
オオケタデ	32
オオサクラソウ	93
オオシシウド	86
オオシラハノダケ	86
オオダイコンソウ	56
オオタカネバラ	57
オオタマガヤツリ	147
オオチゴユリ	154
オオヂンバリ	127
オオチダケサシ	50
オオツノハシバミ	23
オオツリバナ	72
オオツルイタドリ	32
オオツルウメモドキ	71
オオトボンガラ	138
オオトモエソウ	80
オオニワホコリ	138
オオスマハリイ	147
オオネズミガヤ	140
オオネバリタデ	33
オオバキセワタ	103
オオバキセワタ属	103
オオバクサフジ	66
オオバコ	110
オオバコ科	110
オオバコ属	110
オオバコナラ	24
オオハシバミ	23
オオバショリマ属	14
オオバタンキリマメ	64
オオハナワラビ属	10
オオバナトシボソウ	161
オオバナヤエムグラ	112

オオバメギ	43
オオヒナノウスツボ	108
オオヒルムシロ	132
オオペニウツギ	116
オオホソバヨモギ	121
オオホタルサイコ	87
オオボタンヅル	41
オオミズナラ	24
オオミツバウツギ	73
オオミツバシヨウマ	40
オオメシダ	13
オオミヤヤトウバナ	101
オオミヤマバラ	57
オオヤマカタバミ	68
オオヤマトラノオ	109
オオヤマレンゲ	44
オオユウガギク	127
オオリンドウ	97
オカウツボ	109
オカオグルマ	130
オカトラノオ	92
オカトラノオ属	92
オガルガヤ	136
オガルガヤ属	136
オキナグサ属	41
オギョウ	125
オクエゾヤチダモ	95
オクモジハグマ	120
オグルマ属	126
オケラ	122
オケラ属	122
オンダ	14
オンダ科	11
オンダ属	13
オタカラコウ	128
オタネニンジン	86
オタネニンジン属	86
オトギリソウ	80
オトギリソウ科	79
オトギリソウ属	79
オトコエシ	117
オトコゼリ	42
オトコヨモギ	120
オドリコソウ	102
オドリコソウ属	102
オナモミ	131
オナモミ属	131
オニイタヤ	74
オニイラクサ	28
オニスゲ	143
オニカサモチ	89
オニタビラコ	132
オニタビラコ属	132
オニトボシガラ	138
オニノダケ	87
オニノヤガラ	160

オニノヤガラ属	160
オニヒョウタンボク	114
オニメグスリ	74
オニユリ	156
オノオレ	22
オヒルムシロ	132
オヒョウ	26
オヒョウバハンパミ	23
オヘビイチゴ	57
オミナエシ	117
オミナエシ科	116
オミナエシ属	116
オモダカ科	133
オモダカ属	133

〔カ〕

カイナンウツギ	50
カイヒョウタンボク	114
カエデ科	73
カエデ属	73
カエデドコロ	159
ガガイモ	98
ガガイモ科	97
ガガイモ属	98
カキ	93
カキ科	93
カキ属	93
カキラン	160
カキラン属	160
カザグルマ	41
カジノキ	26
カシワ	24
カズザキヨモギ	121
カスマグサ	66
カゼクサ	137
カタクリ	154
カタクリ属	154
カタバミ	68
カタバミ科	67
カタバミ属	67
カテンソウ	28
カテンソウ属	28
カナクギノキ	44
カナビキソウ	29
カナビキソウ属	29
カナムグラ	27
カナワラビ属	16
カニツリグサ	142
カニツリグサ属	142
カノコソウ	117
カノコソウ属	117
カバノキ科	20
ガマズミ	115
ガマズミ属	115
カマツカ	54
カマツカ属	54

カミカワスゲ	145
カメバヒキオコシ	102
カモジグサ	134
カモジグサ属	134
カモノハシ	139
カモノハシ属	139
カモノハシガヤ	135
カモメヅル属	97
カモメラン	161
カヤツリグサ	147
カヤツリグサ科	142
カヤツリグサ属	146
カライトソウ	59
カライヌエンジュ	64
カラキンレイカ	116
カラコギカエデ	73
カラスウリ属	117
カラスノゴマ	77
カラスノゴマ属	77
カラスビシャク	150
カラチダケサン	50
カラナデシコ	36
カラノアザミ	124
カラハナソウ属	27
カラフトアカバナ	84
カラフトナニハズ	82
カラマツソウ	43
カラマツソウ属	42
カラムシ	28
カラムシ属	27
カリガネソウ	100
カリガネソウ属	100
カリマタガヤ	137
カリマタガヤ属	137
カワラケツメイ	60
カワラケツメイ属	60
カワラサイコ	56
カワラスガナ	147
カワラナデシコ	36
カワラボウフウ	88
カワラボウフウ属	88
カワミドリ	100
カワミドリ属	100
カンアオイ属	29
カンエンガヤツリ	147
ガンクビソウ	123
ガンクビヤブタバコ	123
カンサイマユミ	72
カンボク	115
カンヨウキスゲ	155

〔キ〕

キイチゴ属	58
キウリグサ	99
キオン属	130
キカシグサ	83

キカシグサ属	82
キガヤツリ	147
キキョウ	119
キキョウ科	117
キキョウ属	119
キク科	119
キク属	124
キクタニギク	124
キクバエビヅル	77
キクバヒゴタイ	130
キケマン属	45
ギジカクシ	153
ギンギン	34
ギンギン属	34
ギジムシロ	57
ギジムシロ属	56
キスミレ	81
キセワタ	102
キツネアザミ	126
キツネアザミ属	126
キツネガヤ	136
キツネノマゴ	110
キツネノマゴ科	110
キツネノマゴ属	110
キツリフネ	75
キヌゲカメバソウ	99
キハダ	68
キハダ属	68
キバナオウギ	60
キバナトリカブト	38
キバナノカワラマツバ	112
キバナハンショウヅル	40
キビ属	140
ギボウシ属	155
キミカゲソウ	153
ギョウジャノミズ	77
ギョウジャニンニク	153
ギョリュウ	80
ギョリュウ科	80
ギョリュウ属	80
キランソウ	100
キランソウ属	100
キリンソウ属	48
キレコミクマワラビ	14
キンギョモ	38
キンボウゲ	42
キンボウゲ科	38
キンボウゲ属	42
キンミズヒキ	55
キンミズヒキ属	55
キンラン属	160
ギンリョウソウ	90
ギンリョウソウ属	90

〔ク〕

クガイソウ	109
-------	-----

クサギ	100
クサギ属	100
クサコアカソ	28
クサスギカズラ属	153
クサソテツ属	15
クサタチバナ	98
クサノオウ	45
クサノオウ属	45
クサノオウバノギク	132
クサフジ	66
クサレダマ	93
クサヨシ	140
クサヨシ属	140
クジラグサ	47
クジラグサ属	47
クズ	64
クズ属	64
クスノキ科	44
クマイチゴ	58
クマシデ属	22
クヌギ	24
クマツヅラ科	99
クマノミズキ	90
クマワラビ	14
グミ科	82
グミ属	82
クモキリソウ属	160
クララ	65
クララ属	64
クリ属	23
クルマバアカネ	113
クルマバソウ属	110
クルマバツクパネソウ	156
クルマバナ	100
クルミ科	20
クロウメモドキ科	75
クロウメモドキ属	75
クロツバラ	76
クロヅル	72
クロヅル属	72
クロバナキハギ	63
クロフネツジ	91
クロホシクサ	150
クロボシソウ	152
クロミノサワフタギ	93
クロモ	133
クロモ属	133
クロモシ属	44
クワ科	26
クワ属	27
クワガタソウ属	108
クワクサ	27
クワクサ属	27
クワノハシナノキ	78
グンバイナズナ	48
グンバイナズナ属	48

〔ケ〕

ケイボタ	95
ケイリンサイシン	29
ケイリンシロタンボボ	131
ケカンボク	116
ケキツネノボタン	42
ケグワ	27
ケゲンカイツツジ	91
ケコマユミ	71
ケン科	45
ゲジゲジシダ	15
ケタガネソウ	143
ケチジミザサ	140
ケトダンバ	135
ケナシアオハダ	71
ケナシイヌゴマ	105
ケナシエゾノヨツバムグラ	111
ケナシカンボク	116
ケナシハクサンシャクナゲ	91
ケニシキギ	71
ケネコノメソウ	50
ケマルバスマレ	81
ケマンソウ	45
ケミヤマタツナミソウ	104
ケムシクサ	109
ケヤキ	26
ケヤキ属	26
ケヤマハンノキ	21
ケルリソウ	99
ゲンカイツツジ	91
ゲング属	60
ケンボナシ	75
ケンボナシ属	75
ゲンノショウコ	67

〔コ〕

コアカザ	34
コアカソ	28
コイケマ	98
コイヌガラシ	48
コイヌノヒゲ	150
コウガイゼキショウ	152
ゴウソ	144
コウゾ	26
コウゾ属	26
コウゾリナ属	128
コウマノスズクサ	30
コウモリカズラ	44
コウモリカズラ属	43
コウモリソウ属	122
コウヤミズキ	53
コウヤワラビ	15
コウヤワラビ属	15
コウライイッポンワラビ	13
コウライイヌワラビ	12

コウライウツギ	116
コウライオオニガナ	129
コウライコケシノブ	11
コウライコモチマンネングサ	49
コウライシダレヤナギ	20
コウライシャラノキ	79
コウライスズ	134
コウライタンポポ	131
コウライチドリ	161
コウライテンナンショウ	149
コウライトモエソウ	80
コウライパッコヤナギ	20
コウライボダイジュ	78
コウライメシダ	13
コウライヤナギ	20
コウライヤブウツギ	116
コウリンギク	130
コオノオレ	21
コガネバナ	105
コガネホウチャクソウ	153
コキツネノボタン	42
コクワヅル	79
コケイラン	161
コケイラン属	161
コケオトギリ	80
コケシノブ	11
コケシノブ科	10
コケスゲ	144
コケミズ	29
コケリンドウ	97
コゴメウツギ	53
コゴメウツギ属	53
コゴメガヤツリ	147
コゴメグサ属	106
コゴメシモツケ	53
コゴメタデ	32
コシオガマ	108
コシオガマ属	108
コジュズスゲ	145
ゴシュユ属	68
コスミレ	81
コセンダングサ	122
コチジミザサ	140
コツノハシバミ	23
コツマトリソウ	93
コナギ	151
コナスビ	93
コナラ	24
コナラ属	23
コニシキソウ	69
コニワトコ	114
コヌカグサ	135
コヌカグサ属	134
コハクウンボク	94
コバノイシカグマ属	11
コバノカタバミ	68

コバノガマズミ	115
コバノトネリコ	95
コバノミドリヒョウタンボク	114
コバノヨツバムグラ	111
コハリスゲ	144
コヒルガオ	98
コブナグサ	135
コブナグサ属	135
コブニレ	26
コマクサ属	45
コマスミレ	81
コマツナギ属	62
ゴマノハグサ科	106
ゴマノハグサ属	108
コマユミ	71
コマユリ	155
コミカンソウ属	69
コミクリ	132
コミヤマカタバミ	67
コムラサキ	100
コメガヤ	139
コメガヤ属	139
コメツツジ	91
コメナモミ	131
コモチマンネングサ	49
コヤブタバコ	123
コリヤナギ	20
コリンカメバヒキオコシ	102
コリンゴ	54
コンゴウソウ	154
コンロンソウ	47
コーシルネ	55

〔サ〕

サイカチ属	61
サイシュウノガリヤス	136
サイシュウモミ	18
サイトウガヤ	136
サイトウカンパ	21
サカコザクラ	92
サギゴケ属	107
サクラ亜科	59
サクラ属	59
サクラソウ科	92
サクラソウ属	93
ザクロソウ	35
ザクロソウ科	35
ザクロソウ属	35
ササバギンラン	160
ササリンドウ	97
サジギボウシ	155
サトイモ科	149
サナエタデ	32
サナギイチゴ	59
サネブトナツメ	76
サラシナンショウ属	39

ザラツキイチゴツナギ	141
ザリコミ	52
サルトリイバラ	158
サルナン	79
サルナン属	78
サワオグルマ	130
サワギキョウ	119
サワシバ	22
サワトンボ	160
サワヒメスゲ	145
サワヒヨドリ	125
サワフタギ	93
サンカクヅル	77
サンシキキハギ	63
サンショウ	68
サンショウ属	68
サンショウモ	17
サンショウモ科	17
サンショウモ属	17

〔シ〕

シオガマギク	107
シオガマギク属	107
シオデ	158
シオデ属	158
シオン属	121
シカギク属	128
シカクイ	147
シギンカラマツ	42
シケシダ	12
シケチンダ属	13
シシウド属	86
シソ科	100
シタキツルウメモドキ	71
シデシャジン	119
シデシャジン属	119
シナオトギリ	80
シナグリ	23
シナノキ科	77
シナノキ属	77
シノブ	11
シノブ科	11
シノブ属	11
シバ	142
シバ属	142
シバスケ	145
シミズネコノメソウ	50
シモツケ亜科	53
シモツケ亜属	53
シモツケソウ属	56
シモフリキハギ	63
シヤク	87
シヤク属	87
シヤジクソウ属	65
ジャニンジン	47
ジュウモンシダ	15

シュロソウ属	158
ショウジョウバカマ	154
ショウジョウバカマ属	154
ショウブ	149
ショウブ属	149
シラガブドウ	77
シラカンバ属	21
シラキ	70
シラキ属	70
シラクチヅル	79
シラゲアズキナシ	55
シラゲクサフジ	66
シラゲママコナ	107
シラチャレイジンソウ	38
シラネセンキュウ	87
シラネワラビ	14
シラヤマギク	122
シラユキソウ	56
シロアカザ	34
シロカネソウ属	41
シロザ	34
シロシオガマ	108
シロツメクサ	65
シロツリフネ	75
シロネ	103
シロネ属	103
シロバナカワミドリ	100
シロバナカモメラン	161
シロバナキツネノマゴ	110
シロバナジャクナゲ	91
シロバナチョウセンハシドイ	96
シロバナツシママコナ	107
シロバナニガナ	127
シロバナミゾソバ	33
シロバナヤマシオガマ	108
シロホンモンジスゲ	145
シンウシノケグサ	138

〔ス〕

スイカズラ	114
スイカズラ科	113
スイカズラ属	113
スイバ	33
スイラン属	126
スカンタゴボウ	48
スギナ	10
スグリ属	52
スゲ属	143
スズ属	133
スズカゼリ	87
ススキ	140
ススキ属	139
スズメガヤ	137
スズメガヤ属	137
スズメノチャヒキ	135
スズメノチャヒキ属	135

スズメノテッポウ	135
スズメノテッポウ属	135
スズメノヒエ	140, 152
スズメノヒエ属	140
スズメノヤリ	152
スズメノヤリ属	152
スズラン	153, 160
スズラン属	153
スナヂスゲ	144
スノキ属	92
スハマソウ	39
スベリヒユ	35
スベリヒユ科	35
スベリヒユ属	35
ズミ	54
ズミレ	81
ズミレ科	80
ズミレ属	80
ズミレサイシン	82

〔セ〕

セイタカスズムシソウ	160
セイバンイラクサ属	28
セキショウ	149
セキチク	36
セリ	88
セリ科	86
セリ属	88
ゼンマイワラビ	15
センダングサ	122
センダングサ属	122
センナリホウズキ	105
センニンソウ	41
センニンソウ属	40
センノウ属	36
センノキ	85
センブリ属	97
センボンヤリ	128
センボンヤリ属	128
ゼンマイ	10
ゼンマイ科	10
ゼンマイ属	10
ゼンマイワラビ	15
センリョウ科	19
センリョウ属	19

〔ソ〕

ソクシンラン属	152
ソバナ	118
ソバカズラ	32
ソラマメ属	65

〔タ〕

ダイコンソウ属	56
ダイズ属	61
タイスビエ	137

ダイモンジソウ	52
タウコギ	122
タカサゴソウ	127
タカサブロウ	124
タカサブロウ属	124
タガネソウ	145
タカラッキョウ	153
タケ科	133
タケカンバ	21
タチカタバミ	68
タチカモジグサ	134
タチガヤツリ	147
タチクサボタン	41
タチクルマユリ	156
タチコゴメグサ	106
タチシオデ	158
タチシャジン	118
タチハナカズラ	38
タチヒルガオ	98
タチヒガン	60
タチマンネンスギ	9
タチモ	85
タツナミソウ	104
タツナミソウ属	104
タツノヒゲ属	136
タデ科	30
タデ属	30
タニウツギ属	116
タニガワスゲ	143
タニソバ	32
タニタデ	83
タニヘゴ	14
タニワスミレ	82
タニワタシ	66
タスキマメ	61
タスキマメ属	61
タスキモ科	110
タスキモ属	110
タネツケバナ	47
タネツケバナ属	46
タビラコ	99
タビラコ属	99
タマガヤツリ	146
タマツリスゲ	143
タムラソウ	130
タムラソウ属	130
タラノキ	85
タラノキ属	85
タンキリマメ属	64
ダンコウバイ	44
タンナカンスゲ	143
タンナヤナギ	20
タンボボ属	131

〔チ〕

チイサンウコギ	85
---------	----

チイサンウメウツギ……………50
 チイサンカメバヒキオコシ……………102
 チイサンシナカンパ……………22
 チイサンシバスケ……………145
 チイサンタガネソウ……………145
 チイサントリカブト……………38
 チイサンワチガイソウ……………37
 チガヤ……………139
 チガヤ属……………138
 チカラシバ……………140
 チカラシバ属……………140
 チゴザサ……………139
 チゴザサ属……………139
 チゴユリ……………154
 チゴユリ属……………153
 チシバリ……………127, 141
 チシマアマナ属……………156
 チシマカニツリ……………142
 チシマセンブリ……………97
 チジミザサ……………140
 チジミザサ属……………140
 チダケサシ属……………49
 チチコグサ……………125
 チチブシロカネソウ……………41
 チドメグサ……………88
 チドメグサ属……………88
 チャガヤツリ……………146
 チャセンシダ科……………16
 チャボダケカンパ……………21
 チャボツメレンゲ……………48
 チャンパイ……………54
 チョウジタデ……………84
 チョウセンアオスゲ……………145
 チョウセンアキニレ……………26
 チョウセンアサガオ……………105
 チョウセンアサガオ属……………105
 チョウセンアサノハカエデ……………73
 チョウセンイヌガヤ……………17
 チョウセンイヌゴマ……………105
 チョウセンイワキンバイ……………57
 チョウセンイワブキ……………52
 チョウセンウスノキ……………92
 チョウセンウツギ……………51
 チョウセンエンゴサク……………45
 チョウセンオキナグサ……………42
 チョウセンオニシバリ……………82
 チョウセンカラコギカエデ……………73
 チョウセンカサスゲ……………144
 チョウセンカサユリ……………156
 チョウセンカミツレ……………128
 チョウセンカメバソウ……………99
 チョウセンカラスウリ……………117
 チョウセンカラスノゴマ……………77
 チョウセンカリヤス……………136
 チョウセンカリヤス属……………136
 チョウセンガンクビソウ……………123

チョウセンキスゲ……………154
 チョウセンキハギ……………63
 チョウセンクルマユリ……………156
 チョウセンゴシユユ……………68
 チョウセンコウゾリナ……………129
 チョウセンゴミシ……………44
 チョウセンゴヨウ……………18
 チョウセンサイカチ……………61
 チョウセンザリコミ……………52
 チョウセンシュロソウ……………159
 チョウセンスイラン……………126
 チョウセンタイミンガサ……………123
 チョウセンツルドクダミ……………31
 チョウセントネリコ……………95
 チョウセンナツユキソウ……………56
 チョウセンナルコユリ……………157
 チョウセンニワフジ……………62
 チョウセンニンジン……………86
 チョウセンヌマゼリ……………89
 チョウセンノギラン……………152
 チョウセンノコンギク……………121
 チョウセンノビル……………152
 チョウセンバイカウツギ……………52
 チョウセンハウチワカエデ……………74
 チョウセンハシンドイ……………96
 チョウセンハンパミ……………23
 チョウセンハタザオ……………46
 チョウセンハリブキ……………85
 チョウセンヒカゲミツバ……………89
 チョウセンヒメツゲ……………70
 チョウセンフウロ……………67
 チョウセンボウフウ……………88
 チョウセンホトトギス……………158
 チョウセンマツ……………18
 チョウセンマツカサススキ……………149
 チョウセンマツモト……………36
 チョウセンマユミ……………72
 チョウセンマンテマ……………36
 チョウセンミカンソウ……………70
 チョウセンミズキ……………90
 チョウセンミズナラ……………24
 チョウセンミネカエデ……………74
 チョウセンミネバリ……………21
 チョウセンミヤマガマズミ……………116
 チョウセンムグラ……………111
 チョウセンモミ……………18
 チョウセンモミジスグリ……………52
 チョウセンヤナギアザミ……………124
 チョウセンヤマザクラ……………60
 チョウセンヤマツツジ……………91
 チョウセンヤマナラシ……………19
 チョウセンヤマニガナ……………128
 チョウセンヤマハギ……………63
 チョウセンヤマブドウ……………77
 チョウセンヤマムグラ……………111
 チョウセンヤマラッキョウ……………153

チョウセンヨメナ……………126, 127
 チョウセンリンドウ……………97
 チョウレイアザミ……………124
 チョロギダマシ……………105
 チンチョウゲ科……………82
 チンチョウゲ属……………82

〔ツ〕

ツクシイバラ……………58
 ツクシサクラバラ……………58
 ツクシトラノオ……………109
 ツクシリンドウ……………97
 ツクバネソウ属……………156
 ツゲ科……………70
 ツゲ属……………70
 ツシマアカネ……………113
 ツシマママコナ……………107
 ツシマンネングサ……………49
 ツタ……………76
 ツタ属……………76
 ツツジ科……………91
 ツツジ属……………91
 ツヅラフジ科……………43
 ツノハンパミ……………23
 ツバキ科……………79
 ツバメオモト……………153
 ツバメオモト属……………153
 ツボクサボタン……………41
 ツボスミレ……………82
 ツマトリソウ属……………93
 ツメクサ……………37
 ツメクサ属……………37
 ツメレンゲ……………48
 ツユクサ……………151
 ツユクサ科……………150
 ツユクサ属……………151
 ツリガネニンジン……………118
 ツリガネニンジン属……………117
 ツリバナ……………72
 ツリフネソウ……………75
 ツリフネソウ科……………75
 ツリフネソウ属……………75
 ツルウメモドキ……………71
 ツルウメモドキ属……………71
 ツルカミカワスゲ……………145
 ツルキジムシロ……………57
 ツルキンバイ……………57
 ツルガラシ……………46
 ツルニガクサ……………105
 ツルニンジン……………118
 ツルニンジン属……………118
 ツルネコノメソウ……………50
 ツルノイバラ……………57
 ツルフジバカマ……………65
 ツルボ……………157
 ツルボ属……………157

ツルマメ	61
ツルマンネングサ	49
ツルヨシ	141
ツルワチガイソウ	37
ツレサギソウ属	161

〔テ〕

デハノマタタビ	79
テリハカジノキ	26
テリハコナラ	25
テリハノイバラ	58
デンジソウ	17
デンジソウ科	17
デンジソウ属	17
テンツキ	148
テンツキ属	147
テンナンショウ属	149

〔ト〕

トウイヌエンジュ	64
トウイヌシデ	22
トウウチソウ	59
トウウツギ	51
トウシラベ	18
トウシンソウ	151
トウダイグサ科	69
トウトボシガラ	138
トウスマゼリ	89
トウバナ属	100
トウヒ属	18
トウヒレン属	129
トキソウ	161
トキソウ属	161
トキリマメ	64
トキワハゼ	107
トキンソウ	123
トキンソウ属	123
トクサ科	10
トクサ属	10
ドクダミ	19
ドクダミ科	19
ドクダミ属	19
トゲナシイヌザンショウ	69
トサミズキ属	52
ドジョウツナギ	138
ドジョウツナギ属	138
トダシバ	135
トダシバ属	135
トチカガミ科	133
トチナイソウ属	91
トクリイチゴ	58
トネリコ属	94
トネリコヤチダモ	95
トボシガラ	138
トラノオシダ	16
トラノオシダ属	16

トリアシショウマ	50
トリカブト属	38

〔ナ〕

ナガイモ	159
ナガエカマツカ	54
ナガエミクリ	132
ナガジラミ	88
ナガハグサ	141
ナガバコナラ	24
ナガバシュロソウ	158
ナガバタンナヤナギ	20
ナガバノシラネワラビ	14
ナガボノアカワレモコウ	59
ナガボノシロワレモコウ	59
ナガミオノエスゲ	146
ナガミノツルケマン	45
ナギナタコウジュ	101
ナギナタコウジュ属	101
ナシ亜科	54
ナシ属	54
ナス科	105
ナス属	106
ナズナ	46
ナズナ属	46
ナツツバキ	79
ナツツバキ属	79
ナツノハナワラビ	10
ナツノハナワラビ属	10
ナツハゼ	92
ナツメ	76
ナツメ属	76
ナデシコ科	35
ナデシコ属	35
ナナカマド	55
ナナカマド属	55
ナライシダ	16
ナラガシワ	24
ナルコビエ	138
ナルコビエ属	138
ナワシロイチゴ	58
ナンカイイタチシダ	14
ナンザンスミレ	81
ナンセンクルマバモドキ	111
ナンセンバイカウツギ	51
ナンタイシダ	16
ナンテンハギ	66
ナンバンハコベ	35
ナンバンハコベ属	35

〔ニ〕

ニオイウイキョウ	87
ニオイウド	88
ニオイタデ	33
ニガキ	69
ニガキ科	69

ニガキ属	69
ニガクサ	105
ニガクサ属	105
ニガナ	127
ニガナ属	126
ニシキギ	71
ニシキギ科	71
ニシキギ属	71
ニシキコウジュ	101
ニシクソウ	69
ニシクソウ属	69
ニシヨモギ	120
ニッコウツリバナ	72
ニラ	153
ニレ	26
ニレ科	25
ニレ属	25
ニワアジサイ	51
ニワトコ属	114
ニワホコリ	137
ニワヤナギ	31
ニンジン	86, 87
ニンジン属	87

〔ヌ〕

ヌカキビ	140
ヌカボシソウ	152
ヌカボシタデ	32
ヌスビトハギ	61
ヌスビトハギ属	61
ヌマガヤ	140
ヌマガヤ属	140
ヌマシャジン	118
ヌマハリイ	147
ヌメリグサ	141
ヌメリグサ属	141
ヌルデ	70
ヌルデアワブキ	75

〔ネ〕

ネギ属	152
ネコノチチ	75
ネコノチチ属	75
ネコノメソウ属	50
ネコハギ	64
ネコヤナギ	19
ネジバナ	161
ネジバナ属	161
ネズ	19
ネズミガヤ	140
ネズミガヤ属	140
ネズミサシ	19
ネズミノオ	142
ネズミノオ属	141
ネナシカズラ	98
ネナシカズラ属	98

ネバリイバラ	58
ネバリタデ	33
ネムノキ	60
ネムノキ属	60
ネムロブシダマ	114

〔ノ〕

ノウスユキソウ	128
ノガリヤス	136
ノガリヤス属	136
ノカンゾウ	155
ノキノブ属	16
ノグルミ	20
ノグルミ属	20
ノゲシ属	131
ノコギリソウ	119
ノコギリソウ属	119
ノダイオウ	34
ノダケ	86
ノチドメ	88
ノレガナ	127
ノニレ	26
ノナショウブ	159
ノハラエンドウ	66
ノハラクサフジ	66
ノブキ	120
ノブキ属	119
ノブドウ	76
ノブドウ属	76
ノブノキ	20
ノミノツツリ	35
ノミノツツリ属	35
ノミノフスマ	37

〔ハ〕

ハイカウツギ属	51
ハイカタバミ	68
バイカルネコノメソウ	50
バイケイソウ	158
ハイノキ科	93
ハイノキ属	93
ハエドクソウ	110
ハエドクソウ科	110
ハエドクソウ属	110
ハギ属	62
ハクウンキスゲ	155
ハクウンボク	94
ハクサンジャクナゲ	91
ハクサンチドリ属	160
ハクサンハタザオ	46
ハクセン	69
ハクモウイノデ	13
ハコベ属	37
ハコヤナギ属	19
ハゴロモヒカゲミツバ	89
ハシドイ	96

ハシドイ属	96
ハシバミ属	22
ハタガヤ	142
ハタガヤ属	142
ハタザオ	46
ハタザオ属	45
ハチジョウナ	131
ハチス	78
ハッカ	103
ハッカ属	103
ハナイバナ	99
ハナイバナ属	99
ハナウド	87
ハナウド属	87
ハナズオウ	61
ハナズオウ属	60
ハナタデ	31
ハナタネツケバナ	47
ハナハタザオ	47
ハナハタザオ属	47
ハナビガヤ	139
ハナビゼキショウ	151
ハナヤスリ科	10
ハネガヤ	134
ハネガヤ属	134
ハハコグサ	125
ハハコグサ属	125
ハマウツボ	109
ハマウツボ科	109
ハマウツボ属	109
ハマペノギク属	126
ハマヨモギ	121
ハヤザキヒョウタンボク	114
バラ科	53
バラ亜科	55
バラ属	57
ハリイ属	147
ハリウコギ	85
ハリガネワラビ	14
ハリギリ	85
ハリギリ属	85
ハリグワ	27
ハリグワ属	26
ハリゲヤキ	25
ハリゲヤキ属	25
ハリブキ属	85
ハルオミナエシ	117
ハルタデ	32
ハルニレ	26
ハンゲ属	149
ハンノキ	21
ハンノキ属	20

〔ヒ〕

ヒエ属	137
ヒカゲイノコツチ	34

ヒカゲノカズラ	9
ヒカゲノカズラ科	9
ヒカゲノカズラ属	9
ヒカゲシオガマ	108
ヒカゲシラスゲ	145
ヒカゲスゲ	144
ヒガノコソウ	56
ヒキオコシ	102
ヒキヨモギ	108
ヒキヨモギ属	108
ヒゲクサ	142
ヒゲシバ	142
ヒゲネワチガイソウ	37
ヒゴクサ	144
ヒゴスミレ	81
ヒゴタイ	124
ヒゴタイ属	124
ヒデリコ	148
ヒトエノシジミバナ	53
ヒトツバタゴ	94
ヒトツバタゴ属	94
ヒトツバハギ	70
ヒトツバハギ属	70
ヒトリガヤツリ	147
ヒトリシズカ	19
ヒナガヤツリ	146
ヒナノカンザシ	69
ヒナラン	160
ヒナラン属	160
ヒノキ科	18
ヒメアブラガヤ	135
ヒメアブラサスキ	135
ヒメクグ	148
ヒメクグ属	148
ヒメケイラン	161
ヒメシオン	121
ヒメシソ	103
ヒメシダ	15
ヒメジョオン	125
ヒメシラネアザミ	129
ヒメスイバ	33
ヒメスギラン	9
ヒメチチコグサ	125
ヒメバйкаウツギ	52
ヒメハギ	69
ヒメハギ科	69
ヒメハギ属	69
ヒメヒカゲスゲ	144
ヒメヒゴタイ	130
ヒメヒラテンツキ	148
ヒメマイヅルソウ	156
ヒメマツカサススキ	149
ヒメマユミ	72
ヒメムカシヨモギ	125
ヒメミコシガヤ	144
ヒメヨツバムグラ	111

ヒメヨモギ	120
ビャクシン属	18
ビャクダン科	29
ヒユ科	34
ヒユ属	34
ヒヨドリジョウゴ	106
ヒヨドリバナ	125
ヒラギスゲ	143
ヒルガオ	98
ヒルガオ科	98
ヒルガオ属	98
ヒルムシロ科	132
ヒルムシロ属	132
ヒレアザミ	123
ヒレアザミ属	123
ビロウドキハダ	68
ビロウドクサフジ	66
ビロウドンダ	17
ヒロハウラジロヒョウタンボク	114
ヒロハガマズミ	115
ヒロハクサフジ	66
ヒロハクララ	65
ヒロハクマバモドキ	111
ヒロハシロスマレ	81
ヒロハツリバナ	72
ヒロハチョウセンカリヤス	136
ヒロハトラノオ	109
ヒロハスビトハギ	61
ヒロハヌマガヤ	136
ヒロハノイヌノヒゲ	150
ヒロハノドジョウツナギ	138
ヒロハヒョウタンボク	114
ヒロハママコナ	107
ヒロハヤマトラノオ	109
ヒロハヤマヨモギ	121
ヒンジガヤツリ	148
ヒンジガヤツリ属	148

〔フ〕

フイリゲンジスミレ	82
フイリコスミレ	81
フウロソウ	67
フウロソウ科	67
フウロソウ属	67
フキ	128
フキ属	128
フクオウソウ属	129
フクシマシャジン	118
フクロシダ	16
フサガヤ	136
フサガヤ属	136
フジイボタ	96
フジウツギ科	96
フジオトギリ	80
フジカンゾウ	61
フシグロ	36

フシグロ属	36
フシゲチガヤ	139
フシノキ	70
フシノハアワブキ	75
フジバカマ属	125
フタミソウ属	130
フデリンドウ	97
ブドウ科	76
ブドウ属	77
フトボナギナタコウジュ	101
ブナ科	23
フナバラソウ	98
フブキノユウマ	39
フユザンショウ	69
フユノハナワラビ	10
フヨウ属	78
フォーリーガヤ	141
フォーリーガヤ属	141

〔ヘ〕

ヘクソカズラ	112
ヘクソカズラ属	112
ベニカンゾウ	155
ベニバナタチクサボタン	41
ヘビイチゴ	56
ヘビイチゴ属	55
ヘビノネゴザ	13
ベンケイソウ科	48

〔ホ〕

ホウコグサ	125
ホウズキ	106
ホウズキ属	105
ホウチャクソウ	154
ホクチアザミ	129
ホザキシモツケ	53
ホザキヤドリギ	29
ホザキヤドリギ属	29
ホシクサ科	156
ホシクサ属	150
ホソイ	152
ホソイノデ	15
ホソバアオダモ	95
ホソバイラクサ	29
ホソバオグルマ	126
ホソバオモダカ	133
ホソバキスゲ	155
ホソバコケンノブ	11
ホソバコケンノブ属	11
ホソバシケンソウ	12
ホソバシロソウ	158
ホソバソバナ	118
ホソバチョウセンキハギ	63
ホソバツユクサ	151
ホソバトウゲシバ	9
ホソバトネリコヤチダモ	95

ホソバヌマゼリ	89
ホソバノアマナ	156
ホソバノイタチシダ	14
ホソバノエンドウ	65
ホソバノキリンソウ	49
ホソバノセンダングサ	122
ホソバヒカゲスゲ	144
ホソバヒメトラノオ	109
ホソバマユミ	72
ホソバモリトリカブト	39
ホタルイ	149
ホタルイ属	149
ホタルブクロ属	118
ボタン属	41
ボタンヅル	40
ホトケノザ	102
ホトトギス属	158
ホナガコススキ	141
ホワイイトクローバー	65

〔マ〕

マイヅルソウ	156
マイヅルソウ属	156
マイヅルテンナンショウ	149
マオ	28
マキエハギ	64
マスクサ	144
マタタビ	79
マタタビ科	78
マタデ	32
マツ科	18
マツ属	18
マツバイ	147
マツバニンジン	68
マツブサ属	44
マツモ	38
マツモ科	37
マツモ属	37
ママコナ	107
ママコナ属	107
ママコノシリスグイ	33
マメ科	60
マメガキ	93
マメダオシ	98
マメナシ	54
マユミ	72
マルカメバヒキオコシ	102
マルバアオダモ	95
マルバウマノスズクサ	30
マルバエノキ	25
マルバクロウメモドキ	76
マルバコアカソ	28
マルバシャジン	118
マルバヌスビトハギ	61
マルバハギ	63
マルバママコナ	107

マルバミドリヨウラク	157
マルバヤハズソウ	62
マルミスゲ	145
マンカンシロカネソウ	41
マンサク科	52
マンシュウウリハダ	74
マンシュウカエデ	74
マンシュウクロウメドキ	76
マンシュウクロカワスゲ	145
マンシュウシラネアザミ	129
マンシュウスイラン	126
マンシュウタカサゴソウ	127
マンシュウハンドイ	96
マンシュウヒキオコシ	102
マンシュウミズナラ	24
マンセンヌカボ	134
マンネンズギ	9

081

〔ミ〕

ミカン科	68
ミクリ科	132
ミクリ属	132
ミクリスゲ	143
ミコシガヤ	145
ミサキカグマ	14
ミシマサイコ	87
ミシマサイコ属	87
ミズ属	28
ミズアオイ	151
ミズアオイ科	151
ミズアオイ属	151
ミズオオバコ	133
ミズオオバコ属	133
ミズガヤツリ	147
ミズキ	90
ミズキ科	90
ミズキ属	90
ミズキカシグサ	83
ミズギボウシ	155
ミズキンバイ属	84
ミズタマソウ	83
ミズタマソウ属	83
ミズトンボ属	160
ミズヒキ	32
ミズヒキモ	133
ミゾイチゴツナギ	141
ミゾカクシ	119
ミゾカクシ属	119
ミゾコウジュ	104
ミソハギ科	82
ミソハギ属	82
ミゾハコベ	80
ミゾハコベ科	80
ミゾハコベ属	80
ミゾソバ	33
ミツバウツギ	73

ミツバウツギ科	72
ミツバウツギ属	72
ミゾホウズキ	107
ミゾホウズキ属	107
ミチシバ	139
ミチヤナギ	31
ミツデウラボシ	16
ミツデウラボシ属	16
ミツバ	87
ミツバ属	87
ミツバグサ属	88
ミツバゼリ	87
ミツバツチグリ	57
ミツバハンショウヅル	40
ミツバフウロ	67
ミツバヒカゲゼリ	89
ミツバベンケイソウ	49
ミツバフウロ	67
ミツモトソウ	57
ミドリヒョウタンボク	114
ミドリヨウラク	157
ミネトラノオ	109
ミネバリ	22
ミノボロ	139
ミノボロ属	139
ミミナグサ	35
ミミナグサ属	35
ミヤコアザミ	129
ミヤコグサ	64
ミヤコグサ属	64
ミヤマアキノノゲシ	128
ミヤマイトスゲ	146
ミヤマガマズミ	116
ミヤマカエデ	73
ミヤマガラシ	46
ミヤマカラマツ	43
ミヤマクロボシソウ	152
ミヤマシケンダ	13
ミヤマシダ	12
ミヤスマシレ	82
ミヤマタニタデ	83
ミヤマタニソバ	31
ミヤマチダケサシ	49
ミヤマトサミズキ	53
ミヤマナミキ	104
ミヤマヌカボ	134
ミヤマノキシノブ	16
ミヤマハイビャクシン	19
ミヤマハタザオ	46
ミヤマハギ	63
ミヤマビャクシン	19
ミヤマベニンダ	14
ミヤママタタビ	79
ミヤマムグラ	112
ミヤマヤブタバコ	123
ミヤマヨメナ属	126

ミヤマリュウキンカ	39
ミヤマワラビ	15
ミヤマワラビ属	15

〔ム〕

ムカエバシオガマ	108
ムカゴイラクサ	28
ムカゴイラクサ属	28
ムカゴニンジン	89
ムカゴニンジン属	89
ムカシヨモギ属	125
ムクゲ	78
ムクノキ	25
ムクノキ属	25
ムシクサ	109
ムラサキ	99
ムラサキ科	99
ムラサキ属	99
ムラサキシキブ	99
ムラサキシキブ属	99
ムラサキセンブリ	97
ムラサキベンケイソウ	49
ムロ	19

〔メ〕

メイスナズナ	47
メガルガヤ	142
メガルガヤ属	142
メギ科	43
メギ属	43
メシダ属	11
メタカラコウ属	128
メドハギ	63
メナモミ	131
メナモミ属	130
メハジキ	103
メハジキ属	102
メヒシバ	137
メヒシバ属	137
メヒルムシロ	132
メヤブマオ	28

〔モ〕

モクセイ科	94
モクレン科	44
モクレン属	44
モジズリ	161
モチノキ科	70
モチノキ属	70
モデミソウ	41
モデミソウ属	41
モミ属	18
モミジウリノキ	83
モミジスミレ	81
モミジハグマ属	120
モモ	60

モモイロウツボグサ	103
モリトリカブト	39
モンゴリナラモドキ	34
モンツキガヤ属	135

〔ヤ〕

ヤイトバナ	112
ヤエガワカンパ	21
ヤエムグラ	112
ヤエムグラ属	111
ヤクシソウ	132
ヤダケ	133
ヤダケ属	133
ヤチシャジン	118
ヤツシロソウ	118
ヤドリギ	29
ヤドリギ科	29
ヤドリギ属	29
ヤナギ科	19
ヤナギ属	19
ヤナギタデ	32
ヤナギタンポポ	126
ヤナギタンポポ属	126
ヤナギババラモンジン	130
ヤノネグサ	32
ヤハズアザミ	123
ヤハズエンドウ	66
ヤハズソウ	62
ヤハズソウ属	62
ヤブクロウメモドキ	76
ヤブシダ	12
ヤブジラミ	89
ヤブジラミ属	89
ヤブタバコ	123
ヤブタバコ属	123
ヤブニンジン	88
ヤブニンジン属	88
ヤブハギ	61
ヤブヘビイチゴ	56
ヤブマオ	27
ヤブマメ属	60
ヤブヨモギ	121
ヤブラン	156
ヤブラン属	156
ヤブレガサ	131
ヤブレガサ属	131
ヤマアカザ	34
ヤマアジサイ	51
ヤマアゼスゲ	144
ヤマアワ	136
ヤママイ	148
ヤマイスワラビ	13

ヤマウルシ	70
ヤマカシユウ	158
ヤマガラシ	46
ヤマガラシ属	46
ヤマキリンソウ	49
ヤマクルマバナ	101
ヤマグワ	27
ヤマコウバシ	44
ヤマゴボウ	35
ヤマゴボウ科	35
ヤマゴボウ属	35
ヤマシオガマ	108
ヤマシヤクヤク	41
ヤマズズメノヒエ	152
ヤマゼリ	88
ヤマゼリ属	88
ヤマソ	28
ヤマタツナミソウ	104
ヤマヂスゲ	143
ヤマヂノギク	126
ヤマトラノオ	109
ヤマドリゼンマイ	10
ヤマドリゼンマイ属	10
ヤマナシ	55
ヤマスカボ	134
ヤマノイモ科	159
ヤマノイモ属	159
ヤマノコギリソウ	119
ヤマハゼ	70
ヤマハタザオ	46
ヤマハッカ	101
ヤマハッカ属	101
ヤマハンノキ	21
ヤマブキシヨウマ	53
ヤマブキシヨウマ属	53
ヤマボウシ	90
ヤマボクチ	131
ヤマボクチ属	131
ヤマホロシ	106
ヤマミコシガヤ	144
ヤマミズ	28
ヤマムグラ	112
ヤマヨモギ	121

〔ユ〕

ユウレイタケ	90
ユキザサ	157
ユキザサ属	157
ユキノシタ科	49
ユキノシタ属	52
ユキミソウ	104
ユリ科	152

ユリ属	152
-----	-----

〔ヨ〕

ヨシ属	141
ヨツバハギ	66
ヨツバムグラ	112
ヨブスマソウ	122
ヨメナ属	127
ヨモギ	121
ヨモギ属	120
ヨロイグサ	86

〔ラ〕

ラショウモンカズラ	103
ラショウモンカズラ属	103
ラセンソウ	78
ラセンソウ属	78
ラン科	160

〔リ〕

リュウキュウコザクラ	92
リュウキンカ属	39
リンゴ属	54
リンドウ	97
リンドウ科	96
リンドウ属	96

〔ル〕

ルイヨウシヨウマ	39
ルイヨウシヨウマ属	39
ルイヨウボタン	43
ルイヨウボタン属	43
ルリハッカ	100
ルリハッカ属	100
ルリミノウシコロシ	93

〔レ〕

レンリエンドウ	66
レンリソウ	62
レンリソウ属	62

〔ワ〕

ワスレグサ	154
ワスレグサ属	154
ワダソウ	37
ワチガイソウ属	36
ワニグチソウ	157
ワラビ	11
ワラビ属	11
ワレモコウ	59
ワレモコウ属	59