

特性要素の非正則度と

無限階擬微分作用素の増大度

東 大 理 青 木 貴 史

複素領域における擬微分方程式系の $\mathcal{E}^\infty$ -加群としての構造は S-K-K によって明らかにされたが $\mathcal{E}^\infty$ の元 (切断) 即ち一般に無限階の擬微分作用素 (以下 Micro-Differential Operator; M.D.Op. と略記する) は $\mathcal{E}^\infty$ に超越的なものである。その超越的なものとも扱いうる所に micro-local analysis の強かさがあるのではあるが、一方では $\mathcal{E}$ -加群としての構造つまり有限階 M.D.Op. の category ではどうなるかは 確定特異点型方程式系の理論として 柏原-大島 [11] 等で研究されている。以下ではこれらの中間として無限階ではあるが $\mathcal{E}^\infty$ よりはやや小さいクラスの category を考えると方程式系の構造は何に影響されるかを簡単な場合に考察する。

§ 1. 擬微分作用素の増大度

X は n 次元複素多様体 (以下 micro-local な話ゆえ $X = \mathbb{C}^n$ としてよい) とし、 X 上の M.D.Op. の層を $\mathcal{E}^\infty$ とかく。また有限階 M.D.Op. からなる $\mathcal{E}^\infty$ の部分層を $\mathcal{E}$ とかく。

定義 1.1. $\Omega \in P^*X$ の開集合とする. $0 < p < 1$ なる p に対して

$$\mathcal{E}_{(p)}^\infty(\Omega) := \left\{ P \in \mathcal{E}^\infty(\Omega) \mid P(x, D) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} P_j(x, D) \text{ } (P_j \text{ は } j\text{-次成分}) \right.$$

と表わした時 $\forall K \Subset \Omega \exists R > 0, \exists C > 0 \text{ s.t.}$

$$\left. \sup_{\substack{(x, \eta) \in K \\ |\eta| = 1}} |P_j(x, \eta)| \leq \frac{C R^j}{\Gamma(\frac{j}{p} + 1)} \text{ } (j \geq 0) \right\}$$

とおく. 以下 Γ は ガンマ 函数 である. また $p = 0, 1$ に対しては 与えられ $\mathcal{E}_{(0)}^\infty(\Omega) = \mathcal{E}(\Omega)$ (有限階全体), $\mathcal{E}_{(1)}^\infty(\Omega) = \mathcal{E}^\infty(\Omega)$ とおく. $\Omega \mapsto \mathcal{E}_{(p)}^\infty(\Omega)$ は 自然な制限写像により 層となる. $\psi \in \mathcal{E}_{(p)}^\infty$ とおく. $P \in \mathcal{E}_{(p)}^\infty(\Omega)$ のとき P の Ω における増大度は $\text{高々}(p)$ であるという.

例 1.2. $\cosh x_2 \sqrt{D_1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x_2^{2k}}{(2k)!} D_1^k$ の増大度は $(\frac{1}{2})$ である.

命題 1.3 $\mathcal{E}_{(p)}^\infty$ は $\mathcal{E}^\infty$ の環構造について その部分環である.

証明の方針: $0 < p < 1$ のとき $\mathcal{E}_{(p)}^\infty(\Omega)$ が M. D. Op. の積について閉じていることを示せばよいが, M. D. Op. の結合公式を用いて その各成分を評価してやればよい. $0 < p < p' < 1$ なら $\mathcal{E} \subsetneq \mathcal{E}_{(p)}^\infty \subsetneq \mathcal{E}_{(p')}^\infty \subsetneq \mathcal{E}^\infty$ である.

$\mathcal{E}^\infty$ と同様, Späth 型の割算定理が $\mathcal{E}_{(p)}^\infty$ に制限しても成立する. すなわち 増大度 $\text{高々}(p)$ の M. D. Op. を 適当な有限階の M. D. Op. で割算したとき, その商, 余りの増大度も $\text{高々}(p)$ であることが証明できる. 従って P^*X の接触変換に伴った $\mathcal{E}_{(p)}^\infty$ の量子化変換が存在することから $\mathcal{E}^\infty$ の場

合と同様に証明できる.

$\mathcal{E}_{(p)}^\infty$ は ultra-distribution の理論と関係が深い. $\pi: P^*X \rightarrow X$ を projection とすると $\mathcal{D}^\infty \hookrightarrow \pi_* \mathcal{E}^\infty$ により $\mathcal{D}^\infty$ の部分層 $\mathcal{D}_{(p)}^\infty$ が定義できるが $\mathcal{D}_{(p)}^\infty$ を実多様体に制限 (X をその複素化とみなして) (たものは適当な class の ultra-distribution に作用する. 記号の混乱を避ける為) に小松 [2] etc. における ultra-distributions の層 $\mathcal{D}^{(s)'}_p$ を $\mathcal{E}^{(s)'}_p$ とかくことにすると

命題 1.4 (cf. 小松 [3] Theorem 3.1) $p \leq \frac{1}{s}$ なる p に対して $\mathcal{E}^{(s)'}_p$ は 左- $\mathcal{D}_{(p)}^\infty$ -加群となる.

§ 2. 非特異特性要素の非正則度

標題の概念は微分作用素に対して小松 [2] で与えられた. われわれはこれを擬微分作用素および擬微分方程式に対して定義する.

$P(x, D) = \sum_{j \leq m} P_j(x, D)$ は m 階の M.D.Op. とする. P_j は j 階斉次成分を表わす. $V \in P$ の特性多様体とする: $V = \{(x, \eta) \in P^*X \mid P_m(x, \eta) = 0\}$. P に対して次の仮定を設ける. 考える点 $x_0^* \in V$ の近傍で P の重複度は一定で d とする. また V は x_0^* の近傍で正則, すなわち $\omega \in P^*X$ の基本一次形式とすると $\omega|_V \neq 0$ と仮定する.

このとき次の条件 (2.1)~(2.4) をみたす Ψ, G を選ぶことができる.

(2.1) Ψ, G は x_0^* の近傍で定義されたそれぞれ 1 階, 0 階の M.D.Op. である.

Ψ, G の主シンボルを ψ, g とするとき

$$(2.2) \quad x_0^* \text{ の近傍で } V = \{\psi = 0\}$$

$$(2.3) \quad (\omega \wedge d_{(x,\eta)} \psi)_{x_0^*} \neq 0, \quad (d_{(x,\eta)} g)_{x_0^*} \neq 0$$

$$(2.4) \quad [\Psi, G] = 1 \quad (\text{従って } \{\psi, g\} = 1)$$

P に対する仮定から

$$P_m(x, \eta) = e(x, \eta) \psi(x, \eta)^d$$

と書くことができる。ただし $e(x, \eta)$ は x_0^* の近傍で正則で η について $(m-d)$ 次齊次で $e(x_0^*) \neq 0$ である。また $\Psi(x, D)^d$ の主シンボルは $\psi(x, \eta)^d$ であることに注意すると Späth 型の割算定理 (cf. S-K-K 定理 1.8") により次の形に一意的に割算できる:

$$(2.5) \quad \begin{cases} P(x, D) = Q(x, D) \Psi(x, D)^d + R(x, D) \\ (\text{ad } G)^d R = [G] \cdots [G, R] \cdots] = 0. \end{cases}$$

$(\text{ad } G)^d R = 0$ は (2.4) より次の形にかけることと同値である:

$$(2.6) \quad \begin{cases} R(x, D) = \sum_{j=0}^{d-1} R^{(j)}(x, D) \Psi(x, D)^j \\ \text{ただし } [G, R^{(j)}] = 0 \quad j=0, \dots, d-1. \end{cases}$$

(2.5) の両辺の主シンボルを比較して Q の主シンボルは $e(x, \eta)$ である。

従って Q は $(m-d)$ 階で x_0^* の近傍で可逆な M.D.Op. である。また R が高々 $(m-1)$ 階であることもわかる。従って (2.6) における $R^{(j)}$ は高々 $(m-j-1)$ 階である。そこで $R^{(j)}$ の階数を r_j ($\leq m-j-1$) とし

$$q_j = \max \{0, r_j - (m-d)\}$$

と定める。 $0 \leq q_j \leq d-j-1$ である。

定義 2.1 (cf. 小松[2] DEFINITION 1.4)

このとき $\sigma = \max_{0 \leq j < d} \left\{ \frac{d-j}{d-g_j-j} \right\}$ $\in P$ に対する特性要素 x_0^* の非正則度という.

定義から $1 \leq \sigma \leq d$ である. $\sigma = 1$ のとき P は V に沿って確定特異点をもつ, あるいは Levi 条件をみたすという. $\sigma > 1$ のとき P は V に沿って不確定特異点をもつという.

注意 1° σ は $\{(j+g_j, j) \mid j=0, 1, \dots, d\}$ ($g_d=0$ とする) に同伴した Newton 多角形の辺の傾きの最大値である.

2° 特に P が微分作用素のときには 小松[2] の定義と一致する.

3° 明らかに σ は 特性多様体の regular part で一定である.

4° σ は (2.1) ~ (2.4) をみたす Ψ, G の取り方によらずに定まる. 従って非正則度 σ は量子化された接触変換で不変である.

注意 4° から非正則度は特性多様体と標準形 $\eta_1=0$ に変換して計算すればよい.

命題 2.2 $E \in x_0^*$ の近傍で可逆な M.D.Op. とすると, $P_1 = EP$, $P_2 = PE$ に対する x_0^* の非正則度はいずれも σ である.

命題 2.3 $P, Q \in \eta_1=0$ の近くで定義された ζ かつ ζ'' m 階, l 階の M.D.Op. で ζ の主シンボルは η_1^m, η_1^l であると仮定する. 特性要素

$\eta_1 = 0$ の P, Q に対する非正則度 σ_1, σ_2 とすると $\eta_1 = 0$ の $R = PQ$ に対する非正則度 σ は $\sigma = \max\{\sigma_1, \sigma_2\}$ で与えられる。

定義 2.4 定義 2.1 の仮定をみたす P に対して 単独擬微分方程式

$$\mathcal{M} : P(x, D)u = 0 \quad (\mathcal{M} = \mathcal{E} / \mathcal{E}P)$$

を考える時, 特性要素 $x_0^* \in \text{Supp } \mathcal{M}$ の $\mathcal{M}$ に対する非正則度 σ を x_0^* の P に対する非正則度 σ として定義する。

定義 2.4' $\mathcal{M}$ を 射影次元 1 の regular system とする。(regular

system の定義は S-K-K Chap II § 5.3 参照. ここでは $\mathcal{E}$ -加群のみを考える.) $\text{Supp } \mathcal{M} = \Lambda$ とする. $\Lambda \ni x_0^*$ の近傍で $\mathcal{M}$ は Λ に台

をもつ有限個の単独方程式 $\mathcal{M}_i = \mathcal{E} / \mathcal{E}P_i$ ($i=1, \dots, p$) の直和に $\mathcal{E}$ -加群として同型になるが, x_0^* の P_i に対する非正則度を σ_i とするとき x_0^* の $\mathcal{M}$ に対する非正則度 σ

$$\sigma = \max_{1 \leq i \leq p} \sigma_i$$

によって定まる。

§ 3. 構造定理

以上のもとに擬微分方程式(系)の $\mathcal{E}_{\text{Op}}^\infty$ -加群としての構造を調べる。

つまり方程式を“標準型”に変換するときに用いる M. D. Op. の増大度を制限して考える。

定理 3.1. (cf. S-K-K Chap II Theorem 5.2.1)

$P(x, D) \in (x^0, \eta^0) = (0; 0, \dots, 0, 1)$ の近傍で定義された m 階の M.D.O.p. P の主シンボルは η_1^m であるとし, 特性要素 (x^0, η^0) の非正則度は σ であると仮定する. このとき擬微分方程式

$$\mathcal{M} : P(x, D)u = 0$$

は (x^0, η^0) の近傍で擬微分方程式

$$\mathcal{N} : D_1 u_1 = D_1 u_2 = \dots = D_1 u_m = 0$$

と $p \geq \frac{\sigma-1}{\sigma}$ なる p に対して左 $\mathcal{E}_{(p)}^\infty$ -加群として同型である. すなわち

$$\mathcal{E}_{(p)}^\infty \otimes_{\mathcal{E}} \mathcal{M} \simeq \mathcal{E}_{(p)}^\infty \otimes_{\mathcal{E}} \mathcal{N}$$

証明 S-K-K の証明を少し精密化する. P に対する仮定より Weierstrass 型の割算定理を用いて (x^0, η^0) で可逆な因子 ε の存在は確かである.

$$P(x, D) = D_1^m - P_0(x, D') D_1^{m-1} - \dots - P_{m-1}(x, D'), \quad D' = (D_2, \dots, D_n)$$

と仮定する. P_j は高々 j 階の M.D.O.p. である. P_j の階数を r_j ,

$$q_j = \max \{0, r_j\} \text{ とおくと } \sigma = \max_{1 \leq j \leq m} \{j / (j - q_{j-1})\} \text{ である.}$$

$$s_j = \lfloor (j+1) \frac{\sigma-1}{\sigma} \rfloor \quad (j = 0, \dots, m-1, \lfloor \cdot \rfloor \text{ は Gauss 記号}) \text{ によって } s_j \text{ を}$$

$$\text{定めると, } q_j \leq s_j \leq j, \quad s_j \leq s_{j+1} \text{ であり } \sigma = \max_{1 \leq j \leq m} \{j / (j - s_{j-1})\}$$

となる. さて, $\mathcal{M}$ を行列を使って次の形に書きかえろ:

$$(3.1) \quad D_1 U = M(x, D') U \quad U = {}^t(u_1, \dots, u_m)$$

$$\text{ただし } M(x, D') = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ P_{m-1} & P_{m-2} & \dots & P_1 & P_0 \end{pmatrix}$$

D_n は (x_0, y_0) の近傍で可逆だから

$$C = \begin{pmatrix} D_n^{s_{m-1}} & & & & \\ & D_n^{s_{m-2}} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & D_n^{s_1} & \\ & & & & D_n^{s_0} \end{pmatrix}$$

もまた可逆である。(3.1)をさらに C で変換すると M は

$$(D_1 - A(x, D')) V = 0 \quad V = {}^t(v_1, \dots, v_m)$$

$$\begin{aligned} T=T^{-1} \quad A(x, D') &= C M(x, D') C^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & D_n^{s_{m-1}-s_{m-2}} & & & \\ & 0 & D_n^{s_{m-2}-s_{m-3}} & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 0 & D_n^{s_2-s_1} \\ & & & & 0 & D_n^{s_1-s_0} \\ P_{m-1} D_n^{-s_{m-1}} & P_{m-2} D_n^{-s_{m-2}} & \dots & P_1 D_n^{-s_1} & P_0 D_n^{-s_0} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

と同型になる。

M. D. Op. の行列 $D_1 - A(x, D')$ に対して

$$(3.2) \quad (D_1 - A(x, D')) R(x, D') = R(x, D') D_1$$

をみたす $m \times m$ の可逆な M. D. Op. の行列をつくり、その増大度を調べるのである。

存在は S-K-K で示されているので増大度のみをみる。ここでは簡単

のため $[D_1, A(x, D')] = 0$ と仮定する。すなわち $A = A(x', D')$, $x' = (x_2, \dots, x_n)$ の

場合にその方法を述べる。この場合 (3.2) をみたす R は

$$R(x, D) = \exp(x_1 A(x', D')) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x_1^k}{k!} A(x', D')^k$$

によって得られるから $A(x', D')^k$ の各行列要素の階数が問題になる。そ

れを調べるために $A(x', D') = A_0(x', D') + N$ と分解する。ただし A_0

の各行列要素は高々 0 階の M. D. Op. である。

$$N = \begin{pmatrix} 0 & D_n^{s_{m-1}-s_{m-2}} & & \\ & 0 & D_n^{s_{m-2}-s_{m-3}} & \\ & & \ddots & \\ & & 0 & D_n^{s_1-s_0} \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

である。また $\Delta = \{j \mid 0 \leq j \leq m-1, \sigma = \frac{j+1}{j+1-\delta_j}\}$ とおき

$$\mu = \max \{j \mid j \in \Delta\} + 1$$

とすると定義から $\sigma = \frac{\mu}{\nu}$ である。したがって $\nu = \mu - \delta_{\mu-1}$ とおいた。

さて $\sigma = 1$ とすると $s_j = \delta_j = 0$ ゆえ A の各行列要素は高々 0 階ゆえ定理の主張はよく知られている。(cf. 柏原-大島 [1] Theorem 1.9) 以下 $\sigma > 1$ とする。 $\mu > \nu$ である。 N^k の階数を調べる。 明らかに $k \geq m$ ならば $N^k = 0$ であり、 $1 \leq k \leq m-1$ に対しては

$$N^k = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & D_n^{s_{m-1}-s_{m-k+1}} & & \\ & \underbrace{\quad\quad\quad}_k & & 0 & D_n^{s_{m-2}-s_{m-k+2}} & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & 0 & D_n^{s_k-s_0} \\ & & & & & \vdots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

である。従って $N^{\mu-1}$ の各要素の階数は 高々 $s_{\mu-1} = \delta_{\mu-1} = \mu - \nu$ である。

μ の定め方に注意して $A(x', D')^k = (A_0(x', D') + N)^k$ と考えたとその各要素の階数は 高々 $(k - \mu l) + (\mu - \nu)l = k - \nu l$ であることがわかる。

ただし l は $\mu l \leq k$ なる最大の整数である。従って $k \rightarrow \infty$ のとき A^k の階数は 高々 $k - \nu l \leq k - \nu \frac{k}{\mu} = \frac{\mu - \nu}{\mu} k = \frac{\sigma - 1}{\sigma} k$ 程度にたどることがわかる。

つまり $\left[\frac{\sigma-1}{\sigma} k\right]$ 階の係数が $\frac{1}{k!} \times (k \text{ のべき})$ 程度であるから

逆に見ると j 階の齊次成分が $C h^j / \Gamma(\frac{\sigma-1}{\sigma} j)$ 程度 ($C, h > 0$)

であることがわかり定理が導かれる。一般の場合も含め厳密に証明する
為にはやはり formal norm の評価を用いるが問題は階数の評価のみ
でありは上に示したのと全く同様である。

定理 3.2. $\Lambda \in P^*X$ の余次元 1 の正則な部分多様体とする。 Λ を
台とするふたつの regular systems $\mathcal{M}, \mathcal{M}_0$ を考える。 $x_0^* \in \Lambda$ の近くで
 $\mathcal{M}_0$ の重複度は 1, $\mathcal{M}$ の重複度は d とし, さらに x_0^* の $\mathcal{M}$ に対する
非正則度を σ とする。このとき $p \geq \frac{\sigma-1}{\sigma}$ なる p に対して $\mathcal{M}$ は $\mathcal{M}_0$
の d 個の直和に $\mathcal{E}_{(p)}^\infty$ -加群として同型である:

$$\mathcal{E}_{(p)}^\infty \underset{\varepsilon}{\otimes} \mathcal{M} \simeq \mathcal{E}_{(p)}^\infty \underset{\varepsilon}{\otimes} \underbrace{(\mathcal{M}_0 \oplus \dots \oplus \mathcal{M}_0)}_{d \text{ 回}}.$$

文献

- [S-K-K] 佐藤-河合-柏原: Micro-functions and pseudo-differential equations, Lecture Notes in Math. No. 287 Springer, 1973.
- [S-K-K] ———: 超函数論における擬微分方程式論, 数学 25 (1973).
- [1] 柏原-大島: Systems of differential equations with regular singularities and their boundary value problems, Ann Math. 106 (1977) 145-200.
- [2] 小松: Irregularity of characteristic elements and constructions of null solutions, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. 1A. 23 (1976) 297-342.
- [3] ———: Ultradistributions II. ibid.