


JST ACCELプロジェクト 「PCP+ / 空間による分子制御科学と応用展開」

ナノ空間を使ってガスの分離材料を作っています

21世紀はガスの時代

混合気体

純粋気体



石炭(産業革命～19世紀)

石油(20世紀)

天然ガス(21世紀～)

CO, CO₂ (21世紀後半～?)

気体分離技術の最後の難関

窒素

一酸化炭素


酸素

アルゴン

既存の技術 (超低温での蒸留) は困難・高コスト


分離は大変！

エネルギー：産業全体が消費するエネルギーの実に **12%** を分離操作に費やしている




ガス分子はとても小さい


0.36 nm



0.35 nm



0.29 nm




大人しくしているのが苦手

ナノ空間の活用 ーガス分子をナノ空間で捕まえるー

分子に見合った大きさの空間を用意することでフリーダムな分子を捕まえることができる




ナノ空間とは？ → 一辺が1 nm程度の部屋、あるいはトンネル
= 原子数個分が入れる程度の広さ




ナノ空間内では壁面の作用を受けやすく、
ガス分子にとってとても居心地が良い。

でも、こんな材料どうやってつくるの??


どうやってナノ空間を作るのか？ —多孔性配位高分子(PCP)—




PCPのここがすごい！ —混ぜるだけでできる—



—分離したいガスを選ぶ—



—ゲート効果—



PCPを使えば気体の分離・精製を手頃にできるようになる！

PCPの将来展望



貯蔵



水素ステーション



自動車の燃料タンク