

半線形実主要型方程式系に対する polarization set の伝播

京大 理 土居 伸一 (Shin-ichi Doi)

§ 0 序

N. Dencker [D] は、ベクトル値超関数 (distribution) に対して polarization set (略して pol. set) を定義した。それは波面集合の精密化で、最も特異性の高い成分を表している。そして擬微分作用素 (略して $P_\lambda DO_p$) の系に対し、実主要型 (real principal type) という概念を定義し、その方程式系の解の pol. set の伝播 (特異性の伝播の精密化) を示した。同様に H^s の意味での pol. set も定義でき、対応した結果が成り立つ ([G])。

一方 非線形偏微分方程式の解の特異性の伝播や相互作用についての研究が 1970 年代後り頃から盛んに行われている ([Be] の参考文献を参照せよ)。

本稿の目標は、非線形偏微分方程式系の解の pol. set を調べること、特に半線形実主要型の場合にその伝播を示すこと

である。その際、滑らかでない表裏をもつ作用素を取り扱う必要があるため、元の pol. set の定義のままでは不備であるように思える。そこでこの報告では新しい pol. set を導入することを試みた。これは元の pol. set に含まれ、同様の基本的性質をみたしている。そしてこの新しい pol. set について前に述べた目標を実行した。

§1 新しい polarization set の導入

まず準備から始める。 $z_0 = (x_0, \xi_0) \in \mathbb{R}^d \times (\mathbb{R}^d \setminus 0)$, $r > 0$ に対して次のようにおく：

$$M(z_0, r) = \left\{ a \in C_0^\infty(\mathbb{R}^{2d}) : a(z) = 1 \text{ (} z = z_0 \text{ の近傍で)} \right. \\ \left. \text{supp } a \subset \{z : |z - z_0| < r\}, 0 \leq a \leq 1 \right\}, \\ M(z_0) = \bigcup_{r>0} M(z_0, r).$$

$a, b \in M(z_0)$ に対して $a \ll b \Leftrightarrow \text{supp } a \text{ の近傍で } b = 1$ と定める。 $\{a_n(x, D)\}_{n=1}^\infty$ は microlocalizer と呼ばれる (ただし $a_n(x, \xi) = a(x, \frac{\xi}{n})$, $n \in \mathbb{N}$)。microlocalizer に関して詳しくは [M1, 2], [T] を参照せよ。

ここで H^s の意味での波面集合 WF^s の特徴性を掲げておく。

補題 1.1 (cf [T]) $u \in H^{-\infty}(\mathbb{R}^d)$ に対して次は同値である。

- (1) $z_0 \notin WF^s(u)$ 又は $u \in H_z^s$
- (2) $\exists a \in M(z_0)$ s.t. $\{\|a_n(x, D)\|\}_{n=1}^\infty \in \ell^s$

(3) $\exists t > 0 \quad \forall a \in M(z_0, t) \quad \{ \|a_n(x, D) u\| \}_{n=1}^\infty \in \mathcal{H}^s$.

ただし $\mathcal{H}^s = \{ \{e_n\}_{n=1}^\infty ; e_n \in \mathbb{R}, \sum_{n=1}^\infty n^{2s-1} e_n^2 < \infty \} \quad s \in \mathbb{R}$,

$\mathcal{H}^\infty = \bigcap_{s \in \mathbb{R}} \mathcal{H}^s$, $\|\cdot\| = \|\cdot\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$ である。

X を $\mathbb{R}^d$ の開集合とする。 $\mathcal{D}'(X, \mathbb{C}^N)$ を X 上の $\mathbb{C}^N$ 値超関数全体とする。 $\mathbb{C}^N$ の標準基底により $u \in \mathcal{D}'(X, \mathbb{C}^N) \Leftrightarrow u = (u_j)_{j=1}^N$, $u_j \in \mathcal{D}'(X)$ とみよせる。 $\mathcal{E}'(X, \mathbb{C}^N)$, $H_{loc}^s(X, \mathbb{C}^N)$ etc も同様に定める。

さて $z_0 = (x_0, \xi_0) \in X \times (\mathbb{R}^d \setminus 0)$, $s \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, $h \in (\mathbb{C}^N)'$ とする。

このとき $u \in \mathcal{E}'(X, \mathbb{C}^N)$ が h 成分に関して z_0 で micro-local に H^s の滑らかさをもつということを定義したい。これについて三つの案が思い浮かぶ。

$$(1) \quad h \cdot u = \sum_{j=1}^N h_j u_j \in H_z^s.$$

(2) 0階 classical PsDOp の $1 \times N$ 系 P があり、 $Pu \in H_z^s$ かつ $P_0(z_0) = h$ (ただし P_0 は P の主表象)。

(3) $\|a_n(x, D) h \cdot u\| \ll \|a_n(x, D) u\| + e_n \quad (n \in \mathbb{N})$, ただし $a \in M(z_0, t)$, $t > 0$ 十分小, $\{e_n\} \in \mathcal{H}^s$ 。

この内 (1) は $\mathbb{C}^N \rightarrow X$ の $\mathbb{C}$ 級の基底のとりかえにより不変でない。(2) は Dencker の採用したものである。ここでは (3) を明確にする形で $u \in H^s(z_0, h)$ という概念を定義する。

定義 1.2 $u \in \mathcal{D}'(X, \mathbb{C}^N)$ に對し. $u \in H^s(z_0, h)$ とは. 任意の $\varepsilon > 0$ に對し. $r > 0$ が存在し. 次の条件を満たすことと定める:
 $a \ll b$ なる任意の $a, b \in M(z_0, r)$ に對し. a, b, ε, r にはよるが. $n \in \mathbb{N}$ にはよらない $C > 0, \{e_n\}_{n=1}^\infty \in h^s$ がとれて.

$$\|a_n(x, D) h \cdot u\| \leq \varepsilon \|a_n(x, D) u\| + C n^{-1} \|b_n(x, D) u\| + e_n \quad (n \in \mathbb{N})$$

が成立する。

定義 1.2' $u \in \mathcal{D}'(X, \mathbb{C}^N)$ に對し $u \in H^s(z_0, h)$ とは. ある $\varphi \in C_0^\infty(X)$, $\varphi = 1$ ($x = x_0$ の近傍で) があって $\varphi u \in H^s(z_0, h)$ となることと定める。(もちろん φ のとり方によらない。) さらに次のようにおく:

$$H^s(u) = \{ (z, h) \in X \times (\mathbb{R}^d \setminus 0) \times \mathbb{C}^N; u \in H^s(z, h) \},$$

$$H^s(u, z) = \{ h \in \mathbb{C}^N; u \in H^s(z, h) \}.$$

定義 1.3 (H^s energy polarization set, $E^s(u)$).

$u \in \mathcal{D}'(X, \mathbb{C}^N)$ の H^s energy pol. set $E^s(u)$ を次のように定義する:

$$E^s(u) = \{ (z, w) \in X \times (\mathbb{R}^d \setminus 0) \times \mathbb{C}^N; h \cdot w = 0, \forall h \in H^s(u) \}.$$

ここで $h \cdot w$ は $(\mathbb{C}^N)' \times \mathbb{C}^N$ 上の双線形形式である。又 $E^s(u, z)$ を $E^s(u)$ の $z \in X \times (\mathbb{R}^d \setminus 0)$ 上の fiber とする。

注意 1.4 $E^s(u)$ は z について conic, w について linear

である。特に $E^s(u, z)$ は $\mathbb{C}^N$ の部分空間である。 $E^s(u)$ は一般に $X \times (\mathbb{R}^q \setminus 0) \times \mathbb{C}^N$ で開いていないが、若干の定義の修正により開にできる（しかし繁雑なのでここでは略する）。

注意 1.5 M を可算基をもつ C^∞ 級多様体, E をその上の C^∞ 級ベクトル束 ($\mathbb{C}$ 上の), E' を E の双対ベクトル束, Ω を M 上の C^∞ 級 density 束とし, $\mathcal{D}'(M, E) = (C^\infty(M, E' \otimes \Omega))'$ とおく。すると $u \in \mathcal{D}'(M, E)$ に対し $E^s(u)$ と $H^s(u)$ が順に誘導束 π^*E と π^*E' の部分集合として定義できる。ただし $\pi: T^*M \setminus 0 \rightarrow M$ は自然な射影である。

比較のため Dencker [D] ($s=\infty$), Gérard [G] ($s \in \mathbb{R}$) による H^s pol. set, WF_{pol}^s の定義を引用しておく。

定義 1.6 $u \in \mathcal{D}'(X, \mathbb{C}^N)$ の H^s pol. set $WF_{\text{pol}}^s(u)$ を次で定める:

$$WF_{\text{pol}}^s(u) = \bigcap_{A: Au \in H^s} N_A$$

$$N_A = \{ (z, w) \in (T^*X \setminus 0) \times \mathbb{C}^N ; w \in \text{Ker } A_0(z) \}.$$

ただし A は 0 階 classical P.S.D.O.p の $1 \times N$ 系で, A_0 はその主表である。

命題 1.7 $E^s(u) \subset WF_{\text{pol}}^s(u)$, $u \in \mathcal{D}'(X, \mathbb{C}^N)$ 。

証明は略す。次に具体例をあげる。

例 1.8 $u = (u_1, u_2) = (f(D)\delta, \delta) \in H_{loc}^{-\frac{d}{2}-\varepsilon}(\mathbb{R}^d, \mathbb{Q}^2) \quad \forall \varepsilon > 0$

$f(z) = \log(2+|z|^2)$, δ : Dirac の delta 関数 とすると.

$s \geq -\frac{d}{2}$ のとき.

$$\begin{cases} E^s(u) = \{ (0, z, (w_1, 0)) ; z \in \mathbb{R}^d \setminus 0, w_1 \in \mathbb{Q} \} \cup 0, \\ WF_{pol}^s(u) = \{ (0, z, w) ; z \in \mathbb{R}^d \setminus 0, w \in \mathbb{Q}^2 \} \cup 0. \end{cases}$$

ただし $0 = (T^*\mathbb{R}^d \setminus 0) \times \{0\}^2$ と略している.

例 1.9 $u = (u_1, u_2) = (x_{1+}^a x_{2+}^b, x_{1+}^a) \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^2, \mathbb{Q}^2)$,
 $\in H_{z_0}^{a+\frac{1}{2}-\varepsilon} (\forall \varepsilon > 0)$, $0 < a, b$, $z_0 = ((0, 0), (\pm 1, 0))$ とすると

$$\begin{cases} E^s(u, z_0) = \mathbb{Q} \times \{0\} & (a + \frac{1}{2} \leq s < a + b + \frac{1}{2}) \\ WF_{pol}^s(u, z_0) = \mathbb{Q}^2 & (s \geq a + \frac{1}{2}) \end{cases}.$$

ただし $t_+ = \max\{t, 0\}$.

$E^s(u)$ は $WF_{pol}^s(u)$ と同様の基本的性質をみている.

命題 1.10 $\pi(E^s(u) \setminus 0) = WF^s(u) \quad (u \in \mathcal{D}'(X, \mathbb{Q}^N))$.

ただし $\pi: (T^*X \setminus 0) \times \mathbb{Q}^N \rightarrow T^*X \setminus 0$ は射影である.

命題 1.11 P を m 階 classical P.S.D Op の $M \times N$ 系とし. P_m をその主表象とする. このとき $u \in \mathcal{D}'(X, \mathbb{Q}^N)$ に対し.

$$P_m(z) E^s(u, z) \subset E^{s-m}(Pu, z) \quad z \in T^*X \setminus 0$$

が成立し. 特には $M=N$ で P が z で elliptic ならば上式で等号が成り立つ. (P は properly supported と暗黙の内に仮定されている.)

証明は余力があれば §3 で行う。

§2 主結果

X を $\mathbb{R}^1$ の開集合とし、 X 上の一般の非線形偏微分作用素系

$$(2.1) \quad P[u] = F(x, \partial^\alpha u(x))_{|\alpha| \leq m}$$

を考える。また $u = (u_1, \dots, u_N)$ で、 $F(x, u_\alpha)_{|\alpha| \leq m} = (F_j)_{1 \leq j \leq M}$

は $\{(x, u_\alpha)_{|\alpha| \leq m}; x \in X, u_\alpha = (u_{1,\alpha}, \dots, u_{N,\alpha}) \in \mathbb{R}^N\}$ から $\mathbb{C}^M$

への C^∞ map である。 P が半線形の場合は、

$$(2.2) \quad P[u] = P_m(x, D)u + G(x, \partial^\alpha u)_{|\alpha| \leq m-1}$$

という形をとる。ここで $P_m(x, D)u$ は線形の最高階の部分で

$G(x, \partial^\alpha u)_{|\alpha| \leq m-1}$ は残りである。

定理 2.1 $u \in \tilde{C}^{m+p} \cap H_{loc}^s(X, \mathbb{R}^N)$, $p > 0$, $s \leq s_1 \leq s+p$, (2.1) を仮定する。このとき

$$(2.3) \quad P_m(z) E^{s_1}(u, z) \subset E^{s_1-m}(P[u], z), \quad z \in T^*X \setminus 0$$

ただし、

$$P_m(x, z) = \sum_{|\beta|=m} \left(\frac{\partial F_j}{\partial u_{k,\beta}}(x, \partial^\alpha u)_{|\alpha| \leq m} \right)_{\substack{j=1, \dots, m \\ k=1, \dots, m}} (iz)^\beta.$$

特に $z \notin WF^{s_1-m}(P[u])$ ならば、次がなりたつ：

$$(2.4) \quad E^{s_1}(u, z) \subset \ker P_m(z)$$

また $M=N$ で $P_m(z)$ が可逆ならば (2.3) で等号がなりたつ。

定理 2.1' $u \in \tilde{C}^{m-1+p} \cap H_{loc}^s(X, \mathbb{R}^N)$, $p > 0$, $s \leq s_1 \leq s+p+1$, (2.2) を仮定すると定理 2.1 に対応した主張が成立する。

注意 $\tilde{C}^r$ は $r \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ のとき $W_{loc}^{\infty, r}$ を、 $r > 0$, $r \notin \mathbb{N}$ のとき $C^{[r]}$ 級でかつ $[r]$ 回導関数か皆 $r-[r]$ 次 Hölder 連続であることを表わす。又 $u \in H_{loc}^s(X, \mathbb{R}^N) \Leftrightarrow \forall_j u_j \in H_{loc}^s(X)$ かつ u_j は実数値である。

約束 以後 $M=N$, (2.2) を仮定して話を進める。

ここで [D] より 2 つの定義を必要な形で引用しておく。

定義 2.2 P が $(x_0, z_0) \in T^*X \setminus 0$ で実主要型であるとは、 $N \times N$ の $(1-m)$ 次正斉次 (C^∞) 表裏 $\tilde{P}_{1-m}(x, z)$ が存在して

$$\tilde{P}_{1-m}(x, z) P_m(x, z) = q_1(x, z) I_n \quad ((x_0, z_0) \text{ の近傍で})$$

が成り立つことを言う。ただし $q_1(x, z)$ は実主要型のスカラー表裏である。つまり $q_1(x, z)$ は実数値で、 $q_1=0$ ならば dq_1 と dz とは一次独立である。このとき

$$R_P = \{z \in T^*X \setminus 0; \det P_m(z) = 0 \text{ かつ } P \text{ は } z \text{ で実主要型である}\}$$

は超曲面であり、 $T_z Y = (T_z R_P)^\perp = \langle H_{q_1}(z) \rangle$ ($z \in Y$) なる曲線 $Y \subset R_P$ を P の陪特性曲線とよぶことにする。(V^σ は $\sigma = dz \wedge dz$ に対応する V の直交空間を示し、 $H_{q_1} = \sum_{j=1}^d (\frac{\partial q_1}{\partial z_j} \frac{\partial}{\partial x_j} - \frac{\partial q_1}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial z_j})$ は q_1 に対応する Hamilton vector 場である。)

定義 2.3 γ を P の陪特性曲線, L を $\gamma \times \mathbb{C}^N$ の C^1 級複素直線部分束 (底空間 γ), $u \in C^{m-1}(\gamma, \mathbb{R}^N)$ とする。 L が (P, u) の (γ 上の) Hamilton orbit であるとは、 $L \subset N_P = \{(z, w) \in (T^*X \setminus 0) \times \mathbb{C}^N; w \in \ker P_m(z)\}$ であり、 L が局所的に次の解 $w \in C^1(\gamma_0, \mathbb{C}^N)$ ($\gamma_0 \subset \gamma$) で与えられることと定める:

$$(2.5) \quad (Hq_1 + \frac{1}{2} \{\tilde{P}_{1-m}, P_m\} + i \tilde{P}_{m-1} P_{m-1}^s) w = 0 \quad (\gamma_0 \text{ 上})$$

ただし $q_1, \tilde{P}_{1-m}$ は定義 2.2 のもので

$$\{\tilde{P}_{1-m}, P_m\} = \sum_{j=1}^d (\partial_{\tilde{\varepsilon}_j} \tilde{P}_{1-m} \partial_{\alpha_j} P_m - \partial_{\alpha_j} \tilde{P}_{1-m} \partial_{\tilde{\varepsilon}_j} P_m)$$

$$P_{m-1}^s = P_{m-1} - (2i)^{-1} \sum_{j=1}^d \partial_{\alpha_j} \partial_{\tilde{\varepsilon}_j} P_m$$

$$P_{m-1}(\alpha, \tilde{\varepsilon}) = \sum_{|\beta|=m-1} \left(\frac{\partial G_{\beta}}{\partial u_{k,\beta}}(\alpha, \partial^{\alpha} u(\alpha)) \right)_{|\alpha| \leq m-1} \cdot (i\tilde{\varepsilon})^{\beta}_{|\beta| \leq N}$$

である。

注意 $\gamma_0 = \{z(t) : |t| < \varepsilon\}$, $\dot{z}(t) = Hq_1(z(t))$ とすると、 (2.5) は $w(z(t))$ に対する常微分方程式系になる。

定理 2.4 $u \in \tilde{C}^{m-1+p} \cap H_{\text{loc}}^s(X, \mathbb{R}^N)$, $p > 0$, $s \leq s_1 \leq s+p$ を仮定する。 L を (P, u) の γ 上の Hamilton orbit とする。 $\gamma \cap WF^{s_1+1-m}(P[u]) = \emptyset$ ならば、

$$E^{s_1}(u) \cap L = \gamma \times \{0\} \quad \text{または} \quad L$$

言いかえると、 (P, u) の γ 上の Hamilton orbit $L_1, \dots, L_k$ があり、次式がなりたつ：

$$E^{S_1}(u)|_{\gamma} = L_1 \oplus \dots \oplus L_k \quad (\text{直和}).$$

注意 以上の定理の中の S, S_1 の範囲は、(2.1), (2.2) の形に対応するスカラーの場合 ($[Bo]$, $[Me]$) のものを含んでいる。(ただし $P \in \mathbb{N}$ は除く。)

注意 P が線形ならば、 $u \in \mathcal{D}'(X, \mathbb{C}^N)$, $S_1 \in \mathbb{R}$ でこれまでの定理の主張が成り立つ。これは WF_{pol}^S に対する Dencker, Gérard の結果に対応している ($[D]$, $[G]$)。

最後に例をあげる。これは WF_{pol}^S が非線形問題では E^S に比べて不安定なことを示している。

例 2.5 $\mathbb{R}^2$ 上で次の 3×3 系を考える：

$$P[u] \equiv \begin{bmatrix} \partial_1 & 0 & 0 \\ 0 & \partial_1 & 0 \\ -u_2 \partial_1 & 0 & \partial_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a(x_{1+})^{q-1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ただし $a > 1$, $t_+ = \max\{t, 0\}$ 。解の一つは

$$u_1 = (x_{1+})^q, \quad u_2 = (x_{2+})^q, \quad u_3 = (x_{1+})^q (x_{2+})^q$$

がある。これは任意の $\varepsilon > 0$ に対し

$$u \in \tilde{C}^a \cap H_{loc}^{a+\frac{1}{2}-\varepsilon}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3), \quad \notin H_{loc}^{a+\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$$

をみえる。 $z_0 = ((0, 0), (\pm 1, 0))$ とおく。定理 2.1 より

$$E^s(u, z_0) = \mathbb{C} \times \{0\} \times \{0\} \quad (a + \frac{1}{2} \leq s < 2a - \frac{1}{2})$$

である (実際はもっと一般の a, s で成立する)。一方

$$WF_{pol}^s(u, z_0) = \mathbb{C} \times \{0\} \times \mathbb{C} \quad (s \geq a + \frac{1}{2}).$$

例 2.6 $\mathbb{R}^2$ 上で次の 3×3 系を考える:

$$P[u] = \begin{bmatrix} \partial_1 & 0 & 0 \\ 0 & \partial_1 & 0 \\ 0 & 0 & \partial_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} u_2 u_3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0.$$

この解の一つに $u > 0$ として

$$u_1 = \frac{1}{a+1} (x_{1+})^{a+1} (x_{2+})^a, \quad u_2 = (x_{2+})^a, \quad u_3 = (x_{1+})^a$$

がある。このとき任意の $\varepsilon > 0$ に対して

$$u \in \tilde{C}^a \cap H_{loc}^{a+\frac{1}{2}-\varepsilon}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3), \quad \& H_{loc}^{a+\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$$

である。 P の陪特性曲線の一つの γ をとる:

$$\gamma: z = ((t, 0), (0, \pm 1)) \quad t \in \mathbb{R}.$$

このとき定理 2.4 から $a + \frac{1}{2} \leq s < 2a + \frac{1}{2}$ ならば $\dim E$

$(u, z(t))$ は $t \in \mathbb{R}$ で一定ではない。実際このとき

$$E(u, z(t)) = \mathbb{C} \left(\frac{1}{a+1} (t_+)^{a+1}, 1, 0 \right) \quad t \in \mathbb{R}$$

である。一方 $s \geq a + \frac{1}{2}$ で

$$WF_{pol}^s(u, z(t)) = \begin{cases} \mathbb{C} \left(\frac{1}{a+1} (t_+)^{a+1}, 1, 0 \right) & t \neq 0 \\ \mathbb{C}^2 \times \{0\} & t = 0 \end{cases}$$

となり、 $\dim WF_{pol}^s(u, z(t))$ は一定ではない。

§3 証明

X の標準座標により $T^*X \cong X \times \mathbb{R}^d$ とみなして証明を進めれば十分である。ただし証明に飛躍のあることを了承された。

命題 1.10 の証明 $u \in \mathcal{E}'(X, \mathcal{Q}^N)$, $z_0 \in X \times (\mathbb{R}^d_0)$ に對し.

『 $E^s(u, z_0) = \{0\} \Leftrightarrow z_0 \notin WFS^s(u)$ 』を示せばよい。

($\Rightarrow$) 定義 1.2 を $h = (0, \dots, 0, \overset{\cdot}{1}, 0, \dots, 0)$, $r > 0$ 十分小で適用し、 j にかんする和をとると $\forall a \ll b \in M(z_0, r)$ に對し.

$$\|a_n(x, D)u\| \leq \frac{C}{n} \|b_n(x, D)u\| + e_n \quad n \in \mathbb{N}$$

が成立する ($\exists C > 0, \exists \{e_n\} \in h^s$)。任意の列 $a^0 \ll a^1 \ll a^2 \ll \dots \in M(z_0, r)$ をとり、上の評価をくり返すと

$$\|a_n^0(x, D)u\| \leq C_j n^{-j} \|a_n^j(x, D)u\| + e_n^j \quad n \in \mathbb{N}$$

が言える ($\exists C_j > 0, \exists \{e_n^j\} \in h^s$)。ゆえに $\{\|a_n(x, D)u\|\}_{n=1}^\infty \in h^s$, よって補題 1.1 から $z_0 \notin WFS^s(u)$ 。

($\Leftarrow$) 補題 1.1 より明らか。

命題 1.11 の証明 $u \in \mathcal{E}'(X, \mathcal{Q}^N)$ としてよい。 $z_0 = (x_0, \xi_0)$,

$|\xi_0| = 1$ とし、 $\omega \notin E^{s-m}(Pu, z_0)$ ならば $\omega \notin P_m(z_0)E^s(u, z_0)$ と

なることを示す。 $\omega \notin E^{s-m}(Pu, z_0)$ より定義 1.3 から $h \cdot \omega$

$\neq 0$ なる $h \in H^{s-m}(Pu, z_0)$ がある。 $f(\xi) = |\xi|^{-m}$ ($|\xi| \geq 1$) なる

$f(\xi) \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ をとる。 $\forall a \ll b \ll c \in M(z_0, r)$ に對し.

$$\begin{aligned} & \| a_n(x, D) h \cdot P_m(z_0) u \| \\ & \leq \| a_n(x, D) h \cdot (P_m(z_0) - f(D)P) u \| + \| a_n(x, D) h \cdot f(D)Pu \| \\ & = A_n + B_n, \end{aligned}$$

$$A_n \leq \varepsilon_1(h) \| a_n(x, D) u \| + C_1 h^{-1} \| c_n(x, D) u \| + e_n^1,$$

$$B_n \leq K h^{-m} \| a_n(x, D) h \cdot Pu \| + C_2 h^{-1} \| c_n(x, D) u \| + e_n^2$$

$$\leq K h^{-m} \{ \varepsilon_2(h) \| a_n(x, D) Pu \| + C_3 h^{-1} \| b_n(x, D) Pu \|$$

$$+ e_n^3 \} + C_2 h^{-1} \| c_n(x, D) u \| + e_n^2$$

$$\leq \varepsilon_3(h) \| a_n(x, D) u \| + C_4 h^{-1} \| c_n(x, D) u \| + e_n^4,$$

ただし $\{e_n^1\}, \{e_n^2\} \in h^\infty$, $\{e_n^3\} \in h^{s-m}$, $\{e_n^4\} \in h^s$, $C_j > 0$,

$K > 0$, $\varepsilon_j(h) > 0$. $K, \varepsilon_j(h)$ は a, b, c による. $h \downarrow 0$ のと

き $\varepsilon_j(h) \downarrow 0$ である. 従って $h P_m(z_0) h \in H^s(u, z_0)$. $h \cdot w \neq$

0 となり $w \notin P_m(z_0) E^s(u, z_0)$ である。

§ 2 の定理の証明には Bony [Bo], Meyer [Me] による para-differential calculus を用いる。記号の説明もかねて § 4 でまとめ直しておくので参照されたい。

定理 2.1 の証明. $u \in \mathcal{E}'(X, \mathbb{R}^N)$, F は x についてコンパクト台をもつとして証明すれば十分である。補題 4.1 より

$$P[u] = T_a(x, D) u + f, \quad f \in H^{s+p-m}(\mathbb{R}^d, \mathbb{C}^N);$$

$$\text{ただし} \quad Q(x, \xi) = \sum_{|\alpha| \leq m} \left(\frac{\partial F}{\partial u_{k, \beta}}(x, \partial^\alpha u)_{|\alpha| \leq m} \right)_{\substack{j=1, \dots, N \\ \rightarrow k=1, \dots, N}} \cdot (\xi^\alpha)^\beta.$$

よって $E^{s_1-m}(P[u]) = E^{s_1-m}(T_0(x, D)u)$ ($s \leq s_1 \leq s+p$) となり、次の命題に帰着される。

命題 3.1 $u \in H^s(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^N)$ ($s \leq s_1 \leq s+p$), $P(x, \xi) \in B_p^m$, $P_m(x, \xi) \in C_p^m$ (共に $N \times N$ 行列で, P_m は $|k| \geq 1$ について m 次正斉次) でさらに $P(x, \xi) - P_m(x, \xi) \in C_{p-\min\{p, 1\}}^{m-\min\{p, 1\}}$ ならば

$$P_m(\xi) E^{s_1}(u, z) \subset E^{s_1-m}(P(x, D)u, z), \quad z \in \mathbb{R}^d \times S^{d-1}.$$

証明 命題 1.11 の証明の s を s_1 に、 $\{e_n\}, \{e_n^2\} \in h^\infty$ の h^∞ を h^{s+p} にかえればよい。(多少飛躍がある)。

定理 2.1' の証明 定理 2.1 の証明で $f \in H^{s+p-m}$ と $f \in H^{s+1+p-m}$ にかえればよい。

定理 2.4 の証明 γ を十分小さい曲線に分割してその各に於て定理を証明すればよいので、はじめから γ は十分小としてよい。よって $\text{supp } u, \text{supp } P_m(\cdot, \xi), \text{supp } G_\ell(\cdot, u_\alpha)_{1 \leq m \leq M}$ は全て X のあるコンパクト集合に含まれていると仮定して十分である。さらに定義 2.2 の $\tilde{P}_{\ell m}, q_\ell$ ($|k| \leq \frac{1}{100}$ で C^∞ に γ がよくに調節する) があって

$$\begin{cases} \tilde{P}_{\ell m}(x, \xi) P_m(x, \xi) = q_\ell(x, \xi) I & \text{on } \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \\ \tilde{P}_{\ell m}(x, \xi) P[u] \in H^{s_1}(\mathbb{R}^d, \mathbb{C}^N) \\ q_\ell \text{ は実数値で } \gamma \text{ の近傍で実主要型} \end{cases}$$

となるとしてよい。補題4.1より

$$G_T(x, \partial^\alpha u) - \sum_{\ell=0}^{m-1} T_{P_\ell}(x, D) u \in H^{s+p-(m-1)}(\mathbb{R}^d, \mathbb{C}^N),$$

ただし

$$P_\ell(x, \xi) = \sum_{|\beta|=\ell} \left(\frac{\partial G_T}{\partial u_{h,\beta}}(x, \partial^\alpha u) \Big|_{|\alpha| \leq m-1} \right)_{\substack{j=1, \dots, N \\ \rightarrow h=1, \dots, N}} \cdot (\tilde{u}^\beta)^\beta.$$

ゆえに $\tilde{P}_{1-m}(x, D) \left(P_m(x, D) + \sum_{\ell=0}^{m-1} T_{P_\ell}(x, D) \right) u \in H^{s_1}(\mathbb{R}^d, \mathbb{C}^N)$ である。これを表象展開して整とんすると (多少飛躍があるが)

$$(Q(x, D) I + Q(x, D)) u = f \in H^{s_1}(\mathbb{R}^d, \mathbb{C}^N)$$

とかける。ただし $Q = Q_1 + \frac{1}{2i} \sum_{j=1}^d \partial_{x_j} \partial_{\bar{x}_j} Q_1$, $Q \in B_p^0(N \times N$

行列) であり $Q - T_{Q_0} \in B_{p-\min\{p,1\}}^{-\min\{p,1\}}$ が成りた。ただし

$$Q_0 = \frac{1}{2i} \{ \tilde{P}_{1-m}, P_m \} + \tilde{P}_{1-m} P_{m-1}^s + \tilde{P}_{-m}^s P_m,$$

$$\{ \tilde{P}_{1-m}, P_m \} = \sum_{j=1}^d (\partial_{\bar{x}_j} \tilde{P}_{1-m} \partial_{x_j} P_m - \partial_{x_j} \tilde{P}_{1-m} \partial_{\bar{x}_j} P_m),$$

$$P_{m-1}^s = P_{m-1} - \frac{1}{2i} \sum_{j=1}^d \partial_{x_j} \partial_{\bar{x}_j} P_m$$

$$\tilde{P}_{-m}^s = -\frac{1}{2i} \sum_{j=1}^d \partial_{\bar{x}_j} \partial_{x_j} \tilde{P}_{1-m}.$$

さて $(z_0, w_0) = (x_0, \xi_0, w_0) \in L \setminus 0$ に對して

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \nabla_{\bar{x}} q_1(x(t), \xi(t) / |\xi(t)|) \\ \dot{\xi}(t) = -\nabla_x q_1(x(t), \xi(t) / |\xi(t)|) |\xi(t)| \\ \dot{w}(t) = -i Q_0(x(t), \xi(t) / |\xi(t)|) \\ x(0) = x_0, \xi(0) = \xi_0, w(0) = w_0 \end{cases}$$

の解を $(z(t), w(t)) = (x(t), \xi(t), w(t))$ $t \in \mathbb{R}$ とおく。このとき $(z_0, w_0) \notin E^{s_1}(u)$ を仮定し、 $(z(t), w(t)) \notin E^{s_1}(u)$ ($t \in \mathbb{R}$) を言おう。定義1.2より $h_0 \cdot w_0 \neq 0$ かつ $h_0 \in H^{s_1}(u, z_0)$

が存在する。 $h(t)$ を次の解としよう:

$$\begin{cases} \dot{h}(t) = i Q_0(x(t), z(t)/|z(t)|) h(t) \\ h(0) = h_0 \end{cases}$$

すると $\frac{d}{dt} (h(t) \cdot w(t)) \equiv 0$ より $h(t) \cdot w(t) \equiv h_0 \cdot w_0 \neq 0$ と
なる。従って $h(t) \in H^1(u, z(t))$ を示せば十分である。

$T > 0$ を固定する ($T < 0$ の場合も同様に扱える)。各 $a \in M(z(T), r)$ に次の解 $a(t) = a(t, x, z)$ を対応させる:

$$(*) \begin{cases} (\partial_t + H_{q_1}) a(t, x, z) = 0, & 0 \leq t \leq T \\ a(T, x, z) = a(x, z) \end{cases}$$

すると a によらず $r(t) > 0$ で $\sup_{0 \leq t \leq T} r(t) \downarrow 0$ ($r \downarrow 0$) となるものがあり、 $a(t) \in M(z(t), r(t))$ かなりたつ。又 $a_n(x, z) = a(x, n^{-1}z)$ を $t = T$ の値とする解は、 $a_n(t, x, z) = a(t, x, \frac{z}{n})$ で与えられる ($n \in \mathbb{N}$)。 (正確には $(*)$ での q_1 は $z \neq 0$ で 1 次正斉次であるように変更したものをを用いる。)

任意の $a \ll b \ll c \in M(z(T), r)$ に対応する $(*)$ の解を $a(t), b(t), c(t)$ とする。すると

$$\begin{aligned} & (D_t + q(x, D)) a_n(t, x, D) h(t) \cdot u \\ &= [D_t + q(x, D), a_n(t, x, D)] h(t) \cdot u + a_n(t, x, D) h(t) \cdot f \\ & \quad + a_n(t, x, D) h(t) \cdot (Q_0(z(t)) - Q(x, D)) u \\ &\equiv f_n^1(t) + f_n^2(t) + f_n^3(t) \end{aligned}$$

$$\|f_n^1(t)\| \leq C_1 n^{-1} \|b_n(t, x, D)u\| + e_n^1,$$

$$\|f_n^2(t)\| \leq e_n^2,$$

$$\|f_n^3(t)\| \leq \left(\sup_{x, z} |h(t) \cdot (Q_0(z(t)) - Q(x, z))| + C_2 n^{-\frac{\nu}{2}} \right) \\ \times \|a_n(t, x, D)u\| + C_3 n^{-1} \|b_n(t, x, D)u\| + e_n^3$$

か $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq t \leq T$ 成立する。 $f \in L^1 \subset \{e_n^1\} \in \mathcal{H}^\infty$, $\{e_n^2\}$, $\{e_n^3\} \in \mathcal{H}^{s_1}$, $C_j > 0$, $\nu = \min \{1, \frac{2p}{p+2}\}$ 。(ここにも多少飛躍がある)。以上を合わせて

$$\|f_n^0(t)\| \leq \varepsilon_1(r) \|a_n(t, x, D)u\| + C_4 n^{-1} \|b_n(t, x, D)u\| + e_n^4$$

を得る ($C_4 > 0$, $\{e_n^4\} \in \mathcal{H}^{s_1}$, $\varepsilon_1(r) > 0$, $\varepsilon_1(r) \downarrow 0$ ($r \downarrow 0$))。

$$u_n(t) = a_n(t, x, D)h(t) \cdot u \quad \text{と} \quad h < \infty.$$

$$\frac{d}{dt} \|u_n(t)\|^2 = 2 \operatorname{Im} (q(x, D)u_n(t) - f_n^0(t), u_n(t)) \\ \leq 2 (k_1 \|u_n(t)\| + \|f_n^0(t)\|) \|u_n(t)\|$$

だから

$$\frac{d}{dt} \|u_n(t)\| \leq k_1 \|u_n(t)\| + \|f_n^0(t)\|$$

従って

$$\|u_n(t)\| \leq e^{k_1 T} \|u_n(0)\| + \int_0^T e^{k_1(T-s)} \|f_n^0(s)\| ds \\ \leq k_2 (\|u_n(0)\| + \sup_{0 \leq t \leq T} \|f_n^0(t)\|).$$

ただし $k_1, k_2 > 0$ は q, T にかよわずな定数。 $h_0 \in H^{s_1}(U, \mathbb{C})$ なので後述する補題 3.2 を使えば

$$\|u_n(0)\| \leq \varepsilon_2(r) \|a_n(0, x, D)u\| + C_5 n^{-1} \|b_n(0, x, D)u\| + e_n^5 \\ \leq \varepsilon_3(r) \|a_n(x, D)u\| + C_6 n^{-1} \|c_n(x, D)u\| + e_n^6$$

が言える。ここで $\{e_n^5\}, \{e_n^6\} \in h^{s_1}$, $C_j > 0$, $\varepsilon_j(t) > 0$ で $t \downarrow 0$ のとき $\varepsilon_j(t) \downarrow 0$ である。同様の評価が $\|f_n^0(t)\|$ についても行え。結局 $C > 0$, $(e_n) \in h^{s_1}$ があて

$$\|a_n(\alpha, D)h(T) \cdot u\| \leq \varepsilon(t) \|a_n(\alpha, D)u\| + Cn^{-1} \|c_n(\alpha, D)u\| + e_n \quad (n \in \mathbb{N})$$

が成り立つ。これは $h(T) \in H^{s_1}(u, z(T))$ を意味する。

補題 3.2 任意の $a \ll b \in M(z(T), t)$ に対して

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|a_n(t, \alpha, D)u\|$$

$$\leq K \|a_n(\alpha, D)u\| + Cn^{-1} \|b_n(\alpha, D)u\| + e_n, \quad n \in \mathbb{N}$$

が成り立つ。ただし $\{e_n\} \in h^{s_1}$, $C, K > 0$ で K は q, Q, T による依存する。

略証 $a = a^0 \ll a^1 \ll \dots \ll a^k = b$ ($k = [p] + 1$) なる $a^j \in M(z(T), t)$ をとり、各 $j = 0, \dots, k-1$ に対して

$$\frac{d}{dt} \|a_n^j(t, \alpha, D)u\| \leq K \|a_n^j(t, \alpha, D)u\|$$

$$+ Cn^{-1} \|a_n^{j+1}(t, \alpha, D)u\| + e_n$$

なる評価を得る。ただし $K = K(q, Q, T) > 0$, $C > 0$, $\{e_n\} \in h^{s_1}$ である。これに Gronwall の補題を使い、得られた不等式を j に際してたしあわせればよい。

主に [Bo], [Me], [Hö] に従って述べる。

まず $p \geq 0$ に対し $|\cdot|_p$ を定義する:

$$|f|_p = \sum_{|\alpha| \leq p} \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |\partial^\alpha f(x)| \quad (p \in \mathbb{Z}),$$

$$|f|_p = |f|_{[p]} + \sum_{|\alpha| = [p]} \sup_{x, h \in \mathbb{R}^d} \frac{|\partial^\alpha f(x+h) - \partial^\alpha f(x)|}{|h|^{p-[p]}} \quad (p \notin \mathbb{Z}).$$

次に素関クラスを定める。 $m \in \mathbb{R}$, $p \geq 0$ とする。

$$(C_p^m) \quad p(x, \xi) \in C_p^m \Leftrightarrow |p^{(\alpha)}(\cdot, \xi)|_p \leq C_\alpha \langle \xi \rangle^{m-|\alpha|}, \quad \xi \in \mathbb{R}^d \\ (\forall \alpha \quad \exists C_\alpha > 0)$$

$$(A_p^m) \quad p(x, \xi) \in A_p^m \Leftrightarrow p(x, \xi) \in C_p^m \text{ かつ } |p_{(\beta)}^{(\alpha)}(x, \xi)| \leq \\ C_{\alpha\beta} \langle \xi \rangle^{m-p+|\beta|-|\alpha|}, \quad x, \xi \in \mathbb{R}^d \\ (\forall \alpha, \forall |\beta| > p \quad \exists C_{\alpha\beta} > 0)$$

一般に $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ の部分集合 S と $\mu > 0$ に対して

$$S[\mu] = \{ p(x, \xi) \in S : \text{supp } \hat{p}_{x \rightarrow \eta}(\eta, \xi) \subset \{ |\eta| \leq \mu |\xi| \} \}$$

とおくことにする。特に $B_p^m = A_p^m[\frac{1}{10}]$ とおく。

注意 $p \in \mathbb{N}$ のとき A_p^m, B_p^m は [Me] の定義と一致する。

$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ から $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)[\mu]$ ($\mu > 0$) への写像を作ろう。

$0 \leq \psi \leq 1$, $\psi(x) = 0$ ($|x| \geq 1$), $\psi(\eta) = 1$ ($|\eta| \leq \frac{1}{2}$) なる $\psi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$

をとり、

$$\chi_\mu(\eta, \xi) = \psi\left(\frac{\eta}{\mu|\xi|}\right) (1 - \psi(\xi)),$$

$$T_p^M(x, \xi) = \mathcal{F}_{\eta \rightarrow x}^{-1} (\chi_\mu(\eta, \xi) \hat{p}_{x \rightarrow \eta}(\eta, \xi)), \quad p \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$$

により χ_μ, T^M を定める。 T^M が求める写像である。特に

$T = T^{\frac{1}{100}}$ とおく。 $(\frac{1}{10}, \frac{1}{100})$ に深い根拠はない。

補題 4.1 (cf [Me]) $u \in \mathcal{E}' \cap \tilde{C}^{m+p} \cap H^s(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^N)$ ($p > 0$,

$m \in \{0\} \cup \mathbb{N}$) とし. $F(x, u_\alpha)_{|\alpha| \leq m}$ を $f(x, u_\alpha)_{|\alpha| \leq m}$: $x \in \mathbb{R}^d$, $u_\alpha = (u_{1,\alpha}, \dots, u_{N,\alpha}) \in \mathbb{R}^N$ } から $\mathcal{C}^m$ への $x \mapsto 1$ である $\mathcal{C}^\infty$ 写像とす. このとき, $\forall \mu > 0$ に対し,

$$F(x, \partial^\alpha u(x))_{|\alpha| \leq m} = T_p^\mu(x, D) u + f_\mu, \quad \exists f_\mu \in H^{s+p-m}(\mathbb{R}^d, \mathcal{C}^m)$$

と分解できる. ただし

$$P(x, \xi) = \sum_{|\beta| \leq m} \left(\frac{\partial F_j}{\partial u_{k,\beta}}(x, \partial^\alpha u(x))_{|\alpha| \leq m} \right)_{\substack{j=1, \dots, M \\ k=1, \dots, N}} \cdot (i\xi)^\beta.$$

補題 4.2 (cf [Hö]) $P \in S_{1,1}^m[M]$, $0 < \mu < 1$ ならば $P(x, D): H^{s+m} \rightarrow H^s$ はすべての $s \in \mathbb{R}$ で有界である. 単に $P \in S_{1,1}^m$ ならば $s > 0$ に対し有界である.

補題 4.3 (cf [Bo], [Hö]) $P \in A_\rho^m[M]$, $0 < \mu < 1$, $\operatorname{Re} P \geq 0$ とすると $\nu = \min\{1, \frac{2\rho}{\rho+2}\}$ で次が成り立つ:

$$\operatorname{Re}(P(x, D)u, u) \geq -C_\mu(P) \|u\|_{H^{\frac{m-\nu}{2}}}^2, \quad u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d).$$

ただし $C_\mu(\cdot)$ は A_ρ^m 上連続なあるセミノルムである.

補題 4.4 (cf [Me], [Hö]) $P_1 \in S_{1,1}^{m_1}$, $P_2 \in A_{\rho_2}^{m_2}[M_2]$, $0 < \mu_2 < 1$, ならば $P_1(x, D)P_2(x, D) \equiv Q(x, D)$, $Q \in S_{1,1}^{m_1+m_2}$ である. $Q = \sum_{|\alpha| \leq \rho_2} \frac{1}{\alpha!} P_1^{(\alpha)} P_2^{(\alpha)} \in S_{1,1}^{m_1+m_2-\rho_2}$ である. 特に $P_1 \in A_{\rho_1}^{m_1}[M_1]$ ならば $Q \in A_{\min\{\rho_1, \rho_2\}}^{m_1+m_2}[M_1+M_2+\mu_1\mu_2]$ である.

補題 4.5 (cf [Hö]) $P \in A_\rho^m[M]$, $0 < \mu < 1$ ならば $P(x, D)^* = Q(x, D)$, $Q \in A_\rho^m[\frac{M}{1-\mu}]$, $Q = \sum_{|\alpha| \leq \rho} \frac{1}{\alpha!} D_\alpha^\alpha \partial_\alpha^\alpha \bar{P} \in S_{1,1}^{m-\rho}$ である.

補題 4.6 (cf. [Me]) $m \in \mathbb{R}$, $\mu > 0$, $p \geq 0$ とする。

(1) $T^\mu: S \rightarrow S[\mu]$ は有界である ($S = A_p^m$, C_p^m 又は $S_{1,1}^m$)。

(2) $I - T^\mu: A_p^m \rightarrow A_p^{m-p}$, $C_p^m \rightarrow C_p^{m-p}$, $S_{1,0}^m \rightarrow S^{-\infty}$ は有界である。

(3) $C_p^m \ni p \mapsto T_{\frac{p}{2}}^\mu - T_{\frac{p}{2}}^\mu \in S_{1,1}^{m-p-1}[\mu]$ ($\forall \alpha, \forall |\beta| \leq p$),

$j=1,2$, $C_p^m \ni p_j \mapsto T_{\frac{p_1}{2}}^\mu - T_{\frac{p_1}{2}}^\mu T_{\frac{p_2}{2}}^\mu \in S_{1,1}^{m_1+m_2-p}[\mu]$ 。

REFERENCES

[Doi] S. Doi, to appear in J. Math. Kyoto Univ.

[Be] M. Beals, "Propagation and interaction of singularities in nonlinear hyperbolic problems," Birkhäuser, 1989.

[Bo] J. M. Bony, *Calcul symbolique et propagation des singularités pour les équations aux dérivées partielles non linéaires*, Ann. Sc. Ec. Norm. Sup. **14** (1981), 209–246.

[D] N. Dencker, *On the propagation of polarization sets for systems of real principal type*, J. Funct. Anal. **46** (1982), 351–373.

[G] C. Gérard, *Réflexion du front d'onde polarisé des solutions de systèmes d'équations aux dérivées partielles*, C. R. Acad. Sc. Paris **297** (1983), 409–412.

[Hö] L. Hörmander, *Pseudo-differential operators of type 1,1*, Comm. Partial Diff. Eq. **13:9** (1988), 1085–1111.

[Me] Y. Meyer, *Remarques sur un théorème de J. M. Bony*, Suppl. ai Rend. del Circolo mat. di Palermo **II:1** (1981), 1–20.

[M1] S. Mizohata, "On the Cauchy problem," Academic Press, 1985.

[M2] S. Mizohata, *On the Cauchy problem for hyperbolic equations and related problems —micro-local energy method—*, in "Hyperbolic equations and related topics," Kinokuniya, 1986, pp. 193–233.

[T] Y. Takei, *A fine microlocalization and hypoellipticity*, J. Math. Kyoto Univ. **29** (1989), 127–157.